

lagttagelser, anstillede under Mæslinge-Epidemien paa Færøerne i Aaret 1846.

Af Cand. med. & chir. P. L. Panum.

Naar en Læge bliver kaldet til at virke paa et Sted, hvis klimatiske og diætetiske Forhold ere forskellige fra dem, han er vant til at see, saa bliver det hans første Opgave at studere alle de hygiejniske Potenser, der indvirke paa Befolkningens Sundhedstilstand. Det er jo disse hygiejniske Forhold, som bidrage til Udviklingen og Hyppigheden af nogle og Udelukkelsen og Sjeldenheden af andre Sygdomme, og som mere eller mindre modificere enhver Sygdoms Symptomer; det er jo dem, hvorpaa Sygdommens Geographi, hvis specielle Studium maaskee snart vil hæve den til en selvstændig Disciplin, beroer.

Da Mæslingernes Udbrud gav Anledningen til min Rejse til Færøerne, er det naturligt, at jeg nærmest havde min Opmærksomhed henvendt paa den Indflydelse, som Øernes højst ejendommelige hygiejniske Forhold udøvede paa denne Sygdom og vice versa. Men da jeg under mit næsten 5 Maaneders Ophold paa Færøerne gjentagne Gange berejste den allerstørste Del af Øerne, og langt mere end Embedsmændene ellers pleje, levede imellem de Indfødte, var jeg istand til ogsaa at anstille en Del lagttagelser over deres særegne hygiejniske Forholds Indflydelse paa Sundhedstilstanden i Almindelighed, saavel som paa de herskende Sygdommes Hyppighed og Udvikling. For at kunne levere en nogenledes fuldstændig Nosographi over Færøerne, vilde imidlertid et fleraarigt Ophold paa Øerne være nødvendigt; det, som jeg her kan meddele, ere kun nosographiske Momenter og Fragmenter, der maaskee kun forsaavidt kunne have nogen Interesse, som Færøernes Forhold i denne Henseende ere saa lidet bekjendte.

Jeg vil da her søge at fremsætte de ved Øernes Forhold særegne hygiejniske Potenser, og for hver især, saagodt som de lagttagelser jeg har kunnet anstille, tillade det, søge at eftervise den Indflydelse, som de udøve paa Indbyggernes Sundhedstilstand i Almindelighed, paa de forskellige Sygdommes Hyppighed, Udvikling og Fremtrædelsesmaade, samt paa Landets Mortalitets forhold, hvilket jeg tillige vil søge at oplyse nærmere ved statistiske Data, som jeg har samlet under mit Ophold paa Øerne. I et andet Afsnit vil jeg dernæst meddele nogle lagttagelser over Mæslingerne, forsaavidt som de synes at kunne have nogen almindelig Interesse for det medicinske Publikum.

Betragte vi da først Færøernes physiske Forhold og den Indflydelse som de udøve, saa vil man, som man kunde forudsætte, finde dem ret ejendommelige.

De 17 beboede Øer, hvoraf den største er c. 8, den mindste c. 1% Kvadratmil stor, ere adskilte ved Fjorde, hvori Atlanterhavets Østfald og Vestfald, der staaer i Forbindelse med Ebbe og Flod, paa mange Steder frem bringer meget heftige og farlige Strømninger. Øerne bestaae af vulkaniske Bjergmasser, der henhøre til Trapformationen, og som hæve sig til en Højde af 1-2- til 3000 Fod over Havet. Indad imod Fjordene hæver Landet sig terrasseformigt med en græsbegroet Skraaning, udad imod det aabne Hav derimod sædvanlig lodret.

Øernes Beliggenhed midt ude i Atlanterhavet, omtrent 6–7 Grader nordligere og 19-20 Grader mere vestlig end Kjøbenhavn, bestemmer for en stor Del deres Klima. I Sommer var Middeltemperaturen c. 8° R., og den skal sædvanlig om Sommeren være imellem 7 og 8° R.; endog ved Midsommerstid lægges der ofte i Kakkelovnen, og man retter sig hermed ganske efter Vejret, der er meget ustadigt. I 2 Dage havdes under mit Ophold imellem 16 og 17° R., og baade de Indfødte og Embedsmændene vare ved denne Temperatur nærvæd at forgaae af Varme. Men er det paa Færøerne om Sommeren mindre varmt end hos os, saa er Vinterens Kulde ogsaa i Reglen mindre streng, hvorhos dog Luftens Fugtighed ofte giver Anledning til Ansamling af betydelige Snemasser, hvis Nedrullen i Form af Lavinier paa mange Steder anretter Skade. Vindene ere overmaade ustadige og heftige; Vindstille og

en Storm, der kan omstyrte Huse, der nødsager dén Rejsende til at kaste sig ned paa Jorden for ikke at bortføres, ja, der formaaer at flytte Klippeblokke, skifte undertiden timevis. Omendskjøndt jeg ikke var i stand til at anstille hygrometriske Undersøgelser, kan jeg forsikre, at Luftens Fugtighed paa Færøerne er overmaade stor. De højere, ofte kegleformige, Fjeldtoppe ere næsten altid, de lavere Egne, Dalene, Kysterne og Fjordene meget ofte indhyllede i, ved deres skiftende Former interessante Taagemasser, og klar Luft hører til Sjeldenhederne.

Som en Følge af denne store Fugtighed, er Barometer standen sædvanlig lav, ja, viser ikke sjældent paa Jordskjælv, uden at paafaldende Naturphænomener indtræde; af samme Grund er Græsset næsten altid vaadt, og utallige Kilder og smaa Elve løbe med fra Bjergryggene. Søtaagen paa Færøerne synes at indeholde Saltpartikler i temmelig betydelig Mængde; derom vidner tydeligst den Salt kruste, som efter en længere Rejse i Baad, især ved taaget Vejr bedækker Ansigtet, selv om Havet har været saa stille, at intet Stænk er kommet ind i Baaden; i uroligt Vejr føres iøvrigt ogsaa det oppidskede Søvand selv i Form af Regn over Havfladen, og dets Saltgehalt rødmer da Huden og bedækker den ofte med en temmelig tyk Saltskorpe. Tordenvejr er sjældent, men Nordlys oplyse ofte de sædvanlig bælmørke Vinternætter.

Landets Vegetation indskrænker sig til Græs, smaa Urter, Byg og Kartoffler. Træer eller Buske trives slet ikke i det Fri, og selv de Forsøg, som enkelte Embedsmænd have gjort, for ved Hjælp af høje Indhegninger, kunstigen at fremelske Ribs- og Stikkelsbærbuske, Pile og Rønnebærtræer, have ikke givet noget meget glædeligt Resultat. Det synes mindre at være Temperaturen end den med Saltdele og andre Partikler af Søvandet blandede Taage, i Forbindelse med de heftige Vinde, som hindrer deres Væxt. Havet opskyller en Mængde Tangarter, hvoraf den haandformige Tang, der opskylles i stor Mængde, fortjener at nævnes, da den i Nødsfald bruges som Fødemiddel.

Det færøske Landskabs Karakter er næsten saa forskjelligt som muligt fra de venlige danske Prospekter. De beboede Pladser, der uden Undtagelse ligge tæt ved Havet, ere sædvanlig anlagte i en Dal, som paa 3 Sider er indesluttet af høje, terrasseformige, eller med jevn Skraaning sig hævende Fjelde, og som paa den fjerde Side er aaben ud imod Havet. Den mere flade og slette Del af Dalen er opdyrket til Marker, der dannes af smalle, ved Fordybninger adskildte Jordstrimler. Denne dyrkede Indmark, "Bøe" kaldet, bærer dels herligt Græs, dels Byg eller Kartoffler. Udenfor det Hegn, der omgiver Bøen, opad og imellem Fjeldene, ligger Udmarken, der indtager den allerstørste Del af Landet, og hvori Faarene og Køerne gaae frit omkring. Den er overalt bedækket med kort, men fint og smukt-grønt Fjeldgræs, med Undtagelse af de Steder ("Hamre") hvor den nøgne Klippe sænker sig lodret, og derved giver Bjergene deres terrasseformige Udseende, og af de ved Vandløb og Elve dannede Bjergkløfter og nøgne Furer. Da desuden Husene ere lave, dels opførte af Træ, dels af Jord og Kampesten, derhos altid tækkede med Grønsvær og spredte over hele Indmarken, saa kan man tænke sig, at dette for Buske og Træer aldeles blottede Landskab, hvis Hovedskjønhed er den grønne Farve, i Reglen hverken er meget imponant eller venligt. Kun faa af de beboede Pladser afgive ved Bjergmassernes Former eller ved Udsigten til andre Øer og kolossale Klippeblokke ude i Havet, eller ved Vandfald og sørige Sletter, et virkeligt tiltrækkende Perspekt, uden at det dog fornægter sin alvorlige, tungsindige Karakter. Inde i Landet, oppe paa og imellem Fjeldene, bærer Landskabet overalt, ihvor forskjelligt det saa kan være, et i allerhøjeste Grad melankolsk Præg. Oppe paa Højsletterne naaer Øjet inden for Horizontens Grændser ofte kun en, næsten for al Vegetation blottet, med Klippeblokke af den mest for skjellige Størrelse oversaaet Flade og hist og her, naar Taagen for et Øjeblik letter, en fjern nøgen Fjeldtop.

Paa andre Steder i det Indre af Landet seer man Dale, som omgivne af tildels nøgne, tildels græsbeegroede Fjelde, snart føre en liden Elv, snart indeslutte småe Søer, og hvis Jordbund sædvanlig er et af Tørvejord dannet Morads. Overalt hersker i disse Egne den dybeste Stilhed, som

kun bliver afbrudt ved Elvenes murmlende Lyd og Fugleskrig, hvis melankolske, ensformige Tone staaer i Harmoni med hele Landskabets triste Præg. De interessanteste, og ved deres imponante, højtidelige Karakter ofte højest tiltrækkende Landskaber findes ved de Ryster, som støde til det aabne Atlanterhav. Der fremtræde nemlig de lodrette Klippevægge, som kunne naae en Højde af 2000 Fod, beskyllende af den vældige Brænding, der i dem har dannet Huler, som ved deres Størrelse og højtidelige Halvmørke ere ligesaa imponante, som de ved deres skønne Kolorit ere tiltrækkende. Udenfor disse Klippevægge findes utallige Skjær og isolerede Klipper, sædvanlig "Drenge" kaldet, der ofte have de mest eventyrlige Skikkelser, idet de snart ligne Triumphbuer, snart kolossale Statuer, og som ofte naae en Højde af flere hundrede Fod. Baade de paa Toppen græsbeegroede "Drenge" og selve Klippevæggene tjene paa mange Steder, især i de saakaldte Fuglebjerger, utallige Søfugle til Bolig; disse Fugle, især Søpapagøjer, Alker, Lumviger og paa enkelte Steder Maager, sidde ligesom paa Hylder, der ere frembragte ved Bjergmassernes Schichtning, helt op ad Klippen og deres Vrimmel og Skrig opliver Scenen.

Læseren bedes at undskylde, at jeg i denne Skildring har været mere vidtløftig, end det her maaskee synes at være passende, men jeg troer, at alle de anførte Forhold, navnlig ogsaa Landskabets Karakter, har en let efterviselig og ikke ubetydelig Indflydelse paa Færingernes Sundhedstilstand, og at denne Indflydelse først bliver ret anskuelig ved en noget udførligere Skildring af Forholdene.

Hvad for det Første angaaer det omtalte raa og kolde Klima, da vilde man allerede a priori kunde slutte sig til, at det maatte fremavle mange rheumatiske Tilfælde, som i Virkeligheden ogsaa ere meget hyppige. Jeg har under mit Ophold seet overmaade mange Tilfælde af fixe saavelsom af vage rheumatiske Smerter, flere rheumatiske Hydarthri og af dem senere udviklede Tumores albi, mange Hjertesygdomme og enkelte Paralyser, der syntes at være af rheumatisk Oprindelse, og nogle Gange rheumatisk Feber. Efter Mæslingerne vare saavel Diarrhoer, som heftige Koliksmarter meget hyppige, og ofte opstod samtidig hermed Brækning og en betydelig Prostration af Kræfterne, ganske som i den saakaldte danske Cholera. Disse Tilfælde opstode, naturligvis i forskjellig Grad, næsten hos alle Mæslingepatienter, der for tidlig havde udsat sig for Forkølelse, og de forsvandt ofte ligesaa hurtigt som de kom, naar et passende Regimen tilligemed de Medikamenter, som det enkelte Tilfælde indicerede, blev bragt i Anvendelse, hvorimod de, især Diarrhoerne, ved en upassende Diæt bleve kroniske; og det er neppe nogen Tvivl underkastet, at de i de fleste Tilfælde i Begyndelsen vare af rheumatisk Oprindelse.

Det er saa meget mere naturligt, at alle Slags rheumatiske Affektioner paa Færøerne ere særdeles hyppige, som Indbyggernes Beskjæftigelser, især om Sommeren, nødsage dem til at tilbringe den største Del af Dagen i fri Luft, og deres Klædedragt, der er ens for Sommer og Vinter, ikke i alle Henseender er hensigtsmæssig. Deres Fodløj bestaaer saaledes i lange Strømper og et Slags Sko eller Sandaler, som de sye sammen af et Stykke Lammeskind, og som ere saa tynde, at Saalen ofte slides op paa en Dag. Saasnart de derfor komme ud og gaae i det vaade Græs eller paa den sumpede Jord, eller giennevade Elve, faae de vaade Fødder. De ere heri mod saa ligegyldige, at de sædvanlig undlade at skifte Fodtøj, selv naar de have Lejlighed dertil. Hos mange, især ældre Mænd er, da de ofte ikke bruge Seler, Midten af Underlivet kun bedækket af den uldne Skjorte, som iøvrigt næsten Alle bære nærmest Roppen, idet Vesten eller Trøjen foroven og Knæbuxerne forneden ikke slutte til hinanden.

Ogsaa at kroniske Affektioner af Bronchialslimhinden ere hyppige, kunde man allerede formode ved de beskrevne klimatiske Forhold. Kronisk Bronchitis hører uden Tvivl til de hyppigste Sygdomme paa Færøerne, hvortil ikke blot den raa kolde Luft, men ogsaa de i Taagen suspenderede Saltpartikler, der selv paa Huden kunne fremkalde Erythem hos den Uvante, synes at bidrage meget. Denne Sygdom varer, ofte saa længe, at Patienterne døe af den under hektiske Symptomer, og den synes

efter de Oplysninger jeg har kunnet faae, at være en af de hyppigste, maaskee endog den hyppigste Dødsarsag hos ældre Folk paa Færøerne. Vel forekommer Skrophulosen i dens forskjellige Former paa Færøerne, og den dermed beslægtede Tuberkulose er heller ikke ganske ubekendt deroppe, men begge ere dog i al Fald temmelig sjeldne Sygdomme, hvilket jeg for Tuberkulosens Vedkommende troer at kunne slutte deraf, at jeg, som under mit Ophold vist har stethoskoperet flere hundrede Patienter, kun har truffet 2 Tilfælde, hvor de stethoskopiske Tegn med Sikkerhed lode mig diagnosticere Phthisis. Derimod har jeg seet et betydeligt Antal af Patienter, som aabenbart ifølge en kronisk Bronchitis vare hektiske; herfor talte idetmindste Stethoskopien og Sygdommens Gang, ihvor vel jeg desværre ikke kunde faae det klareste Bevis ved at foretage Obduktioner, da Færingerne paa ingen Maade vilde tillade dem. Da Intermittens, som vi senere skulle høre, saavidt vides, er en for Færøerne aldeles fremmed Sygdom, kunde man bruge Boudins Paastand om det antagonistiske Forhold imellem Intermittens og Phthisis som en Indvending imod os, idet man herefter skulde troe, at Phthisis var meget hyppig deroppe; og ved første Øjekast kunde det virkelig synes at være Tilfældet, naar man nemlig ikke distingverer imellem virkelige Phthisiske og Patienter som ere hektiske ifølge en meget kronisk Bronchitis. Men Luftens store Fugtighed, der her ikke skyldes Jordbunden men det omkringliggende Hav, og hvis Dunster derfor ikke indeholde de Tilblandinger, som karakterisere Sumpluften, men tvertimod Klor- og Saltpartikler o. desl., kunde vel tænkes samtidig at modvirke Udviklingen af Intermittens, der bedst trives i en ved sumpet Jordbund fugtig Luft, og af Phthisis, der er fordærligst for tørre og støvrige Egne – selv naar vi ikke tage Hensyn til de Modsigelser, som Boudins rigtignok paa store Tal støttede Paastand har fundet. Om det imidlertid mest skyldes Klimaets eller den for største Delen animalske Kysts Indflydelse, at Skrophler og Tuberkler synes at være saa sjeldne paa Færøerne, er for Tiden vist vanskeligt at afgjøre. – At Brystaffektioner, navnlig kronisk Bronchitis, vare langt hyppigere under mit Ophold paa Færøerne, da Mæslingerne grasserede, end sædvanlig, er naturligt. Ved at opstille hin Paastand om Hyppigheden af Bronchitis som Sygdom og Dødsarsag paa Færøerne, har jeg derfor ikke taget Hensyn til de Tilfælde, hvor Mæslingerne vare Brystaffektionens Udgangspunkt, og jeg støtter mig ved den kun paa de mangfoldige Tilfælde, som jeg har iagttaget, hvor Sygdommen ikke stod i Forbindelse med Mæslingerne, og hvor der ikke fandtes Tegn paa Tuberkulose i Lungerne, i Forbindelse dermed, at der blandt de i Kirkebøgerne opgivne Dødsarsager, neppe findes nogen saa hyppig som "Brystsyge". Lang sjeldnere var, idetmindste under Mæslinge-Epidemien, Pneumoni; jeg har deraf kun seet eet Tilfælde, som dog ikke frembød tydelige stethoskopiske Tegn, men hvor det glutinøse Expektorat, hvoraf jeg udvaskede de Remakske fibrinøse forgrenede Bronchialkoagler, ikke lod mig tvivle om Diagnosen Rigtighed.

Hvorvidt de paa Færøerne saa overmaade hyppige Menostasier, som have hele de hysteriske Affektioners Hær i deres Følge, skyldes Forkølelser ved det raa og kolde Klima, og ved de vaade Fødder, som ogsaa Fruentimmerne faae saa jevnlig, især ved at gaae ud i Fjeldene for at malke Køerne, eller om de skyldes den megen Stillesiddende, der falder i de fleste færøske Fruentimmers Lod, tør jeg ikke afgjøre med Bestemthed, men det første forekommer mig sandsynlig at være den hyppigste Aarsag. Det tør, som endnu en Aarsag til Forkølelser, ikke forbigaaes med Taushed, at de færøske Fruentimmer aldrig gaae med Underbenklæder.

Vilde man skrive nogen af de paa Færøerne temme lig hyppige Hudsygdomme paa Klimaets Regning, saa maatte det være Urticaria og Psoriasis. Den sidste Affektion er paa Norderøerne ikke sjelden, dog har jeg kun seet den hos Mandfolk og især paa Underextremiteterne.

Dette kunde lede til den Formodning, at Saltvandets Indvirkning paa Huden bærer Skylden, saameget mere som netop Norderingerne tumble sig mest paa Søen. At Saltvandets Virkning, hvad enten saa den skeer ved selve Sø vandet eller ved Taagen, ikke er uden Indflydelse paa

Hudsygdommes Oprindelse, derpaa havde jeg et Exempel paa mig selv, idet jeg, hvergang jeg gjorde en Omrejse, som varede et Par Uger, fik en Blanding af Urticaria og Eczema paa Hænderne, der især i Varmen voldte en utaalelig Kløe, og som hver Gang forsvandt, naar jeg i nogle Dage opholdt mig paa eet Sted, og da endte med Deskvation. Hvorvidt de betydelige Abnormiteter i Deskvationen efter Mæslingerne, især dens navnlig hos Mænd¹ paafaldende Langvarighed, og Udviklingen af andre Hudsygdomme efter Deskvationen skyldtes samme Indvirkning, skal jeg lade være usagt.

Da det er eftervist, at Sindssygdommens Hyppighed ellers staaer i lige Forhold til Kulturen, og de med den følgende sociale Kollisioner, saa skulde man vente, at de paa Færøerne vare overmaade sjeldne, da Kulturen der vist ikke har naaet noget højt Trin, og de sociale Sindet opirrende Kollisioner ved de patriarkalske Forhold, som der herske, forholdsvis ere saa faa. Men tvertimod, der er maaskee neppe et Land, ja maaskee ingen Hovedstad, hvor Sindssygdomme ere saa hyppige i Forhold til Folkemængden som paa Færøerne. Desværre er jeg for Øjeblikket ikke istand til at meddele sikre statistiske Data over dette Forhold ², men jeg har været i de fleste Bølgder paa Øerne og kan forsikre, at der i de allerfleste Pladser som beboes af 100–200 Mennesker, findes en eller flere Sindssvage, og jeg troer ikke at overdrive ved at antage, at idet mindste 1 pCt. af Befolkningen paa Færøerne er sindssvag. Dette er saa meget mere paafaldende, som Færingerne i Almindelighed udmærke sig ved fortrinlige Aandsevner. Derhos iagttages en mærkelig Overensstemmelse i Sygdommens Form. Hos Mange er det stille religiøst Vanvid, hvor de Syge have Syner, og troe at leve i umiddelbart Samkvem med Aandevederen, Kristus, den hellige Aand, Guds Moder o. s. v.; maaskee endnu flere Syge troe sig besatte af en ond Dæmon, som uvilkaarlig tvinger dem til at handle imod deres bedre Viden og Villie, hvorhos de da, medens de ere urolige, slaae og ødelægge deres Omgivelser og senere hensynke i en melankolsk angerfuld Grublen. Begge Former synes temmelig hurtigt at gaae over til Fatuitet, der iøvrigt hos Andre er medfødt og hos atter Andre først kommer tilsyne i Pubertetsperioden.

Naar jeg forhen saa udførlig beskrev det færøske Landskab, saa skete det især, fordi jeg holder mig næsten overbevist om, at det Indtryk, som Landskabets Karakter i Forbindelse med den hyppige Taage, gjør paa Sindet, er den vigtigste prædisponerende Aarsag til Sinds sygdommenes Hyppighed paa Færøerne. Uden at indlade mig paa at forsøge at drage en Parallel med Alpernes Kretinere, skal jeg blot her tillade mig at gjøre opmærksom paa et Par Omstændigheder, som tale for min Anskuelse. – Det er for en uhildet iagttagelse umiskjendeligt, at Landskabets Karakter hos Færingerne saa at sige afspejler sig i Nationalkarakterens Gemytsside.

Vel giver den physiske og psykiske Kraftanstrengelse, som Bjergnaturen altid fordrer af sine Beboere, og som paa Færøerne desuden Kampen imod det oprørte Hav gjør nødvendig, Færingen den samme Livlighed, Tænksomhed og Opvaktethed, som karakteriserer de fleste Beboere af Fjeldegne; men dog er der altid udbredt en vis Alvor over Færingen: overladt til sig selv er han indadvendt, og selv hans Lystighed bærer, om den end undertiden er forbunden med en Larm der ligner Havets Brusen, et højst monotont og ofte næsten melankolsk Præg.

I sine Meningsyttringer er han sædvanlig tilbageholdende og ikke oprigtig; ofte er han hul som hans Klipper. Det ved Naturforholdene bevirkede isolerede Samliv og fælleds Farer, bidrager vist meget til at styrke den Anskuelse, at alle Mennesker ere Brødre, og det tjener Færingerne til Ros, at de vise denne Anskuelse i Gjerningen. Medfølelse vækkes meget let i Færingens Gemyt, og ”af kristelig

¹ Hos en Mand saae jeg endnu i 11te Uge tydelig Deskvation efter Mæslingerne paa Hænderne, Albuerne og over spina tibiae, hos Flere var den endnu i temmelig stærk Grad tilstede 7 Uger efterat Exanthemet var forsvundet.

² Dr. Hübertz's Angivelse, at der paa Færøerne blandt 277 Individuer findes 1 Afsindig er aabenbart altfor lav, og dog er ogsaa, efter den af ham meddelte Oversigt, Forholdet næsten dobbelt saa ugunstigt for Færøerne som for Kjøbenhavn.

Barmhjertighed" er han næsten altid villig til at yde den Trængende redebon Hjælp, det være ved Arbejde, Levnetsmidler, Klæder eller Penge, ihvor høj Pris han end plejer at sætte paa disse Ting.

Det grandiose Præg, som det færøske Landskab saa ofte bærer, og den magiske Virkning, som Taagen, Skyerne, Brændingen, Vandfaldene, Klippehulerne o. s. v., uvilkaarlig gjør paa ethvert aabent Gemyt, maa hos hvert følende og tænkende Menneske vække Tanken om Guds Almagt og Menneskets Ubetydelighed, det maa vække og nære en religiøs Stemning. Denne findes i høj Grad næsten hos alle Færinger, men desværre maa man tilstaae, af den, vistnok for en stor Del ved de tidligere Præsters Indflydelse, ofte grændser til Bigotteri, og fremtræder som Skinhellighed; saaledes føres Guds og Kristi Navn altid i Munden; at forrette hvilket som helst Arbejde om Søndagen betragtes som en stor Synd; at bivaane Gudstjenesten og flittigen at nyde Alterets Sakramente er derimod, efter deres Mening, et Gud særdeles behageligt Værk; og Præsten ansees som et højere med Guddommen nærmere beslægtet Væsen, ihvor misunde lige de end pleje at være paa hans Indtægter. Ogsaa deres Frihedsfølelse og Stolthed, der kraftigt protesterer imod ethvert Afhængighedsforhold, og som nødsager Embedsmanden til at bede, ja trygle, betale og takke, hvergang han trænger til en Færings Tjeneste, synes idetmindste tildels at staae i Forbindelse med Landets physiske Beskaffenhed, da man jo finder det samme hos de fleste Fjeld- og Kystbeboere. – Noget, som iøvrigt endnu mere taler for et ubevidst Indtryk af den omgivende Naturs Karakter paa Sindet, er den Forskjellig hed der findes imellem de forskellige Egnen, ja imellem de enkelte Bølgders Beboere i den Henseende, og som staaer i Harmoni med den Karakter, som Egnen eller Bølgden har. Herpaa kunde jeg anføre mange højst paa faldende Exempler, f. Ex. Norderingernes Forskjellighed fra Sandingerne og Suderingerne, Tjørnevigernes særegne Præg o. s. v., men det vilde blive for vidtløftigt her nærmere at gaae ind derpaa, og det vilde dog neppe kunne gjøres ret iøjnefaldende for den, som ikke er bekendt med Lokaliteterne. –Tager man derhos den Overensstemmelse i Betragtning, som findes i den Maade hvorpaa Sindssygdommene ytre sig hos Færingerne, og den Harmoni, som findes imellem det Præg som Sindssygdomme have, og det Indtryk, som det færøske Landskab uvilkaarlig gjør paa Sindet, saa troer jeg, at man vil være enig med mig i, at de ejendommelige Naturforhold sandsynlig er den vigtigste prædisponerende Aarsag til Færingernes Sindssygdomme, hvorhos maaskee ogsaa den sædvanlig meget lave Barometerstand i denne Henseende er af Vigtighed.

Som Momenter, der synes dels at udvikle denne Disposition, dels at give Lejlighedsaarsag til Sygdommens Udbrud, troer jeg, kommer især følgende, ved sociale Forhold fremkaldte Omstændigheder i Betragtning.

Den af Lucas Debes i hans Færoea reserrata udtalte Anskuelse, at Djævelens Anfægtelse og Satans Blændværk ved Huldemænd, Nisser og Havfruer, ved Kristendommens Magt vel var bleven sjældnere end i gamle Dage, men dog endnu (1650) langt fra var ophørt at spøge, hvorpaa han anfører mange, af egen Erfaring henlede Exempler, der tillige vise, hvilken Magt en gudfrygtig Præsts Bøn har til at tilintetgjøre Fandens Kogleri, lever endnu i Folket, kun med den Forandring, at de mere Oplyste troe, at Kristendommen i vor Tid er bleven saa mægtig, at Huldefolk o. desl. nu ikke mere vove sig op paa Jordens Overflade, og at Præsterne ikke mere oplæres saa godt som før i "den sorte Skole" i Kjøbenhavn. Endnu for ikke ret mange Aar siden skulle færøske Præster, sandsynlig fordi de følte sig smigrede ved at nyde en mere end menneskelige Anseelse, ved formelige Taskenspillerkunster have søgt at dupere Folket, ved Spaadomme og Besværgelser have søgt at indbilde Indbyggerne, at de stode i umiddelbart Samkvem med højere Magter, og at de ved Troldom kunde helbrede Syge. Endnu den Dag idag komme Bønderne jevnlig til Præsterne, og byde dem Betaling for at skaffe Folk eller Børn tilbage, som have forvildet sig i Fjeldene, eller for at gjøre deres Indflydelse hos højere Magter gjældende til Bedste for en kjær Syg. Men jeg skylder tillige Sandheden at sige, at

ingen af de nuværende færøske Præster bestyrke Almuen i Overtro eller Bigotteri, men som man kunde vente af oplyste Mænd, efter bedste Evne ved Ord og Gjerning modarbejde dem. Færingernes Tilbageholdenhed og Mangel paa Oprigtighed imod Danske er uden Tvivl bleven forøget og næret derved, at der i senere Tid, af med Forholdene ikke tilstrækkelig bekjendte Personer, er skrevet saa meget om Færingernes Forurettelser med Hensyn til deres Sprog, Skolevæsen o. s. v., men ligesaa vist er det, at dette Karaktertræk ikke er bleven fremkaldt derved.

Brændevinsdrik er egentlig ikke bleven almindelig paa Færøerne, kun Faa, som da ere afgjorte Drankere, bruge den diætetisk, men ved højtidelige Lejligheder eller paa Rejser drikkes meget store Kvantiteter af en, ved Handelens Omsorg rigtignok temmelig tynd Brændevin. Naar man imidlertid kun tager Hensyn til de deklarerede Drankere, der som sagt ere sjeldne paa Færøerne, saa troer jeg, at en nøjagtigere Undersøgelse end jeg har kunnet anstille derover, vil vise, at blandt de færøske Drankere et relativt større Antal bliver afsindig end hos os, Noget som vilde tale for en Prædisposition hos Færingerne til Sindssvaghed, der da vel nærmest maatte tilskrives Naturomgivelsernes Indflydelse.

Onani skal, ifølge en med Forholdene nøje bekjendt Embedsmands Forsikring, ikke være sjelden paa Færøerne. Blandt andre kan jeg meddele et Exempel, hvor en Moder, der, da hendes Søn ønskede at gifte sig, fraraadede ham dette, og som Surrogat lærte ham at onanere. Dette drev den Ulykkelige derefter i den Grad, at han blev sindssvag, og i lysere Øjeblikke forbandede han sin Moder med de frygteligste Eder: "fordi hun havde spildt bort hans Livsens Olie." Ihvorvel det, at Forholdene ofte ikke tillade attraaede Giftermaal, og Udsvævelser med det andet Rjøn ofte forekomme den betænksomme Færing for vovelige, tildels kunde forklare denne Kjønsdriftens abnorme Retning, saa forekommer det mig ikke ganske usandsynligt, at den Sindsstemning, som Naturens ubevidste Indtryk frembringer paa Indbyggerne, kan give et Slags Prædisposition til denne Last, der da igjen baade udvikler en tilstedeværende Disposition til Sindssyg domme, og bliver et vigtigt okkasionelt Moment til deres Udvikling. Dog er det naturligvis umuligt at afgjøre, om denne Last er almindeligere paa Færøerne end i Danmark.

Vende vi os efter denne lille Digression til de ved Færingernes Levemaade betingede hygiejniske Forhold, saa ere de ikke mindre afvigende fra vore, end de foroven omtalte fysiske Forhold ere det.

Hvad for det første Kosten angaaer, da have Færingerne 3 Hovedmaaltider: Morgenmad Kl. 8—9, Døvre Kl. 12—2, og Nøttere eller Aftensmad Kl. 9-10 om Aftenen. Om Morgenens spises Mælk, oftere sur end sød og dertil "Drujl" og "Skjærpekjød". "Drujl" er usyret Bygbrød, der i Reglen bages Aftenen førend det skal bruges, men af Nogle foretrækkes varmt, og da tilberedes om Morgenens, kort førend det spises. Det æltes af Mel og Vand og formes til c. 1 Fod lange, runde, 1—3 Tommer tykke Stokke, der sædvanlig kun bages ved at lægges paa hed Aske og Gløder; kun Faa bage det paa Rist. Ved denne Fremgangsmaade brændes Skorpen, men Dejgen indvendig forbliver oftest næsten aldeles, raa. I Slagtertiden bruges, især af de Uformuende, kogt Lammeblod istedetfor "Drujl". "Skjærpekjød" er vindtørret Lammekjød. Om Efteraaret indfanges nemlig de til Slagtning udsete Lam og Faar, og paa en Gang eller dog saa hurtigt som muligt, slagter hænges uden nogensomhelst Præparation op til Tørring i et Udhus. Om man end vil tillægge de i Taagen suspendere Saltpartikler nogen Indflydelse ³. til at konservere Kjødets, saa maa det dog gennemgaae en betydelig Grad af Forraadnelse, der imidlertid er forskjellig efter det Vejr, som indtræffer om Vinteren, inden det bliver tørt. Ved Fastelavnstid plejer Skjærpekjødet at være tjenligt; det skjæres da, medens det spises, i smaa Stykker, og spises raat til Druilen. Ud paa Sommeren opfyldes Skjærpekjødet med Mider, som

³ Stor kan denne Indflydelse ikke være, da det er en Erfaring, at Skjærpekjødet bliver desto mere stramt, jo mere taaget Vejret er, medens det hænger ude, endog efter at det er tørt.

endmere forøge dets stramme Lugt og Smag ⁴ Døvren eller Middagsmaden bestaaer af 2 Retter. Den ene Ret er sædvanlig Suppe, d. e. Bygmel eller Byggryn kogt med Vand og med en god Tilsætning af "Baut", d. e. alle Slags fede Varer, helst harsk Tælle eller andet harskt Fedt. Sjeldnere bruges Grød, hvori da altid ogsaa koges en god Del Baut; den spises helst med sur Mælk.

Til den anden Ret, som imidlertid spises først, hører, naar det kan have, "rast" d. e. halvraaddent Rjød eller Fisk. Den samme Methode til at konservere Rjødet, som anvendes ved Lammekjødet, bruges nemlig ogsaa for Grindekjød⁵), Fisk og Fuglekjød; Alt hænges uden nogen Præparation ved Saltning, Røgning eller desl. Uden videre op til Tørring. I det flere Maaneders Mellemrum, da Kjød (eller Fisken) hverken er friskt eller vindtørt, kaldes det "rast", hvilket Ord ikke lader sig oversætte anderledes end ved "halvraaddent", et Prædikat, som det ogsaa tilfulde fortjener, naar man tager Hensyn til den afskyelige Stank det udbreder, til dets ubehagelige mugne Udseende, og dets idetmindste ikke sjeldne Befolkning af Maddiker. Dette "raste" Kjød koges sædvanlig før det spises, dog foretrække Nogle at spise det raat, især naar den Tid nærmer sig, da det er bleven nogenledes vindtørt. Jeg har seet en hel Baads Mandskab (8 Mand) med stor Appetit spise Grindekjød i raa Tilstand, om endskjøndt det var saa raaddent, at Stanken deraf generede mig i aaben Baad, og at Baadens Bund paa somme steder var hvid af de Insektlarver, som dels vare krøbne, dels pillede af Kjødet. I Mangel af "rast" Kjød eller Fisk spises Skjærpekjød, eller "Grindetvist" d. e. vindtørret Grindekjød eller tør Fisk, og da altid i raa Tilstand. Aftensmaaltidet (Nøttene), som Færingerne pleje at indtage umiddelbart førend de gaae til Sengs, er egentlig Hovedmaaltidet, og bestaaer altid i i varm Kjødmad, helst frisk Kjød eller Fisk, jo federe desto bedre, dertil sædvanlig Kartofler. I Mangel affrisk Kjød eller frisk Fisk, som kun have i Slagtetiden eller naar de samme Dag have været paa Fuglefangst, Jagt eller Fiskeri, bruges kogt "rast" Kjød eller "rast" Fisk med saltet Grindespæk til. Som Drik under og efter Maaltidet bruges kogt Mælk, som gjerne er skilt ad ved Løbe eller Eddike, eller ogsaa en Blanding af sød og sur Mælk eller den forhen omtalte Suppe. Mærkeligt er det, at f. Ex. Hønsekjød vrages af de fleste Færing. Højtidsretterne, saasom Knytlunger, d. e. kogte Fiskefrikadeller, Skindsekjød, d. e. først kogt, senere saltet og derpaa tørret Lammekjød, Steg af alle Slags, kogt eller saltet Oxe- eller Svinekjød, adskilt Mælk, kogt med Rosiner og Krydderier, kogte eller stegte Muslinger (mutilus) og Flier (patella), Ærter, Risengrød, kogte Æg, Pandekager, Cakes, Skonroggen, Rugbrød, Rugdrujl og fint Hvedebrød komme mindre i Betragtning, da end ikke de Rigeste nyde slige Rariteter til daglig Brug. Til de færøske Slikkerier henhøre især de meget yndede Kvanner, d. e. de skrællede Stilke af Angelica archangelica. De spises sædvanlig uden noget Andet, men undertiden af de Rige med Sukker og Fløde, som Jordbær hos os. Børnene spise desuden gjerne Syrer, der voxe vildt. Tobak bruges ogsaa af Fruentimmerne; den ryges af fingerbølstore Kridtpiber. Kaffe bruges i Reglen kun af de Riger, men ved Handelsstederne ere ogsaa mange Fattige saa at sige forfaldne til dens Brug. Brændevinens Brug have vi forhen berørt. Vin nyder vel ingen Færing til daglig Brug, men ikke sjelden bruges den som et Universalmiddel i Syg domstilsfælde, ligesom "hjertestyrkende Draaber" d. e. liq. anodynus Hoffm. o. desl., der af et overmaade stort Antal Fruentimmer næsten nydes diætetisk.

En saadan Kost vil vist enhver Dansk ansee for meget usund, om ikke af anden Grund, saa fordi man er tilbøjelig til at ansee den Kost, man er vant til, for den sundeste og bedste. Færingerne finde det imidlertid lige saa modbydeligt, at vi f. Ex. spise gammel norsk Ost, som vi at de spise halvraaddent

⁴ Endog Embedsmændene pleje temmelig snart at vænne sig til Skjærpekjød, og finde det da ofte delikat. Jeg kunde imidlertid paa ingen Maade finde Behag i denne Kost, som var mig saa modbydelig, at jeg fik Kvalme deraf.

⁵ Grinden er en Art Delphin, der i store Flokke, fra 100-1000 Stykker, svømmer omkring Landet, og som, naar en Flok forvilder sig ind i en Fjord, drives op paa Land og dræbes; et saadant Grindedrab er Færingens største Lyst.

Grindekjød o. desl., de finde det sædvanlig ligesaa urimeligt, at vi fordærve vort gode Lammekjød ved at salte det, som vi at de lave Skjærpekroppe deraf.

Endnu mere finde vi os bestyrkede i vor Anskuelse, at den færøske Kost er usund, ved at undersøge de forskellige færøske Fødevarers physiologiske Virkning, som vi nu i al Korthed ville gennemgaae.

Det friske eller endog varme, usyrede og næsten raa Brød (Drujl) er endnu langt mere tungfordøjeligt end friskbagt Rugbrød. Det er vist ikke uden Indflydelse paa de baade hos Mandfolk og Fruentimmer, men især hos de sidste, som sidde mere stille, saa hyppige Dyspepsier i Forbindelse med Kardialgi ("Ondt forHjertet") og Pyrosis. Det "raste" Kjød af alle Slags bevirker ogsaa undertiden Kardialgi og Pyrosis, men en konstantere Virkning deraf, naar det nydes i Mængde, er Diarrhee. Da Fuglefangsten finder Sted ved Midsommerstid, saa bliver Fuglekjød det ud paa Efteraaret naturligvis "rast"; deraf bliver det forklarligt, at, som en troværdig og med Forholdene nøje bekendt Færing har forsikret mig, Beboerne af Widerø og alle de Pladser, som have megen Fuglefangst, fremfor andre Bøjgder om Efteraaret og ud paa Vinteren lide meget og næsten almindeligt af yderst langvarige og udmattende Diarrheer. Ogsaa naar der er faldet Grind i en Bøjgd, pleje, ifølge paalidelige Mænds Forsikring, Bøjgdens Indbyggere, som faae det meste Grindekjød, at lide af Diarrheer, saalænge de have frisk eller "rast" Grinde kjød. Det ganske magre Rjød af Grinden smager iøvrigt som grovt Oxekjød og kan, tilberedet saaledes som vi pleje at behandle dette, afgive en god Føde, men Færingerne spise foruden det Magre, en god Del Spæk til, og kun en forholdsvis ubetydelig Kvantitet af Kjød spises, medens det er nogenledes friskt. Ogsaa "rast" Fisk frembringer Diarrhee. Det er iøvrigt naturligt at, da den Forraadningsgrad, som det til Tørring ophængte Kjød naaer, er afhængig af Vejrliget, disse Diarrheer, der sædvanlig grassere om Efteraaret, ere stærkere og komme tidligere, naar Sommeren og Efteraaret ere usædvanlig fugtige og dog ret varme, saaledes som det var Tilfældet i Sommeren 1846, der var den fugtigste, som de ældste Folk paa Færøerne kunde mindes. Det friske Kjød ansees for at være desto bedre, jo federe det er.

Helleflynder falder temmelig hyppigt, og Leveren i Sei og Torsk, der som bekendt er meget fed, gjælder for den bedste Bid. Denne Mængde Fedt kan ikke andet end ligeledes virke afførende, og hos Personer, som have en svag Mave og sidde meget stille, fremkalde Forstyrrelser i Fordøjelsen. Det vindtørre Kjød med sin stramme Smag og Lugt, kan just heller ikke henregnes til de letfordøjelige Fødemidler. – Ved at nyde sur Melk strax om Morgen, og ved paa de besværlige Fjeldtoure at drikke iskoldt Elvvand i betydelige Kvantiteter, Noget som kun Faa vogte sig for, maa ofte give Indbyggerne Anledning til Forkølelse af Tarmkanalen. "Kvanner" frembringe altid, naar de nydes i Mængde, Brænden bag i Svælget, omtrent som Radix Senegæ, Kardialgi, Pyrosis, Kvalme, Brækning, Diarrhee, almindeligt Ildebefindende og Saar paa Læberne eller i Munden. Den udvendige Skæl af disse Stilke, der vel skrælles før de spises, men langt fra altid med tilbørlig Omhu, er et saa stærk Rubefaciens, at det er meget almindeligt at see Saar, psoriasisagtige Pletter og Erythemer paa Børnenes Arme og Ben, som opstaae naar de i fugtigt Vejr gaae ud at plukke Kvanner.

Men naar disse Næringsmidler virke saaledes paa den sunde Organisme, saa er det saameget mere indlysende, at de under og efter enhver hidsig Sygdom maa være skadelige. Dette havde man især Lejlighed til at iagttage under Mæslingeepidemien, thi Mange vedbleve til Trods for alle Advarsler baade under og efter Mæslingerne, at bruge deres sædvanlige Rost. Hertil bidrog dels Vanens Magt, der er saa stor, at Indbyggerne foretrække deres sædvanlige Kost for enhver anden, og pleje at ansee den for den sundeste i alle Tilfælde, dels Mangel paa Evne til at forskaffe sig mere passende Føde midler. Den uformuende Færing fortjener nemlig i Reg len netop saa meget som han skal fortære den følgende Dag; kun af "rast" eller tør Fisk og Grindekjød har han sædvanlig et lille Forraad, men af Korn, især om Sommeren, sjældent mer end #–1–2 Skjepper; og uformuende kan man kalde den største Del af Befolkningen.

Ihvor betydelige Offre Fattiggasserne end i Sommer maatte bringe, saa tillod hverken de Trængendes store Antal eller deres afsides liggende Boliger, at Alle fik betimelig Understøttelse. Naar da det ringe Forraad af Korn, som ved Sygdommens Udbrud forefandtes i Huset, var opbrugt til Bygsuppe og desl., medens maaskee samtlige Beboere paa engang havde Mæslinger, saa maatte de under Rekonvalescensen ty til deres sædvanlige Kost.

Mange kunde ikke engang under Mæslingerne have Byg eller Havresuppe, men maatte nøjes med, sædvanlig sur, Melk ; Andre, som havde Sygdommen mildt, benyttede hele Tiden uforandret den sædvanlige færøske Kost.

Efter Mæslingerne fandt de sædvanlig saameget mere Indikation for "rast" Kjød og Fisk, for Fedt og dygtig harsk "Baut" i Suppen, som de følte sig svage og syntes at trænge til noget Styrkende, hvorhos de ansaae den stærkest smagende og mest tungfordøjelige Føde for den mest styrkende. Intet Under var det da, at Pluraliteten efter Mæslingerne kom til at lide af meget langvarig (ofte flere Maaneder vedholdende) og ofte ved Kræfternes Svinden farlig Diarrhee. Det forekommer mig meget sandsynligt, at den Betændelse, som under de exanthematiske Febre findes i de Peyerske Kirtler, ved Fødemidlernes irriterende Virkning hos Mange er gaaet over i Ulceration, ihvorvel jeg af den foroven anførte Grund ikke har kunnet overbevise mig derom ved at foretage Obduktioner. Exkrementernes slimede, ofte lysegule og lugtløse Beskaffenhed tilligemed Diarrheernes Langvarighed, og det med dem forbundne betydelige Tab af Kræfter, talte imidlertid stærkt nok for denne Anskuelse. At Forkølelser ofte gave først Anledning til Diarrheernes Optraeden, som forhen er anført, taler ikke herimod.

I Almindelighed kan jeg forsikre, at de gastriske Tilfælde, og især Diarrheerne, som optraadte efter Mæslingerne vare almindeligst i de fattige Børgdelag, som især leve af Fiskeri, saavelsom i dem, hvor der var faldet Grind, samt at de mest Formuende og Oplyste i hver Børgd, som kunde og vilde holde sig den foreskrevne Diæt efterrettelig, bleve ganske forskaanede for denne ubehagelige Eftersygdom eller dog kun for en kort Tid, efter en begaaet Uforsigtighed, have lidt af den, hvorimod den var desto almindeligere og værre, jo mere fattige og uoplyste Beboerne af et Hus vare.

Foruden den anførte skadelige Virkning, som de færøske Alimenter udøve direkte paa Tarmkanalen, fortjener det at anføres, at Hæmorrhoider, Plethora og Lithiasis ere temmelig hyppige Sygdomme paa Færøerne, Noget, som ved den overvejende animalske Kost er let forklarligt. Derimod udmærke Færingerne sig ved før trinitlige og durable Tænder. Rariøse Tænder sees overmaade sjældent hos de egentlige Færing, og man kan ofte see Folk paa 70 Aar med fuldstændigt Gebis, hvor hos da rigtignok Tandkronerne pleje at være afslidte paa samme Maade som man seer det paa Grønlænder-Kranier. Dette maa da vist tilskrives dels den faste og sejge Føde, som det tørrede Kjød afgiver, dels den Rensning, som de uvilkaarlig foretage med deres Tænder, hvergang de tage en Mundfuld af deres "Drujler."

Naar en Dansk, ifølge det som vi her have anført om den færøske Kost og dens Virkninger, aldeles vilde fordømme den, og vilde gjøre sig tilgode af at hans Mad er bedre, saa maatte vi imidlertid gjøre ham opmærksom paa, at det dog kunde være nogen Tvivl underkastet, om den færøske eller danske Mad i det Hele taget er sundest. Naar vi senere komme til at sammenligne Mortalitetsforholdene paa Færøerne med dem i Danmark, saa ville, vi see, at medens den største Dødelighed hos os findes intellem det 60de og 70de Aar, saa findes den paa Færøerne imellem det 80de og 90de Leveaar, og at Livets Gjennemsnitsvarighed, som hos os er 36 Aar, paa Færøerne er 44½ Aar, omendskjøndt de Dødfødte her ere regnede med. Heraf fremgaaer, at den færøske Kost dog ikke er saa skadelig, som man ved første Øjekast skulde troe. Desuagtet er jeg overbevist om, at den kunde og burde undergaae mange betydelige Forbedringer, hvorved Færingernes Livsvarighed endnu vilde blive

højere, da det særdeles gunstige Mortalitetsforhold paa Færøerne, som jeg senere ved statistiske Data skal søge at vise, nærmest vistnok maa tilskrives de fjerne Øers Fritagelse for mange Sygdomme, som grassere hos os.

De færøske Huse ere tildels opførte af Brædder, saaledes at de bedste Huse ganske eller tildels have en indvendig utjæret, og en udvendig tjæret Bræddbeklædning, medens andre kun indvendig ere beklædte med Brædder, men udvendig ere omgivne af Mure, der bestaae af Sten, Jord og Græs. Tagene ere næsten uden Undtagelse tækkede med Græstørv. Det egentlige Vaaningshus er, efter Formuesomstændighederne, af en forskjellig Størrelse og Indretning. De allerfattigste Folks Huse bestaae kun i eet Rum, der tillige tjener som Køkken, Dagligstue, Soveværelse og Opholdssted for Høns o. desl. Den eneste Dør til dette, med Brædder indvendig udklædte Rum, er circa 4 Fod høj; Gulvet bestaaer af Jord; Vinduer findes slet ikke, men et firkantet Hul oppe i Taget, som kan lukkes ved en Skodde, tjener tillige Lyset til Indgang og Røgen til Udgang. Sengene ere anbragte som Køjer omkring langs med Væggene, og udenfor dem findes gjerne en Bænk. Et saaledes indrettet Værelse kaldes med Rette en "Røgstue"; thi det er sædvanlig saa opfyldt med Tørverøg, at man ofte har ondt ved at begribe, at Mennesker kunne aande en saadan Luft. Færingerne synes imidlertid ofte endog at finde Behag i Tørverøgens Lugt; saaledes har jeg ofte seet Folk sidde ved Ildstedet, og med sand Vellyst vifte Tørverøgen af det brændende Baal ind mod Næsen, og de gamle Sagn vise, at Færingerne ogsaa i gamle Dage godt kunde taale Røg, og undertiden anvendte den til at ryge danske Folk ud. Ikke sjældent maatte jeg selv ved Sygebesøg i en Røgstue gjentagne Gange løbe ud, for at trække Luft, inden jeg fik seet og undersøgt de Mæslingepatienter, som laae derinde, uden at anfægtes af den Atmosfære, hvortil de vare vante. Dog pleje i vore Dage selv meget fattige Færinger, foruden Røgstuen, der, væsentlig altid indrettet paa samme Maade, (kun at den hos de Rige er mere rummelig og forsynet med en Slags Skorsten), er en uundværlig Del af enhver færøsk Bolig, at have en, rigtignok lille, "Glasstue" d. e. et Værelse med Glasvindue, Bræddeloft og Bræddegulv. Kun de mest Velhavende pleje, foruden en rummelig Røgstue, der ofte bruges som Dagligstue, men altid som fælleds Spiseværelse og som Sovestue for Tjenestefolkene, at have et Spisekammer og flere Glasstuer. Af disse staaer da sædvanlig en ledig, for der at kunne modtage Embedsmændene og andre høje Fremmede; den er sædvanlig meget renlig, og indeholder, blandt andre Møbler, altid en velopredt Himmelseng. En anden Glasstue, hvor Væverstolen staaer, har gjerne et Par Senge, og undertiden findes en tredie Glasstue, som da tjener den største Del af Familien til Dagligstue og Sovekammer; disse to sidste Værelser udmærke sig sædvanlig ikke ved den Renlighed, som findes i Stadsstuen.

De Omstændigheder ved de færøske Boliger, som kunne antages at virke skadeligt paa Sundheden, ere:

- 1) den Tørverøg, hvormed Luften i dem er svangret;
- 2) den Fugtighed og daarlige Luft, som dels skyldes Røgstuernes Jordgulv, samt den fugtige Jord, som udvendig danner Væggen og Taget, og som selv i Glasstuer med Trægulv sædvanlig ligger lige under Bræderne, dels den ringe Mængde Luft, som ved Husenes Sneverhed kommer paa ethvert Individ, og som i Glasstuerne endnu formindskes derved, at kun Bilæggerovne bruges;
- 3) den Træk, som især findes i Røgstuerne.

At disse Omstændigheder maatte indvirke særdeles skadeligt netop paa Mæslingerne er indlysende, men og saa til andre Tider er deres Virkning kjendelig. Kronisk Blepharo-Adenitis og Konjunktivitis er hos ældre Folk særdeles hyppig, og gaaer efter Aar og Dag gjerne over i Lippitudo⁶. Ihvorvel Klimaet

⁶ blaar eye, older term for blepharitis accompanied by a viscid discharge that tends to cause the lid edges to cling together.

vist ikke har nogen heldig Indflydelse paa disse Øjenaffektioner, saa synes det dog rimeligt, at den vigtigste Aarsag til deres Hyppighed er Røgstuernes Tørverøg. Herfor taler ogsaa deres hyppige Forekomst hos gamle Kjærlinger, som bygge og boe i Røgstuerne, men kun komme lidt ud i den fri Luft. At ogsaa kronisk Bronchitis og alle Slags Forkølelser, hvis Hyppighed dog mest maa tilskrives Klimaet, snarere befordres end modvirkes ved Husenes Indretning, er klart. At Leuchhæmier og Kloroser ved den beskrevne Indretning af Boligerne ikke ere hyppigere, end de virkelig ere det, maa vist for største Delen tilskrives den stærke animalske Rost. Kun i de allerelendigste Hytter har jeg seet leuchhæmiske og klorotiske Fruentimmer; leuchhæmiske Mandfolk mindes jeg ikke at have seet paa Færøerne. – Man skulde troe, at Mb. Brighii⁷ trivedes vel i saadanne Huse, men saavidt jeg kan slutte af mine Undersøgelser, er dette ikke Tilfældet; ikke sjeldent raadspurgtes jeg af ældre Folk med Ødem i Benene, og jeg undersøgte da altid deres Urin ved at koge den i et Reagensglas, men der fandtes aldrig Albumen i den, hvorimod en nærmere Undersøgelse næsten altid godtgjorde Tilstedeværelsen af en Hjertesygdom.

Klædedragten have vi allerede omtalt foroven, forsaavidt som den ikke tilstrækkeligen beskytter Legemet imod Klimaets Indvirkning. Her have vi derfor kun endnu at omtale den, forsaavidt som den befordrer Urenlighed. At den i Reglen fra yderst til inderst bestaaer af Uldtøj, er nemlig vist hensigtsmæssigt med Hensyn til Klimaet, men det er klart, at ogsaa Utøj, navnlig Lus og Fnatmider, trives vel i de uldne Skjorter, som i det Hele taget skiftes sjeldent. Den Lugt, som Færingernes Klæder faae derved at de vadske deres Tøj i Urin, hvoraf hele Familiens Produktion gjemmes vel i et stort Trækar, synes ikke at være disse smaa Dyr ubehagelig, idetmindste er Fnat en overmaade hyppig Sygdom, og kun faa Familier ere fri for Lus.

De daglige Forretninger tør, som en af de vigtigste hygiejniske Potenser, her ikke forbigaaes med Taushed.

Mandfolkenes Beskæftigelser ere især Faarenes . Røgt, Fiskeri, Fuglefangst, lidt Agerdyrkning og Tørveskjæring. Alle disse Beskæftigelser holde dem ude i den fri Luft, især om Sommeren, og ere forbundne med betydelige legemlige Anstrengelser. Herved hærdes de og blive istand til at fordøje den tunge Kost, men de udsættes ogsaa meget for Klimaets Indflydelse, som foroven er omtalt. Kirurgiske Tilfælde saasom Frakturer, Luxationer, Saar ved Fald og Beskadigelser med Knive,⁸ som de altid bære ved Siden i et Futteral, ligesom en Dolk, ere ogsaa hyppige og Hernia er ikke sjelden.

Om Vinteren oplolde ogsaa Mandfolkene sig mere inde i Huset og ere behjælpelige med at forarbejde Ulden og sye Klæder. Fruentimmernes Beskæftigelser holde dem sædvanlig inde i Huset, hvor de besørge Madlavningen, Vadsken og alle andre indvendige Sysler, men især Strikning af uldne Trøier og Strømper, Vævning o.desl.; kun Røernes Malkning nødsager Pigerne til at begive sig op imellem Fjeldene, og i Høstens Tid ere de behjælpelige med Høets Bjergning saavelsom med Rornhøsten og Rornets Tørring. Denne megen Stillesidden og Opholdet i den fordærvede Luft inde i Husene kan ikke andet end befordre Hysteri, Forstyrrelser i Digestionen , Uordener i Menstruationen o. s. v., ligesom de derved udsættes mere for Forkølelse ved Markarbejdet om Efteraaret. Hvilken Indflydelse disse Fruentimmer mes daglige Forretninger have paa deres Konstitution, sees af den paafaldende Forskjel, som iagttages imellem de Fruentimmer, som maa gjøre Fjeldtoure for at malke Røerne og de andre. Sædvanlig ere de færøske Fruentimmer fint byggede, ja ofte gracile, og naar de komme ud over det 40de Aar magre, men de Piger, som malke Køerne, ere robuste, som vore Bondefruentimmer. Paafaldende er det alligevel, at de endog ved svært Arbejde bevare deres

⁷ Nephritis, akut eller kronisk

⁸ Disse Beskadigelser skyldes dog kun Uforsigtighed; thi det er vist uhørt, at en Færing har trukket Kniv imod en Anden.

udmærket smukke smaa Hænder og Fødder, og at Uordener i Menstruationen idet mindste ere ligesaa hyppige hos Malkepigerne som hos de andre Fruentimmer, hvilket Sidste taler for, at, som vi foroven anmærkede, Forkølelsen maae ansees som en af de vigtigste Aarsager til disse Uordener.

Nærmest for at faae et klart Overblik over Mæslingeepidemiens Indflydelse paa Mortalitetsforholdene paa Færøerne, har jeg samlet adskillige statistiske Data, der, ved at sammenstilles med Danmarks Mortalitetsforhold, i flere Henseender synes at være interessante.

Da Færingerne saa godt som aldrig vandre ud, og Fremmede næsten aldrig have bosat sig paa Øerne, hvor hos det Antal af Individuer, som udgjør Embedsmændenes Familier ikke kan være saa forskjelligt, at det kunde frembringe nogen betydelig Fluktuation i Folkemængden, saa give Folketællingerne paa Færøerne et renere Resultat med Hensyn til Folkemængdens Formerelse ved Fødslernes Overskud over Dødsfaldenes end f. Ex. i Danmark. Men efter Folketællingerne for 1782, 1834, 1840 og 1845 levede paa Færøerne:

	1782	1834	1840	1845
Paa Norderøerne	585	862	913	953
Østerøen	1040	1648	1777	1910
Strømøen med Hestø, Kolter og Nolsø	1375	2169	2255	2405
Vaagø med Myggenæs	384	642	694	748
Sandøen med Skuø og store Dimon	388	552	569	610
Suderøen	637	1055	1100(?)	1156
summa	4409	6928	7308	7782

Søger man et Gjennemsnitstal for Folkemængden imellem Aarene 1834 og 1845 ved at addere 6928 og 7782 og dividere med 2, udregner man dernæst et aarligt Gjennemsnitstal for Folkemængdens Tilvæxt i disse Aar og beregner endelig hvor mange pCt. den aarlige Tilvæxt giver, saa findes denne i nævnte Tidsrum at være 1,05 pCt. For Danmark derimod er den for Aarene 1801—34 kun 0, sa pCt. Altsaa falder Sammenligningen ud til betydelig Fordel for Færøerne.

Da det efter Dr. Caspers Beregninger over mere end 60 Millioner Mennesker synes at være godtgjort, at Dødelighedens Maal i en Befolkning staaer i lige Forhold til sammes almindelige Frugtbarhed, saa skulde man her efter vente at finde en stor Dødelighed paa Færøerne, men dette er langt fra at være Tilfældet.

I Uldalls Haandbog i Sundhedspolitiet⁹, som til Sammenligning er mig nærmest ved Haanden, meddeles nedenstaaende Oversigt over Livsvarighedens Tilvæxt i Danmark, beregnet for 1000 Mandfolk efter Gjennemsnit af 5 Aar for 1784, 1828 og 1833, hvorhos det bemærkes: at Forholdet med Hensyn til Kvindekjønnets omtrent var det samme, og at Kvinkvinniet indtil 1833 incl. afgiver en ugunstigere Maalestok formedelst de i samme herskende slemme Epidemier. For Færøerne har jeg for Aarene 1835—45 incl. samlet 1059 Dødsfald, som ere optegnede efter de med Omhu førte Kirkebøger for alle Sogne undtagen for Suderøen, hvorfra jeg ikke er i Besiddelse af statistiske Data. Da blandt disse 1059 Dødsfald indbefattes 60 Dødfødsler, saa kunne de nedenstaaende Tal uden videre benyttes til Sammenligning, kun at man erindrer, at Dødsfaldenes Antal for Alderen under 10 Aar derved for Færøernes Vedkommende bliver større end det virkelig skulde være.

⁹ Nok i betydningen politik

Af 1000 Mandfolk i Danmark Af 1059 Mennesker, som døde efter et Gjennemsnit af døde paa Færøerne i Aarene 5 Aar: 1835–45 incl. vare :

	Af 1000 Mandfolk i Danmark døde efter et Gjennemsnit af 5 Aar:			Af 1059 Mennesker, som døde paa Færøerne i Aarene 1835–45 incl. vare:
	1784	1828	1833	
Under 10 Aar	458	385	366	279*
Mellem 10 og 20	40	39	43	60
_20 og 30	57	55	56	72
_30 og 40	62	54	60	68
_40 og 50	73	74	77	81
_50 og 60	85	91	105	60
_60 og 70	104	115	123	90
_70 og 80	81	118	113	164
_80 og 90	34	60	51	169
over 90	7	9	6	16

*Und. 1 Aar I 99. Mellem 1 og 10 A.80.

Hvorledes man herefter end anstiller Sammenligningen, saa er det aabenbart, at Mortalitetsforholdene ere langt gunstigere for Færøerne end for Danmark. Medens Dødeligheden blandt Børn under 10 Aar i Danmark er 366 af 1000, saa er den paa Færøerne kun 279 af 1059, omendskjøndt 60 Dødfødte ere indbefattede i disse 279. Medens den største Dødelighed (med Undtagelse af Børn under 10 Aar) i Danmark findes imellem det 60de og 70de Leveaar, saa findes den paa Færøerne (ligeledes med Undtagelse af Børn under 10 Aar) imellem det 80de og 90de Leveaar, og medens i Danmark af 1000 Døde kun 122–187 blive over 70 Aar gamle, overlevede paa Færøerne af et lignende Antal Individer 349 denne Alder.

Som bekjendt har man beregnet Livets Gjennemsnittsvarighed for forskellige europæiske Stater. For Rusland angives den til 21,3, for Preussen til 29,6, for Schweitz til 34,6, for Frankrig til 35,8, for Danmark til 36, for Belgien til 36,5 og for England til 38,5 Aar. Jeg har for hvert Sogn paa Færøerne, med Undtagelse af Suderø, søgt denne Gjennemsnitts alder ved at addere de fra 1835–45 incl. Dødes Alder og derefter at dividere med Individernes Antal, saaledes at jeg har regnet de Dødfødte med, hvorved naturlig det Tal, som betegner Livets Gjennemsnittsvarighed, bliver temmelig betydelig mindre end det ellers vilde blive. Derved har jeg fundet Livets Gjennemsnittsvarighed for Nordstrømø 41,5, for Sydstrømø Sogn 43,9, for Østerøen 39,7, for Vaagøe 48,8, for Sandøe 49,8, for Norderøerne 43,7 og for alle Færøerne med Undtagelse af Suderøe 44,6 Aar. Herved bliver det endnu klarere, hvor gunstige Mortalitetsforholdene ere for Færøerne, thi en saa høj Gjennemsnitts alder er, saa vidt jeg veed, ikke bekjendt for noget Land i Verden.

Ved nærmere at betragte den til Sammenligning opstillede Tabel vil man finde, at Forskjellen imellem Danmarks og Færøernes Mortalitetsforhold egentlig ligger deri, at der i Danmark døde flere Børn under 10 Aar end paa Færøerne, og at derimod her et langt større Antal naaer en Alder af over 70 Aar end i Danmark. For den kraftfuldeste Alder, imellem 10 og 50 Aar finder man imidlertid, at Dødeligheden er større paa Færøerne end i Danmark. Dette Sidste finder sin naturlige Forklaring deri, at et uforholdsmæssigt større Antal paa Færøerne lider en voldsom Død ved at drukne i de farlige Fjorde og ved at styrte ned fra Fjeldene, end i det flade, af et roligt Hav omgivne Danmark. Saaledes er af de 172, som fra 1835–45 incl. døde paa Norderøerne, omkomne 20 Mænd i deres bedste Aar ved Ulykkestilfælde.

Efterat have fremstillet disse Fakta skulle vi søge at udfinde Aarsagerne til disse Forskelligheder imellem Danmarks og Færøernes statistiske Forhold baade med Hensyn til Folkeformerelsen og til Mortalitetsforholdene. Det vilde aldeles stride imod alle vedtagne og af Erfaringen stadfæstede Begreber om hygiejniske Potensers gavulige eller skadelige Indvirkning paa Sundheden, hvis man i de foroven angivne ved Landets physiske Beskaffenhed eller ved Indbyggernes Levemaade betingede Forhold vilde søge Ilovedaarsagen til de gunstige Mortalitetsforhold og den betydelige Folkeformerelse paa Færøerne. Et raat koldt Klima, med næsten evig Taage og voldsomme ustadige Vinde ; en ved farlige Fjorde adskilt Øgruppe, der bestaaer af høje Fjelde, hvis Veje og Stier ofte virkelig fortjene at kaldes halsbrækkende og hvis Indbygges Beskæftigelser stadig udsætte dem for Klimaets Indvirkning og for den Fare, som er for Ibunden med at færdes paa dette oprørte Hav og disse farlige Fjelde; en Kost, som vi ere tilbøjelige til at ansee for tungfordøjelig, for ved Vædskernes Bedærvelse skadelig, for altfor stærk animalsk og for ubehagelig ja modbydelig; en Klædedragt, hvorved Fødderne næsten bestandig ere vaade, og som ved de gamle Mænds Mangel paa Seler og Fruentimmernes Mangel paa Underbenklæder udsætter Underlivet for Forkølelse, og som desuden nærer Utøj og Urenlighed; Boliger, der ere opfyldte med Røg og overalt omgivne af fugtig Jord –.

Alt dette kan ikke paa nogen Maade antages at bidrage til at forøge Folkeformerelsen eller til at forlænge Indbyggernes Levetid. Alligevel maa vi, for at undgaae Ensighed, ogsaa fremhæve Det i de physiske og diætetiske Forhold, som kunde antages at være gavnligt for Sundheden, og som saaledes maaskee kunde bidrage Noget til at gjøre de omtalte Forhold mindre skadelige.

Til Ros for Klimaet kan man sige, at Temperaturen er temmelig ensformig i Sammenligning med den i andre Lande, og hverken naaer nogen megen høj eller nogen meget lav Grad; at Luften i det Hele taget er fri for animalske eller vegetabiliske Tilblandinger; og at den, selv naar disse f. Ex. efter Grindedrab true med at forpæste den, ved de hyppige Vinde bestandig renses og fornyes; og endelig at en blot ved Vanddunster taaget Luft ikke synes at være usund, naar man seer hen til Livets Gjennemschnittsvarighed i det taagerige England (38½ Aar), der er større end det øvrige Europas, og til Færøernes (44½ Aar), der endnu er større. Landets Bjergnatur hærder Legemet ved Anstrengelser, der virkelige gavnligt paa Fordøjelsen, Blod- og Nervelevet. –

Kosten kan vel kun roses, forsaavidt som den er fri for Kryderier og Ganen pirrende Tilblandinger, der friste til at fylde Maven med Mere end den kan fordøje; og om Boligerne kan næppe siges noget Godt, uden forsaavidt som den Træluft, som de have, modvirker en altfor overvættets Ansamling af Dunst og Røg. Klædedragten er hensigtsmæssig, forsaavidt som den hovedsageligen bestaaer af Uld og i det Hele taget er varm. Mændenes og Malkepighernes Beskæftigelser maa ansees for sunde, forsaavidt som Legemet ved deres Ophold i fri Luft og ved Rampen imod Naturen styrkes og hærdes. At imidlertid denne tilsyneladende saa vigtige Omstændighed ikke udøver nogen væsentlig Indflydelse paa Mortaliteten eller dog fuldkommen opvejes af andre Skadeligheder, som betinges ved Mændenes Beskæftigelser, sees deraf, at af de 1059 Døde for 1835–45 incl. fandtes 538 Mand folk og kun 521 Fruentimmer. Af større Indflydelse turde de sociale Forhold være, der ved Sædernes Simplicitet tilstede Indbyggerne at bevare Sindsro langt mere end paa Steder, hvor Civilisationen har naaet en højere Grad, der forebygge betydelige Udsvævelser imellem begge Kjønn, og der betinge den almindelige Goddædighed og Hjælpsomhed, hvorved Sult og Fattigdommens største Yderligheder nogenlunde undgaaes, idet mindste i de i det hele mere velhavende Bølgder.

Vi kunne imidlertid ikke antage, at de opregnede for Sundheden gunstige Omstændigheder opveje de oven for anførte skadelige Indvirkninger, og langt mindre kunne vi tilskrive dem de højst gunstige Mortalitetsforhold. Kun med Hensyn til Folkeformerelsen synes den frugale og Legemet hærdende Levemaade og den i det Hele taget større Sædelighed, i Forbindelse med de almindeligvis tidlige Giftermaal og den kraftige Konstitution, hvormed den Færøerne befolkende, oprindelig fra Norge

afstammende Race er begavet af Naturen, at maatte tilskrives den væsentligste Indflydelse. Idetmindste er det ikke det færøske Gjordemodervæsens Fortjeneste, at Folkeformerelsen (eller de levende Fødtes Overskud over Dødsfaldene) paa Færøerne er 1,05 pCt., medens den i Danmark kun er 0,83 pCt., og at der af 1059 Døde paa Færøerne kun vare 279 under 10 Aar (60 Dødfødte eller inden 24 Timer døde Børn iberegnet) medens der i Danmark i gunstigste Tilfælde blandt 1000 Døde findes 366 under 10 Aar (de Dødfødte sandsynlig ikke iberegne).

Heller ikke er Forholdet imellem de Dødfødte og de levende fødte Børn ugunstigere paa Færøerne end i Danmark, men snarere gunstigere, og det omendskjønt Gjordemodervæsenets Forfatning deroppe næsten kan kaldes uforsvarligt. Da nemlig ifølge Forholdene en færøisk Gjordemoders Liv er forbundet med Stabadser og Farer, som hertilands ere ubekjendte, og hun derhos hverken af det Offentlige eller af de resp. Indbyggere faaer en nogenledes til hendes Amstrængelser eller til hendes Fornødenheder svarende Godtgjørelse, saa er det sjældent, at et passende Subjekt finder sig villigt til at rejse til Kjøbenhavn for at lære Gjordemodervæsenet. Men naar et passende Fruentimmer nu ogsaa har erklæret sig villig dertil, saa skal den kongelige Fødselsstiftelses Direktion oftere have nægtet et saadant Fruentimmers Optagelse i Stiftelsen. En Følge deraf er, at der paa Færøerne kun findes meget faa (hvis jeg mindes ret kun 4–5) oplærte Gjordemødre, hvilket synes at være saa meget mere misligt, som nu ingen Koner oplæres af Landets autoriserede Læger, hvilket tidligere var Tilfældet. Det var derfor vist meget ønskeligt, at disse Forhold bleve ordnede bedre end hidtil er skeet, uagtet Amtmandens og Landkirurgens gjentagne Forestillinger derom til vedkommende Autoriteter. Intet vilde være mere urigtigt, end af de ovenfor angivne gunstige Forhold at udlede den Slutning, at med Fødselens Mekanisme aldeles ubekjendte Koner kunne gjøre samme Tjeneste som veloplærte Gjordemødre; thi dette er vel tilstrækkelig modbevist ved andre statistiske Undersøgelser; og det er utvivlsomt, at de for Færøerne gjældende gunstige Forhold med Hensyn til Folkeformerelsen og de dødfødte Børns Forhold til de levende fødte maa tilskrives andre Omstændigheder, derere saa gunstige, at de opveje den skadelige Indflydelse, som et daarlig ordnet Gjordemodervæsen udøver.

Ligesaa lidt som Gjordemodervæsenets bestaaende Indretning kan antages at befordre Folkeformerelsen, ligesaa lidt synes Færøernes gunstige Mortalitetsforhold væsentlig at være Lægernes Fortjeneste; thi som bekjendt findes der paa Færøerne kun een kongelig ansat og fortiden een praktiserende Læge, som begge boe i Thorshavn, og hvis Virksomhed ifølge Landets physiske Beskaffenhed maa være endnu mere mangelfuld og ufuldkommen end i de danske Landdistrikter. Efter en gennemsnitlig Beregning for 9 Aar, fra 1837–45, incl. døde aarlig af de resp. Sognes Befolkning:

I Sydstrømø (med Thorshavn)	1,856 pCt.
I Nordstrømø	1,263 –
Paa Østerø	1,593 –
» Norderøerne	1,691 –
» Vaagø	1,376 –
» Sandø	1,634 –
» Suderø (ifølge Hr. Kandidat Manicus's godhedsfulde Meddelelse)	1,555 –

Da nu Beboerne af Sydstrømø og navnlig af Thorshavn oftest have Lejlighed til at faae Lægehjælp, medens f. Ex. Suderø undertiden i Aar og Dag ikke besøges af nogen Læge, saa sees af disse Angivelser, at Lægerne paa Færøerne ikke have saa stor Indflydelse paa Mortalitetsforholdene, som andre Forhold, navnlig Formuesomstændighederne og Øernes physiske Beskaffenhed. Deraf kan man imidlertid ligesaa lidt drage den Slutning, at flere Lægers Ansættelse vilde være overflødig, som

man af de foroven angivne Resultater kunde erklære Gjordemodervæsenet for overflødig. Som et Exempel, der kunde synes at tale for det Modsatte, vil jeg tillade mig at anføre Følgende. I Aarene 1780—90, da der ikke fandtes nogen videnskabelig dannet Læge paa Færøerne, døde 223 Mennesker paa Østerø, som 1782 havde 1040 Indbyggere. Da Østerøs Befolkning i de følgende 52 Aar, efter gjennemsnitlig Beregning, aarlig er forøget med ca. 11,5¹⁰ Individer, saa kan Folkemængden for 1785 eller Beboernes gjennemsnitlige Antal i den nævnte Periode anslaaes til 1075 Individer; herefter døde da paa Østerø fra 1780—90 1 af 4,82¹¹ Individer. Fra 1835—45 incl. døde paa Østerø 299 Mennesker; men Øens Befolkning var stegen saaledes, at den 1840 havde 1777 Beboere.

Antages dette som Beboernes Gjennemsnittsantal i den sidstnævnte Periode, saa døde i denne sidste Periode kun 1 af 5,94. Man vil maaskee indvende, at der 1781 grasserede Mæslinger; men disse forøgede for Østerøs Vedkommende Dødeligheden saa lidt, at medens Dødeligheden paa Østerø fra 1771—80 incl. efter en gjennemsnitlig Beregning aarlig var 24,2, befindes den fra 1781—90 incl., uagtet Folkemængdens Tiltagen, kun at være 19,9 derimod døde i Aaret 1838 under en ondartet Influenza--Epidemi 47 Individer paa Østerøen, medens der paa denne Ø efter en gjennemsnitlig Beregning for 1835—45 incl. aarlig kun døde 27,2 Individer. Da nu Østerøens physiske Forhold, saavel som Indbyggernes Levemaade synes at have været næsten uforandret i de nævnte Perioder, og foruden de anførte ingen usædvanlige Aarsager synes at have indvirket paa Dødeligheden, saa kunde man fristes til at tilskrive Lægens Virksomhed den ikke ubetydelige Differens.

Imidlertid troer jeg, at man i Almindelighed ikke kan tælle sig til Lægernes Virksomhed, fordi det er umuligt tillige at tage Hensyn til andre Forhold; og det Modsigende i de ovenstaaende, paa forskjellig Maade tilvejebragte, numeriske Resultater synes ydermere at være et Bevis herfor. Kun saa meget er vist, at ihvorvel Lægernes Virksomhed hverken synes at kunne komme i Betragtning som noget væsentligt Moment til Færøernes gunstige Mortalitetsforhold, eller ved statistiske Undersøgelser over de forskjellige Øers Dødelighed bliver iøjnefaldende, en Læges Ansættelse paa Suderø, en Ø med 1156 Indbyggere, der nu saa at sige aldeles er afskaaren fra al Lægehjælp, af Humanitetshensyn maa ansees ikke blot som ønskelig, men som nødvendig, naar man ikke overhovedet vil drage Lægernes Indflydelse til at gjøre Mortalitetsforholdene gunstigere i Tvivl.

Efter saaledes at have gennemgaaet de Aarsager, som ved første Øjekast kunde synes muligen at have nogen Indflydelse paa Færøernes gunstige Mortalitetsforhold, uden hidtil at have fundet noget Moment, som man ved nærmere Drøftelse kunde tilskrive nogen væsentlig Betydning i den Henseende, ledes vi til at antage Færøernes fuldstændige eller partielle Fritagelse for en Mængde, især smitsomme, Sygdomme, som decimere andre Landes Befolkninger, for den allervigtigste Aarsag til Færøernes gunstige Mortalitetsforhold og til Indbyggernes høje Levealder. Dette vil blive saa meget mere indlysende ved i Rorthed at gennemgaae de Sygdomme, som ere sjeldne eller ubekjendte paa Færøerne.

Skrophulosen og Tuberkulosen, hvis uhyre Indflydelse paa andre Landes Dødelighed overhovedet, saavel som i Særdeleshed paa Mortaliteten af Børn under 10 Aar, er noksom bekjendt, ere, ihvorvel ikke ubekjendte, saa dog i Forhold til andre Lande sjeldne paa Færøerne. Maaskee kunde heraf det anførte særdeles gunstige Mortalitetsforhold for Børn under 10 Aar forklares. Maaskee har Indbyggernes i Almindelighed saa stærkt animalske Kost Indflydelse herpaa, men det er ikke umuligt, at ogsaa den Omstændighed, at Syphilis indtil for ganske faa Aar siden var en paa Færøerne aldeles

¹⁰ RFC: min fortolkning af en uforståelig oplysning i originalen

¹¹ dss

ubekjendt Sygdom (hvorom senere mere), har bidraget Sit til de 2 nævnte Sygdomsfamiliers relative Sjældenhed.

Om Skirrhus og Kræft forekommer paa Færøerne, skal jeg lade være usagt; jeg har ikke seet noget Tilfælde deraf, og det er ikke sandsynligt, at Sygdommen ganske skulde være undgaaet min iagttagelse, hvis den ikke idetmindste hørte til Sjældenhederne. Morbus Briqthii, der, idetmindste blandt de Patienter, som indlægges paa Almindelig Hospital, er en meget hyppig Sygdom, har jeg ikke seet paa Færøerne, ihvorvel jeg altid har kogt Urinen af Patienter, som lede af Ødem i Benene eller af andre mistænkelige Symptomer; jeg har da aldrig fundet Albumen i Urinen, derimod, som foroven anført, sædvanlig en Hjertesygdom som Aarsag til Ødemet.

Intermittens og de med den i Forbindelse staaende Lever- og Milt-Infarkter etc. forekommer som sagt ikke paa Færøerne.

Blandt de smitsomme Sygdomme hjem søges Færøerne egentlig kun af Scabies, Influenza, Typhus og i de sidste Aar af Syphilis. Da vi hidtil ikke have omtalt disse Sygdomme, skulle vi her i Korthed undersøge, hvilken Indflydelse der kan tilskrives dem paa Mortaliteten.

Scabies forkorter som bekjendt neppe nogensinde et Menneskes Liv, og fortjener derfor her ingen videre Omtale. Influenza- (Rrujm-) Epidemier derimod ere hyppige, og undertiden, som det synes, ret alvorlige. Den lille Epidemi, jeg under mit Ophold havde Lejlighed til at iagttage, var meget mild og kostede saavidt vides ikke noget Menneskeliv, men f. Ex. i Aaret 1838 grasserede en Krujmepidemi, som forøgede Landets Dødelighed overmaade meget. Dette sees tydeligst af følgende Oversigt:

	Der døde 1838	Der døde efter en gjennemsnitlig Beregning for#1835 –45 incl.
Paa Nordstrømø.	15 Individer	10,8 Individer
– Sydstrømø	41 –	23,8 –
– Østerø	47 –	27,2 –
– Vaagø	12 –	9,9 –
– Sandø	13 –	9 –
– Norderøerne	32 –	15,6 –
	Summa 160 Individer	Summa 96,3 Individer

Denne betydelige Forøgelse af Dødsfaldene i Aaret 1838 kan, saavidt man kan dømme efter de Opgivelser, der findes i Kirkebøgerne, og efter mundtlige Meddelelser, ifølge hvilke Aaret 1838 ellers ikke frembød noget Usædvanligt, som den forøgede Dødelighed kunde tilskrives, vel nærmest kun skyldes den ondartede Krujm-Epidemi.

Mærkeligt er det, at disse Epidemiers Udbrud staaer i nøje Forbindelse med Handelsskibenes Ankomst især om Foraaret. Dette kan ikke vel være noget Tilfældigt, da det første Handelsskibs Ankomst falder paa meget forskellige Tider, snart i Marts, snart i April, snart endog i Maj, og da det, blandt Andres, ifølge Hr Amtmand Pløyens mundtlige Forsikring i de 17 Aar, han har opholdt sig paa Øerne, er indtruffet hvergang, at der 2-3 Dage efter det første Skibs Ankomst er udbrudt en saadan Epidemi, og det saaledes, at først Handelsforvalteren og Handelsbetjentene, dernæst hele Thorshavn, og derpaa Landets øvrige Steder ere blevne angrebne. Sjelden kommer Epidemien ogsaa til andre Tider af Aaret, saaledes som i August Maaned 1846 under mit Ophold paa Øerne. Denne Epidemi begyndte ogsaa et Par Dage efter Skibets Ankomst, og udbredte sig ganske paa den nysangivne Maade. Sygdommen viste sig som en katarrhalsk Feber i Forbindelse med Snue og Hoste

i større eller mindre Grad og i de heftigere Tilfælde tilligemed katarrhalsk Injektion af Conjunctiva og Taareflod; den forløb i 8 eller højst 14 Dage. Som Analogon hertil være det mig tilladt at minde om det som Kuriosum bekendte Faktum, at der paa Øen St. Kilda udbryder en lignende Epidem, der ligeledes optræder med Snue, Hoste og katarrhalsk Feber, hvergang der ankommer et Skib.

Typhoid Feber, paa Færøerne kaldet "Landfarsot," grasserer der vel af og til; men vistnok ikke saa hyppigt som hos os. Bølgdernes isolerede Beliggenhed gjør, at man tydeligt kan iagttage, at Sygdommen fra først af er af spontan Oprindelse, men derefter udbreder sig kontagiøst. I Slutningen af September Maaned 1846 udbrød en Landfarsot Epidem i Vestmannhavn og en anden, skjøndt mindre, omtrent samtidig i Thorshavn. Da jeg paa Grund af Mæslingernes Ophør dengang kun havde at oppebie Skibets Ankomst for at vende tilbage til Danmark, blev jeg af Amtmanden anmodet om at tage Ophold i Vestmannhavn, for at behandle de derværende Syge og for at træffe Anstalter, der om muligt kunde hindre Smittens Udbredelse. Under mit Ophold, som varede 15 Dage, behandlede jeg 14 Patienter, som lede af en udtalt typhoid Feber. Da man har troet at see noget Ejendommeligt i den færøske "Landfarsot," som om det var en nervøs Feber sui-generis, skal jeg her i Korthed tillade mig at fremsætte de Symptomer, som de Patienter, der kom under min Behandling, frembød, og som efter min Mening vise, at Sygdommen ikke er andet end en typhoid Feber, under hvilken kun de putride Symptomer undertiden synes at være stærkere udtalte, end de pleje at være det hos os. – Hos Alle vare: Hovedpine, ofte strax, ofte senere hen, i Forbindelse med Svindel, et stuporøst Udseende, Øresusen og Photopsie, Dedolationer i alle Lemmer, almindeligt Ildebefindende med stor Mathed, Kvalme og Anorexi de første Sygdomstegn. Snart tiltog Cerebralsymptomerne, og hos omtrent Halvdelen af de Syge vare musciterende Delirier uafbrudt tilstede, medens Sygdommen var heftigst. I de første Dage klagede Patienterne over Søvnløshed, senere hen sov de næsten altid. Hos Alle fandtes en betydelig Hensvinden af Kjød og Kræfter under Sygdommens Forløb; medens Sygdommen var heftigst, skjælvede de Fleste stærkt paa Hænderne, og i Ansigtet iagttoges mimiske Spasmer. Rubor fugax genarum iagttoges næsten hos Alle. Dybt Tryk paa Underlivet, især i Cøcalregionen voldte hos 11 af de 14 Syge betydelig Smerte. Hos Alle uden Undtagelse var Tungen stærkt belagt, især i Midten, hvor den tillige var tør; hos Flere var Tungens Belægning brun eller sort, skorpet og revnet med Fissurer, hvis Bund var blodig. Naar Tungens Belægning løsne sig, iagttoges undertiden diphtheritiske eller aphthøse Pletter paaden, men den gjenvandt snart sit naturlige Udseende, og hvor der fandtes Fissurer, heledes de snart. Smagen var hos Alle bitter eller raadden; Appetitten manglede i Begyndelsen ganske, men i Rekonvalescenstadiet vendte den tilbage med fornyet Kraft, Alle lede af Tørst, der sædvanlig var meget heftig. Hos omtrent Halvdelens skiftede Diarrhee, der hos Nogle var temmelig profus, med Forstoppelse, Nogle lede kun af Forstoppelse, Andre kun af Diarrhee, og kun hos Faa var Aabningen hele Tiden naturlig.

Næseblod var i Sygdommens Begyndelse tilstede hos Iere, dog ikke hos det større Antal af Syge; blodig Diarrhee iagttoges kun hos en aldrende Kone, men tydelige Petechier, dels isolerede, dels konfluerende til store mørk-violette Pletter, fandtes hos 3 Patienter. Det blege, svage Morbilli lignende Typhusexanthem, var tilstede hos over Halvdelen af de Syge og især tydeligt paa Armene, Brystet og Benene. Flere af de Syge havde desuden en, sædvanlig ubetydelig, katarrhalsk Hoste, og tør Næse, hvorhos da Konjunktiva især hos ældre Personer, var temmelig stærkt injiceret. Efter Sygdommen var Matheden overmaade stor hos Alle, men størst og mest langvarig hos ældre Personer. Desuden var Ordknaphed, Modløshed og Morositet, især i den første Del af Rekonvalescensen, stor. Hos Alle iagttoges Deskvamation paa Læberne, og hos de Fleste tillige en klidagtig Afskalning over hele Legemet. Ældre Personer vare ulige stærkere angrebne end yngre. – Denne lille Epidem, der under mit Ophold ikke bortrev Nogen, var aabenbart opstaaet spontant, men derefter var det ganske tydeligt, at den udbredte sig ved Kontagium, da Sygdommen, efter at der var foranstaltet en Spærring, ikke blot holdt sig til de ved min Ankomst allerede angrebne

Bylinger¹², men under mit Ophold endog til de angrebne Huse, og da selv i disse de Personer som sov i et fra de Syge afsondret Værelse, enten ganske bleve forsaaned eller først senere hen bleve syge, medens de, som vare nødsagede til at sove i det samme Værelse med Patienterne, strax bleve angrebne, den Ene efter den Anden.

Paa samme Maade som i Vestmannhavn lykkes det paa Færøerne sædvanlig at hindre en Typhus-Epidemis videre Udbredelse, hvortil da Indbyggernes overordentlige Frygt for smitsomme Sygdomme bidrager meget. Da Sygdommen saaledes sjeldent kommer til at udbrede sig udenfor det Sted, hvor den opstod spontant, og denne spontane Oprindelse heldigvis ikke er ret hyppig, saa synes Typhus ikke at bidrage meget til at forøge Dødeligheden paa Færøerne, idetmindste ikke saameget som i andre Lande, hvor Indbyggerne have mere Samkvem med hinanden og ere mindre villige til at foretage en Spærring.

Syphilis var indtil for c. 2 Aar siden ubekjendt paa Færøerne; siden den Tid ere henved 20 Tilfælde komne under Behandling. Efter det som jeg har seet af den deroppe, maa jeg erklære den for simpel Syphilis, idet jeg ikke har seet Andet end superficielle Chankre, Slimtuberkler, hvide overfladiske Saar i Halsen og Syphilider, der især henhørte til de exanthematiske Former. Det Eneste, hvorved den synes at være forskjellig fra Syphilis, betragtet *en masse* her paa Hospitalet, er Slimtuberklernes overvejende Hyppighed, der maaskee kunde beroe paa Beskaffenheden af den primære Form, der blev forplantet til Færøerne. Naar Hr. Landkirurg Regensburg har kaldet Sygdommen en leprøssyphilitisk Affektion, saa kan jeg kun forklare mig dette derved, at han maaskee har anseet Slimtuberklerne for leprøse Knuder. I hans sidste Indberefning til det kongelige Sundhedskollegium seer jeg imidlertid, at han har forandret sin Anskuelse om Sygdommen, idet han i den kun taler om Syphilis. – Hvor meget Færøernes tidligere Fritagelse for Syphilis har bidraget til at gjøre Mortalitetsforholdene gunstigere, er det for Tiden umuligt at bestemme, især naar man tænker paa den Forbindelse, hvori denne Sygdom muligen staaer med Skrophulosen og Tuberkulosen.

Af endnu større Vigtighed for Færøernes gunstige Mortalitetsforhold synes det at være, at Øerne, idetmindste i Aarene 1835–45 incl., have været fritagne for Kopper, Skarlagensfeber og Mæslinger. Kopperne grasserede, saavidt jeg veed, sidste Gang paa Færøerne 1705, og anrettede dengang store Ødelæggelser, hvorom der endnu leve Sagn i Folkets Mund; saaledes fortælles der, at hele Skuøens Befolkning derved uddøde. Nu skulde man haabe, at en saadan Ulykke idetmindste tildels vilde blive forebygget ved Vaccinationen. Det er imidlertid indlysende, at Landets physiske Beskaffenhed gjør det særdeles vanskeligt, at udføre denne paa en tilfredsstillende Maade. Det kunde neppe skee anderledes end derved, at Lægen delte Øerne for Ex. i 5 Distrikter, og skiftevis i et af disse hvert Aar besørgede Vaccinationen ved at gjøre en dobbelt Omrejse, paa hvilken han kom til at berøre hver Bøjgd 2 Gange med 8 Dages Mellemrum, den første Gang for at foretage Vaccinationen, den anden Gang for at overbevise sig om dens Resultat. Men det vilde være ubilligt at forlange en saadan Ulejlighed af den ansatte Læge uden en passende Godtgjørelse, da han, uden Hensyn til Besværlighederne, ved en saa lang Fraværelse fra Thorshavn vilde miste en Del af sin Indtægt ved Praxis, der da vilde komme den praktiserende Læge tilgode. Saameget er imidlertid vist, at Vaccinationen, saaledes som den nu udføres paa Færøerne, er aldeles utilforladelig og hensigtsløs. Det overdrages nemlig til en Bondekarl at rejse omkring i Landet for at vaccinere Børnene; han forsynes dertil med Vaccine og en Naal eller Lancet, og faaer Underretning om, hvorledes han skal bære sig ad.

¹² De færøske Landsbyer eller "Bøjgder" ligge spredt over hele Indmarken, og de mindre Samlinger af Huse, hvoraf "Bøjgden" sammensættes, kaldes "Bylinger".

Denne Bondekarl paalægger da en skriftkyndig Mand i de resp. Bøjgder, 8 Dage efter Vaccinationen at eftersee Børnene, og at tilskrive Landkirurgen, om Vaccinen har slaaet an eller ikke. Da det imidlertid dels altid er uvist, ja i mange Tilfælde endog højst usandsynligt, at den Mand, der skal see Børnene efter, nogensinde har seet en karakteristisk Vaccinepustel, dels er tvivlsomt, om han ikke, for at tjene sin Nabo eller Landsmand, undertiden er istand til at sige en lille Usandhed, eftersom Indbyggerne meget ofte ere bange for at lade deres Børn vaccinere, da de frygte Indpodning af fremmede Sygdomme o. desl., saa indsees let, hvad man kan vente sig af en saadan Rontrol. Skulde der derfor gennem føres en, især hvis friere Handelsforhold kunne forventes, vist højst ønskelig Totalreform med Vaccinationen paa Færøerne, saa maatte den ikke blot foretages af Lægen selv paa dobbelte Omrejser, saaledes som foroven antydet, men den maatte tillige gjentages hos alle Individuer uden Undtagelse, uden at de hidtil udstedte Vaccinationsattester kunde fritage Nogen for denne lille Operation.

Skarlatina har, saavidt jeg veed, aldrig hjemsøgt Færøerne, sandsynlig heller ikke Kighoste, ihvorvel den 1838 er opført i nogle Kirkebøger som Dødsårsag, thi denne Angivelse synes kun at hidrøre derfra, at en og anden Præst har antaget en heftig katarrhalsk Brystaffektion under den herskende Rujmepidemi for Kighoste.

Mæslingerne havde siden 1781 ikke grasseret paa Færøerne, da de udbrød i de første Dage af April 1846. Da jeg i et andet Afsnit agter at meddele nogle lagttagelser om denne Sygdom, skal jeg her indskrænke mig til at omtale denne Epidemis Indflydelse paa Mortaliteten. Af de 7782 Indbyggere angrebes c. 6000 af Mæslinger omtrent i Løbet af et ½ Aar, idet det første Tilfælde viste sig den 4de eller 5te April i Thorshavn, og der efter den 17de September kun endnu paa Sandø forekom enkelte Tilfælde. Fra Aarets Begyndelse indtil medio September døde ialt 255 Individuer, hvoriblandt idetmindste 102 af Mæslinger eller deres Følger. Da jeg imidlertid savner nærmere statistiske Data for Suderøen, som Hr. Manicus har soigneret, skal jeg her kun tage Hensyn til de andre Øer, som udgjøre 6 Sogne med 6626 Indbyggere, hvoraf c. 5000 ifjor fik Mæslinger. Fra Begyndelsen af Aaret 1846 indtil Epidemien var endt, døde i disse Sogne 215 Individuer, hvoriblandt 164 døde under Epidemien, sammes Varighed beregnet særskildt for hver Bøjgd, og blandt disse bortreves idetmindste 78 af Mæslinger eller deres Suitter. Derhos maa det imidlertid bemærkes, at de af Mæslinger Dødes Antal for Syd-Strømøes Vedkommende synes at være ansat alt for lavt. For dette Sogn har jeg nemlig kun kunnet henholde mig til de Optegnelser, som jeg fandt i Kirke bogen, hvor kun hos 12 Individuer Mæslinger ere angivne som Dødsårsag. Men naar Kirkebogen tillige viser, at der af de 68 Individuer, som fra Aarets Begyndelse indtil 30te Juli døde i Sydstrømø, døde 64 imellem den 21de April og 21de Juli, altsaa netop i det Tidsrum da Mæslingerne grasserede der, hvorhos der efter gennemsnitlig Beregning for Aarene 1835—45 incl. aarlig kun pleje at døde 23° Individuer i Sydstrømø, saa bliver det usandsynligt, at kun 12 skulde være bortrevne af Mæslinger. Dette er saa meget mere paafaldende, som af de 64 Døde 45 vare bosatte i Thorshavn (med c. 800 Indbyggere), hvor begge Landets Læger opholde sig og forskriftsmæssigt opgive Dødsårsagerne til Præsten, som infører dem i Kirkebogen. I alle de andre Sogne, hvor jeg ved personlig Nærværelse har kunnet skaffe mig tilforladeligere Underretning, befandtes imellem en Trediedel og Halvdelen af de i Aarets Løb Døde at være bortrevne af Mæslinger eller deres Suitter, dog med Undtagelse af Sandøen, hvor Mæslingerne ikke have krævet noget Offer. Selv om man derfor vil tilskrive en med Skibets Ankomst begyndende Krujmepidemi nogen Indflydelse paa Dødeligheden, forekommer det mig sandsynligt, at de virkelig af Mæslinger Dødes Antal ligger imellem 78 og 164; i første Tilfælde vilde der være død 1 af 64, i andet 1 af 30½ Mæslingepatienter. Medens de Dødes Forhold til hele Folkemængden, som i Danmark efter gennemsnitlig Beregning fra 1801—34 er 1: 41,22, sædvanlig paa Færøerne, efter gennemsnitlig Beregning fra 1835—45 incl. er 1:64,66, befindes den her alene i de første ⅓ af Aaret 1846 at være 1:31,107.

Paafaldende og betegnende for Mæslingernes alvorlige Karakter hos Voxne er det, at de iaar Afdødes Gjennemsnitsalder omtrent var uforandret, nemlig **44,12 Aar (sædvanlig 44,67 Aar)**. Følgende Oversigt kan nærmere tjene til at vise Dødelighedens Forhold i de resp. Aldere under Mæslinge-Epidemien 1846, og til at sammen ligne disse Forhold med de paa Færøerne sædvanlige.

I Aarene 1835—45 incl. døde efter gennemsnitlig Beregning aarlig i de respektive Aldere:	I de første 3 af Aaret 1846 døde	Hvormange pCt. der aarlig pleje at døde af de resp. Alderes Folke-mængde, beregnet efter Folketællingen i 1845 incl.	Hvormange pCt. af de resp. Alderes Folke-mængde der døde i de første 3 af Aaret 1846, beregnet efter Folketællingen for 1845 og egne Optegnelser.	Hvormange Gange Dødeligheden i de første 3 af Aaret 1846 var større end den plejer at være i et sædvanligt helt Aar.
Under 1 Aar 18 $\frac{1}{11}$	50	10 $\frac{2}{11}$ pCt.	30 pCt.	c. 2 $\frac{9}{11}$
imellem 1 og 10 Aar 7 $\frac{3}{11}$	6	$\frac{6}{11}$ —	$\frac{6}{11}$ —	0
— 10 - 20 — 5 $\frac{5}{11}$	5	$\frac{5}{11}$ —	$\frac{4}{11}$ —	÷
— 20 - 30 — 6 $\frac{6}{11}$	8	$\frac{12}{11}$ —	$\frac{15}{11}$ —	c. 1 $\frac{4}{11}$
— 30 - 40 — 6 $\frac{9}{11}$	13	$\frac{17}{11}$ —	2 $\frac{1}{11}$ —	c. 2 $\frac{1}{2}$
— 40 - 50 — 7 $\frac{4}{11}$	18	1 $\frac{1}{11}$ —	2 $\frac{8}{11}$ —	c. 2 $\frac{1}{2}$
— 50 - 60 — 5 $\frac{5}{11}$	28	$\frac{10}{11}$ —	4 $\frac{8}{11}$ —	c. 5
— 60 - 70 — 8 $\frac{2}{11}$	31	2 —	7 $\frac{8}{11}$ —	c. 3 $\frac{3}{4}$
— 70 - 80 — 14 $\frac{10}{11}$	30	6 $\frac{5}{10}$ —	13 $\frac{1}{11}$ —	c. 2
— 80 - 100 — 16 $\frac{9}{11}$	26	16 $\frac{9}{11}$ —	26 —	c. 1 $\frac{1}{2}$
Summa: 96 $\frac{3}{11}$	215			

Denne Oversigt viser, at Mæslingerne, maaskee i Forbindelse med den i Foraaret grasserende Krujme-epidemi, vare fordærlige for de spæde Børn under 1 Aar, hvorimod de ikke mærkeligen forøgede Dødeligheden imellem det 1ste og 20de Leveaar, eftersom Sygdommen i denne Livsperiode var mindst farlig, men at Dødeligheden fra det 30te Aar af stiger, indtil den for Alderen imellem 50 og 60 Aar bliver størst, nemlig 5 Gange saa stor som sædvanlig, hvorhos den da efter det 60de Aar igjen daler, ikke fordi Sygdommen var mindre farlig for de endnu Ældre, hvilket ingenlunde var Tilfældet, men fordi det netop var 65 Aar siden, at Mæslingerne sidst grasserede paa Færøerne, og de, som som dengang havde overstaaet Sygdommen, nu bleve forskaanede.

Følgende Oversigt viser, hvorledes Mæslinge-Epidemien paa Færøerne, uagtet den Forskjellighed, som maatte fremkomme derved, at ingen Alder blev forskaanet, medens Mæslingerne i Danmark jo kun pleje at angribe Børn, bidrog til at gjøre Mortalitetsforholdene for 1846 mere lig de for Danmark gjældende Dødelighedsforhold end sædvanlig. Det kunde derefter synes, som om den ejendommelige Maade, hvorpaa Mæslingerne virkede paa Færøernes Mortalitetsforhold, havde Noget tilfældeds med den Maade, hvorpaa Mængden af flere samtidig grasserende Epidemier virker paa Dødeligheden i Danmark og andre Lande.

Dødeligheden paa Færøerne (med Undtagesle af Suderø) i de første $\frac{3}{4}$ af Aaret 1846, beregnet paa 1000 Individer, istedenfor paa den virkelige Dødelighed af 215.	Dødeligheden i Danmark i Aarene 1829—33 incl., beregnet paa 1000 Mandfolk.	Dødeligheden paa Færøerne (med Undtagelse af Suderø) i Aarene 1835—45 incl., beregnet paa 1059 Individer, hvoriblandt 60 vare dødfødte eller døde inden 24 Timer.
Under 1 Aar 233 imellem 1 og 10 Aar 28 } tilsammen 261. — 10 - 20 — 23 — 20 - 30 — 37 — 30 - 40 — 60 — 40 - 50 — 84 — 50 - 60 — 130 — 60 - 70 — 144 — 70 - 80 — 140 — 80 - 100 — 121	366 43 56 60 77 105 123 113 57	199 } tilsammen 279. 80 } 60 72 68 81 60 90 164 185

Den Indflydelse som Mæslinge - Epidemien i Aaret 1846 havde paa Færøernes Mortalitetsforhold, kan tjene som Exempel til at oplyse, hvilken Indflydelse Epidemier overhovedet have til at decimere et Lands Befolkning. Selve Mæslingerne pleje under sædvanlige Forhold kun at true Børn, medens de paa Færøerne angrebe næsten hele Befolkningen uden Hensyn til Alderen, men de Epidemier tilsammen, som grassere i andre Lande men tildels forskaane Færøerne, true ogsaa hele Befolkningen uden synderligt Hensyn til Alderen. I hvert Tilfælde troer jeg at have godtgjort, at den væsentligste Aarsag til de gunstige Mortalitetsforhold paa Færøerne maa søges i disse, ved deres Beliggenhed saavel som ved Handelsforholdene isolerede, Øers Fritagelse for mange Sygdomme, som paa andre Steder, f. Ex. i Danmark, forøge Dødeligheden meget betydeligt. Det er saaledes indlysende, at prophylaktiske Forholdsregler imod fremmede Sygdommes Opkomst og Udbredelse, have en meget høj Betydning paa saadanne Steder, hvor de kunne iværksættes, som f. Ex. paa Færøerne, medens de blive betydningsløse der, hvor de ved en større Konflux af Mennesker og andre Forhold, gjøres udførlige, f. Ex. i Kjøbenhavn. Her vilde derfor en Karantæneforordning imod Mæslingerne synes at være latterlig, men Færøerne vilde sandsynlig ikke have mistet henvend 100 Indbyggerne, hvis ikke en imod Mæslingernes Indsnigelse rettet Forordning for nogle Aar siden var bleven op hævet,

II.

Mæslingerne ere en saa almindelig bekjendt og næsten triviel Sygdom, at man ikke skulde vente, at lagttagelser over dem kunde frembyde noget Nyt undtagen i enkelte Tilfælde, ved mer eller mindre sjældne Komplikationer. Her er det imidlertid ikke min Hensigt at gaae ind paa Enkeltheder, som kun have en mer eller mindre partiel Interesse, men at meddele nogle lagttagelser over Mæslingekontagiets Natur, som særegne gunstige Forhold gjorde det muligt for mig at anstille, og som jeg troer fortjene nogen Opmærksomhed.

Om Inkubationsstadiets Længde savnede man hidtil, saavidt jeg veed, nøjagtige og tilfredsstillende Observationer, idet nogle Forfattere anslaae det til 8, andre til 10—14 Dage, og atter andre slet ikke antage nogetbestemt Stadium contagii latentis. Dette kan imidlertid ikke være paafaldende, da lagttagelser herover ikke vel kunne anstilles, hvor der findes et mere levende Samkvem imellem

Befolkningen, hvor altsaa ethvert Individ kommer i Berørelse med et stort Antal andre Individ, blandt hvilke ethvert kunde føre Smittestof med sig.

Her i Kjøbenhavn f. Ex. vil det være yderst sjældent, at man kan sige om en Mæslingepatient, at han kun engang, paa den eller den Dag, har været udsat for for Smitte, da det næsten aldrig vil kunne bevises, at han aldeles ikke, hverken tidligere eller sildigere, uden at vide det, har været udsat for Mæslingekontagiets Indvirkning. For at kunne komme til noget bestemt Resultat i den Henseende, udfordres særegne Omstændigheder, som gjøre det muligt at anstille nøjagtige lagttagelser, og disse Omstændigheder vare givne paa Færøerne. Bøjgdernes isolerede Beliggenhed og i det Hele ubetydelige Samkvem, gjorde det muligt i mange, ja i de fleste Tilfælde, at faae Vished om, hvor og naar den, som først blev syg, havde været udsat for Smitte, og at bevise, at Kontagiet hverken før eller efter den bestemte Dag havde kunnet indvirke paa ham.

Den Første, som fik Mæslingerne paa Færøerne, var en nu i Thorshavn bosat Snedker. Han forlod Kjøbenhavn den 20de Marts og naaede Thorshavn den 28de, havde undervejs befundet sig fuldkommen vel, men blev i de første Dage af April, uvist paa hvilken Dag, angrebet af Mæslinger. Kort før hans Afrejse havde han besøgt Mæslingepatienter i Kjøbenhavn. Omtrent 14 Dage senere bleve hans 2 nærmeste Omgangsvener angrebne. Disse ihvorvel unøjagtig observerede Fakta¹³, som før min Afrejse fra Thorshavn meddeltes mig, bestemte mig dog til paa mine Omrejser at være opmærksom paa Inkubationsstadiets Længde.

Den første Bøjgd, jeg paa mine Omrejser kom til (den 2den Juli), var Tjørnevig paa Nordstrømmø, hvor 80 af de 100 Indbyggere laae af Mæslinger. Den 4de Juni havde en Baad med 10 Mand fra Tjørnevig del taget i en Grindefangst i Vestmannhavn, og netop den 14de Dag derefter, den 18de Juni, udbrød Mæslingeexanthemet hos alle 10 Mand, efterat de i 2–4 Dage havde befundet sig ilde og lidt af Hoste og Smerter i Øjnene.

De omtalte 10 Mænd havde intetsteds været samlede uden paa den anførte Grindefangst, og ingen af dem havde været nogensteds, hvor de i fjerneste Maade kunde antage at have været udsat for Smitten, som de frygtede og skyede. I Vestmannhavn derimod havde de ikke blot været i Berørelse med mange Mænd, som nylig (maaskee tildels endnu med blomstrende Exanthem) vare komne op efter Mæslingerne, men havde ogsaa i længere Tid opholdt sig i Huse, hvor Personer Dagen derefter maatte søge Sengen formedelst Mæslingeexanthemets Udbrud. 12–16 Dage efter at disse 10 Mænd havde faaet Mæslinger (beregnet fra Exanthemets Udbrud) udbrød Mæslingeexanthemet næsten hos alle de andre Beboere, med Undtagelse af nogle ganske faa Individ, som først bleve angrebne 12–16 Dage efter det andet Nederlag.

Dette maatte vække den Formodning, at Mæslinge kontagiet i længere Tid, sædvanlig 10–12 Dage efter dets Optagelse i Organismen ikke frembringer nogen synlig Virkning, da det katarrhalske Forløberstadium først begyndte efter denne Tids Forløb; og at Exanthemet først kommer tilsyne den 14de Dag efter Smittestoffets Optagelse. Hvis denne Formodning bekræftede sig, saa vilde den lagttagelse, at andet og tredie Nederlag paafulgte hvert med omtrent 14 Dages Mellemrum, gjøre det sandsynligt, at Mæslingerne ere mest smitsomme under Eruptions- og Efflorescensstadiet, ikke som sædvanlig angives under Afskallingen.

For at undersøge hvorvidt, disse Formodninger vare grundede eller ikke, besluttede jeg, i hver Bøjgd hvor jeg kom, at optage et lille Forhør, saa nøjagtigt som muligt, over Sygdommens Oprindelse, Anledning og Udbredelse. Paa denne Maade har jeg for 52 Bøjgder antegnet Navnene paa de

¹³ Landkirurg Regenburt, som var Snedkerens Læge, var selv syg, dengang da dennes Sygdom var heftigst, hvilket saa vidt Hr. Landkirurgen kan mindes, var den 4de April.

Personer, som først fik Mæslinger, Lejligheden hvorved og Datum hvornaar de vare udsatte for Smitte, Datum naar Exanthemet kom tilsyne hos dem, og hvorlænge derefter andre Indbyggere fik Exanthemet. Det vilde imidlertid blive for trættende, at gennemgaae dette for hver enkelt Bølgd, saameget mere, som jeg overalt har fundet ovenstaaende Formodninger bekræftede og ikke er stødt paa noget Tilfælde, som kunde vise, at der fandtes Undtagelser fra Reglen. Jeg vil her derfor kun anføre nogle Tilfælde, hvor dette Forhold bekræftedesig paa en ret paafaldende Maade.

I Welberstad i Sydstrømø fik jeg Opgivelser, som strede imod min Formodning om et Inkubationsstadium af en bestemt Længde, forsaavidt som der hos en Syg kun skulde have været 10 Dage imellem det Øjeblik, da Patienten var udsat for Smitlen, og den Dag, da Exanthemet kom tilsyne. Da det var en meget paalidelig Mand, som opgav dette for mig, og den paagjældende Patient var hans egen Kone, troede jeg her at have fundet en Undtagelse fra Reglen. Men ved Olai (den 29de Juli) sendte den samme Mand mig en Hilsen ved sin Brodersøn, Pastor Djurhuus, at hans Opgivelse ikke havde været rigtig, men at det netop var 14 Dage, istedenfor 10 Dage, der var imellem det Øjeblik, da hans Kone udsatte sig for Smitten, og den Dag da hun fik Exanthem. Manden havde kort før min Ankomst samtidig tabt en kjær Hustru og en Søster, og hans Sorg havde gjort ham distrahit.

Det andet Tilfælde, hvor jeg troede at finde en Undtagelse fra Reglen, var i Hattervig paa Fuglø. En ung Mand, den første som der havde faaet Mæslinger, opgav for mig, at han ikke havde været udenfor Hattervig undtagen 2den Pindsedag (den 1ste Juni), da han tilligemed en anden Mand var i Arnefjord paa Bordøen, hvor Mæslingerne dengang ikke vare udbrudt, men hvor han senere havde erfaret, at en Mand den 3die og to andre den 8de Juni havde faaet Exanthem¹⁴. Denne unge Mand forsikrede, at Exanthemet hos ham var udbrudt den 11te Juni, men hos hans Ledsager først den 14de. Omendskjøndt jeg foresillede ham, at det var af stor Vigtighed for andre Mennesker, at han sagde mig Sandheden, og at der ikke var Talen om noget Ansvar for ham, vilde han ikke indrømme, tidligere at have været udsat for Smitte. Men om Aftenen, da jeg iført færøske Klæder opholdt mig i Røgstuen, kom han til mig og bad mig om Forladelse, fordi han ikke havde husket sig ret om; han havde nemlig den 30te Mai ogsaa været i Klaksvig, og i beskjenket Tilstand været inde i flere Huse, hvor der vare Mæslinger. Den noget forhørmæssige Form, som jeg havde anvendt, havde gjort den unge Mand paa det isolerede Fuglø ængstelig, og havde bragt ham til at fordølge Sandheden.

I Selletræd paa Østerø sagde man mig, at en ung Mand var bleven smittet den 4de Juni ved Grindefangsten i Vestmannhavn, og at han den 9de Juni havde faaet Exanthem, samt at hans yngre Broder og andre Folk i Bølgden vare blevne smittede ved ham og den 17de Juni havde faaet Exanthem. Jeg bad om Almanakken og spurgte, hvor den ældre Broder havde været den 26de Maj (14 Dage før Exanthemets Udbrud hos ham). Man sagde mig da, at han netop paa den Dag havde været i Nord-Øre, hvor der grasserede Mæslinger, og at han samme Dag undervejs i Sydre-Gøthe havde ligget i Seng med P. Johnsens Enkes Tjenestekarl, men at han i Nord-Øre ikke havde været inde i noget Hus, og at der i Sydre Gøthe dengang ikke fandtes Mæslinger. Ved imidlertid at see efter i mine Optegnelser fandt jeg, at den omtalte Tjenestekarl var den første Person, som fik Mæslingerne i Sydre-Gøthe, og at Exanthemet et Par Dage senere var udbrudt over hele hans Legeme. Dernæst erfor jeg, at netop de Folk i Bølgden, som samtidig med den yngste Broder havde faaet Mæslingeexanthem, havde været samlede med Brødrene ved Grindefangsten i Vestmannhavn. Det var nu for mig klart, at den ældste Broder var bleven smittet i Gøthe (eller muligen i Nord-Øre) og den yngste tilligemed de andre Brødre i Vestmannhavn.

¹⁴ Dette forholdt sig rigtigt. Den ene Mand havde den 20de Mai været ved Handelsstedet Klaksvig, hvor Mæslingerne grasserede, og han fik Exanthem den 3die Juni; de 2 andre havde været sammesteds den 25de Mai og fik Exanthem den 8de Juni.

Fuglefjord paa Østerø var jeg ved mine lagttagelser nær kommet Ry for at kunne spaae. Ved min første Ankomst dertil havde Bonde og Kirkeværge J. Hansens Datter nylig havt Mæslinger, men var nu kommet op og befandt sig paa lidt Hoste nær fuldkommen vel. Alle 9 andre Personer i Huset følte sig i enhver Henseende raske, og de ytrede deres Haab om at slippe for Sygdommen. Jeg spurgte hvilken Dag Exanthemet havde viist sig hos Datteren, bad dernæst om Almanakken og pegede paa den 14de Dag efterat Exanthemet først iagttoges hos Datteren, med den Bemærkning, at de skulde gjøre en sort Streg under den Dag, thi paa den frygtede jeg for, at Mæslingerne vilde vise sig hos Andre i Huset, hvis det ikke skete, saa kunde de maaskee gjøre sig noget Haab om at blive forskaanede. Tilfældigvis blev jeg rigelig 10 Dage senere igjen hentet til Fuglefjord, og man kom mig imøde med det Udraab: "ret var det, som han sagde! den Dag han viste, sloge Mæslingerne med de røde Pletter ud hos alle 9!"

Da jeg paa min første Omrejse havde fundet mine Formodninger stadfæstede i de 13 Bølgder, som jeg paa den tilsaae, ansaae jeg det for min Pligt at meddele dem til mine Kolleger, navnlig Landkirurg Regenburg i Thorshavn og Kandidat Manicus, som opholdt sig paa Suderø. Begge have senere sagt mig, at ogsaa de have fundet dem stadfæstede i deres Praxis, uden dog at være forsikrede om, at der ikke fandtes Undtagelser fra Regelen. Den praktiserende Læge, Kandidat Nolsøe forsikrede mig, ligeledes overalt at have fundet de anførte lagttagelser stadfæstede i sin Praxis med Undtagelse af Skaalevig paa Sandø, hvor den almindelige Regel slet ikke holdt Stik, og hvor det var umuligt at opdage noget bestemt Inkubationsstadium eller nogen Regel for Sygdommens Udbredelse. Den 24de September kom jeg imidlertid selv til Skaalevig, hvorved jeg blev sat istand til at skaffe mig nøjagtig Underretning derom, og erfor Følgende. Hr. Kandidat Nolsøe var før Pindse 3 Gange bleven hentet til Skaalevig, fordi der graserede en heftig Krujmepidemi i Bølgden, første Gang den 5te, anden Gang den 12te og tredie Gang den 18de Maj. Den 19de Mai fik en af de Mænd, som havde været med for at hente Lægen første Gang, Mæslingeexanthem, og den 25de en af de Mænd, som havde hentet ham anden Gang. Den første Mand, som fik Mæslingerne, havde en Søster, som tjente hos den rige Bonde J. Dahlsgaard. Hun havde uagtet Husbondens Forbud seet til Broderen, og fik Exanthem den 2den Juni (14, Dage efter Broderen); en anden Tjenestepige hos samme Bonde havde besøgt den anden Mand, som havde faaet Mæslingeexanthem den 25de Maj, og hun fik Exanthem den 7de Juni. Dernæst fik Husmoderen Exanthem den 16de Juni (14 Dage efter den første Pige); 3 Børn og 2 Tjenestekarle den 20de Juni (13 Dage efter den anden Pige); Husbonden den 30te Juni (14 Dage efter Konen); den ældste Datter den 4de Juli (14 Dage efter Sødskendene) og den ældste Søn den 7de Juli. I flere Huse, hvor jeg søgte Underretning om Mæslingernes Oprindelse, erfor jeg, at først en Tjenestepige eller Tjenestekarl, hvis Familie havde Mæslinger, var bleven smittet, og 14 Dage derefter Een eller sædvanlig Flere i Huset. Den nærmere Undersøgelse viste da her, at Skaalevig langt fra at frembyde nogen Undtagelse fra Reglen, tvertimod afgav et meget fuldstændigt Exempel paa Inkubationsstadiets konstante Længde og Mæslingernes største Smitsomhed i Efflorescensstadiet. Den eneste Afvigelse fra det, som almindelig iagttoges, bestod i Sygdommens langsommere Omsiggriben i Skaalevig end i de andre Byer, og dette syntes at være paafaldende, da man almindelig sagde, at Beboerne af Skaalevig slet ikke skyede Mæslingesmittet. Men denne Afvigelse finder ligeledes sin naturlige Forklaring ved en nærmere Betragtning af Forholdene. Skaalevig er nemlig en af de færøske Bølgder, som ligger mest spredt; sædvanlig ligge Husene enten isolerede midt ude i Marken eller 2–3 tilsammen; i den største Byling med 6 Huse havde Mæslingerne ved min Ankomst gjort deres fuldstændige Runde. Bonden J. Dahlsgaards Bolig, hvor Mæslingernes langsommere Omsiggriben var mest paafaldende, udmærker sig ved sin Størrelse og Rummelighed, samt derved, at Soveværelserne i den ere adskildte i langt større Grad fra hinanden, end i de fleste andre, ja maaskee end i alle andre færøske Huse. En anden væsentlig Omstændighed fandt jeg deri, at Folk i Skaalevig, som man overalt forsikrede mig, især i Begyndelsen, ikke fra noget

Hus, som endnu var fritaget for Sygdommen, var gaaet ind i noget sygt Huus og at Husfædrene havde paalagt deres Børn og Tyende at undgaa Samkvem med de syge Huse. Kun ved Arbejder og Sammenkomster i fri Luft havde Folk fra de sunde og de syge Huse ikke skyet hinandens Omgang, og deraf var det kommet, at man sagde, at Skaalevigs Beboere ikke skyede Mæslingesmitten, hvilket saaledes, strengt taget, ikke var rigtigt. En tredje Omstændighed, som især henimod Slutningen kom i Betragtning, var uden tvivl Smittens henimod Epidemiens Ophør aftagende Intensitet. Ligesom her greb Sygdommen henimod Epidemiens Slutning langsomt om sig i Kunø, Midtvaag og Sandevaag.

Istedenfor at der i Epidemiens Kraftstadium, f. Ex. i Tjørnevig, c. 14 Dage efterat en eller nogle enkelte Personer havde faaet Mæslinger, Pluraliteten af Bøjgdens Beboere blev angrebet, medens kun et relativt ringe Antal blev forskaanet indtil 14 Dage efter det store Nederlag, saa bleve Folk i de sidstnævnte Bøjgder syge efterhaanden, saaledes at kun nogle Faa bleve angrebne, 14 Dage efter den, som først fik Sygdommen; 14 Dage senere Andre; omtrent 14 Dage efter disse atter Andre o. s. v., saaledes at Sygdommen vedligeholdte sig længere i de sidst angrebne Bøjgder, end i dem, som allerede tidlig bleve befængte. Derhos bevarede alligevel Mæslingerne idetmindste efter mine Erfaringer deres bestemte Udviklingstid (fra Smittens Optagelse indtil Exanthemets Udbrud), og jeg veed intet Tilfælde, hvor Mæslingerne efter en mere end 14 Dages Pause havde viist sig paany i en Bøjgd, uden at der havde fundet en ny Smitte Sted andetstedsfra. Dog kan man ikke benægte Muligheden af, at Smittestoffet kan gjemmes i længere Tid efter Mæslingernes Ophør f. Ex. i Uld, Klæder eller andre Ting, som ere skikkede til at optage det.

Den Regel: at Mæslingekontagiet i længere Tid efter dets Optagelse i Organismen slet ikke frembringer nogen sygelige Phænomener, og dernæst efter et ubestemt Stadium prodromorum, ifølge mine Erfaringer altid den 13de eller 14de Dag frembringer det bekjendte Exanthem, har saaledes for mig i en betydelig Række af nøjagtige Observationer viist sig konstant. Derhos kan det vel ikke nægtes, at Patienternes Konstitution, Diæt etc. kan bidrage Noget til at paaskynde eller forsinke Exanthemets Udbrud; men ikke nær saa meget som man havde kunnet vente a priori; og det synes som om de ydre Forhold neppe ere istand til at paaskynde eller forsinke Exanthemets Udbrud mere end henved 24 Timer paa den ene eller anden Side af den normale Udbrudstid, som maa søges omtrent paa Grænsen imellem den 13de og 14de Dag. Idetmindste troer jeg efter mine lagttagelser over Mæslingernes Udbrud i 52 forskellige Byer, hvor jeg altid fandt ovenstaaende Regel stadfæstet, ofte endog ved flere Data for en enkelt By, at være berettiget til at forlange, at Undtagelser fra Reglen (hvis Existens jeg jo ikke tør benægte, ihvorvel jeg ikke har seet dem), som man kunde fremføre imod min Paastand, ere nøjagtigen observerede og ere af den Beskaffenhed, at de have Beviskraft. De anførte Exempler vise nemlig tydeligt nok, at tilsyneladende Modsigelser imod Reglen ved en nøjagtigere Undersøgelse ofte allermest tjene til at stadfæste den; jeg selv følte mig i de fleste af de anførte Tilfælde rokket i min Tro paa et konstant Inkubationsstadium, men i alle disse Tilfælde svandt min Tvivl ved en nøjagtigere Undersøgelse.

Analogien med de Erfaringer, man har gjort over Koppernes Inkubationsstadium paa 14 Dage imellem Kontagiets Optagelse og Koppernes Udbrud giver disse lagttagelser, som mig synes, endnu mere Betydning.

En Omstændighed, som let kan bringe Konfusion ind i disse Undersøgelser, er det katarrhalske Forløberstadiums ubestemte Længde. Nogle Syge lede nemlig 6–8 Dage før Exanthemets Udbrud af Hoste, Smerte i Øjnene og lette Feberbevægelser, Andre kun i 4–6 Dage, de Fleste kun i 2–4 Dage, og i mange lette Tilfælde manglede Forløberstadiet enten ganske eller varede kun 1–2 Dage. Man maa derfor ikke spørge Patienterne om, naar de bleve syge, men naar de fik Exanthem, hvis man vil vente at faa Oplysninger om Længden af det Tidsrum, som Kontagiet behøver for at udvikle Exanthemet.

Naar det nu betragtes som en Regel, at Mæslingekontagiet behøver imellem 13 og 14 Dage efter dets Optagelse i Organismen for at udvikle Exanthemet, og ligesaa talrige Erfaringer, som de der begrundede denne Regel, vise, at der sædvanlig netop ligge 13–14 Dage imellem det Øjeblik, da Exanthemet viste sig hos en Patient og det Øjeblik, da Exanthemet udbrød hos hans smittede Omgivelser, saa er det klart, at de Personer, som bleve smittede af ham, optog Kontagiet i deres Organismer netop paa den Tid, da Exanthemet udbrød eller nylig var kommet frem hos ham. Heraf er det idetmindste klart, at Mæslingerne ikke smitte, saalænge Kontagiet endnu ligger skjult, uden at have fremkaldt nogen sygelige Phænomener. Hvorvidt de kunne antages at være smitsomme i det katarrhalske Forløberstadium kort før Exanthemets Udbrud, er vanskeligt at afgjøre. Jeg har seet ikke faa Tilfælde, hvor man efter Patientens Udsagn skulde antage, at de kun havde været i Berørelse med Personer, som havde Prodromi, men ikke endnu Exanthem. De meddelte Exempler om den Mand fra Fuglø, som blev smittet i Arnefjord, og den Mand fra Selletrød, som blev smittet i Gøthe, kunde f. Ex. tale derfor. Men da jeg saa mange Gange har seet, at Folk havde tydeligt Exanthem i Ansigtet, uden selv at vide Noget deraf førend jeg viste dem det, men ofte først blive opmærksomme derpaa, naar det efter en Dags Forløb har udbredt sig over hele Kroppen, saa troer jeg ikke, at man med Sikkerhed kan antage, at Mæslingerne undertiden ogsaa smitte før Exanthemets Udbrud. Idetmindste ere de af mig iagttagne Tilfælde, som kunde synes at tale derfor, af den Beskaffenhed, at man ikke med Bestemthed tør paastaae, at der ikke var Exanthem tilstede hos de smittede Personer; thi i alle disse Tilfælde var Exanthemet en eller et Par Dage senere udviklet over hele Legemet.

Man har almindelig paastaaet, at Mæslingerne ere mest smitsomme i Deskvationsperioden. Jeg veed ikke, hvorpaa denne Paastand grunder sig; men jeg er tilbøjelig til at antage, at man er kommet til denne Anskuelse ved at see, at en Mæslingepatients smittede Omgivelser først fik Mæslingeexanthem, naar Patienten befandt sig i Deskvationsstadiet. Er nu lagttageren ubekjendt med det forholdsvis lange Stadium contagii latentis, saa er det naturligt, at han antager, at Smitten udgik fra den første Syge i et senere Stadium, end virkelig var Tilfældet. Det har ikke været mig muligt at finde noget Tilfælde, som kunde bevise, at Deskvationsstadiet virkelig kan afgive noget Kontagium; men ligesaa lidt kan jeg bevise, at det ikke kan smitte. I nogle Bøjgder bleve enkelte yngre Individuer, som ikke tidligere havde faaet Mæslinger og idelig vare udsatte for Smitten, ganske forskaaenede og smittedes hverken af Mæslingepatienter, som havde Exanthem, eller af dem, som skallede. Saameget troer jeg imidlertid, i Henhold til den opstillede Regel, at der ligger 13–14 Dage imellem Kontagiets Indvirkning og Exanthemets Udbrud, at kunne forsikre, at Smitten i de allerfleste, om ikke i alle Tilfælde udgik fra Mæslingepatienterne, medens Exanthemet udbrød eller nylig var kommet frem, og der er mig ikke noget Exempel bekjendt, hvor en Person havde faaet Mæslinger mere end 14 Dage efterat Exanthemet var forsvundet hos de Personer, som kunde antages, at have paaført ham Smitten. Det er ikke umuligt, at Aarsagen hertil tildels ligger deri, at en Mæslinge patients for Smitten modtagelige Omgivelser saa at sige altid allerede bleve smittede af ham, naar han har Exanthem, og saaledes ikke kunne smittes, medens han deskvamerer; men det er vist, at Mæslingerne under Udbruddet og i Efflorescensstadiet ere overmaade smitsomme, hvorimod deres Smitsomhed baade i Stadium prodromorum og desquamationis er tvivlsom. Hvorvidt dette skyldes de Syges Uddunstninger, der ere stærkest, og hvis ejendommelige syrlige Lugt er mest karakteristisk under Udbruddet og paa Efflorescensens første Dag, tør jeg ikke paastaae med Bestemthed; men det forekommer mig højst rimeligt.

Paa Hr. Landkirurg Regenburs Opfordring vaccinerede jeg paa en af mine Omrejser 60 Børn, for at see hvorvidt den lette Feber, som fremkaldes ved Kokoppernes Udvikling, stod i noget fjendtligt Forhold til Mæslingerne; men jeg kom til det Resultat, at der slet ikke finder noget Forhold Sted imellem Kokopper og Mæslinger; men at de kunne udvikles samtidig ved Siden af hinanden. Med

Inokulation af Mæslinger anstillede jeg ingen Forsøg, da jeg hos de Personer, som bevislig vare udsatte for Mæslingekontagiet, ikke kunde vente noget Resultat, og hos Personer, som ikke havde været udsatte for Smitte, maatte befrygte at gjøre Skade istedetfor Gavn.

Det er som bekjendt almindelig antaget, at Mæslinger i nogle Tilfælde 2 Gange kunne angribe et og samme Individ. I den Henseende er det imidlertid mærkeligt nok, at der paa Færøerne blandt de mange endnu levende Gamle, som 1781 havde Mæslingerne, saavidt jeg ved nøjagtig Efterspørgsel har kunnet bringe i Erfaring, ikke en Eneste blev angreben anden Gang. Af saadanne gamle Folk, som bleve fri, fordi de i deres Ungdom havde overstaaet Sygdommen, har jeg allene seet 98. Dette er saa meget mere paafaldende, som en høj Alder ingenlunde svækkede Modtageligheden for Mæslinger, da, saavidt jeg veed, alle de Gamle, som ikke havde overstaaet Mæslingerne tidligere, bleve angrebne naar de vare udsatte for Smitte, medens dog enkelte yngre Personer, ihvorvel bestandig udsatte for Smitte, bleve forskaanede. Naar det, at have overstaaet Mæslingerne for 65 Aar siden, kan befrie Folk for at faae dem andeu Gang, saa skulde man troe, at det endnu maatte beskytte bedre, at have overstaaet dem for kortere Tid siden, og jeg er derfor tilbøjelig til at antage, at de Tilfælde, hvor man vil have iagttaget Mæslinger 2 Gange hos samme Individ beroe paa en fejlagtig Diagnose, eller idetmindste ere overmaade sjeldne.

Man har været uenig om, hvilken Grad af Intensitet man skulde tiltroe Mæslingesmitten. Som Bidrag til dette Spørgsmaals Besvarelse synes følgende Tilfælde ikke at være uden Inferesse:

Den 2den Juni afgik en Baad fra Funding til Handelsstedet Klaksvig, for at hente Varer. De Handelssøgende kunde imidlertid ikke faae Varer, med mindre de vilde hjælpe til at udlade Korn af Transportskibet, der nylig var kommet fra Thorshavn. Ombord paa Skibet vare Mænd, som lige vare komne op efter Mæslingerne, og Handelsbetjentene i Klaksvig vare just sengeliggende af dem. Mændene fra Funding, som havde været nede i Skibslasten og i Pakhusene, men forresten ikke havde været hos Mæslingesyge, kastede efter deres Hjemkomst alt det Papir, som var omkring deres Varer, bort, klædte sig aldeles om i en Kjæld (et Udhus, der er indrettet til at tørre Fisk), vaskede sig over hele Legemet med Vand, iførte sig rene Klæder og kastede alle de Klæder, de havde havt paa, i Vand. Ingen af disse Mænd fik Mæslinger før den 3die Juli, da allerede hele Bølgden var angreben. Den 3die Juni afgik en anden Baad fra Funding tilligemed en Baad fra Nordre-Gjov til Handelsstedet. Mændene fra disse Baade maatte, for at faae Varer, lade Skibet med tørrede Fisk. En Mand fra Funding fik Ondt og maatte gaae ind i et Hus, ja i en Stue, hvor der laa flere Mæslingesyge; de andre Mænd fra Funding og Mændene fra Nordre-Gjov, vare kun inde i Skibsrummet og i Pakhuset, hvor de stode tæt sammentrængt med andre Mennesker, hvoriblandt der var en Mand fra det af Mæslinger angrebne Nord-Øre.

Efter deres Hjemkomst gjorde Mændene fra Funding ligesom de Mænd, der med den første Baad havde været i Klaksvig – og Ingen af dem blev syg, før hele Bølg den var angreben. Mændene fra Nordre-Gjov, som ikke havde foretaget samme omhyggelige Renselse efter Hjemkomsten, fik alle 5 Exanthem omtrent 14 Dage derefter.

Den 8de Juni var en tredie Baad fra Funding i Klaksvig; da vare Handelsbetjentene netop komne op af Mæslinger, og der vare Folk fra Leervig, som første Gang efter Mæslingerne vare komne ud; Fundingsmændene vare i idelig og nær Berørelse baade med Handelsbetjentene og Folkene fra Leervig. Omendskjøndt de ved Hjemkomsten iagttog samme Forsigtighed, som de tidligere Handelssøgende fra Leervig, saa bleve dog Alle, med Undtagelse af et (ikke frugtsommeligt) Fruentimmer, angrebne af Mæslinger og fik Exanthem omtrent 14 Dage derefter.

Kvalvig paa Nordstrømø var en af de Bølgder, hvorman mest frygtede for Mæslingesmitten. I hvor villige Færingerne ellers vare til at befordre mig videre og til at vise mig Tjenstvillighed, saa var i Kvalvig Frygten for Mæslinger saa stor, at man næsten nægtede mig Befordring til Vestmannhavn, og da jeg fik den, holdt Mændene, som bare mit Tøj, sig i lang Afstand fra mig, og den Mand, som førte Hesten, havde indsvøbt Hovedet i et stort Tørklæde, og holdt sig altid idetmindste i 3 Skridts Afstand fra mig. Dette var paafaldende, da Færingerne ellers pleje at være overbeviste om, at Lægen aldrig fører nogen Smitte med sig; men Aarsagen til deres Frygt laa i den Anledning, hvorved Mæslingerne vare førte til Kvalvig. 3 Uger før Pindse blev Landkirurgen nemlig hentet til Kvalvig, hvor der grasserede en stærk Krujmepidemi, og han maatte overnatte i Bølg den. I det Hus, hvor Landkirurgen havde tilbragt Natten, udbrød netop 14 Dage efter hans Ankomst Mæslinger.

Man kunde aldeles ikke angive nogen anden Anledning til Sygdommens Udbrud, da ingen Beboer af Kvalvig havde været paa noget mistænkeligt Sted, og navnlig ingen af dem, som boede i det først angrebne Hus, og da ingen anden Fremmed fra nogen af de angrebne eller mistænkelige Pladser havde været i Bølgden.

Fra Fuglefjord, hvor jeg havde tilseet mange Mæslingepatienter, blev jeg hentet til Mygledahl, som endnu var forskaanet. Da 8 Mænd uagtet deres Frygt for Sygdommen havde vovet at hente mig tilen Kone, der skulde være meget syg, var det min Pligt at gjøre, hvad der stod i min Magt, for at undgaae at bringe Mæslingerne til Mygledahl. Ved Ankomsten midt om Natten klædte jeg mig derfor om i et Udhus, hvori der tørredes Fisk, og iførte mig et Sæt Klæder, som jeg ikke havde havt paa hos Mæslingepatienter. Mygledahl er ikke senere bleven angrebet af Mæslinger.

Til Midtvaag paa Vaagø, paastod man, kom Mæslingerne ved Gjordemoderen, som paa Steegaard havde tilbragt flere Dage hos Mæslingepatienter. Konen selv havde overstaaet Sygdommen i Danmark. I alle de Huse, hvor Gjordemoderen havde været inde, sagde man, udbrød Mæslingerne 14 Dage derefter, og en Pige, som havde vasket Gjordemoderens Tøj strax efter hendes Ankomst, var den allerførste, som fik Mæslingerne i Midtvaag.

Disse Exempler, som synes at vise, at Mæslingekontagiet kan bringes videre i Klæder, som bæres af Personer, der selv ere uimodtagelige for Smitten, synes at vidne om en saa høj Grad af Kontagiositet, som man neppe ellers vilde have tiltroet Mæslingerne. Man skulde f. Ex. have troet, at det Kontagium, hvormed Lægens Klæder vare impregnerede, maatte blæses bort paa en 4 Mils Rejsei aaben Baad, især da Vejret paa denne hans Rejse var daarligt med Vind og Regn. Derhos synes det anførte Tilfælde med de handelssøgende Belboere af Funding, at vise, at en prophylaktisk Renselse, efterat have været udsat for Smitten, undertiden kan beskytte.

At det sikreste Middel til at hindre Sygdommens Udbredelse imidlertid er, hvor det lader sig gjøre, at holde Karantæne, er ganske utvivlsomt. Paa denne Maade lykkedes det i mange Bølgder ved en Hus spærring at hindre Sygdommens videre Udbredelse. Saaledes forskaanedes i Saxen 2 Huse, i Midtvaag 10, i Sandevaag 10, i Gaasedahl 2, i Glibre 2, i Funding 1, i Fundingbotn 1, i Nordskaale 1, i Selletræd (idetmindste ved min Ankomst) 4, den halve Del af Thorsvig og Lambavig, den største Del af Kvalvig, Skaapen og en Del af Skaalevig for Mæslinger. Ved at afbryde Samkvem med befængte Steder, lykkedes det Beboerne af følgende Pladser ganske at holde Mæslingerne borte: Haldersvig med 102 Indbyggere, Eldevig med 85, Andafjord med 121, Viderø med 101, Mygledahl med 66, Trollenæs med 29, Husum med 54, Blankeskaale med 51, Skare med 26, Skaaltofte med 19, Myggenæs med 99, Skuø med 61, Sands med 240, Husevig med 52, Skarvenæs med 26 Beboere. Ved at holde Karantæne forskaanedes saaledes c. 1500 af Færøernes Beboere for Mæslinger.

Naar der iblandt 6000 Tilfælde, hvoraf jeg selv har iagttaget og behandlet c. 1000, ikke fandtes et eneste, hvor man med nogensomhelst Grund kunde være berettiget til at antage en miasmatiske Oprindelse af Mæslingerne, fordi det overalt var klart, at Sygdommen var forplantet fra Mand til Mand og fra Bøjgd til Bøjgd ved Kontagium, hvad enten dette var modtaget ved umiddelbar Berørelse med en Syg, eller var tilført den Smittede ved Klæder o. desl., saa er man vistnok berettiget til, idetmindste at nære en betydelig Tvivl om Sygdom mens miasmatiske Natur.

Naar man overalt saa at sige kunde lukke Døren for Sygdommen, saa er man, efter min Mening, ikke blot i theoretisk Henseende berettiget til overalt at betragte den som en kontagiøs Sygdom, men i praktisk Henseende endog forpligtet dertil. Troer man nemlig at maatte søge Sygdomsaarsagen som almindelig udbredt i Atmosfæren, saa kan man ikke have noget Haab om at beskytte sig imod den, og vil heller ikke være tilbøjelig til at træffe Anstalter i den Hensigt, da man maatte ansee dem for forgjæves, men betragter man det som afgjort, at Mæslingerne kun overføres til saadanne Individuer, som modtage noget af det Smittestof, som enhver Mæslingepatient frembringer, hvad enten nu Smittestoffet er suspenderet i den Syge nærmest omgivende Luft, eller optaget i Klæder o. desl., saa kan man haabe at sætte Sygdommens Udbredelse Grændser, og vil i den Hensigt træffe de fornødne Foranstaltninger med grundet Haab om et heldigt Resultat. Der ere vist flere Læger, som have den samme Anskuelse om Mæslingernes miasmatiske-kontagiøse Natur, som Færøernes 2 Læger havde, da Mæslingerne kom til Landet. Da man holdt sig overbevist om, at Sygdomsaarsagen igjennem Luften vilde føres fra Hus til Hus, fra Bøjgd til Bøjgd og fra Ø til Ø, saa fandt man det ikke Umagen værdt itide at for tage en Spærring, hvorved Sygdommen sandsynlig havde kunnet indskrænkes til nogle ganske faa Huse. Erfaringen havde imidlertid 1781 lært en Del af Indbyggerne, at Mæslingernes Udbredelse kunde forhindres ved en Sted-, ja ved en Hus-Spærring; og de gamle Folk, som havde bevaret Erindringen herom fra deres Ungdom, iværksatte paa flere Steder, saaledes som foroven er anført, paa egen Haand en Slags Karantæne, hvorved de paagjældende Pladser ganske eller tildels bleve for skaanede. Først længere hen, da Erfaringen ogsaa havde lært Landets Læger, at Smitten overalt aabenbart førtes fra Sted til Sted ved Personer og ikke gjorde Spring, begyndte ogsaa de at fraraade Samkvem med de syge Huse og Pladser, – men da havde Sygdommen allerede udbredt sig over hele Landet, og det var for sent fra det Offentliges Side at træffe alvorlige Anstalter til Spærring. Erfaringen om Mæslingernes ikke miasmatiske, men rent kontagiøse Natur blev saa dyrt kjøbt paa Færøerne, at man vel vil være enig med os i, at det herefter er rigtigst, idetmindste i Praxis, at betragte Mæslingerne som en kontagiøs, ikke som en miasmatiske eller miasmatiske-kontagiøs Sygdom.

Et andet Spørgsmaal er det, om Mæslingerne under ganske særegne Omstændigheder kunne opstaae spontant. Paa Færøerne skete det ikke, og naar det overhovedet skeer, Noget, hvis Mulighed fra et theoretisk Standpunkt, i Analogi med Typhus o. desl. vel ikke kan benægtes, saa ere saadanne Tilfælde saa sjældne, at de med Hensyn til de Forholdsregler, man, især under Forhold som paa Færøerne, Island og andre isolerede Steder, maatte finde sig foranlediget til at træffe imod Sygdommens Udbredelse, slet ikke kunne komme i Betragtning._