



# Aufgabenseminar klassische Mechanik

[pankratius.github.io/rolf](https://pankratius.github.io/rolf)

## Looping (Maximilian Marienhagen)

In welcher Höhe  $h$  muss eine Kugel losrollen, um einen Looping mit Radius  $R$  durchqueren zu können?

## Bonbon (4. Runde zur 48. IPhO 2017)

Schätze ab, wie lange man braucht, um ein kugelförmiges Bonbon der Masse  $m$  zu lutschen.

Wie verhalten sich die Zeiten zueinander, wenn man zwei Bonbons betrachtet, von denen eines doppelt so schwer ist, wie das andere? Wie wenn eines einen doppelt so großen Radius hat wie das andere?

## Brunnen (Maximilian Marienhagen)

Ein Stein wird in einen Brunnen fallengelassen. Nach einer Zeit  $t$  hört man oben am Brunnenschacht das Auftreffen des Steins. Die Schallgeschwindigkeit sei  $c$ .

Wie tief ist der Brunnen?

## Motorrad in der Kugel (Maximilian Marienhagen)

Betrachte eine Kugel mit Radius  $R$  und einen (natürlich punktförmigen) Motorradfahrer, der mit einer Geschwindigkeit  $v$  in einem horizontalen Kreis des Radius  $r$  auf der Innenseite der Kugel fährt.

In welcher Höhe  $h$  über dem Boden ist er unterwegs?

## Kugelschuss (IPHO 1967)

Auf einer Säule der Höhe  $h$  liegt eine Kugel der Masse  $M$ . Völlig grundlos wird sie von einem Projektil der Masse  $m$  durchschossen, welches vorher mit der Geschwindigkeit  $v$  unterwegs war.

1. In welcher Entfernung  $p$  trifft das Projektil am Boden auf, wenn die Kugel in der Entfernung  $k$  aufkommt?
2. Welcher Teil der kinetischen Energie wird bei diesem Vorgang in Wärme umgewandelt?

## Brett auf Rollen (Vorbereitungsaufgabe für die 4. Runde zur 47. IPhO 2016)

Gegeben seien zwei parallele Zylinder mit identischem Radius  $R$  und Abstand  $L$  voneinander, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen. Auf ihnen liegt ein Brett der Masse  $m$ . Der Reibungskoeffizient zwischen Brett und Zylinder ist  $\mu$ .

Gib eine Gleichung für die Bewegung des Bretts an.

## Zylinder und Quader (IPHO 1968)

Auf einer schiefen Ebene mit Neigungswinkel  $\alpha$  liegt ein homogener Zylinder der Masse  $m$ , der durch eine inelastische Schnur mit einem Quader (Masse  $M$  und Reibungskoeffizient  $\mu$ ) verbunden ist.

Wie groß ist die Beschleunigung dieses Systems?

## Flummis (4. Runde zur 44. IPhO 2013)

Zwei Flummis mit Massen  $m$  und  $M > m$  werden direkt übereinander gehalten ( $m$  ist oben,  $M$  unten) und aus einer Höhe  $h$  fallengelassen. Sie stoßen vollkommen elastisch mit dem Boden und untereinander.

1. Welche Höhe erreicht der leichtere Flummi?
2. Wie muss  $M$  gewählt werden, damit der leichtere Flummi möglichst hoch fliegt?

## Trägheitsmoment (4. Runde zur 44. IPhO 2013)

Eine homogene Platte der Dicke  $d$  und Masse  $m$  besitze die Form eines gleichseitigen Dreiecks der Seitenlänge  $a$ .

Berechnen Sie das Trägheitsmoment der Platte bei Drehung um die zur Platte senkrechte Schwerpunktsachse. Hinweis: Es ist möglich (aber nicht zwingend erforderlich) diese Aufgabe ohne Integration zu lösen.