

Guia de Hongos para Senderistas

Identifica, Aprende y Mantente Seguro en el Sendero

Por Paola Adventurer | Archery · Camping · Explore

Como Usar Esta Guia

Hola! Si estas leyendo esto, probablemente eres de esas personas que notan cosas en el sendero que la mayoría ignora. Ese estante anaranjado creciendo en un tronco caido. Esa bola blanca colgando de un arbol. Ese embudo dorado asomandose entre el musgo.

Has tenido curiosidad. Ahora vas a saber que estas viendo.

Esta guia cubre 10 hongos que todo senderista deberia reconocer — 7 especies comestibles y 3 mortalmente toxicas. Para cada uno vas a encontrar:

- Como se ve (sombrero, laminas/poros, tallo, tamano)
- Donde y cuando encontrarlo
- En que regiones de Estados Unidos crece
- Con que se puede confundir
- Si es seguro o peligroso

Como buscar por area: Ve a la **Referencia Rapida por Region** al final de esta guia. Encuentra tu region, mira cuales de los 10 hongos crecen ahi, y ve directo a esas paginas.

Quieres imprimir? Cada hongo tiene su propia seccion. Imprime solo los que necesites para tu area, o imprime la guia completa — tu decides.

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Esta guia es para fines educativos e identificacion general. Nunca comas un hongo silvestre basandote unicamente en una guia escrita. Ante la duda, dejalo donde esta. Si sospechas envenenamiento por hongos, llama a Control de Envenenamientos (1-800-222-1222 en EE.UU.) o a tu numero de emergencias local inmediatamente. Siempre consulta con un recolector experimentado o micologo antes de consumir cualquier hongo silvestre.

Reglas de Oro Antes de Empezar

Antes de entrar a los hongos, grabate estas cinco reglas:

1. **Si tienes duda, dejalo.** Ninguna comida vale una visita al hospital. Si no estas 100% seguro, camina y sigue de largo.
 2. **Nunca comas hongos silvestres crudos.** Incluso los seguros necesitan cocinarse.
 3. **Aprende una especie a la vez.** No intentes aprender los 10 de golpe. Elige un comestible, aprende a reconocerlo bien, y despues pasa al siguiente.
 4. **La huella de esporas no miente.** Cuando la identificacion visual no alcanza, una huella de esporas te da una segunda confirmacion. Coloca el sombrero con las laminas hacia abajo sobre un papel (mitad blanco, mitad oscuro) por 4–8 horas. El color del deposito de esporas te ayuda a confirmar la especie.
 5. **Fotografialo todo.** Parte superior del sombrero, parte inferior (laminas/poros), tallo, base, y el habitat alrededor. Si necesitas ayuda de un grupo local de recolectores despues, esas fotos valen oro.
-

LOS 7 COMESTIBLES

1. Chanterelle (Rebozuelo)

Cantharellus cibarius

Estado: COMESTIBLE — Ideal para principiantes

Como se ve

- **Sombrero:** Dorado a amarillo yema de huevo, 5–12 cm de ancho, ondulado y con forma de embudo con bordes irregulares
- **Parte inferior:** Falsas laminas — pliegues bifurcados que bajan por el tallo, no laminas verdaderas tipo cuchilla. Esta es la clave de identificación
- **Tallo:** Sólido, del mismo color que el sombrero, se estrecha hacia la base
- **Carne:** Blanca a amarillo pálido al cortarlo
- **Olor:** Afrutado, casi como albaricoque
- **Tamaño:** 3–15 cm de alto

Donde y cuando

- **Habitat:** Pisos de bosque cerca de robles, coníferas y maderas duras. Crece del suelo (nunca de la madera)
- **Temporada:** Verano a principios de otoño (junio–octubre)
- **Crece:** Disperso o en pequeños grupos, rara vez en racimos densos

Regiones

Noroeste del Pacífico | Noreste | Sureste | Medio Oeste

Cuidado con: Jack O'Lantern (TOXICO — #10 en esta guía)

El Jack O'Lantern es el gemelo malvado del chanterelle. Diferencias clave: - Los Jack O'Lanterns tienen **laminas verdaderas y filosas** (no pliegues bifurcados) - Los Jack

O'Lanterns crecen **en racimos sobre madera** (los chanterelles crecen solos del suelo) - Los Jack O'Lanterns brillan levemente **en la oscuridad** (bioluminiscentes)

Si encuentras uno

Cocina bien en mantequilla o aceite. Nunca lo comas crudo. Los chanterelles son carnosos, ligeramente picantes y afrutados — uno de los hongos silvestres mas deliciosos del mundo.

2. Morilla (Morel)

Morchella esculenta

Estado: COMESTIBLE — Ideal para principiantes

Como se ve

- **Sombrero:** Superficie tipo panal de abeja con hoyos profundos y crestas, color canela a marron oscuro, forma de cono
- **Interior:** Completamente hueco de arriba a abajo al cortarlo por la mitad — esta es la característica #1 de identificacion
- **Tallo:** Blanco a crema, tambien hueco, textura ligeramente granulada
- **Tamano:** 5–15 cm de alto

Donde y cuando

- **Habitat:** Cerca de olmos, fresnos, manzanos y tulipaneros muertos o moribundos. Le encantan las areas quemadas (zonas post-incendio son minas de oro para morillas)
- **Temporada:** Primavera (marzo–mayo), uno de los primeros hongos del ano
- **Crece:** Solo o en grupos dispersos

Regiones

Noroeste del Pacifico | Noreste | Sureste | Medio Oeste | Montanas Rocosas

Cuidado con: Falsa Morilla (*Gyromitra esculenta*)

La falsa morilla puede causar enfermedad grave o muerte. Diferencias clave: - Las falsas morillas tienen **sombreros arrugados tipo cerebro** (no un patron limpio de panal) - Las

falsas morillas **NO son huecas** por dentro — tienen carne algodonosa y compartimentada - Ante la duda, cortalo por la mitad. Hueco = morilla verdadera. Compartimentado = falsa morilla. Alejate.

Si encuentras uno

Remoja en agua con sal por 30 minutos para eliminar insectos. Cocina completamente — nunca lo comas crudo. Las morillas son terrosas, con sabor a nuez, y consideradas un manjar.

3. Pollo del Bosque (Chicken of the Woods)

Laetiporus sulphureus

Estado: COMESTIBLE — Ideal para principiantes

Como se ve

- **Forma:** Hongo grande tipo repisa/mensula que crece en capas sobrepuestas en troncos o trozos de arboles
- **Parte superior:** Naranja brillante a salmon
- **Parte inferior:** Amarillo azufre brillante con poros diminutos (sin laminas)
- **Carne:** Gruesa, blanca, firme cuando es joven — se pone calcarea y dura cuando envejece
- **Tamano:** Repisas individuales de 5–30 cm de ancho; el racimo completo puede superar los 60 cm

Donde y cuando

- **Habitat:** En maderas duras muertas o vivas, especialmente robles. Tambien en coniferas muertas (pero evita esos — ver nota abajo)
- **Temporada:** Final de primavera a otono (mayo–noviembre)
- **Crece:** En racimos de repisas grandes sobre madera — nunca del suelo

Regiones

Noroeste del Pacifico | Noreste | Sureste | Medio Oeste

Cuidado con

- **Evita los que crecen en coníferas, eucalipto o tejo** — pueden causar malestar estomacal aunque el hongo sea la misma especie
- **Los ejemplares viejos** se ponen palidos, calcarios y se deshacen — solo come los juvenes y vibrantes

Si encuentras uno

El pollo del bosque joven tiene una textura increíblemente similar a la pechuga de pollo real cuando se cocina. Corta los bordes tiernos (evita la base dura), saltea en aceite con ajo y sazona.

4. Gallina del Bosque (Maitake)

Grifola frondosa

Estado: COMESTIBLE — Ideal para principiantes

Como se ve

- **Forma:** Gran roseta de sombreros superpuestos en forma de abanico que crecen desde una sola base — parece una gallina esponjada sentada al pie de un arbol
- **Color:** Gris-marron por arriba, blanco por debajo
- **Parte inferior:** Poros blancos diminutos (sin laminas)
- **Tallo:** Corto, ramificado, blanco, todos conectados a un nucleo central
- **Tamano:** Puede crecer enorme — de 5 a 25+ kilogramos en un solo racimo

Donde y cuando

- **Habitat:** Base de maderas duras vivas o muertas, especialmente robles. Regresa al mismo lugar ano tras ano
- **Temporada:** Otono (septiembre–noviembre)
- **Crece:** En racimos grandes al pie de arboles

Regiones

Noreste | Sureste | Medio Oeste

Cuidado con: Poliporo de Mancha Negra (*Meripilus sumstinei*)

Similar en apariencia, pero: - **Se mancha de negro** cuando se golpea o corta — la gallina del bosque no - No es peligroso, pero no tan bueno para comer

Si encuentras uno

El maitake es apreciado en la cocina japonesa. Desgarralo en trozos, saltea hasta que quede crujiente por los bordes. Sabor rico, sabroso, lleno de umami. Se seca y congela bien.

5. Melena de Leon (Lion's Mane)

Hericiium erinaceus

Estado: COMESTIBLE — Practicamente sin dobles toxicos

Como se ve

- **Forma:** Una bola blanca unica cubierta de espinas largas y colgantes tipo carabano — parece un pompon blanco o una cascada de dientes diminutos
- **Color:** Blanco puro cuando es joven, se amarillenta con la edad
- **Sin sombrero, sin tallo, sin laminas** — forma completamente unica
- **Tamano:** 10–30 cm de ancho

Donde y cuando

- **Habitat:** En maderas duras muertas o moribundas, especialmente haya, roble y arce. Crece alto en arboles muertos en pie o en troncos caidos
- **Temporada:** Final de verano a otono (agosto–noviembre)
- **Crece:** Ejemplares individuales sobre madera

Regiones

Noroeste del Pacifico | Noreste | Sureste | Medio Oeste

Cuidado con

Casi nada. La melena de leon es uno de los hongos silvestres mas seguros de identificar porque nada se le parece. Otras especies de *Hericium* (cabeza de oso, diente de coral) son comestibles tambien.

Si encuentras uno

Cortalos en "filetes" gruesos y sellalos en mantequilla hasta dorar por ambos lados. La textura es como cangrejo o langosta — no es broma. Tambien valorado por sus potenciales beneficios para la salud cognitiva.

6. Hongo Ostra (Oyster Mushroom)

Pleurotus ostreatus

Estado: COMESTIBLE — Ideal para principiantes

Como se ve

- **Sombrero:** Forma de abanico o concha de ostra, 5–20 cm de ancho, liso
- **Color:** Blanco, crema, gris, o canela (a veces marron palido)
- **Laminas:** Blancas, bajan por un tallo corto y grueso (o sin tallo)
- **Tallo:** Corto, descentrado, adherido al lado del sombrero
- **Crece en:** Madera dura muerta — troncos, tocones, arboles muertos en pie
- **Olor:** Suave, agradable, ligeramente anisado
- **Tamano:** Sombreros individuales de 5–20 cm; los racimos pueden cubrir un tronco

Donde y cuando

- **Habitat:** Maderas duras muertas o moribundas. Le encantan los troncos caidos en bosques humedos
- **Temporada:** Primavera y otono principalmente, pero puede fructificar todo el ano en climas templados — incluso en invierno
- **Crece:** En racimos tipo repisa superpuestos sobre madera

Regiones

Noroeste del Pacifico | Noreste | Sureste | Medio Oeste | Montanas Rocosas

Cuidado con: Alas de Angel (*Pleurocybella porrigens*)

- Las alas de angel son **blanco puro, delgadas como papel**, y crecen en madera de **coniferas** (no madera dura)
- Los hongos ostra son **mas gruesos y carnosos**, y crecen en **madera dura**
- Quedate con los que crecen en madera dura y estaras bien

Si encuentras uno

Uno de los hongos silvestres mas versatiles. Saltea, usa en salteados, empaniza y frie, agrega a sopas — funcionan con casi todo. Sabor suave, ligeramente dulce.

7. Porcini (Boleto Rey)

Boletus edulis

Estado: COMESTIBLE — Identificacion intermedia

Como se ve

- **Sombrero:** Liso, convexo, marron a marron rojizo, 8–25 cm de ancho, ligeramente pegajoso cuando esta humedo
- **Parte inferior:** Superficie esponjosa de poros (NO laminas) — blanca cuando es joven, se torna amarillo-verdosa con la edad
- **Tallo:** Grueso, bulboso, blanco a canela, con un fino reticulado blanco (patron de red) en la parte superior
- **Carne:** Blanca, firme, NO cambia de color al cortarla
- **Tamano:** 10–25 cm de alto, robusto y pesado

Donde y cuando

- **Habitat:** Bajo coniferas (abeto, pino, picea) y algunas maderas duras, en bosques montanosos y del norte

- **Temporada:** Verano a otoño (julio–octubre)
- **Crece:** Solo o disperso en pisos de bosque

Regiones

Noroeste del Pacífico | Noreste | Medio Oeste | Montañas Rocosas

Cuidado con: Boleto Amargo (*Tylopilus felleus*)

- Se ve casi idéntico pero sabe **intensamente amargo** — un mordisco te lo dice
- El reticulado del tallo es **mas oscuro y grueso** que el fino reticulado blanco del porcini
- La superficie de poros se torna **rosada** con la edad (la del porcini se mantiene amarillo-verdosa)
- No es tóxico, solo de sabor terrible — arruinara un platillo

Si encuentras uno

El porcini es uno de los hongos culinarios mas buscados del mundo. Cortalo en rebanadas y saltea fresco, o seca las rebanadas para un sabor concentrado increíble en risottos, pastas y sopas. El tallo también es comestible.

LOS 3 TOXICOS

8. Hongo de la Muerte (Death Cap)

Amanita phalloides

Estado: MORTALMENTE TOXICO — Responsable de la mayoría de muertes relacionadas con hongos en el mundo

Como se ve

- **Sombrero:** 5–15 cm de ancho, liso, verde-amarillento a verde oliva (a veces blanco palido o marronaceo), ligeramente pegajoso cuando esta humedo
- **Laminas:** Blancas, muy juntas, libres (no unidas al tallo)
- **Tallo:** Blanco, 8–15 cm de alto, con un **anillo tipo falda** (anillo) cerca de la parte superior
- **Base:** Bulbosa, dentro de un **saco tipo copa (volva)** — frecuentemente enterrada en el suelo. DESENTIERRA la base para ver esta característica critica
- **Huella de esporas:** Blanca
- **Olor:** Los ejemplares jovenes huelen agradable, a miel o rosas. Esto es enganoso.

Donde y cuando

- **Habitat:** Bajo robles y otras maderas duras, en parques, jardines y bosques. Originario de Europa, ahora ampliamente distribuido en Norteamerica
- **Temporada:** Otono e invierno en climas templados; final de verano a otono en otras zonas
- **Crece:** Solo o en pequenos grupos en el suelo

Regiones

Noroeste del Pacifico | Noreste | Sureste (rango en expansion)

Por que es tan peligroso

- Contiene **amatoxinas** que destruyen el hígado y los riñones
- **Los síntomas se retrasan 6–24 horas** después de comer — para cuando te sientes mal, el daño a los órganos puede estar ya en marcha
- Hay una fase engañosa de "mejoría" donde te sientes mejor antes de la etapa final, potencialmente mortal
- **Media capsula puede matar a un adulto**
- No hay antídoto casero confiable. Si sospechas ingestión de este hongo, ve a urgencias inmediatamente

Se confunde comunmente con

- Hongos de paja (en comunidades asiáticas)
- Bejines jóvenes (antes de que se abra el sombrero)
- Champiñones de botón (para el ojo no entrenado)

Si ves uno

No lo toques para comerlo. Manejarlo no es peligroso en sí — las toxinas deben ingerirse. Toma fotos para tus registros y sigue caminando.

9. Angel Destructor (Destroying Angel)

Amanita bisporigera / A. virosa / A. ocreata

Estado: MORTALMENTE TOXICO — Tan letal como el Hongo de la Muerte

Como se ve

- **Sombrero:** 5–12 cm de ancho, blanco puro, liso, ligeramente convexo a plano
- **Laminas:** Blancas, libres del tallo
- **Tallo:** Blanco, alto y esbelto, con un **fragil anillo tipo falda** que puede desaparecer con la edad
- **Base:** Bulbosa con una **volva tipo saco** — frecuentemente enterrada bajo tierra.
DESENTIERRA LA BASE

- **Huella de esporas:** Blanca
- **Todo el hongo:** Completamente blanco. Proporcionado elegantemente. Parece inofensivo.

Donde y cuando

- **Habitat:** Cerca de robles, pinos y bosques mixtos. Tambien aparece en cesp ed y jardines cerca de arboles
- **Temporada:** Verano a otono
- **Crece:** Solo o en pequenos grupos en el suelo

Regiones

Noroeste del Pacifico | Noreste | Sureste | Medio Oeste

Por que es tan peligroso

- Contiene las **mismas amatoxinas** que el Hongo de la Muerte
- Los sintomas, la linea de tiempo y la letalidad son identicos
- Su **apariencia blanca y "limpia"** lo hace parecer inofensivo — que es exactamente por lo que es tan mortal
- Se llama "Angel Destructor" porque se ve hermoso y mata sin piedad

Se confunde comunmente con

- Champinones de boton (*Agaricus bisporus*)
- Bejines jovenes
- Hongos de pradera
- Cualquier hongo blanco mediano

La regla #1 con hongos blancos

Si es blanco, tiene laminas y crece del suelo — tratalo como mortal hasta que se demuestre lo contrario. Esta unica regla podria salvarte la vida.

10. Jack O'Lantern (Hongo Linterna)

Omphalotus olearius

Estado: TOXICO — Te enfermara gravemente, rara vez fatal

Como se ve

- **Sombrero:** 5–20 cm de ancho, naranja brillante a naranja-amarillo, liso, convexo a forma de embudo
- **Laminas:** Verdaderas, filosas, tipo cuchilla — naranja, muy juntas, bajan ligeramente por el tallo. **Las laminas brillan tenuemente en verde en oscuridad total** (bioluminiscentes)
- **Tallo:** Naranja, solido, central, se estrecha hacia la base
- **Crece en:** Madera — tocones, raices enterradas, base de arboles. **Siempre sobre o cerca de madera**
- **Patron de crecimiento:** Racimos densos, no solitarios

Donde y cuando

- **Habitat:** Al pie de tocones de maderas duras o de raices enterradas (puede parecer que crece del suelo, pero debajo hay madera)
- **Temporada:** Verano a otono (julio–noviembre)
- **Crece:** En racimos — multiples hongos desde el mismo punto

Regiones

Noreste | Sureste | Medio Oeste

Por que importa

El Jack O'Lantern es el hongo que mas se confunde con el Chanterelle (#1 en esta guia). Cada ano, personas se enferman por este error. Asi los distingues:

Característica	Chanterelle	Jack O'Lantern
Laminas	Falsas (pliegues bifurcados)	Verdaderas y filosas
Crecimiento	Del suelo, disperso	En racimos, sobre/cerca de madera
Color interior	Carne palida/blanca	Carne naranja por completo

Característica	Chanterelle	Jack O'Lantern
Bioluminiscencia	No	Si (laminas brillan en la oscuridad)
Olor	Afrutado, tipo albaricoque	Desagradable

Si alguien come uno

Los síntomas (calambres severos, vomito, diarrea) usualmente comienzan dentro de 1–2 horas. Es extremadamente desagradable pero rara vez fatal en adultos sanos. Busca atención medica.

Referencia Rapida por Region

Encuentra tu region de senderismo y mira cuales de los 10 hongos es mas probable que encuentres.

Noroeste del Pacifico

(Washington, Oregon, Norte de California)

#	Hongo	Estado	Temporada
1	Chanterelle	Comestible	Jun–Oct
2	Morilla	Comestible	Mar–May
3	Pollo del Bosque	Comestible	May–Nov
5	Melena de Leon	Comestible	Ago–Nov
6	Hongo Ostra	Comestible	Todo el ano
7	Porcini	Comestible	Jul–Oct
8	Hongo de la Muerte	MORTAL	Ago–Nov
9	Angel Destructor	MORTAL	Jun–Oct

Dato PNW: Esta region es el paraíso del chanterelle. Los chanterelles dorados del Pacifico pueden crecer al tamaño de un plato de cena aquí. También es donde el Hongo de la Muerte se ha expandido rápidamente — mantente alerta.

Noreste y Apalaches

(Nueva Inglaterra, Medio Atlantico, estados de los Apalaches)

#	Hongo	Estado	Temporada
1	Chanterelle	Comestible	Jul–Sep
2	Morilla	Comestible	Abr–May

#	Hongo	Estado	Temporada
3	Pollo del Bosque	Comestible	Jun–Oct
4	Gallina del Bosque	Comestible	Sep–Nov
5	Melena de Leon	Comestible	Ago–Nov
6	Hongo Ostra	Comestible	Primavera y Otono
7	Porcini	Comestible	Jul–Sep
8	Hongo de la Muerte	MORTAL	Sep–Nov
9	Angel Destructor	MORTAL	Jun–Sep
10	Jack O'Lantern	TOXICO	Jul–Oct

Dato Noreste: La region mas diversa en esta guia — podrias encontrar los 10. El otono es la temporada pico, especialmente septiembre–octubre.

Sureste

(Sureste de EE.UU., estados del Golfo, Piedmont)

#	Hongo	Estado	Temporada
1	Chanterelle	Comestible	Jun–Sep
2	Morilla	Comestible	Mar–Abr
3	Pollo del Bosque	Comestible	May–Nov
4	Gallina del Bosque	Comestible	Oct–Nov
5	Melena de Leon	Comestible	Sep–Nov
6	Hongo Ostra	Comestible	Todo el ano
8	Hongo de la Muerte	MORTAL	Oct–Dic
9	Angel Destructor	MORTAL	Jun–Sep
10	Jack O'Lantern	TOXICO	Jul–Nov

Dato Sureste: Las condiciones calidas y humedas significan temporadas de fructificacion mas largas. Los chanterelles pueden ser abundantes despues de lluvias de verano. Cuidado con los Jack O'Lanterns — les encanta el calor.

Medio Oeste

(Grandes Lagos, estados de las Llanuras, Valle de Ohio)

#	Hongo	Estado	Temporada
1	Chanterelle	Comestible	Jul–Sep
2	Morilla	Comestible	Abr–May
3	Pollo del Bosque	Comestible	Jun–Oct
4	Gallina del Bosque	Comestible	Sep–Nov
5	Melena de Leon	Comestible	Ago–Oct
6	Hongo Ostra	Comestible	Primavera y Otono
7	Porcini	Comestible	Jul–Sep
9	Angel Destructor	MORTAL	Jun–Sep
10	Jack O'Lantern	TOXICO	Jul–Oct

Dato Medio Oeste: Capital de la morilla en Norteamerica. La temporada de morillas en primavera es practicamente un deporte aqui — comunidades enteras organizan cacerías. Busca cerca de olmos y fresnos muertos.

Suroeste y Montanas Rocosas

(Colorado, Utah, Arizona, Nuevo Mexico, Oeste montanoso)

#	Hongo	Estado	Temporada
2	Morilla	Comestible	May–Jun
6	Hongo Ostra	Comestible	Primavera y Otono
7	Porcini	Comestible	Jul–Sep

Dato Suroeste: El clima mas seco significa menos especies, pero las montanas compensan. Los porcini prosperan a mayor altitud bajo abetos y piceas. Las busquedas de morillas post-incendio en bosques montanosos quemados pueden ser increiblemente productivas.

Que Llevar: Tu Lista de Equipo para Buscar Hongos

No necesitas mucho. Esto cabe en una mochila de día y marca toda la diferencia:

Lo Esencial

- **Un cuchillo pequeño o navaja** — para cortar hongos limpiamente en la base sin alterar el micelio bajo tierra
- **Bolsas de papel o de papel encerado** — nunca plastico. El plastico atrapa humedad y convierte tus hallazgos en pure. El papel los deja respirar
- **Una canasta o bolsa de malla** — mantiene los ejemplares intactos y deja caer esporas mientras caminas (literalmente estas sembrando el bosque para el proximo ano)
- **Tu telefono (camara)** — para fotos de cada hallazgo: sombrero, parte inferior, tallo, base y habitat. No negociable

Bueno Tener

- **Una lupa de mano (10x)** — para examinar de cerca la estructura de las laminas, superficie de poros y detalles del tallo
- **Una libreta de campo o app de notas** — anota que especies de arboles hay cerca, tipo de suelo, condiciones climaticas. Tu yo del futuro te lo agradecera
- **Papel aluminio** — envuelve ejemplares individuales para mantenerlos separados y protegidos
- **Papel blanco + oscuro (tarjetas de indice funcionan)** — para huellas de esporas directo en el sendero. Coloca el sombrero con las laminas hacia abajo, cubre con un vaso, y revisa despues de unas horas
- **Toallitas humedas** — siempre lavate las manos despues de manejar hongos desconocidos, especialmente antes de comer snacks en el sendero
- **Esta guia (impresa)** — imprime las paginas de hongos de tu region y la Referencia Rapida. Lamina si quieres que sobrevivan la lluvia

Que NO Llevar

- **Bolsas de plastico** — destruyen los ejemplares. Dejalas en casa
 - **Exceso de confianza** — lo mas peligroso que puedes llevar al bosque. Ante la duda, dejalo
-

Tu Lista de Verificacion de Identificacion en el Sendero

Usa esta lista cada vez que encuentres un hongo en el sendero:

- ☐ **Donde crece?** Suelo, madera, tronco de arbol, madera enterrada?
 - ☐ **Que hay cerca?** Roble, haya, conifera, bosque mixto?
 - ☐ **Como crece?** Solo, disperso, racimo denso?
 - ☐ **Sombrero:** Color, forma, tamano, textura (liso, pegajoso, escamoso)?
 - ☐ **Parte inferior:** Laminas, poros, pliegues, o espinas/dientes?
 - ☐ **Tallo:** Color, grosor, anillo/falda, copa en la base?
 - ☐ **Cortalo:** Hueco? Solido? La carne cambia de color?
 - ☐ **Olor:** Afrutado? Terroso? Desagradable? Sin olor?
 - ☐ **Fotos tomadas?** Arriba, abajo, tallo, base, habitat — al menos 5 tomas
 - ☐ **Huella de esporas iniciada?** Papel blanco + papel oscuro, laminas hacia abajo, 4–8 horas
-

Emergencia: Que Hacer si Alguien Come un Hongo Toxico

El tiempo importa. Actua rapido.

1. **Llama a Control de Envenenamientos inmediatamente:** 1-800-222-1222 (EE.UU.) o tu numero de emergencias local
2. **NO esperes a que aparezcan sintomas.** Con el Hongo de la Muerte y el Angel Destructor, los sintomas se retrasan 6–24 horas. Para cuando te sientes mal, el dano a los organos ya esta en marcha
3. **Guarda una muestra** del hongo (o toma fotos claras) — esto ayuda a los profesionales medicos a identificar lo que se comio y elegir el tratamiento correcto
4. **NO intentes provocar el vomito** a menos que te lo indique especificamente Control de Envenenamientos o un medico
5. **Ve a la sala de emergencias** — no intentes "esperar a que pase" en casa
6. **Anota la hora** en que se comio el hongo y cuando aparecieron los sintomas

Sintomas por tipo de toxina

Envenenamiento por amatoxinas (Hongo de la Muerte, Angel Destructor): - 6–24 horas despues de comer: calambres abdominales severos, vomito, diarrea acuosa - 24–72 horas: mejoria enganosa ("ya me siento mejor") - 3–5 dias: falla hepatica y renal. Esta es la zona de peligro critico

Envenenamiento por irritante GI (Jack O'Lantern y la mayoria de otros hongos toxicos):
- 30 minutos a 2 horas: nausea, vomito, diarrea, calambres - Usualmente se resuelve en 24 horas con cuidado de soporte - Aun asi ve al medico — no auto-diagnostiques el tipo de toxina

Sobre Esta Guía

La Guía de Hongos para Senderistas es un producto de Paola Adventurer — ayudando a personas comunes a salir, probar algo nuevo, y darse cuenta de que son mas capaces de lo que creen.

No necesitas un titulo en biología para aprender a identificar hongos. Solo necesitas curiosidad, paciencia, y un respeto saludable por los que pueden danarte.

Empieza con un hongo. Aprendelo bien. Despues agrega otro. Antes de que te des cuenta, seras la persona en el sendero diciendo, "Oye, mira — eso es un chanterelle."

Felices senderos.

Paola Adventurer *Archery · Camping · Explore*

Aviso legal: Esta guía es para fines educativos e informativos unicamente. La autora no es micologa ni profesional medica. La identificacion de hongos silvestres conlleva riesgos inherentes. Nunca consumas un hongo silvestre a menos que estes 100% seguro de tu identificacion, idealmente confirmada por un recolector experimentado. La autora y Paola Adventurer no asumen responsabilidad por enfermedad o lesion resultante del uso de esta guia. Siempre sigue las regulaciones locales respecto a la recoleccion de hongos en terrenos publicos.