UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 3

Prisme et lame à faces parallèles

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ appliquer les quatre formules du prisme ;
- ✓ discuter les conditions d'émergence ;
- ✓ exploiter le minimum de déviation pour mesurer un indice ;
- ✓ étudier la dispersion (loi de Cauchy) ;
- ✓ calculer le déplacement d'un rayon ou d'une image par une lame.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Les formules du prisme

Exercice 1 — Marche d'un rayon dans un prisme ★

Un prisme d'angle $A = 60°$ et d'indice $n = 1{,}50$ reçoit un rayon, contenu dans une section principale, sous l'incidence $i = 40°$.

1. Calculer l'angle de réfraction r sur la première face.
2. En déduire l'angle d'incidence r' sur la seconde face. Le rayon émerge-t-il ?
3. Calculer l'angle d'émergence i' et la déviation D.
4. Tracer qualitativement la marche du rayon.

Exercice 2 — Conditions d'émergence ★★

On dispose de deux prismes taillés dans un verre d'indice $n = 1{,}60$: l'un d'angle $A_1 = 60°$, l'autre d'angle $A_2 = 90°$.

1. Calculer l'angle critique λ du verre.
2. Montrer qu'aucun rayon ne peut traverser le prisme d'angle A_2. Que deviennent les rayons ?
3. Pour le prisme d'angle A_1, calculer l'incidence minimale i_0 permettant l'émergence. Que vaut alors l'angle d'émergence ?

Exercice 3 — Prisme mince ★

Un prisme de verre ($n = 1{,}52$) d'angle $A = 5{,}0°$ est éclairé sous faible incidence par un pointeur laser.

1. Établir l'expression de la déviation dans l'approximation des petits angles, puis la calculer.

2. Le faisceau dévié est reçu sur un écran à $L = 2{,}0$ m du prisme. De combien le spot s'est-il déplacé par rapport à sa position sans prisme ?

Partie B Minimum de déviation et dispersion

Exercice 4 — Mesure d'un indice au goniomètre ★

Un prisme d'angle $A = 60{,}0°$ est éclairé par une lampe à vapeur de sodium. On mesure une déviation minimale $D_m = 48{,}0°$.

1. Rappeler les propriétés de la marche du rayon au minimum de déviation.
2. Calculer l'incidence i_m correspondante, puis l'indice n du verre.
3. L'angle A est connu à $\pm 0{,}1°$ près. Pourquoi mesure-t-on la déviation au minimum plutôt qu'à une incidence quelconque ?

Exercice 5 — Dispersion par un prisme de crown ★★

Un verre crown a pour indices $n_R = 1{,}514$ pour la raie rouge ($\lambda_R = 656$ nm) et $n_V = 1{,}532$ pour la raie violette ($\lambda_V = 434$ nm). On en fait un prisme d'angle $A = 60°$.

1. Calculer la déviation minimale pour chacune des deux radiations. Laquelle est la plus déviée ?
2. En déduire l'écart angulaire entre les deux raies (au voisinage du minimum de déviation).
3. On admet la loi de Cauchy $n = a + \dfrac{b}{\lambda^2}$. Déterminer a et b (avec λ en µm), puis l'indice pour la raie jaune du sodium (589 nm).

Exercice 6 — Prisme éclairé sous incidence normale ★★

Un rayon arrive perpendiculairement à la première face d'un prisme d'angle A et d'indice n.

1. Que valent i, r et r' ? Écrire la relation donnant i'.
2. À quelle condition sur A le rayon émerge-t-il ?
3. Application : $A = 30°$, $n = 1{,}50$. Calculer i' et la déviation D.
4. Montrer que la mesure de i' permet de déterminer l'indice : exprimer n en fonction de A et i'.

Partie C La lame à faces parallèles

Exercice 7 — Déplacement latéral par une vitre ★

Une vitre de verre ($n = 1{,}50$) a une épaisseur $e = 5{,}0$ mm.

1. Montrer que le rayon émergent est parallèle au rayon incident.
2. Calculer le déplacement latéral d pour les incidences $i = 0$, $30°$ et $60°$.
3. Montrer que pour les faibles incidences, $d \approx e\,i\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$ (i en radians).

Exercice 8 — Objet vu à travers un bloc de verre ★★

Un point lumineux A est placé à 20 cm d'un bloc de verre à faces parallèles d'épaisseur $e = 3{,}0$ cm et d'indice $n = 1{,}50$. On l'observe de l'autre côté, presque normalement aux faces.

1. Déterminer, par deux applications successives de la relation du dioptre plan, la position de l'image intermédiaire A_1 puis celle de l'image finale A'.
2. Calculer le déplacement $\overline{AA'}$. Retrouver la formule du cours.
3. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? Dépend-elle de la distance entre A et le bloc ?




Figure 1 – Point A observé à travers un bloc de verre (schéma, pas à l'échelle).

Exercice 9 — Mesure de l'indice d'une lame au microscope ★★★

On vise au microscope une marque tracée sur une platine. On note la position du tube lorsque l'image est nette. On pose sur la marque une lame d'épaisseur $e = 2{,}00$ mm : pour retrouver une image nette, il faut remonter le tube de $\Delta = 0{,}68$ mm.

1. Pourquoi faut-il remonter le tube ? Exprimer Δ en fonction de e et n.
2. En déduire l'indice n de la lame.
3. L'épaisseur est mesurée à $\pm 0{,}01$ mm et Δ à $\pm 0{,}01$ mm. Estimer l'incertitude sur n (on pourra calculer n pour les valeurs extrêmes).