Gauss-Jordanova eliminačná metóda riešenia sústavy lineárnych rovníc o *m* riadkoch a *n* premenných

- o. Definujme maticu A typu (m, n+1) a vektor B dĺžky m. A je rozšírená matica sústavy lineárnych rovníc, vektor B nazvem bázou (bázickým vektorom).
- 1. Koeficienty sústavy rovníc prepíšeme do matice A, tak že (n+1)-vý stĺpec bude obsahovať koeficienty stĺpec pravých strán sústavy.
- 2. Postupne prechádzame riadky i=1..m. Prvý nenulový koeficient zľava v riadku i nazveme pivotom. Index pivotového stĺpca (stĺpca, v ktorom sa nachádza pivot) označíme s. Pivotový riadok (riadok, ktorý sa práve spracováva) označím r.
 - 2a. Ak všetky koeficienty v riadku i sú nulové, prejdeme na spracovávanie ďalšieho riadka, t.j. položíme i=i+1 a prejdeme na bod 2. (Pre takýto riadok môžeme položiť B[i]=o alebo záporné celé číslo).
 - 2b. Ak pivot je v stĺpci *n*+1, **úloha nemá žiadne riešenie, koniec**. (Pretože hodnosť matice sústavy je menšia ako hodnosť rozšírenej matice).
 - 2c. Ak neplatí ani bod 2a ani bod 2b, potom index pivotového stĺpca *s* uložíme do *B[i]*, teda *B[i]*=*s* a celý pivotový riadok vydelíme pivotom, t.j. po tomto kroku bude aktuálny pivot rovný 1.
 - 2d. **Pivotová transformácia.** Postupne upravíme riadky k=1..m, $k\neq r$ elementárnymi maticovými úpravami, tak, aby po úpravách boli koeficienty pivotového stĺpca (okrem samotného pivota) rovné o. Teda pre každé k=1..m, $k\neq r$ vynásobíme celý pivotový riadok opačným koeficientom ku koeficientu a_{ks} (teda číslom $-a_{ks}$), pripočítame ho k riadku k a výsledok zapíšeme do riadka k.
- 3. V prípade, že úloha má riešenie, bude výsledná matica okrem stĺpca n+1 (stĺpec pravých strán sústavy) obsahovať iba nuly a jednotky. Vyhodnotenie riešenia:
 - 3a. Ak počet nenulových riadkov vo výslednej matici je rovný počtu premenných n, potom má sústava jediné riešenie, ktoré získam pre každé i=1..m a pre každé B[i]>o takto: x[B[i]]=A[i,n+1]. **Koniec úloha má práve 1 riešenie**.
 - 3b. Ak počet nenulových riadkov vo výslednej matici *A* je menší ako počet premenných *n*, potom **má sústava nekonečne veľa riešení, koniec.**

Poznámky

Pivotový riadok - riadok, v ktorom sa nachádza pivot (v jednom riadku môže byť najviac jeden pivot)
Pivotový stĺpec - stĺpec, v ktorom sa nachádza pivot (v jednom stĺpci môže byť najviac jeden pivot)

Sústava lineárnych rovníc **má riešenie jedine vtedy**, ak hodnosť matice koeficientov sústavy sa rovná hodnosti matice sústavy rozšírenej o stĺpec pravých strán, t.j. $h(A_n) = h(A_{n+1})$.

Sústava lineárnych rovníc **má práve jedno riešenie**, ak sa hodnosti matice sústavy a matice rozšírenej matice sústavy rovnajú a ak je táto hodnosť rovná počtu premenných, t.j. $h(A_n) = h(A_{n+1}) = n$.

Sústava lineárnych rovníc **má nekonečne veľa riešení**, ak sa hodnosti matice sústavy a matice rozšírenej matice sústavy rovnajú a ak je táto hodnosť menšia ako počet premenných, t.j. $h(A_n) = h(A_{n+1}) < n$.