

No: C3

Date: _____

T1. 设素数 $p \nmid a$, $k \geq 1$. 证明: $n^2 \equiv an \pmod{p^k} \Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod{p^k}$ 或 $n \equiv a \pmod{p^k}$.

证明: \Rightarrow 必要性: $n^2 \equiv an \pmod{p^k} \Leftrightarrow p^k \mid n^2 - an = n(n-a)$
则可能的所有情形有 ① $p^k \mid n$, 即 $n \equiv 0 \pmod{p^k}$; ② $p^k \mid n-a$, 即 $n \equiv a \pmod{p^k}$; ③ $\exists i, j \in \mathbb{Z}$, $1 \leq i, j < p^k$, 使得 $p^i \mid n$, $p^j \mid n-a$, 其中 $i+j \geq k$.

下面证明③情形不存在:

设 $p^m = \min\{p^i, p^j\}$, 则 $p^m \mid n$, $p^m \mid n-a$, 由此得 $p^m \mid a$, 与 $p \nmid a$ 矛盾! 故③情形不可能成立。

由 $n^2 \equiv an \pmod{p^k}$ 可得 $n \equiv 0 \pmod{p^k}$ 或 $n \equiv a \pmod{p^k}$.

\Leftarrow 充分性: $n \equiv 0 \pmod{p^k} \Rightarrow p^k \mid n \Rightarrow p^k \mid n(n-a) \Leftrightarrow n^2 \equiv an \pmod{p^k}$

$n \equiv a \pmod{p^k} \Rightarrow p^k \mid n-a \Rightarrow p^k \mid n(n-a) \Leftrightarrow n^2 \equiv an \pmod{p^k}$

综上所述, $n^2 \equiv an \pmod{p^k}$ 成立的充要条件为 $n \equiv 0 \pmod{p^k}$ 或

$n \equiv a \pmod{p^k}$.

T2. 解: (1) $10 = 2 \times 5$, $2^{400} \equiv 0 \pmod{2}$, 又 $(2, 5) = 1$, $\varphi(5) = 4$

由 Euler 定理得 $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$, 故 $2^{400} = (2^4)^{100} \equiv 1 \pmod{5}$

即已知 $\begin{cases} 2^{400} \equiv 0 \pmod{2} \\ 2^{400} \equiv 1 \pmod{5} \end{cases}$, 在模 5 剩余类中满足是偶数且 $\pmod{5} = 1$

的 (且个位数) 有且仅有 6 (或利用中国剩余定理求解).

故 $2^{400} \equiv 6 \pmod{10}$.

(也可利用 $\varphi(10) = 4$ 求出 $2^n \pmod{10}$ 的周期性变化, 其中 $T=4$)

(3) 因为 $(9, 10) = 1$, $\varphi(10) = 4$, 由 Euler 定理, $9^4 \equiv 1 \pmod{10}$, 故

$9^8 \equiv 1 \pmod{10}$, $9^9 \equiv 9 \pmod{10}$, 故有

$9^{9^9} \equiv 9^9 \equiv -11 \equiv 89 \pmod{100}$, 末两位为 89;

$9^{9^{9^9}} \equiv 9^{89} \equiv 9^9 \equiv 89 \pmod{100}$, 末两位为 89.

T₂ 证明: 当 $m > 2$ 时, $0^2, 1^2, 2^2, \dots, (m-1)^2$ 一定不是模 m 的完全剩余系。

证明: $m > 2$ 时, $m-1 > 1$, $(m-1)^2 = m^2 - 2m + 1 = m(m-2) + 1$

$m \nmid m(m-2)$, 故 $(m-1)^2 \equiv 1 \pmod{m}$, 不满足任意两个数模 m 不同余。

故 $0^2, 1^2, 2^2, \dots, (m-1)^2$ 一定不是模 m 的完全剩余系。

T₆ 证明: $(m, n) = 1$, 由 Euler 定理得 $m^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{n}$,

$n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. 由于 $n^{\varphi(m)} \equiv 0 \pmod{n}$, 故 $m^{\varphi(m)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{n}$

同理 $m^{\varphi(m)} \equiv 0 \pmod{m}$, $m^{\varphi(m)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$, 所以得出

$m^{\varphi(m)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$. 证毕。

T₈ 证明: (1) $(p-1)! = [2 \cdot (p-2)] \cdot [4 \cdot (p-4)] \cdot \dots \cdot [(p-1) \cdot (p-(p-1))]$

$$= (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdot \dots \cdot (p-1)^2 \pmod{p}$$

又由 Wilson 定理得 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. 所以

$$2^2 \cdot 4^2 \cdot \dots \cdot (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (-1) \pmod{p} \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}. \text{ 证毕}$$

No: _____

Date: _____

T5. (不确定, 尝试) 证明: (1) 设 $S_1 = \{-r_s, \dots, -r_2, -r_1, r_1, r_2, \dots, r_s\}$,
 $S_2 = \{r_1, r_2, \dots, r_s, (m-r_s), (m-r_{s-1}), \dots, (m-r_2), (m-r_1)\}$. 要证明 S_1, S_2
是 m 的简化剩余系, 需证 ① S_1, S_2 包含所有小于 m 且与 m 互素的整数;
② S_1, S_2 中元素两两模 m 不同余, 而 S_1, S_2 在模 m 运算下等价, 只需证 S_2 即
①: 设 a 是小于 m 与 m 互素的整数, 若 $0 < a < \frac{m}{2}$, 则为 r_1, \dots, r_s , 必在
 S_2 中; 若 $\frac{m}{2} < a < m$, 则 $0 < m-a < \frac{m}{2}$, 由于 $(a, m) = 1$, 得 $(m-a, m) = 1$,
所以 $m-a \in S_2$, 所以 S_2 包含所有小于 m 与 m 互素的数.

②: 对于 $1 \leq i, j < s, i \neq j$, 易知 r_i 与 r_j 模 m 不同余, $m-r_i$ 与 $m-r_j$ 模 m
等价于 $-r_i, -r_j$ 模 m 也不同余. 考虑 r_i 与 $m-r_j$, 假设 $r_i \equiv m-r_j$
 \pmod{m} , 则 $m \mid r_i - (m-r_j) = r_i + r_j - m$, 即 $m \mid r_i + r_j$. 又 $0 < r_i, r_j < \frac{m}{2}$
故 $0 < r_i + r_j < m$, $m \mid r_i + r_j$ 不成立, 矛盾! 故 r_i 与 $m-r_j$ 模 m 不同余.

综上 ①② 得 S_1, S_2 为 m 的简化剩余系.

(2) 由以上证明, 当 $m \geq 3$ 时, 对 $\forall r_i \in S_1$, 必有对应 $m-r_i \in S_1$, S_1 元素
个数为偶数, 即 $2 \mid \varphi(m)$.

Date: _____

反证明: (1) $q \mid a^p + 1 \Rightarrow a^p \equiv -1 \pmod{q} \Rightarrow a^{2p} \equiv 1 \pmod{q}$

故 a 模 q 的阶 (离散的知识?) d 是 $2p$ 的因子. 显然 $d \neq 1$, $d \neq q$.

若 $d = 2$, 则 $a^2 \equiv 1 \pmod{q}$, 又 $a^p \equiv -1 \pmod{q}$, 故有 $a \equiv -1 \pmod{q}$.

即 $q \mid a + 1$; 若 $d = 2p$, 则 ~~$a^{2p} \equiv 1 \pmod{q}$~~ 由同余运算以及 q 的剩余系构成的群阶为 $q-1$, $d \mid q-1$, 即 $2p \mid q-1$, 得 $q \equiv 1 \pmod{2p}$.

综上, q 为 $a+1$ 的因子或 $q \equiv 1 \pmod{2p}$.

(2) (没想很明白, 太难了qwq)