



תרופות המט"ב

הסיכום הזה נכתב בשביל חובשי היחידה, על מנת להקל עליהם את הלמידה אודות תרופות הנמצאות ברשות המטפל הבכיר. לפי סדר א-ב.
לכל תרופה יש שם (מסחרי וגנרי), מה היא עושה, איך תראו אותה במגש התרופות של המט"ב (גודל אמפולה וכמות חומר פעיל) ומה המינון לכל ערוץ מתן מקובל.

ראשית, מספר הגדרות בהם עושה שימוש המסמך הזה:

"הלם עמוק"

צהל מגדיר הלם עמוק לפי אחד הממצאים הבאים:

- ל"ד סיסטולי נמוך מ 90 מ"מ"כ

או

- היעדר דופק רדיאלי בנוכחות ל"ד שאינו ניתן למדידה

ובנוסף

שינוי ברמת ההכרה שלא כתוצאה מפגיעת ראש או תרופות

כל פעם שמופיע המושג "סימני הלם עמוק" כהתוויה או שיקול, יש לזכור כי הכוונה לאחד מהסימנים הנ"ל.

ערוצי מתן:

IV – תוך ורידי

IO – תוך גרמי

SL – תת לשוני

INH – בשאיפה

TM – דרך ריריות (הפה)

PO – דרך פה (בבליעה)

ET – לתוך הטובוס

SC – תת עורי

IM – תוך שריר

- כל תרופה במתן תוך גרמי או תוך ורידי תישטף ב 20 מ"ל
- אין לתת תרופות דרך פה או ריריות הפה במטופל מעורפל הכרתית
- למעט סליין, הרטמן, אקמול, אופטלגין ואקטיק – כל התרופות יינתנו ע"י מט"ב בלבד



אדרנלין

שם גנרי: Epinephrine

שם מסחרי: Adrenaline

כמות חומר פעיל באמפולה: 1 מ"ג / 1 מ"ל

ערוצי מתן: IM, IV, IO, SC, ET

מנגנון פעולה: מעורר פעילות סימפתטית

התוויות: אנפילקסיס, החייאה שלא על רקע טראומה

אופן הכנה: שאיבה למזרק 3 מ"ל, להוסיף עוד מ"ל סליין (בהחייאה לא מוהלים)

מינון: 0.5 מ"ג IM, חזרה כל 5–15 דק'

דגשים: אין קונטרה-אינדיקציה מסכנת חיים



אטרופין

שם גנרי: Atropine

שם מסחרי: Atropine

כמות חומר פעיל באמפולה: 1 מ"ג / 1 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: מדכא פעילות פראסימפתטית ומפחית הפרשות

התוויות: ריור יתר לאחר קטמין

אופן הכנה: שאיבה למזרק 3 מ"ל, להוסיף עוד מ"ל סליין

מינון: 0.5 מ"ג IV

דגשים: שימוש ייעודי



אקטיק

שם גנרי: Fentanyl

שם מסחרי: Actiq

כמות חומר פעיל ב"סוכריה": 800 מק"ג

ערוצי מתן: TM

מנגנון פעולה: אופיאט לשיכוך כאב

התוויות: כאב ללא גישה ורידית

אופן הכנה: קיבוע סוכריה לאצבע

מינון: 800 מק"ג

דגשים: אסור בהלם עמוק ומחוסר הכרה. יש לקבע ואגודל

אקמול

שם גנרי: Paracetamol

שם מסחרי: Acamol

כמות חומר פעיל בטבליה: 500 מ"ג לטבליה

ערוצי מתן: PO

מנגנון פעולה: שיכוך כאב מרכזי

התוויות: כאב קל (נסבל)

אופן הכנה: מתן פומי

מינון: 1000 מ"ג (שני כדורים)

דגשים: דורש שיתוף פעולה



אופטלגין

שם גנרי: Dipyrrone

שם מסחרי: Optalgin

כמות חומר פעיל בטבליה: 500 מ"ג

ערוצי מתן: PO

מנגנון פעולה: שיכוך כאב מרכזי

התוויות: כאב קל (נסבל)

אופן הכנה: מתן פומי

מינון: 1000 מ"ג (שני כדורים)

דגשים: דורש שיתוף פעולה, אין מניעה לתת למי שרגיש לפול (G6PDd)



דורמיקום

שם גנרי: Midazolam

שם מסחרי: Dormicum

כמות חומר פעיל באמפולה: 5 מ"ג / 1 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: העמקת סדציה

התוויות: העמקת הרדמה

אופן הכנה: שאיבה למזרק 5 מ"ל, להוסיף עוד 4 מ"ל סליין

מינון: 5 מ"ג, אחזקה 1.5–1

דגשים: **בהלם – חצי מינון**



הקסקפרון

שם גנרי: Tranexamic acid

שם מסחרי: Hexacaprone

כמות חומר פעיל באמפולה: 500 מ"ג / 5 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: מעכב פירוק קרישים

התוויות: פציעה חודרת בגו או אזור חיץ, דימום מלווה הלם עמוק לאחר שניתן נפח

אופן הכנה: שאיבה של שתי אמפולות למזרק 10 מ"ל

מינון: 1 גרם

דגשים: הזרקה איטית



הרטמן

שם גנרי: Ringer Lactate

שם מסחרי: Hartmann

כמות חומר פעיל באמפולה: 500 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: קריסטלואיד לאיזון נפח

התוויות: היפולמיה

אופן הכנה: חיבור לסט

מינון: 250 מ"ל

דגשים: לא סמוך למתן דם



וונטולין – תמיסה

שם גנרי: Salbutamol

שם מסחרי: Ventolin

כמות חומר פעיל באמפולה: 100 מ"ג / 20 מ"ל

ערוצי מתן: ET, INH

מנגנון פעולה: מרחיב סימפונות

התוויות: התקף אסטמה, אנפילקסיס, שאיפת עשן

אופן הבנה: שואבים 1 מ"ל למזרק 5 מ"ל, משלימים 4 מ"ל נוספים, שמים בכוסית

אינהלציה או מזליפים דרך קטטר שאיבה לטובוס

מינון: 5 מ"ג

דגשים: לא מיועד להזרקה לוריד או תוך גרמי



וונטולין – משאף

שם גנרי: Salbutamol

שם מסחרי: Ventolin Inhaler

כמות חומר פעיל באמפולה: 20 מ"ג

ערוצי מתן: INH

מנגנון פעולה: מרחיב סימפונות

התוויות: התקף אסטמה, אנפילקסיס, שאיפת עשן

אופן הכנה: לוחצים פעם אחת לאוויר חדר, מנחים את המטופל לבצע נשיפה ארוכה מקסימלית, אחרי שהמטופל אוטם עם השפתיים את הפיה לוחצים 1-3 פעמים, מנחים את המטופל לקחת שאיפה עמוקה, מנחים את המטופל להחזיק אוויר כמה שניות

מינון: 1-3 לחיצות

דגשים: חייב שיתוף פעולה מצד המטופל

מורפיום

שם גנרי: Morphine

שם מסחרי: Morphine

כמות חומר פעיל באמפולה: 10 מ"ג / 1 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO, IM

מנגנון פעולה: אופיאט לשיכוך כאב

התוויות: כאב משמעותי

אופן הכנה: שאיבה למזרק 10 מ"ל, להוסיף עוד 9 מ"ל סליין

מינון: 5 מ"ג

דגשים: בהלם – מינון 2 מ"ג

נרקן

שם גנרי: Naloxone

שם מסחרי: Narcan

כמות חומר פעיל באמפולה: 0.4 מ"ג / 1 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: נוגד אופיאטים

התוויות: מנת יתר

אופן הכנה: מהילה 1 מ"ל תרופה ועוד 9 מ"ל סליין

מינון: 0.4 מ"ג

דגשים: הזרקה איטית



סולומדרול

שם גנרי: Methylprednisolone

שם מסחרי: Solu-Medrol

כמות חומר פעיל באמפולה: 125 מ"ג

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: מדכא תגובה דלקתית

התוויות: אנפילקסיס, אסטמה, שאיפות עשן (בנוסף לוונטולין)

אופן הכנה: המסת אבקה ושאיבה למזרק 3 מ"ל

מינון: 125 מ"ג

דגשים: בתוספת לוונטולין באינהלציה



סליין שם גנרי: NaCl 0.9%

שם מסחרי: Saline

כמות חומר פעיל באמפולה: 10 מ"ל או 100 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO, IM

מנגנון פעולה: קריסטלואיד לשטיפה

התוויות: שטיפות, כוויות

אופן הכנה: שאיבה

מינון: 10 מ"ל

דגשים: הנזל הנחות להחזר נפח



פוסיד

שם גנרי: Furosemide

שם מסחרי: Fusid

כמות חומר פעיל באמפולה: 20 מ"ג / 2 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: משתן

התוויות: אי מתן שתן

אופן הכנה: שאיבת 2 אמפולות למזרק 5 מ"ל

מינון: 40 מ"ג

דגשים: מעקב תפוקת שתן, בהזרקה מהירה עלול לגרום לחרשות זמנית





פרמין

שם גנרי: Metoclopramide

שם מסחרי: Prammin

כמות חומר פעיל באמפולה: 10 מ"ג / 2 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO, PO


מנגנון פעולה: נוגד בחילות

התוויות: בחילות קשות והקאות

אופן הכנה: שאיבה למזרק 10 מ"ל, להוסיף עוד 8 מ"ל סליין

מינון: 10 מ"ג

דגשים: אפשר פומי



פלזמה

שם גנרי: AB FDP

שם מסחרי: LyoPlas

כמות חומר פעיל באמפולה: 200 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: תחליף דם לקרישה

התוויות: הלם עמוק

אופן הכנה: מהילה ב-WFI

מינון: 200 מ"ל

דגשים: זמן הכנה

קטמין

שם גנרי: Ketamine

שם מסחרי: Ketalar

כמות חומר פעיל באמפולה: 500 מ"ג / 10 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: משרה דיסוציאציה במינונים גבוהים, משכך כאב במינונים נמוכים
התוויות: צורך בסדציה (בליווי דורמיקום), צורך בשינוך כאב כאשר יש גישה ורידית

אופן הכנה:

דיסוציאציה: שאיבת כל האמפולה למזרק 10 מ"ל

שינוך כאב: שאיבת 1 מ"ל למזרק 5 מ"ל והשלמה של 4 מ"ל

מינון:

דיסוציאציה: 3-4 מ"ג / ק"ג

שינוך כאב: 25 מ"ג

דגשים: **בהלם עמוק – חצי מינון כאשר משמש לסדציה**

צפטריאקסון

שם גנרי: Ceftriaxone

שם מסחרי: CeftriCare

כמות חומר פעיל באמפולה: 1 גרם

ערוצי מתן: IV, IO, IM

מנגנון פעולה: אנטיביוטיקה רחבת טווח

התוויות: פציעה חודרת

אופן הכנה: מהילה במים (מצורף באריזה)

מינון: 2 גרם IV

דגשים: לא בהרטמן



מטרונידזול

שם גנרי: Metronidazole

שם מסחרי: Flagyl

כמות חומר פעיל באמפולה: 500 מ"ג / 100 מ"ל

ערוצי מתן: IV, IO

מנגנון פעולה: אנטיביוטיקה אנאירובית

התוויות: פציעות בטן/ראש

אופן הכנה: חיבור סט

מינון: 500 מ"ג

דגשים: בהשהיית פינוי – המשך



מינוני מבוגרים

- קטמין לצורך אינדוקציה [תוך ורידי] 3-4 מ"ג/ק"ג
- העמקה אחרי 5 דק' 75-100 מ"ג
- אחזקה כל 15 דק' 25-50 מ"ג
- קטמין לצורך אנלגיה [תוך ורידי] 25 מ"ג
- אחזקה כל 45 דק' 25 מ"ג
- אטרופין למניעת ריויר יתר על רק מתן קטמין [תוך ורידי] 0.5 מ"ג
- מידזולם לצורך אינדוקציה [תוך ורידי] 5 מ"ג
- העמקה – אין
- אחזקה כל 15 דק' 1-1.5 מ"ג
- מידזולם לצורך הפסקת פרוכוס על רקע פגיעת ראש [תוך ורידי] 5 מ"ג
- אחזקה כל 5 דק' 5 מ"ג
- מידזולם לצורך הפסקת פרוכוס על רקע פגיעת ראש [לשירי] 10 מ"ג
- מורפין לצורך אינדוקציה* [תוך ורידי] 5 מ"ג
- העמקה – אין
- אחזקה כל 60 דק' 5 מ"ג
- מורפין לצורך אנלגיה [תוך ורידי] 5 מ"ג
- אחזקה כל 15 דק' 5 מ"ג
- פרמין לטיפול בבחילות קשות או הקאות על רקע אופיאטים [תוך ורידי] 10 מ"ג
- אקמול לצורך אנלגיה [דרך פה] 1 גרם
- מנה חוזרת כעבור 6 שעות
- אופטלגין לצורך אנלגיה [דרך פה] 1 גרם
- מנה חוזרת כעבור 6 שעות
- אקטיק לצורך אנלגיה [דרך ריריות הפה] 800 מק"ג
- מנה חוזרת אחת בלבד של 800 מק"ג
- הקסקפרון לפצוע בהלם עמוק או פגיעה חודדת בגו/אזורי חיץ [תוך ורידי] 1 גרם
- מנה חוזרת כעבור 3 שעות 1 גרם
- פוסיד לטיפול באי מתן שתן על רקע פגיעת מעיכה [תוך ורידי] 40 מ"ג
- גלוקוז לטיפול בהיפוגליקמיה על רקע פגיעת מעיכה [תוך ורידי] 25 ג' / 500 מ"ל
- קלציום גלוקנט לטיפול בהיפרקלמיה על רקע פגיעת מעיכה [תוך ורידי] 1 גרם
- אדרגלין לטיפול באנפילקסיס על רקע מתן מוצרי דם [תוך שריי] 0.5 מ"ג
- סולומדורל לטיפול באנפילקסיס על רקע מתן מוצרי דם [תוך ורידי] 125 מ"ג

מינוני ילדים

- קטמין 2-3 מ"ג לק"ג לוריד
- לטיפול בבאב 0.3 מ"ג לק"ג
- דורמיקום 0.1 מ"ג לק"ג לוריד (מינון מקסימאלי 5 מ"ג)
- בפרוכוסים 0.05 מ"ג לק"ג
- הקסקפרון
- עד גיל 12 – 15 מ"ג לק"ג
- מגיל 12 – 1 גרם
- פלזמה 20 מ"ל לק"ג (מינון מקסימאלי 400 מ"ל)
- מורפין 0.1 מ"ג לק"ג (מנה חד פעמית)
- בהלם עמוק – 0.02 מ"ג לק"ג
- צפטריאקסון 100 מ"ג לק"ג (מינון מקסימאלי 2 גרם)
- מטרוניאדזול 10 מ"ג לק"ג (מינון מקסימאלי 500 מ"ג)

מינוני כלבים

אין לתת אקמול
אין לתת איבופן
אין לתת פלזמה/דם

מדדים תקינים:
דופק: 50-120 בדקה
נשימות: 10-40 בדקה
חום: PR 38-39.5

- מורפין 0.2-0.5 מ"ג/ק"ג IM או SC כל 4-6 שעות

- אופטלגין 25 מ"ג/ק"ג PO

- טרמדקס 3-5 מ"ג/ק"ג PO

- רוצפין 22 מ"ג/ק"ג IV כל 8-12 שעות

- פלג'יל 10-15 מ"ג/ק"ג PO כל 12 שעות

- מידזולם 0.4 מ"ג/ק"ג IV

- קטמין 3 מ"ג/ק"ג IM/IV

- הרטמן 20 מ"ל לק"ג

- טיפול בכאב:

- מורפין 10-20 מ"ג IM

- מידזולם 10-15 מ"ג IM

תצילו חיים!

צוות המרפאה