

חשיפה לדם

אוקטובר 2021
נערך ע"י סמל ליהי כהן נצפית הכש"י

שורשרת הדבקה

נדבק

אדם בריא



מעביר

מגע של דם
בדם או דם
ברירות



מקור

חולה או
נשא סמוי

יחסי מין

מאם לעובר-

(בזמן ההיריון דרך השליה,

בזמן הלידה ובהנקה – לא גנטי)

חשיפה לדם

חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים מוגדרת כ:
החשיפה לדם או להפזרות גוף היא אירוע לא נדיר, שבמקרים מסוימים יכול גם להוות סכנת
דקירה על ידי מחט או על ידי חפץ חד, שהיו במגע עם דם או הפרשות
גוף של אדם אחר או היו בגופו של אדם.



דקירה על ידי מחט או חפץ חד שאין עליהם מידע נוסף, או שהיו במגע
עם חומר גוף שעלול להעביר

מגע ריריות (למשל של פה או של עין) של אדם עם דם ו/או נוזלי גוף של
אדם אחר



מגע עור פצוע של אדם עם דם ו/או נוזלי גוף של אדם אחר

יחסי מין שאינם מוגנים (ללא שימוש בקונדום)



נשיכה על ידי אדם

רק רופא יכול לשלול חשיפה לדם!



Trust Me, I'm a Doctor

נוהל חשיפה לדם



הפניה לרופא

- דיווח טלפוני מידי לקצין בריאות צבא
- ישקול מתן חיסונים
- טופס דיווח חשיפה לדם

הסכנה:
חשיפה למחלות
כרוניות
מדבקות

1

ניקוי מידי וחיטוי הפצע

- מים וסבון, ספוגגטה אלכוהול



2

**כל מקרה חשיפה לדם
יצריך פינוי מידי של
הנחשף והחושף למיון**

חדרי מיון



3

Scanned with
 CamScanner™

דלקת כבד נגיפית B/C

גורם ביולוגי: ווירוס הגורם לדלקת בכבד (HCV/HBV)

תקופת הדבקה:
לכל אורך הנשאות
והמחלה

תקופת דגירה:
חודש עד חצי שנה ללא
סימנים

סימנים לדלקת כבד

סימנים ספציפיים - צהבת



שתן כהה



צואה בהירה



צהבת
בציפורניים



צהבת בעור
ולחמיות העיניים



בחילות והקאות



חולשה


סימנים כלליים



כאבי בטן



חוסר תאבון



חום גבוה

סיבוכים:

פגיעה בכבד והזרדרות מהירה של המחלה או מצב המטופל



מחלות אלו מאופיינות
באחוז גשאים
א-סימפטומטיים גרוע

טיפול בדלקות כבד

תרופות אנטי ויראליות + הורמונים המחזקים את מערכת החיסון



החלמה:
מספר שבועות עד חצי
שנה של תשישות או
נשאות כרונית!

חיסון הפטיטים B

למי ניתן החיסון פעיל להפטיטים B?



משטרה צבאית



ניתן לסגלי רפואה



ספרים



צוותי סילוק פצצות

פעיל- התחלת סדרת החיסונים או
השלמתה

סביל- ניתן עד 48 שעות מרגע החשיפה



AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome



AIDS

גורם ביולוגי

וירוס ה- HIV המשעבד תאי דם לבנים וגורם לקריסת מערכת החיסון

וירוס ה- HIV



תא דם לבן



AIDS מהלך המחלה


החלמה

אין, המוות נגרם כתוצאה מחוסר הגנה של הגוף כנגד זיהומים שונים



סימנים

סימנים הקשורים להיחלשות מערכת החיסון



תקופת דגריה

מספר חודשים עד שנים



PEP

זבלת הקוקטייל במהירות האפשרית, עד 72 שעות מרגע החשיפה למשך 28 יום



טיפול

מקבלים שילוב של מספר תרופות HIV אנשא כדי להתמודד עם הנגיף - "הקוקטייל"

מניעה



**הדרכות תקופתיות
ביחידה**



שימוש אישי

במברשת שיניים
וסכין גילוח



**מניעת הידבקות ביחסי
מין**

שימוש בקונדום
מיעוט פרטנרים
בדיקות תקופתיות

מניעה - סגלי רפואה




שימוש בכפפות

**בכל מגע, בדיקה
וטיפול**



פסולת רפואית

**שימוש בפח מחטים
ופח לפסולת ביולוגית**



מניעת הידקרות

**אין להחזיר את
מכסה המחט
למקומו לאחר
השימוש**



סריקת מנות דם

שאלות?