



UNSTIM

Université Nationale des Sciences,
Technologies, Ingénierie
et Mathématiques

ENSGMM

École Nationale Supérieure
de Génie Mathématique
et Modélisation



MMI 2 – Méthodes Mathématiques de l'Ingénieur II

Thème :

THÉORIE DES DISTRIBUTIONS

INGÉNIEUR 1 — GÉNIE MATHÉMATIQUE ET MODÉLISATION

Sous la direction de

Dr. MOUSSA DJIBRIL A.

MEMBRES DU GROUPE

01. AFFOUKOU Prosper

02. BOTCHI Parfait

03. DOBOEVI Judicaël Karol

04. DOHOU Alexis

Année universitaire 2025–2026

TABLE DES MATIÈRES

Table des figures	iii
Contexte	1
1 Notion de distribution	3
1.1 L'espace des fonctions test	3
1.2 Définition d'une distribution	3
1.3 Les exemples fondamentaux	4
2 Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$	7
2.1 Définition	7
2.2 Le Dirac comme limite de distributions	7
2.3 Stabilité de la limite	9
3 Dérivation des distributions	11
3.1 Motivation — le paradigme de Schwartz	11
3.2 Définition de la dérivée	11
3.3 Toute distribution est indéfiniment dérivable	12
3.4 Propriétés algébriques et topologiques	12
3.5 Multiplication d'une distribution par une fonction C^∞	13
3.6 Exemples fondamentaux de dérivation	14
3.6.1 Dérivée de la fonction de Heaviside	14
3.6.2 Dérivée de la valeur absolue	14
3.6.3 Dérivées successives de $ x $	14
3.6.4 Dérivées successives de $x^n H(x)$	14
3.6.5 Dérivée de $\ln x $	15
3.6.6 Dérivée de la partie entière $\lfloor x \rfloor$	15
3.7 Formule des sauts — fonctions C^∞ par morceaux	15
3.8 Dérivée de la distribution de Dirac et de ses itérées	17
3.9 Formule des distributions $\partial_j T$ en dimension n	18
3.10 QCM — Dérivation des distributions	18
3.11 Exercices — Dérivation	19
4 Primitives des distributions en dimension 1	21
4.1 Définition et premières remarques	21

4.2	Le noyau de la dérivation : distributions de dérivée nulle	21
4.3	Existence et unicité d'une primitive	22
4.4	Primitives des distributions usuelles	23
4.5	Primitive d'ordre n de δ_0	23
4.6	Structure des primitives dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$	24
4.7	Lien avec les intégrales à paramètre	24
4.8	Primitives et équation $T' = S$	24
4.9	QCM — Primitives des distributions	25
4.10	Exercices — Primitives	26
5	Opérations sur les distributions	28
5.1	Multiplication par une fonction C^∞	28
5.2	Les équations $xT = 0$, $xT = 1$ et $xT = S$	29
5.3	Dérivation d'une distribution	29
5.4	Les équations $T' = 0$ et $\partial_{x_i} T = 0$	30
5.5	Formule des sauts en dimension 1	30
5.6	Exemples illustratifs	31
5.7	QCM — Opérations sur les distributions	32
5.8	Exercices — Opérations sur les distributions	33
6	Convolution des distributions	35
6.1	Produit de convolution de deux distributions	35
6.2	Propriétés de la convolution	36
6.3	Interprétation physique de la convolution	37
6.4	Comment calculer un produit de convolution	37
6.5	Exemples de calculs de convolution	38
6.6	QCM — Convolution des distributions	38
6.7	Exercices — Convolution des distributions	40
7	Applications aux équations différentielles linéaires	42
7.1	Cadre général	42
7.2	Solution fondamentale	42
7.3	Exemples fondamentaux	44
	Corrections des exercices et QCM	47
	Réponses aux QCM	47
	Corrections des exercices	49
	References bibliographiques	61

Table des figures

1.1	Représentation symbolique de la fonction de Heaviside $H(x)$ et de la masse de Dirac δ_0 (flèche).	5
2.1	Approximation de la masse de Dirac δ_0 par des gaussiennes $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}$ qui deviennent de plus en plus étroites et hautes.	8
3.1	Représentation du peigne de Dirac $\Delta_1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$	16
3.2	Succession des dérivées de la fonction triangle au sens des distributions.	17

CONTEXTE

CONTEXTE

La théorie des distributions a été développée par le mathématicien français Laurent Schwartz dans les années 1940–1950, travail pour lequel il a reçu la médaille Fields en 1950. L’objectif était de donner un cadre rigoureux à des objets qui apparaissaient naturellement en physique — notamment l’impulsion de Dirac δ , utilisée par le physicien Paul Dirac depuis les années 1930 sans justification mathématique satisfaisante.

Le problème central que résout cette théorie est le suivant : certaines fonctions physiquement naturelles (la fonction de Heaviside, les solutions de certaines équations aux dérivées partielles) ne sont pas dérivables au sens classique. L’idée de Schwartz est de renverser le point de vue : plutôt que d’évaluer une fonction en un point, on mesure son effet sur des fonctions très régulières appelées fonctions test. Cela permet de dériver n’importe quel objet raisonnable, et de donner un sens à des équations qui n’en avaient pas.

Notations — valables pour tout l'exposé

Dans tout ce qui suit, Ω désigne un ouvert de $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 1$), et $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Notation	Signification
$C^k(\Omega)$	Fonctions k fois dérivables à dérivées d'ordre k continues sur Ω
$C^\infty(\Omega)$	Fonctions infiniment dérivables sur Ω
$C_c^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega)$	Fonctions C^∞ à support compact inclus dans Ω
$\mathcal{D}'(\Omega)$	Espace des distributions sur Ω
$\text{supp}(f)$	Support de f : adhérence de $\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}$
$\langle T, \varphi \rangle$	Crochet de dualité : action de la distribution T sur φ
$L_{\text{loc}}^1(\Omega)$	Fonctions localement intégrables sur Ω
$\alpha \in \mathbb{N}^d$	Multi-indice : $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$, $ \alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$
$\partial^\alpha f$	Dérivée partielle $\frac{\partial^{ \alpha } f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}}$
$\partial^\alpha T$	Dérivée d'ordre α de la distribution T
$T^{(n)}$	Dérivée d'ordre n de T en dimension 1
H	Fonction de Heaviside : $H(x) = 1$ si $x > 0$, 0 sinon
sgn	Fonction signe : $\text{sgn}(x) = 1$ si $x > 0$, -1 si $x < 0$
δ_a	Distribution de Dirac au point a : $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$

NOTION DE DISTRIBUTION

1.1 L'ESPACE DES FONCTIONS TEST

Définition 1.1 (Fonctions test — $\mathcal{D}(\Omega)$). L'espace des fonctions test est

$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega) = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp}(\varphi) \text{ est compact et contenu dans } \Omega\}.$$

Intuition. Une fonction test est infiniment régulière et s'annule au-delà d'un certain rayon. On peut la voir comme une « sonde » qu'on applique à un objet mathématique pour mesurer ses propriétés locales sans perturber ce qui se passe loin.

Définition 1.2 (Convergence dans $\mathcal{D}(\Omega)$). Une suite $(\varphi_n) \subset \mathcal{D}(\Omega)$ converge vers φ dans $\mathcal{D}(\Omega)$ si :

- (i) Il existe un compact $K \subset \Omega$ tel que $\text{supp}(\varphi_n) \subset K$ pour tout n .
- (ii) Pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^d$, $\partial^\alpha \varphi_n \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ uniformément sur K .

1.2 DÉFINITION D'UNE DISTRIBUTION

Il existe deux formulations équivalentes, que l'on présente toutes les deux.

Définition 1.3 (Distribution — définition séquentielle). Une distribution sur Ω est une forme linéaire $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi \implies \langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad \text{dans } \mathbb{R}.$$

Définition 1.4 (Distribution — définition par majoration). Une forme linéaire $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ est une distribution si et seulement si, pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe $C_K > 0$ et $m \in \mathbb{N}$ tels que

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \text{ avec } \text{supp}(\varphi) \subset K.$$

L'entier m s'appelle l'**ordre** de la distribution. Si m peut être choisi indépendant de K , on dit que T est d'ordre m .

L'ensemble de toutes les distributions sur Ω se note $\mathcal{D}'(\Omega)$.

1.3 LES EXEMPLES FONDAMENTAUX

Exemple (Distribution régulière). Toute fonction $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ (localement intégrable) définit une distribution T_f via

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

La majoration $|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq \|f\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_{\infty}$ montre que T_f est d'ordre 0. On dit que f est identifiée à T_f , et que T_f est une distribution régulière. Ainsi les fonctions classiques sont des distributions, mais pas l'inverse.

Exemple (La distribution de Dirac δ_a). Pour $a \in \Omega$, le Dirac en a est défini par

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Vérification rapide (majoration) :

$$|\langle \delta_a, \varphi \rangle| = |\varphi(a)| \leq \sup_{x \in K} |\varphi(x)|,$$

ce qui correspond à la majoration avec $C_K = 1$ et $m = 0$. Donc $\delta_a \in \mathcal{D}'$, d'ordre 0.

Attention. δ_a n'est pas une distribution régulière : il n'existe aucune fonction f telle que $\int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx = \varphi(a)$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Exemple (La fonction de Heaviside). La fonction de Heaviside $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $H(x) = 1$ si $x > 0$ et $H(x) = 0$ sinon, est dans $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Elle définit donc une distribution régulière :

$$\langle T_H, \varphi \rangle = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$




FIGURE 1.1 – Représentation symbolique de la fonction de Heaviside $H(x)$ et de la masse de Dirac δ_0 (flèche).

Elle n'est pas dérivable en 0 au sens classique — c'est précisément ce genre de situation que la théorie des distributions permet de dépasser.

QCM

Question 1. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

- A. Toute distribution est une fonction.
- B. Toute fonction localement intégrable est une distribution.
- C. La distribution de Dirac est une distribution régulière.
- D. L'espace $\mathcal{D}(\Omega)$ contient toutes les fonctions continues.

→ Voir la réponse, p. 47

Question 2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ avec $\varphi(2) = -3$ et $\varphi(0) = 7$. Calculer $\langle \delta_2, \varphi \rangle$.

- A. 7 B. -3 C. 0 D. $\varphi'(2)$

→ Voir la réponse, p. 47

EXERCICE 1.1 — Vérifier qu'une forme est une distribution

Soit $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\langle T, \varphi \rangle = 3\varphi(0) - \varphi(1).$$

1. Vérifier que T est linéaire.
2. Vérifier que T est une distribution en utilisant la définition par majoration.

3. Quel est l'ordre de T ?
4. Exprimer T comme combinaison de distributions connues.

→ Voir la correction, p. 49

À RETENIR — Chapitre 1

- $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$: fonctions C^∞ à support compact — ce sont les « sondes ».
- Une distribution est une forme linéaire continue sur $\mathcal{D}(\Omega)$ (continuité = séquentielle = contrôle par les dérivées de φ).
- Les fonctions L_{loc}^1 définissent des distributions régulières ; le Dirac est une distribution, mais singulière (pas associée à une fonction).
- L'ordre mesure combien de dérivées de φ sont nécessaires dans la majoration.

CONVERGENCE DANS $\mathcal{D}'(\Omega)$

2.1 DÉFINITION

Définition 2.1 (Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$). Une suite (T_n) de distributions converge vers T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ si

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle T_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle T, \varphi \rangle \quad \text{dans } \mathbb{R}.$$

On note alors $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, et T est appelée la limite de (T_n) .

Nature de cette convergence. Il s'agit d'une convergence faible : on ne demande pas que les T_n se rapprochent dans un sens géométrique ou en norme. On demande seulement que leur action sur chaque fonction test converge. C'est une condition bien moins exigeante que la convergence uniforme ou L^p , ce qui rend $\mathcal{D}'(\Omega)$ très souple.

Si (T_n) est une suite de distributions telle que $\langle T_n, \varphi \rangle$ converge dans $\mathbb{R}$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, alors l'application $\varphi \mapsto \lim_n \langle T_n, \varphi \rangle$ est encore une distribution. Autrement dit, $\mathcal{D}'(\Omega)$ est complet pour la convergence faible : on ne peut pas « sortir » de l'espace des distributions en prenant des limites.

Ce théorème est remarquable : dans les espaces de fonctions classiques (C^0, L^p) , une limite de fonctions régulières peut être irrégulière et sortir de l'espace. Ici, toute limite de distributions est encore une distribution — l'espace $\mathcal{D}'(\Omega)$ est stable par passage à la limite.

2.2 LE DIRAC COMME LIMITE DE DISTRIBUTIONS

On illustre la définition par un exemple purement distributionnel, qui ne fait intervenir aucune intégrale.

Exemple ($n(\delta_{1/n} - \delta_{-1/n})$ converge dans $\mathcal{D}'$). Pour $n \geq 1$, posons $T_n = n(\delta_{1/n} - \delta_{-1/n})$. Chaque T_n est une combinaison de deux masses de Dirac — c'est une distribution, mais pas une fonction.

Calcul de $\langle T_n, \varphi \rangle$. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T_n, \varphi \rangle = n(\langle \delta_{1/n}, \varphi \rangle - \langle \delta_{-1/n}, \varphi \rangle) = n\left(\varphi\left(\frac{1}{n}\right) - \varphi\left(-\frac{1}{n}\right)\right).$$

Passage à la limite. En écrivant le développement limité à l'ordre 1 de φ en 0 :

$$\varphi\left(\frac{1}{n}\right) = \varphi(0) + \frac{1}{n}\varphi'(0) + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad \varphi\left(-\frac{1}{n}\right) = \varphi(0) - \frac{1}{n}\varphi'(0) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

En soustrayant :

$$\langle T_n, \varphi \rangle = n \cdot \frac{2}{n}\varphi'(0) + o(1) = 2\varphi'(0) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\varphi'(0).$$

L'application $\varphi \mapsto 2\varphi'(0)$ est bien une forme linéaire continue sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, donc une distribution. On a ainsi :

$$T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T \quad \text{où} \quad \langle T, \varphi \rangle = 2\varphi'(0).$$

La limite T définie par $\langle T, \varphi \rangle = 2\varphi'(0)$ n'est associée à aucune fonction : il n'existe pas de f telle que $\int f(x)\varphi(x) dx = 2\varphi'(0)$. C'est une distribution singulière, obtenue comme limite de distributions elles-mêmes singulières — ce que l'espace $\mathcal{D}'$ absorbe sans difficulté grâce au théorème de complétude.

Remarque. Pour mémoire, on peut aussi approcher δ_0 par des fonctions régulières : par exemple $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}$ converge vers δ_0 dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (changement de variable $t = nx$, puis convergence dominée).




FIGURE 2.1 – Approximation de la masse de Dirac δ_0 par des gaussiennes $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}$ qui deviennent de plus en plus étroites et hautes.

2.3 STABILITÉ DE LA LIMITE

Un résultat fondamental : les opérations classiques sur les distributions sont compatibles avec la convergence dans $\mathcal{D}'$.

Soit (T_n) une suite de distributions convergeant vers T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$. Alors pour tout multi-indice α et toute fonction $f \in C^\infty(\Omega)$:

- (i) Stabilité par dérivation : $\partial^\alpha T_n \rightarrow \partial^\alpha T$.
- (ii) Stabilité par multiplication : $f \cdot T_n \rightarrow f \cdot T$.

Démonstration du point (i) en dimension 1. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T'_n, \varphi \rangle = -\langle T_n, \varphi' \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle.$$

QCM

Question 1. (T_n) converge vers T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ signifie :

- A. $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ pour une certaine norme sur $\mathcal{D}'$.
- B. Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ dans $\mathbb{R}$.
- C. $T_n(x) \rightarrow T(x)$ pour presque tout $x \in \Omega$.
- D. T_n et T ont le même support pour n assez grand.

→ Voir la réponse, p. 47

Question 2. Si $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, qu'est-ce qu'on peut affirmer ?

- A. $T'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T'$ pour tout ordre de dérivation.
- B. T_n ne converge pas en général.
- C. T_n converge seulement si les T_n sont des fonctions C^1 .
- D. On ne peut rien dire sans hypothèse supplémentaire.

→ Voir la réponse, p. 47

EXERCICE 2.1 — Convergence vers le Dirac

Pour $n \geq 1$, on définit $h_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$h_n(x) = \frac{n}{\pi(1 + n^2 x^2)}.$$

1. Vérifier que $\int_{-\infty}^{+\infty} h_n(x) dx = 1$ pour tout n .
2. Montrer que $h_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

→ Voir la correction, p. 50

À RETENIR — Chapitre 2

- $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$ signifie : $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ dans $\mathbb{R}$ pour toute fonction test φ . C'est une convergence faible.
- $\mathcal{D}'(\Omega)$ est complet : toute suite « raisonnable » de distributions converge encore vers une distribution.
- Toute suite de fonctions positives d'intégrale 1 dont le support se concentre en 0 converge vers δ_0 — indépendamment de la forme (gaussienne, créneau, Cauchy...).
- La convergence dans $\mathcal{D}'$ est stable par dérivation : $T_n \rightarrow T \Rightarrow \partial^\alpha T_n \rightarrow \partial^\alpha T$. C'est faux en général pour les fonctions classiques.

DÉRIVATION DES DISTRIBUTIONS

3.1 MOTIVATION — LE PARADIGME DE SCHWARTZ

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe C^1 . Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, une intégration par parties donne

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx = \left[f(x) \varphi(x) \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx,$$

le crochet étant nul car φ est à support compact. Autrement dit,

$$\langle T_{f'}, \varphi \rangle = -\langle T_f, \varphi' \rangle.$$

La distribution associée à la dérivée classique f' n'est autre que l'application $\varphi \mapsto -\langle T_f, \varphi' \rangle$. **L'idée fondatrice de Schwartz** : définir la dérivée de n'importe quelle distribution T par la même formule, sans jamais supposer que T provient d'une fonction différentiable.

3.2 DÉFINITION DE LA DÉRIVÉE

Définition 3.1 (Dérivée d'une distribution). Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

1. La **dérivée** T' de T est la distribution définie par

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

2. Plus généralement, la **dérivée d'ordre** m de T est

$$\langle T^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \langle T, \varphi^{(m)} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), m \in \mathbb{N}.$$

Remarque. La définition est légitime : $\varphi \mapsto -\langle T, \varphi' \rangle$ est bien une forme linéaire continue sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. En effet, si $\varphi_n \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{D}$, alors $\varphi'_n \rightarrow \varphi'$ dans $\mathcal{D}$, et la continuité de T donne $\langle T, \varphi'_n \rangle \rightarrow \langle T, \varphi' \rangle$.

3.3 TOUTE DISTRIBUTION EST INDÉFINIMENT DÉRIVABLE

Théorème 3.1 (Dérivabilité infinie dans $\mathcal{D}'$). *Toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ admet des dérivées de tous ordres dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, et l'opérateur de dérivation $T \mapsto T'$ est un endomorphisme continu de $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. En d'autres termes : si (T_n) est une suite de distributions convergeant vers T dans $\mathcal{D}'$, alors $T_n^{(k)} \rightarrow T^{(k)}$ dans $\mathcal{D}'$ pour tout $k \geq 0$.*

Démonstration. Existence. L'application $\varphi \mapsto (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle$ est bien linéaire et continue sur $\mathcal{D}$: si $\varphi_n \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{D}$, les dérivées $\varphi_n^{(k)}$ convergent uniformément vers $\varphi^{(k)}$ (avec supports dans un compact commun), donc $\langle T, \varphi_n^{(k)} \rangle \rightarrow \langle T, \varphi^{(k)} \rangle$.

Continuité de l'opérateur. Si $T_n \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'$, alors pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$:

$$\langle T'_n, \varphi \rangle = -\langle T_n, \varphi' \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle. \quad \square$$

Corollaire 3.2. *Toute fonction continue (ou localement intégrable) est indéfiniment dérivable au sens des distributions. Sa k -ième dérivée distributionnelle peut toutefois être une distribution singulière dès que k dépasse la régularité classique.*

3.4 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES ET TOPOLOGIQUES

Proposition 3.3 (Propriétés de la dérivation). *Soient $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $a \in C^\infty(\mathbb{R})$, $h \in \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}^*$.*

1. **Linéarité** : $(\alpha T + \beta S)' = \alpha T' + \beta S'$.
2. **Continuité séquentielle** : $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T \Rightarrow T_n^{(k)} \xrightarrow{\mathcal{D}'} T^{(k)}$ pour tout k .
3. **Règle de Leibniz** : $(aT)' = a'T + aT'$.
4. **Commutation avec les translations** : Si $\tau_h T$ est définie par $\langle \tau_h T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-h} \varphi \rangle$, alors $(\tau_h T)' = \tau_h(T')$.
5. **Dérivée comme limite de différences finies** :

$$T' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T - \tau_h T}{h} \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

6. Homothétie : Si $\langle T(\lambda x), \varphi \rangle := \frac{1}{|\lambda|} \langle T, \varphi(\cdot/\lambda) \rangle$, alors $\frac{d}{dx} T(\lambda x) = \lambda T'(\lambda x)$.

Démonstration. Leibniz (point 3). Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$:

$$\langle (aT)', \varphi \rangle = -\langle aT, \varphi' \rangle = -\langle T, a\varphi' \rangle = -\langle T, (a\varphi)' - a'\varphi \rangle = \langle T', a\varphi \rangle + \langle T, a'\varphi \rangle = \langle aT', \varphi \rangle + \langle a'T, \varphi \rangle.$$

□

3.5 MULTIPLICATION D'UNE DISTRIBUTION PAR UNE FONCTION C^∞

Définition 3.2 (Produit aT). Soient $a \in C^\infty(\mathbb{R})$ et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On définit $aT \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ par

$$\langle aT, \varphi \rangle := \langle T, a\varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Proposition 3.4 (Propriétés du produit avec δ et ses dérivées). Soient $a \in C^\infty(\mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. $a \delta_0 = a(0) \delta_0$, en particulier $x \delta_0 = 0$.
2. $a \delta'_0 = a(0) \delta'_0 - a'(0) \delta_0$, en particulier $x \delta'_0 = -\delta_0$.
3. **Formule générale :**

$$a \delta_0^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k a^{(k)}(0) \delta_0^{(n-k)}.$$

4. $x \delta_0^{(n)} = -n \delta_0^{(n-1)}$, et plus généralement $x^m \delta_0^{(n)} = 0$ si $m > n$.
5. $x^n \delta_0^{(n)} = (-1)^n n! \delta_0$.

Démonstration. Point 1. $\langle a\delta_0, \varphi \rangle = \langle \delta_0, a\varphi \rangle = a(0)\varphi(0) = a(0)\langle \delta_0, \varphi \rangle$.

Point 2. $\langle a\delta'_0, \varphi \rangle = \langle \delta'_0, a\varphi \rangle = -(a\varphi)'(0) = -a'(0)\varphi(0) - a(0)\varphi'(0)$, ce qui donne bien $a(0)\delta'_0 - a'(0)\delta_0$.

Point 3 (formule de Leibniz). Découle de $\langle a\delta_0^{(n)}, \varphi \rangle = \langle \delta_0^{(n)}, a\varphi \rangle = (-1)^n (a\varphi)^{(n)}(0)$ et de la formule de Leibniz pour $(a\varphi)^{(n)}$.

Point 4. Prendre $a(x) = x$ dans (3) : $a(0) = 0$, $a'(0) = 1$, $a^{(k)}(0) = 0$ pour $k \geq 2$, ce qui donne $x\delta_0^{(n)} = -n\delta_0^{(n-1)}$. □

Exemple (Calculs pratiques). $x^2\delta_0'' = 2\delta_0$, $x^2\delta'_0 = 0$, $\sin(x)\delta_0 = 0$, $\cos(x)\delta_0 = \delta_0$, $e^x\delta'_0 = \delta'_0 - \delta_0$.

3.6 EXEMPLES FONDAMENTAUX DE DÉRIVATION

3.6.1 Dérivée de la fonction de Heaviside

Proposition 3.5. Soit H la fonction de Heaviside : $H(x) = 1$ si $x > 0$, $H(x) = 0$ sinon. Alors

$$H' = \delta_0 \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Démonstration. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \quad \square$$

3.6.2 Dérivée de la valeur absolue

Proposition 3.6. $(|x|)' = \text{sgn}(x)$ et $(|x|)'' = 2\delta_0$.

Démonstration.

$$\langle |x|', \varphi \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} x \varphi'(x) dx.$$

Deux intégrations par parties donnent chacune $\mp \int \text{sgn}(x) \varphi dx$, d'où $(|x|)' = \text{sgn}(x)$. Puis $\text{sgn}(x) = 2H(x) - 1$ implique $\text{sgn}'(x) = 2H'(x) = 2\delta_0$. $\square$

3.6.3 Dérivées successives de $|x|$

$$|x|^{(0)} = |x|, \quad |x|^{(1)} = \text{sgn}(x), \quad |x|^{(2)} = 2\delta_0, \quad |x|^{(3)} = 2\delta_0', \quad |x|^{(n)} = 2\delta_0^{(n-2)} \text{ pour } n \geq 2.$$

3.6.4 Dérivées successives de $x^n H(x)$

Proposition 3.7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, si on pose $f_n(x) = \frac{x^n}{n!} H(x)$, alors

$$f_n' = f_{n-1}, \quad f_0' = H' = \delta_0, \quad f_n^{(k)} = f_{n-k} \text{ pour } k \leq n, \quad f_n^{(n+1)} = \delta_0.$$

Démonstration.

$$\left\langle \left(\frac{x^n}{n!} H \right)', \varphi \right\rangle = - \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \varphi'(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \varphi(x) dx, \quad \text{par IPP (crochet nul).}$$

□

3.6.5 Dérivée de $\ln |x|$

Proposition 3.8.

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \text{vp} \frac{1}{x} \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

où $\text{vp} \frac{1}{x}$ désigne la valeur principale de Cauchy définie par $\langle \text{vp} \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \langle T', \varphi \rangle &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \ln |x| \varphi'(x) dx \\ &= - \int_0^{+\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx - \int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx. \end{aligned}$$

Pour le premier terme, une intégration par parties avec régularisation en $\varepsilon \rightarrow 0^+$ donne $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\ln \varepsilon) \varphi(\varepsilon) + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx$. De même pour le second terme avec $-\ln \varepsilon$. Les logarithmes se compensent, et la somme converge vers $\langle \text{vp} \frac{1}{x}, \varphi \rangle$. □


3.6.6 Dérivée de la partie entière $[x]$

Proposition 3.9. La fonction partie entière $f(x) = [x]$ a pour dérivée le *peigne de Dirac* :

$$[x]' = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_n = \Delta_1.$$

Démonstration. $\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n \int_n^{n+1} \varphi'(x) dx = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n [\varphi(n) - \varphi(n+1)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \varphi(n)$ (somme télescopique à support fini). □

3.7 FORMULE DES SAUTS — FONCTIONS C^∞ PAR MORCEAUX


 FIGURE 3.1 – Représentation du peigne de Dirac $\Delta_1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$.

Théorème 3.10 (Formule des sauts — cas général). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}$ sauf en un nombre localement fini de points $(x_\nu)_{\nu \in \mathbb{Z}}$ avec $x_\nu \rightarrow \pm\infty$. On note, pour $p \geq 0$:

$$[f^{(p)}]_\nu := f^{(p)}(x_\nu^+) - f^{(p)}(x_\nu^-) \quad (\text{saut de la dérivée d'ordre } p \text{ en } x_\nu),$$

et $[f^{(p)}]$ la fonction qui vaut $f^{(p)}$ entre les points de discontinuité (non définie en ceux-ci). Alors, au sens des distributions :

$$f' = [f'] + \sum_\nu [f]_\nu \delta_{x_\nu},$$

$$f'' = [f''] + \sum_\nu [f']_\nu \delta_{x_\nu} + \sum_\nu [f]_\nu \delta'_{x_\nu},$$

et plus généralement :

$$f^{(n)} = [f^{(n)}] + \sum_{k=0}^{n-1} \sum_\nu [f^{(k)}]_\nu \delta_{x_\nu}^{(n-1-k)}.$$

Démonstration. Une intégration par parties sur chaque intervalle $(x_\nu, x_{\nu+1})$ donne, après sommation :

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} [f'](x) \varphi(x) dx + \sum_\nu [f]_\nu \varphi(x_\nu).$$

On applique la formule récursivement pour les ordres supérieurs. □

Exemple (Fonction créneau). Soit $f = \mathbf{1}_{[a,b]}$ (indicatrice de $[a, b]$). Alors f a pour sauts $[f]_a = 1$ et $[f]_b = -1$. Donc

$$f' = \delta_a - \delta_b, \quad f'' = \delta'_a - \delta'_b.$$

Exemple (Fonction triangulaire). Soit $f(x) = \max(1 - |x|, 0)$ (chapeau sur $[-1, 1]$). Elle est C^0 mais pas C^1 . On a $[f']_{-1} = 1$, $[f']_0 = -2$, $[f']_1 = 1$; les sauts de f en ces points sont nuls. Donc

$$f'' = [f''] + \delta_{-1} - 2\delta_0 + \delta_1 = -2\delta_0 + \delta_{-1} + \delta_1.$$

(car $[f''] = 0$ en dehors des points de non-dérivabilité, et f est nulle hors de $[-1, 1]$).




FIGURE 3.2 – Succession des dérivées de la fonction triangle au sens des distributions.

3.8 DÉRIVÉE DE LA DISTRIBUTION DE DIRAC ET DE SES ITÉRÉES

Proposition 3.11. *Pour tout $m \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$:*

$$\langle \delta_a^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \varphi^{(m)}(a).$$

En particulier $\delta_a^{(m)}$ est à support $\{a\}$ et est une distribution singulière pour tout $m \geq 1$.

Théorème 3.12 (Structure des distributions à support ponctuel). *Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ à support $\{0\}$. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ et des constantes $c_0, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ tels que*

$$T = \sum_{k=0}^N c_k \delta_0^{(k)}.$$

Remarque. Ce résultat est très important : toute distribution dont le support est réduit à un point est *nécessairement* une combinaison linéaire finie de la mesure de Dirac et de ses dérivées.

3.9 FORMULE DES DISTRIBUTIONS $\partial_j T$ EN DIMENSION n

En dimension $n \geq 1$, si $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ et $\alpha \in \mathbb{N}^n$, on définit

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Toutes les propriétés précédentes s'étendent *sans modification*.

3.10 QCM — DÉRIVATION DES DISTRIBUTIONS

QCM

Question 1. Quelle est la dérivée de $f(x) = x_+ := \max(x, 0)$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. $H(x)$ B. δ_0 C. $H(-x)$ D. $|x|$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 2. Quelle est la valeur de $\langle \delta_0^{(3)}, \varphi \rangle$?

- A. $\varphi^{(3)}(0)$ B. $-\varphi^{(3)}(0)$ C. $3\varphi(0)$ D. $\varphi''(0)$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 3. Soit $f(x) = |x|^3$. Quelle est f'' dans $\mathcal{D}'$?

- A. $6|x|$ B. $6x \operatorname{sgn}(x)$ C. $6|x| + \delta_0$ D. $3x^2 \operatorname{sgn}(x)$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 4. Quel est $x \delta_0''$?

- A. 0 B. $-2\delta_0$ C. $-\delta_0'$ D. $2\delta_0$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 5. Soit $f(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$. Quelle est f' dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. 0 B. $\delta_0 + \delta_1$ C. $\delta_0 - \delta_1$ D. $-\delta_0 + \delta_1$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 6. La dérivée distributionnelle de $e^{|x|}$ est :

- A. $e^{|x|} \operatorname{sgn}(x)$ B. $e^{|x|} \operatorname{sgn}(x) + 2\delta_0$ C. $|x|e^{|x|}$ D. $e^x H(x) - e^{-x} H(-x)$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 7. Si $T = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$ (peigne de Dirac), quelle est T' ?

- A. $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_n$ B. 0 C. T D. $\sum_{n \in \mathbb{Z}} n \delta_n$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 8. Parmi les énoncés suivants, lequel est *faux* ?

- A. $\delta'_0 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
 B. $H \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $H' = \delta_0$.
 C. Toute distribution est indéfiniment dérivable.
 D. Si $f \in C^0(\mathbb{R})$ et f n'est pas C^1 , alors f' n'existe pas dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

→ Voir la réponse, p. 47

Question 9. Quelle est la dérivée de $\text{vp} \frac{1}{x}$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. $-\text{Pf} \frac{1}{x^2}$ B. 0 C. $\frac{1}{x^2}$ D. $\text{vp} \frac{1}{x^2}$

→ Voir la réponse, p. 47

Question 10. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ à support $\{0\}$. Alors T est nécessairement :

- A. proportionnelle à δ_0 .
 B. une combinaison finie de $\delta_0, \delta'_0, \delta''_0, \dots$.
 C. nulle.
 D. une mesure bornée.

→ Voir la réponse, p. 47

3.11 EXERCICES — DÉRIVATION

EXERCICE 3.1 — Dérivation de fonctions par morceaux

Calculer les dérivées f' , f'' et f''' dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

→ Voir la correction, p. 50

EXERCICE 3.2 — *Action de $x \delta_0^{(n)}$*

Montrer que $x^2 \delta_0'' = 2\delta_0$ et $x^3 \delta_0'' = 0$.

→ Voir la correction, p. 51

EXERCICE 3.3 — *Dérivée de $|x| \sin x$*

Calculer les dérivées d'ordre 1 et 2 de $T = |x| \sin x$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

→ Voir la correction, p. 51

EXERCICE 3.4 — *Vérification par deux méthodes*

Montrer que $\frac{d}{dx}(H(x) \sin x) = \delta_0 + H(x) \cos x$.

→ Voir la correction, p. 52

EXERCICE 3.5 — *Dérivée du peigne de Dirac et série trigonométrique*

Montrer que $\frac{d}{dx} \Delta_a = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_{na}$, et en déduire que, au sens des distributions,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \sin(nx) = -\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta'_{2k\pi}.$$

→ Voir la correction, p. 52

PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS EN DIMENSION 1

4.1 DÉFINITION ET PREMIÈRES REMARQUES

Définition 4.1 (Primitive d'une distribution). Soit $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On appelle **primitive** de S toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ vérifiant

$$T' = S.$$

Remarque. Cette définition est la transposée exacte de la définition classique. Si $f \in C^0(\mathbb{R})$, ses primitives au sens classique et ses primitives au sens des distributions coïncident (à constante près).

4.2 LE NOYAU DE LA DÉRIVATION : DISTRIBUTIONS DE DÉRIVÉE NULLE

Lemme 4.1 (Caractérisation des distributions de dérivée nulle). Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Alors

$$T' = 0 \text{ dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \iff \exists C \in \mathbb{C}, \quad T = C \quad \left(\text{i.e. } \langle T, \varphi \rangle = C \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \right).$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Si $T = C$ (constante), alors $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = -C \int \varphi' = 0$.

($\Rightarrow$) Supposons $T' = 0$, c'est-à-dire $\langle T, \varphi' \rangle = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$.

Étape 1 (image de la dérivation). Montrons que l'image de $\varphi \mapsto \varphi'$ dans $\mathcal{D}$ est précisément

$$\mathcal{D}_0 := \left\{ \psi \in \mathcal{D} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = 0 \right\}.$$

Si $\varphi \in \mathcal{D}$, alors $\varphi' \in \mathcal{D}_0$ (intégrale d'une dérivée à support compact). Réciproquement, si $\psi \in \mathcal{D}_0$, posons $\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \psi(t) dt$: c'est C^∞ , nul pour $x \ll 0$, et nul pour $x \gg 0$ (car $\int \psi = 0$). Donc $\varphi \in \mathcal{D}$ et $\varphi' = \psi$.

Étape 2. $T' = 0$ signifie que T s'annule sur $\mathcal{D}_0$, qui est un hyperplan de $\mathcal{D}$. Fixons $\theta \in \mathcal{D}$ avec $\int \theta = 1$. Toute $\varphi \in \mathcal{D}$ s'écrit

$$\varphi = \underbrace{\left(\varphi - \left(\int \varphi \right) \theta \right)}_{\in \mathcal{D}_0} + \left(\int \varphi \right) \theta.$$

Donc $\langle T, \varphi \rangle = \langle T, (\int \varphi) \theta \rangle = \langle T, \theta \rangle \cdot \int \varphi$. Posant $C = \langle T, \theta \rangle$, on obtient $T = C$. $\square$

4.3 EXISTENCE ET UNICITÉ D'UNE PRIMITIVE

Théorème 4.2 (Existence et unicité à une constante près). *Toute distribution $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ admet au moins une primitive T . L'ensemble des primitives de S est*

$$\{T + C \mid C \in \mathbb{C}\},$$

où T est une primitive particulière quelconque. C 'est un espace affine de dimension 1 sur $\mathbb{C}$.

Démonstration. Unicité modulo constante. Si $T_1' = T_2' = S$, alors $(T_1 - T_2)' = 0$, donc $T_1 - T_2 = C$ par le lemme précédent.

Existence. On construit explicitement une primitive. Reprenons les notations du lemme : fixons $\theta \in \mathcal{D}$ avec $\int \theta = 1$. Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$, posons $\Psi_\varphi(x) = \int_{-\infty}^x (\varphi(t) - (\int \varphi)\theta(t)) dt \in \mathcal{D}$. Définissons T par

$$\langle T, \varphi \rangle := -\langle S, \Psi_\varphi \rangle.$$

T est linéaire et continue (car $\varphi \mapsto \Psi_\varphi$ est continue dans $\mathcal{D}$). Vérifions $T' = S$:

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = \langle S, \Psi_{\varphi'} \rangle.$$

Or $\Psi_{\varphi'} = \varphi$ (car $\int \varphi' = 0$, donc $\Psi_{\varphi'}(x) = \int_{-\infty}^x \varphi'(t) dt = \varphi(x)$). Donc $\langle T', \varphi \rangle = \langle S, \varphi \rangle$. $\square$

4.4 PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS USUELLES

Théorème 4.3 (Tableau des primitives fondamentales).

<i>Distribution S</i>	<i>Primitive particulière T</i>	<i>Commentaire</i>
Constante C_0	$C_0 x$	<i>primitives classiques</i>
$H(x)$	$x_+ = xH(x)$	$\int_0^x H(t) dt = x$ si $x > 0$
δ_0	$H(x)$	$H' = \delta_0$
δ'_0	δ_0	$\delta'_0 = (\delta_0)'$
$\delta_0^{(n)}$	$\delta_0^{(n-1)}$	<i>réurrence</i>
δ_a	$H(x - a) = \tau_a H$	<i>translation</i>
$\text{sgn}(x)$	$ x $	<i>car</i> $ x ' = \text{sgn}(x)$
$\text{vp} \frac{1}{x}$	$\ln x $	<i>car</i> $(\ln x)' = \text{vp} \frac{1}{x}$
$-\text{Pf} \frac{1}{x^2}$	$\text{vp} \frac{1}{x}$	<i>par définition</i>
$\Delta_a = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_{na}$	$\sum_{n \in \mathbb{Z}} H(x - na)$	<i>peigne de Heaviside</i>

4.5 PRIMITIVE D'ORDRE n DE δ_0

Proposition 4.4. La suite de fonctions $f_n(x) = \frac{x^n}{n!} H(x)$ vérifie

$$f_n^{(n+1)} = \delta_0, \quad f_0 = H, \quad f'_n = f_{n-1}.$$

En particulier, la primitive d'ordre n de δ_0 qui s'annule sur $] -\infty, 0[$ est $f_n(x) = \frac{x^n}{n!} H(x)$.

Démonstration. Par récurrence. $f'_0 = H' = \delta_0$. Si $f'_{n-1} = f_{n-2}$, alors $\left(\frac{x^n}{n!} H\right)' = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H + \frac{x^n}{n!} \delta_0 = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H = f_{n-1}$ (car $x^n \delta_0 = 0$). $\square$

4.6 STRUCTURE DES PRIMITIVES DANS $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Proposition 4.5 (Primitives de distributions à support borné). *Soit $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ à support compact. Alors toutes ses primitives sont à support borné à gauche (bornées inférieurement), mais pas nécessairement compactes.*

Proposition 4.6 (Commutation avec la multiplication par C^∞). *Si T est une primitive de S et $a \in C^\infty(\mathbb{R})$, alors la primitive de aS n'est pas aT en général : $(aT)' = a'T + aS$.*

Remarque. C'est précisément pourquoi la résolution de $T' + a(x)T = S$ dans $\mathcal{D}'$ ne se réduit pas à la recherche d'une primitive, mais demande l'utilisation d'un facteur intégrant $e^{A(x)}$ (voir chapitre 5).

4.7 LIEN AVEC LES INTÉGRALES À PARAMÈTRE

Théorème 4.7 (Primitive via intégrale à paramètre). *Si $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, la fonction*

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est continue, localement intégrable, et vérifie $F' = T_f$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. C'est une primitive classique de T_f .

Exemple. – Primitive de T_f avec $f(x) = e^{-|x|}$: $F(x) = \int_0^x e^{-|t|} dt$, qui vaut $1 - e^{-x}$ pour $x \geq 0$ et $e^x - 1$ pour $x < 0$.

- Primitive de $\text{vp} \frac{1}{x} : \ln |x|$ (déjà vue).
- Primitive d'ordre 2 de δ_0 : $\frac{x^2}{2} H(x) = x_+^2 / 2$.

4.8 PRIMITIVES ET ÉQUATION $T' = S$

Théorème 4.8 (Résolution de $T' = S$). Pour tout $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, la solution générale de l'équation $T' = S$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est

$$T = T_0 + C, \quad C \in \mathbb{C},$$

où T_0 est une primitive particulière de S .

Lorsque S est une fonction localement intégrable, $T_0(x) = \int_0^x S(t) dt$ est une primitive particulière.

Exemple (Primitive de $|x|$). $|x|' = \text{sgn}(x)$, donc une primitive de $\text{sgn}(x)$ est $|x|$. Vérification : $\langle \text{sgn}', \varphi \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sgn}(x) \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = 2\varphi(0)$. Donc $\text{sgn}' = 2\delta_0$ et une primitive de sgn est bien $|x|/1 = |x|$ (modulo constante).

4.9 QCM — PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS

QCM

Question 1. Quelle est la primitive de δ_0 s'annulant sur $] -\infty, 0[$?

- A. δ_0' B. $H(x)$ C. $H(x) + 1$ D. $x \delta_0$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 2. Quelle est la solution générale de $T' = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. $T = 0$ B. $T = \delta_0$ C. $T = C$ (constante) D. $T = Cx$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 3. Si $T'' = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, quelle est la forme générale de T ?

- A. $T = C$ B. $T = Cx + D$ C. $T = C\delta_0$ D. $T = H$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 4. Parmi les distributions suivantes, laquelle est une primitive de $2\delta_0$?

- A. $2H(x)$ B. δ_0' C. $2\delta_0'$ D. $H(-x)$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 5. La primitive de $\delta_0^{(n)}$ la plus naturelle est :

- A. $\delta_0^{(n+1)}$ B. $\delta_0^{(n-1)}$ C. $\frac{x^n}{n!}H$ D. $n! \delta_0$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 6. Combien y a-t-il de primitives de $\delta_0 + \delta_1$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. Aucune B. Exactement une C. Une infinité D. Deux

→ Voir la réponse, p. 48

Question 7. Quelle est la primitive de $\operatorname{sgn}(x)$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. $2\delta_0$ B. $|x| + C$ C. $H(x) + C$ D. $xH(x) + C$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 8. Soit $f(x) = x^2 H(x)$. Quelle est sa dérivée seconde dans $\mathcal{D}'$?

- A. $2H(x)$ B. $2H(x) + \delta_0$ C. $2H(x) + 2\delta_0$ D. $2x\delta_0 + 2H$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 9. La distribution $\ln|x|$ est une primitive de :

- A. $\frac{1}{x^2}$ B. $\operatorname{Pf}\frac{1}{x^2}$ C. $\operatorname{vp}\frac{1}{x}$ D. 0

→ Voir la réponse, p. 48

Question 10. Dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, l'équation $T'' = \delta_0$ a pour solution générale :

- A. $T = H(x) + C$ B. $T = xH(x) + Cx + D$ C. $T = \frac{x^2}{2}H(x) + Cx + D$ D. $T = \delta'_0 + Cx + D$

→ Voir la réponse, p. 48

4.10 EXERCICES — PRIMITIVES

EXERCICE 4.1 — *Primitives successives de δ_0*

Trouver, pour chaque $n \in \{1, 2, 3\}$, la primitive d'ordre n de δ_0 qui s'annule sur $] -\infty, 0[$.

→ Voir la correction, p. 53

EXERCICE 4.2 — *Résolution de $T' = H - 1$*

Trouver la solution générale de $T' = H(x) - 1$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

→ Voir la correction, p. 53

EXERCICE 4.3 — Équation de la chaleur et primitive en t

Soit $\Gamma(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$ pour $t > 0, x \in \mathbb{R}$.

Montrer que $\Gamma(\cdot, t) \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$ lorsque $t \rightarrow 0^+$, et en déduire que la distribution $E(x, t) = H(t)\Gamma(x, t)$ vérifie $\partial_t E - \partial_x^2 E = \delta_{(0,0)}$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$.

→ Voir la correction, p. 53

EXERCICE 4.4 — Primitives de la valeur principale

Montrer que $x \operatorname{vp} \frac{1}{x} = 1$, et en déduire que la primitive de 1 dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est $x + C$.

→ Voir la correction, p. 54

EXERCICE 4.5 — Structure des primitives du peigne de Dirac

Déterminer la primitive particulière $\Sigma(x)$ du peigne de Dirac $\Delta_1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$ qui s'annule sur $] -\infty, 0[$.

→ Voir la correction, p. 54

À RETENIR — Chapitre 4

- $T' = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ si et seulement si T est une constante.
- Toute distribution admet une infinité de primitives, formant un espace affine de dimension 1.
- La primitive d'ordre n de δ_0 s'annulant sur $] -\infty, 0[$ est $\frac{x^n}{n!} H(x)$.
- Les opérations de dérivation et de recherche de primitive dans $\mathcal{D}'$ sont inverses l'une de l'autre, modulo des constantes additives.
- La primitive de $\operatorname{vp} \frac{1}{x}$ est $\ln |x|$; celle de $-\operatorname{Pf} \frac{1}{x^2}$ est $\operatorname{vp} \frac{1}{x}$.

OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

5.1 MULTIPLICATION PAR UNE FONCTION C^∞

Définition 5.1 (Produit d'une distribution par une fonction C^∞). Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et $a \in C^\infty(\Omega)$. La forme linéaire aT définie sur $C_0^\infty(\Omega)$ par

$$\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \quad \langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$$

est une distribution, appelée *produit de a par T* .

Remarque. La définition est cohérente car $a\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ dès que $a \in C^\infty(\Omega)$ et $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$. La continuité de aT se vérifie via la formule de Leibniz.

Pour $a, b \in C^\infty(\Omega)$ et $T, S \in \mathcal{D}'(\Omega)$, on dispose des propriétés algébriques :

$$(a + b)T = aT + bT, \quad (ab)T = a(bT), \quad a(S + T) = aS + aT.$$

Proposition 5.1 (Continuité du produit). Soient $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $a \in C^\infty(\Omega)$. Si (a_n) converge vers a dans $C^\infty(\Omega)$ et (T_n) converge vers T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$, alors $a_n T_n \rightarrow aT$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Exemple. – Si $a \in C^\infty(\Omega)$ et $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$, alors $aT_f = T_{af}$.

– Si $a \in C^\infty(\Omega)$ et $x_0 \in \Omega$, alors $a\delta_{x_0} = a(x_0)\delta_{x_0}$. En particulier, $x\delta_0 = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

– On a $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Remarque. On ne peut pas définir de produit raisonnable entre deux distributions générales. En effet, si un tel produit était commutatif et associatif, on obtiendrait la contradiction $\delta_0 = 0$ en utilisant $x\delta_0 = 0$ et $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$.

5.2 LES ÉQUATIONS $xT = 0$, $xT = 1$ ET $xT = S$

Proposition 5.2. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On a l'équivalence :

$$xT = 0 \iff T = C\delta_0, \quad C \in \mathbb{C}.$$

Démonstration. Si $T = C\delta_0$, alors $\langle xT, \varphi \rangle = C\langle \delta_0, x\varphi \rangle = C \cdot 0 = 0$.

Réciproquement, si $xT = 0$, pour toute $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ vérifiant $\psi(0) = 0$, on peut écrire par Taylor $\psi(x) = x\theta(x)$ avec $\theta \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, donc $\langle T, \psi \rangle = \langle xT, \theta \rangle = 0$. En fixant $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ avec $\chi(0) = 1$ et en décomposant $\varphi = \varphi(0)\chi + (\varphi - \varphi(0)\chi)$, on obtient $\langle T, \varphi \rangle = \varphi(0)\langle T, \chi \rangle$, d'où $T = C\delta_0$ avec $C = \langle T, \chi \rangle$. $\square$

Proposition 5.3. Les distributions $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ vérifiant $xT = 1$ sont exactement

$$T = \text{vp} \frac{1}{x} + C\delta_0, \quad C \in \mathbb{C}.$$

Démonstration. On sait que $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$. Si T est une solution, alors $x(T - \text{vp} \frac{1}{x}) = 0$, donc $T - \text{vp} \frac{1}{x} = C\delta_0$ par la proposition précédente. $\square$

Proposition 5.4. En dimension d quelconque, soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ avec $0 \in \Omega$. Si $x_i T = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$, alors $T = C\delta_0$ avec $C \in \mathbb{C}$.

5.3 DÉRIVATION D'UNE DISTRIBUTION

La dérivation est l'opération centrale de la théorie des distributions. Son principe est fondé sur la formule d'intégration par parties.

Définition 5.2 (Dérivée d'une distribution). Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et $i \in \{1, \dots, d\}$. La forme linéaire $\partial_{x_i} T$ définie sur $C_0^\infty(\Omega)$ par

$$\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \quad \langle \partial_{x_i} T, \varphi \rangle = -\langle T, \partial_{x_i} \varphi \rangle$$

est une distribution sur Ω , appelée i -ième dérivée partielle de T .

Plus généralement, pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^d$:

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle.$$

Remarque. Toute distribution est infiniment dérivable. Si T est d'ordre m , alors $\partial_{x_i} T$ est d'ordre $m + 1$.

Proposition 5.5 (Continuité de la dérivation). *Si $(T_n) \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$, alors $\partial^\alpha T_n \rightarrow \partial^\alpha T$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^d$.*

Proposition 5.6 (Règle de Leibniz). *Pour $a \in C^\infty(\Omega)$ et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$:*

$$\partial_{x_i}(aT) = (\partial_{x_i} a) T + a \partial_{x_i} T.$$

Exemple. – Soit H la fonction de Heaviside ($H(x) = 0$ pour $x < 0$, $H(x) = 1$ pour $x > 0$). Alors $H' = \delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

– On a $(\ln |x|)' = \text{vp} \frac{1}{x}$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

– Pour $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, la fonction $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ vérifie $F' = T_f$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

5.4 LES ÉQUATIONS $T' = 0$ ET $\partial_{x_i} T = 0$

Proposition 5.7. *Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Alors $T' = 0$ si et seulement si T est une distribution associée à une constante.*

Corollaire 5.8. *Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ où Ω est un ouvert connexe de $\mathbb{R}^d$. Si $\partial_{x_i} T = 0$ pour tout i , alors T est constante.*

5.5 FORMULE DES SAUTS EN DIMENSION 1

Théorème 5.9 (Formule des sauts). Soit f une fonction C^1 par morceaux sur $[a, b]$ admettant des limites à gauche et à droite en chaque discontinuité $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ (avec $a_0 = a, a_{n+1} = b$). Alors

$$(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=0}^{n+1} (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \delta_{a_i},$$

où f' est la dérivée classique définie presque partout, et les conventions $f(a_0^-) = 0, f(a_{n+1}^+) = 0$.

Démonstration. Par définition, $\langle (T_f)', \varphi \rangle = - \int_a^b f(x) \varphi'(x) dx$. On découpe cette intégrale sur chaque intervalle $[a_i, a_{i+1}]$ et on intègre par parties sur chacun, faisant apparaître des termes de bord correspondant aux sauts de f aux points a_i . $\square$

Proposition 5.10. Soit $u \in C^1([a, b])$. Si $\tilde{u}$ désigne son prolongement par 0 hors de $[a, b]$, alors

$$(T_{\tilde{u}})' = T_{u'} + u(a)\delta_a - u(b)\delta_b.$$

5.6 EXEMPLES ILLUSTRATIFS

Exemple (Dérivée de $|x|$). La fonction $|x|$ est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sa dérivée classique est $\text{sgn}(x)$ (avec $+1$ pour $x > 0$ et -1 pour $x < 0$). Comme $|x|$ est continue en 0 (pas de saut), la formule des sauts donne

$$|x|' = \text{sgn}(x) \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Exemple (Dérivée de $x_+ = \max(x, 0)$). La fonction $x_+ = xH(x)$ vaut 0 pour $x \leq 0$ et x pour $x > 0$. Par la règle de Leibniz :

$$x_+' = H(x) + x\delta_0 = H(x).$$

On retrouve que $x_+'' = \delta_0$.

Exemple (Dérivée de la valeur absolue, méthode directe). Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle |x|', \varphi \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} x \varphi'(x) dx.$$

Une intégration par parties dans chaque intégrale donne $\langle |x|', \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 (-\varphi) dx + \int_0^{+\infty} \varphi dx$, ce qui correspond bien à $\text{sgn}(x)$.

5.7 QCM — OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

QCM

Question 1. Soit $a \in C^\infty(\mathbb{R})$. Comment est défini $\langle aT, \varphi \rangle$?

- A. $\langle T, a\varphi \rangle$ B. $\langle T, \varphi/a \rangle$ C. $a\langle T, \varphi \rangle$ D. $\langle aT', \varphi \rangle$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 2. Quelle est la valeur de $x\delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. δ_0 B. δ'_0 C. 0 D. 1

→ Voir la réponse, p. 48

Question 3. Les solutions de $xT = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ sont :

- A. $T = 0$ B. $T = C\delta_0, C \in \mathbb{C}$ C. $T = \text{vp}\frac{1}{x}$ D. $T = H$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 4. Si $T' = 5$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, quelle est la forme générale de T ?

- A. $T = 5x$ B. $T = 5\delta_0$ C. $T = 5x + C, C \in \mathbb{C}$ D. $T = 5H$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 5. Soit $f(x) = |x - 1|$. Quelle est f' dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. $\text{sgn}(x - 1) + 2\delta_1$ B. $\text{sgn}(x - 1)$ C. $|x - 1|$ D. δ_1

→ Voir la réponse, p. 48

Question 6. La dérivée de $H(x) - H(x - 1)$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est :

- A. $\delta_0 - \delta_1$ B. $\delta_0 + \delta_1$ C. $2\delta_0$ D. 0

→ Voir la réponse, p. 48

Question 7. Laquelle de ces opérations est *toujours* bien définie dans $\mathcal{D}'$?

- A. $T \cdot S$ (produit de deux distributions) B. $a \cdot T$ avec $a \in C^\infty$ C. $1/T$ D. $|T|$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 8. Quelle est la dérivée de $f(x) = e^x H(x)$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. $e^x H(x)$ B. $e^x H(x) + \delta_0$ C. δ_0 D. e^x

→ Voir la réponse, p. 48

Question 9. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ d'ordre m . Quel est l'ordre de T' ?

- A. m B. $m - 1$ C. $m + 1$ D. $2m$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 10. Quelle propriété caractérise les solutions de $T'' = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$?

- A. T est nulle B. T est affine : $T = ax + b$ C. $T = \delta_0$ D. T est 2π -périodique

→ Voir la réponse, p. 48

5.8 EXERCICES — OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

EXERCICE 5.1 — Calcul de dérivées par la définition

Calculer dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ les dérivées des distributions T_f associées aux fonctions suivantes :

- (a) $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$.
- (b) $f(x) = |x|$.
- (c) $f(x) = e^x H(x)$.

→ Voir la correction, p. 55

EXERCICE 5.2 — Équations algébriques dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Résoudre dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ les équations suivantes :

- (a) $xT = 0$.
- (b) $xT = 1$.
- (c) $x^2T = \delta_0$.

→ Voir la correction, p. 55

EXERCICE 5.3 — Formule des sauts et dérivées successives

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin(x)$ pour $x \in [0, \pi]$ et $f(x) = 0$ sinon.

- (a) Calculer f' dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
- (b) Calculer f'' dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

→ Voir la correction, p. 56

EXERCICE 5.4 — *Produit et multiplication C^∞*

Soit $a(x) = x^2$ et $T = \text{vp} \frac{1}{x} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

- (a) Calculer $x^2 \text{vp} \frac{1}{x}$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
- (b) En déduire $(x^2 \text{vp} \frac{1}{x})'$ par deux méthodes : directement et via la règle de Leibniz.

→ Voir la correction, p. 56

EXERCICE 5.5 — *Distribution à support réduit à un point*

On admet que si $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est à support $\{0\}$, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C}$ tels que $T = \sum_{k=0}^m a_k \delta_0^{(k)}$.

Déterminer toutes les distributions $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ à support dans $\{0\}$ qui vérifient $x^2 T = 0$.

→ Voir la correction, p. 57

À RETENIR — Chapitre 5

- Le produit d’une distribution par $a \in C^\infty$ est défini par $\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$.
- On ne peut pas définir le produit de deux distributions générales.
- Toute distribution est infiniment dérivable : $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$.
- La dérivation est continue : $T_n \rightarrow T \Rightarrow T'_n \rightarrow T'$.
- Formule des sauts : $(T_f)' = T_{f'} + \sum_i (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \delta_{a_i}$.
- $T' = 0 \Leftrightarrow T$ est constante sur tout ouvert connexe.
- Les solutions de $xT = 0$ sont $T = C\delta_0$; celles de $xT = 1$ sont $T = \text{vp} \frac{1}{x} + C\delta_0$.

CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

6.1 PRODUIT DE CONVOLUTION DE DEUX DISTRIBUTIONS

Rappelons d'abord le produit de convolution dans le cadre L^1 . Si $u \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^d$:

$$(u * \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} u(y) \varphi(x - y) dy = \langle T_u, \varphi(x - \cdot) \rangle.$$

Cette formule fournit la définition naturelle dans le cadre distributionnel.

Définition 6.1 (Convolution distribution-fonction test). Soient $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$. Leur *produit de convolution* est la fonction définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad (T * \varphi)(x) = \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle.$$

Alors $T * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$.

Proposition 6.1 (Dérivation et convolution). Pour $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ et $\alpha \in \mathbb{N}^d$:

$$\partial^\alpha (T * \varphi) = (\partial^\alpha T) * \varphi = T * (\partial^\alpha \varphi).$$

Plus généralement, pour toute décomposition $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$:

$$\partial^\alpha (T * \varphi) = (\partial^{\alpha_1} T) * (\partial^{\alpha_2} \varphi).$$

On convient de noter $\check{f}(x) = f(-x)$ pour toute fonction f . Si $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, on a la relation utile :

$$\langle T, \varphi \rangle = (T * \check{\varphi})(0).$$

Proposition 6.2. Pour $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi, \psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$:

$$(T * \varphi) * \psi = T * (\varphi * \psi) \quad \text{et} \quad \langle T * \varphi, \psi \rangle = \langle T, \varphi * \psi \rangle.$$

Théorème 6.3 (Densité de C_0^∞ dans $\mathcal{D}'$). Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Il existe une suite $(\varphi_n) \subset C_0^\infty(\Omega)$ qui converge vers T au sens des distributions.

Définition 6.2 (Convolution de deux distributions). Soient $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ à support compact. On approche T par $(\varphi_n) \subset C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$. Alors $(\varphi_n * S)$ converge dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ vers une limite notée $T * S$.

6.2 PROPRIÉTÉS DE LA CONVOLUTION

Proposition 6.4 (Propriétés algébriques). Soient $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $S, U \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ à supports compacts :

- (1) **Associativité** : $T * (S * U) = (T * S) * U$.
- (2) **Commutativité** : $T * S = S * T$.
- (3) **Élément neutre** : $T * \delta_0 = \delta_0 * T = T$.

Proposition 6.5 (Dérivation et convolution de distributions). Soient $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ à support compact, $\alpha \in \mathbb{N}^d$. Alors

$$\partial^\alpha (T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S).$$

En particulier, $(\partial^\alpha \delta_0) * T = \partial^\alpha T$.

Proposition 6.6 (Continuité). (1) Si $(T_n) \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi \in C_0^\infty$, alors $T_n * \varphi \rightarrow T * \varphi$ dans $\mathcal{D}'$.

(2) Si $(\varphi_n) \rightarrow \varphi$ dans C_0^∞ et $T \in \mathcal{D}'$, alors $T * \varphi_n \rightarrow T * \varphi$ dans $\mathcal{D}'$.

6.3 INTERPRÉTATION PHYSIQUE DE LA CONVOLUTION

Considérons un système physique linéaire, invariant par translation temporelle, qui transforme un signal d'entrée $s(t)$ en une réponse $r(t)$. Les hypothèses physiques sont :

- **Superposition** : la réponse à $\lambda_1 s_1 + \lambda_2 s_2$ est $\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2$.
- **Invariance temporelle** : un signal décalé de τ produit une réponse décalée de τ .
- **Continuité** : des signaux voisins produisent des réponses voisines.

Sous ces hypothèses, il existe une distribution T (la *réponse impulsionnelle* du système) telle que $r = T * s$. Ce résultat explique l'omniprésence de la convolution en traitement du signal et en physique.

6.4 COMMENT CALCULER UN PRODUIT DE CONVOLUTION

Cas 1 : Convolution de deux fonctions dans $L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^d)$

Si $f, g \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^d)$, la convolution (quand elle est définie) est donnée par la formule intégrale classique :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y) g(y) dy.$$

Cas 2 : Convolution d'une distribution et d'une fonction C_0^∞

Si $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, la distribution $T * \varphi$ est la fonction C^∞ :

$$x \mapsto \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle.$$

Cas 3 : Utilisation des propriétés de dérivation

En dimension $d = 1$, si $T = \tilde{T}'$ pour une distribution $\tilde{T}$ plus simple à convoluer, on calcule d'abord $\tilde{T} * S$ puis on utilise :

$$T * S = (\tilde{T} * S)'.$$

Réciproquement, si on connaît $T' * S$, on peut retrouver $T * S$ par une primitive (à une constante près).

Exemple. Calculons $\delta_0' * \delta_0'$. En utilisant la règle de dérivation : $\delta_0' * \delta_0' = (\delta_0 * \delta_0)'' = \delta_0''$.

Exemple (Convolution avec le Dirac). Pour toute $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et tout $a \in \mathbb{R}^d$, on a $T * \delta_a = \tau_a T$ (le translaté de T en a), où $\langle \tau_a T, \varphi \rangle = \langle T, \varphi(\cdot + a) \rangle$. En particulier $T * \delta_0 = T$.

Exemple (Convolution de deux fonctions de Heaviside). Calculons $H * H$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Pour $x > 0$:

$$(H * H)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x-y)H(y) dy = \int_0^x 1 dy = x.$$

Pour $x < 0$, l'intégrale est nulle. Donc $H * H = x_+ = xH(x)$.

6.5 EXEMPLES DE CALCULS DE CONVOLUTION

*Exemple ($\delta_0 * T = T$).* Pour $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$:

$$(\delta_0 * T)(x) = \langle \delta_0, \varphi(x - \cdot) \rangle = \varphi(x - 0) = \varphi(x) = \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle|_{T=\delta_0}.$$

Plus directement : $\langle \delta_0 * T, \psi \rangle = \langle T, \check{\delta}_0 * \psi \rangle = \langle T, \psi \rangle$.

*Exemple ($H * \delta'_0 = H' = \delta_0$).* Par la propriété de dérivation : $H * \delta'_0 = (H * \delta_0)' = H' = \delta_0$.

6.6 QCM — CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

QCM

Question 1. Quel est l'élément neutre de la convolution dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$?

A. 0 B. 1 C. δ_0 D. H

→ Voir la réponse, p. 48

Question 2. La convolution $T * S$ est-elle toujours définie pour $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$?

A. Oui B. Non, il faut une hypothèse sur les supports C. Seulement si T est une fonction D. Seulement en dimension 1

→ Voir la réponse, p. 48

Question 3. Quelle est la valeur de $\delta'_0 * T$?

A. T B. T' C. $T + \delta_0$ D. 0

→ Voir la réponse, p. 48

Question 4. Si $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y)g(x - y) dy$, la convolution de H avec elle-même $H * H$ vaut :

- A. H B. $2H$ C. $xH(x)$ D. $H(x)/2$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 5. Quelle relation lie $\partial^\alpha(T * S)$, $(\partial^\alpha T) * S$ et $T * (\partial^\alpha S)$?

- A. $\partial^\alpha(T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$
 B. $\partial^\alpha(T * S) = (\partial^\alpha T) * S$ seulement
 C. Il n'y a pas de relation simple
 D. $\partial^\alpha(T * S) = 0$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 6. Quel résultat de densité est essentiel pour définir $T * S$ lorsque S est à support compact ?

- A. $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans L^2
 B. $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{D}'$ pour la topologie des distributions
 C. $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans les fonctions continues
 D. $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans L^1

→ Voir la réponse, p. 48

Question 7. Que vaut $\delta_0^{(n)} * \delta_0^{(m)}$?

- A. $\delta_0^{(n+m)}$ B. $\delta_0^{(nm)}$ C. 0 D. $n! m! \delta_0$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 8. Que vaut $(H * \delta_1)(x)$ où $\delta_1 = \delta_{x=1}$?

- A. $H(x)$ B. $H(x - 1)$ C. $H(x + 1)$ D. $H(x) + 1$

→ Voir la réponse, p. 48

Question 9. L'interprétation physique de la convolution correspond à :

- A. La réponse d'un système non linéaire
 B. La réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant par translation
 C. La transformée de Fourier du signal
 D. La primitive du signal d'entrée

→ Voir la réponse, p. 49

Question 10. Que vaut $\delta_0 * \delta_0$?

- A. 1 B. δ_0^2 C. δ_0 D. 0

→ Voir la réponse, p. 49

6.7 EXERCICES — CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

EXERCICE 6.1 — *Convolution et dérivation*

- (a) Calculer $\delta_0^{(n)} * H$ pour $n \geq 1$.
- (b) Montrer que $H * H * \dots * H$ (n fois) vaut $\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H(x)$.

→ Voir la correction, p. 57

EXERCICE 6.2 — *Convolution avec des translations de Dirac*

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Calculer $\delta_a * \delta_b$ et $\delta_a * f$ pour $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

→ Voir la correction, p. 58

EXERCICE 6.3 — *Calcul explicite de produits de convolution*

Calculer dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ les convolutions suivantes :

- (a) $e^x H(x) * H(x)$.
- (b) $H(x) * \cos(x) H(x)$.

→ Voir la correction, p. 58

EXERCICE 6.4 — *Convolution et la propriété de régularisation*

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$ avec $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\rho \geq 0$, $\int \rho = 1$ (noyau régularisant).

- (a) Montrer que $T * \rho_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$.
- (b) Montrer que $T * \rho_\varepsilon \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$.
- (c) Application : montrer que $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ pour $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

→ Voir la correction, p. 59

EXERCICE 6.5 — *Convolution et résolution de l'équation $T' - T = \delta_0$*

Trouver toutes les solutions $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de l'équation $T' - T = \delta_0$.

→ Voir la correction, p. 59

À RETENIR — Chapitre 6

- La convolution $T * \varphi$ pour $T \in \mathcal{D}'$ et $\varphi \in C_0^\infty$ est la fonction $C^\infty : x \mapsto \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle$.
- La dérivation et la convolution commutent : $\partial^\alpha(T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$.
- δ_0 est l'élément neutre : $T * \delta_0 = T$ pour toute distribution T .
- $\delta_0^{(n)} * T = T^{(n)}$: la convolution par une dérivée de Dirac dérive.
- $\delta_a * T = \tau_a T$: la convolution par δ_a translate de a .
- $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$: la convolution des masses de Dirac correspond à l'addition des points.
- La convolution par un noyau régularisant ρ_ε régularise : $T * \rho_\varepsilon \in C^\infty$ et $T * \rho_\varepsilon \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'$.
- La réponse d'un système linéaire invariant par translation est donnée par une convolution : $r = T * s$.

APPLICATIONS AUX ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

7.1 CADRE GÉNÉRAL

Définition 7.1 (Opérateur différentiel à coefficients constants). Soit $P \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_d]$ un polynôme de degré m , $P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha X^\alpha$. L'opérateur différentiel associé est

$$P(\partial) : T \longmapsto P(\partial)T := \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha T.$$

Une **EDP linéaire à coefficients constants** est une équation de la forme $P(\partial)T = F$ avec $F \in \mathcal{D}'(\Omega)$ donné et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ inconnu.

Proposition 7.1 (Structure de l'ensemble des solutions). *L'ensemble des solutions de $P(\partial)T = F$ est soit vide, soit un sous-espace affine $T_0 + \ker P(\partial)$, où T_0 est une solution particulière et $\ker P(\partial) = \{T \in \mathcal{D}'(\Omega) : P(\partial)T = 0\}$.*

Remarque (À retenir). – $P(\partial)$ agit linéairement sur $\mathcal{D}'(\Omega)$: les distributions généralisent le cadre classique.

- La structure affine des solutions est identique à celle de l'algèbre linéaire : solution générale = solution particulière + noyau.

7.2 SOLUTION FONDAMENTALE

Définition 7.2 (Solution fondamentale (élémentaire)). Une distribution $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ est une **solution fondamentale** de $P(\partial)$ si

$$P(\partial)E = \delta_0.$$

On dit aussi *solution élémentaire* ou *fonction de Green* de $P(\partial)$.

Théorème 7.2 (Théorème fondamental — Malgrange–Ehrenpreis (1955)). *Tout opérateur différentiel à coefficients constants $P(\partial) \neq 0$ admet une **solution fondamentale** dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$.*

Remarque. La démonstration utilise la transformée de Fourier et des propriétés des fonctions holomorphes. Elle est admise dans ce cours.

Théorème 7.3 (Résolution par convolution). *Soit E une solution fondamentale de $P(\partial)$, et soit $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ à **support compact**. Alors $u := E * F$ est une solution de $P(\partial)u = F$.*

Démonstration. En utilisant le fait que la dérivation commute avec la convolution :

$$P(\partial)(E * F) = (P(\partial)E) * F = \delta_0 * F = F.$$

□

Théorème 7.4 (Unicité et régularité). (i) *Parmi les solutions à support compact, $E * F$ est l'**unique solution** de $P(\partial)u = F$.*

(ii) *Si $E \in C^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ et si $F \in C^\infty(\Omega)$, alors toute solution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ de $P(\partial)T = T_F$ est en fait une fonction C^∞ (régularité elliptique).*

Remarque (À retenir). C'est là la force des distributions : une **solution fondamentale** E concentre toute l'information du système. La formule $u = E * F$ signifie que l'on superpose les réponses impulsionnelles pondérées par la source F — c'est l'intuition physique de la convolution. Le théorème de Malgrange–Ehrenpreis garantit l'**existence** de E sans la calculer : on la cherche au cas par cas.

7.3 EXEMPLES FONDAMENTAUX

Exemple (Équation de transport : $u' - \lambda u = f$). **Opérateur** : $P(\partial) = \partial_x - \lambda$. **Solution fondamentale** : $E(x) = e^{\lambda x} H(x)$.

Vérification (formule des sauts + règle de Leibniz) :

$$E' - \lambda E = (e^{\lambda x} H)' - \lambda e^{\lambda x} H = \lambda e^{\lambda x} H + e^{\lambda \cdot 0} \delta_0 - \lambda e^{\lambda x} H = \delta_0. \quad \checkmark$$

Interprétation. $E(x)$ est nulle pour $x < 0$ (avant l'impulsion) et exponentielle pour $x > 0$ — c'est la *réponse causale* du système.

Exemple (Laplacien en dimension $d \geq 2$: $-\Delta u = f$). **Solutions fondamentales** :

$$E(x) = \frac{1}{2\pi} \ln |x| \quad (d = 2), \quad E(x) = \frac{-1}{(d-2) S_{d-1} |x|^{d-2}} \quad (d \geq 3),$$

où S_{d-1} est l'aire de la sphère unité S^{d-1} . En dimension 3 :

$$E(x) = \frac{1}{4\pi|x|}.$$

Interprétation physique. C'est le **potentiel de Coulomb** : le potentiel électrique créé par une charge ponctuelle unitaire. La théorie des distributions formalise ce que les physiciens utilisaient intuitivement.

Régularité. Ces solutions sont C^∞ hors de 0, donc toute solution de $-\Delta u = f$ avec $f \in C^\infty$ est aussi C^∞ (régularité elliptique — conséquence du Théorème 7.3 (ii)).

Exemple (Équation des ondes en dimension $1 + 1$: $\partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f$). **Solution fondamentale** :

$$E(x, t) = \frac{1}{2} H(t - |x|) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } t > |x|, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Interprétation. E est nulle hors du cône $\{t > |x|\}$ et vaut $\frac{1}{2}$ à l'intérieur. L'information se propage exactement à la vitesse 1 dans les deux directions — c'est le **principe de Huygens** en dimension 1.

Vérification. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, un calcul direct par Fubini et intégrations par parties donne $\langle (\partial_t^2 - \partial_x^2) E, \varphi \rangle = \varphi(0, 0)$.

QCM

Question 1. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- A. E est toujours C^∞ sur $\mathbb{R}^d$ entier.
- B. E vérifie $P(\partial)E = \delta_0$.
- C. E est unique pour tout opérateur $P(\partial)$.
- D. E n'existe que si $P(\partial)$ est d'ordre 1.

→ Voir la réponse, p. 49

Question 2. Soit E une solution fondamentale de $P(\partial)$ et $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ à support compact. Quelle expression est une solution de $P(\partial)u = F$?

- A. $u = E + F$
- B. $u = P(\partial)F$
- C. $u = E * F$
- D. $u = F * F$

→ Voir la réponse, p. 49

Question 3. Quelle est la solution fondamentale du Laplacien $-\Delta$ en dimension 3?

- A. $E(x) = \frac{\ln|x|}{2\pi}$
- B. $E(x) = \frac{1}{4\pi|x|}$
- C. $E(x) = e^{-|x|}$
- D. $E(x) = |x|$

→ Voir la réponse, p. 49

EXERCICE 7.1 — Calculer des solutions fondamentales

1. Montrer que $E(x) = e^{\lambda x}H(x)$ est une solution fondamentale de l'opérateur $P(\partial) = \partial_x - \lambda$, c'est-à-dire que $E' - \lambda E = \delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
2. En déduire qu'une solution particulière de $u' - \lambda u = g$ (avec $g \in L^1(\mathbb{R})$ à support compact) est $u = E * g$. Écrire explicitement cette convolution.
3. Vérifier que $(T_{|x|})'' = 2\delta_0$ en appliquant deux fois la formule des sauts.

→ Voir la correction, p. 60

À RETENIR — Chapitre 7

- La **solution fondamentale** E vérifie $P(\partial)E = \delta_0$ et existe toujours (Malgrange–Ehrenpreis 1955).
- **Résolution par convolution** : $u = E * F$ résout $P(\partial)u = F$ (pour F à support compact).
- Résultats clés : $H' = \delta_0$, $E_{\text{transport}}(x) = e^{\lambda x}H(x)$, $E_{-\Delta}(x) = \frac{1}{4\pi|x|}$ (dim. 3),
 $E_{\text{ondes}}(x, t) = \frac{1}{2}H(t - |x|)$.
- La dérivée au sens des distributions **prolonge** la dérivée classique : si f est C^1 , alors $T_{f'} = (T_f)'$.

CORRECTIONS DES EXERCICES ET RÉPONSES AUX QCM

RÉPONSES AUX QCM

Chapitre 1 — Notion de distribution

← Revenir aux questions du chapitre 1, p. 5

Réponse 1 : B. Toute fonction localement intégrable est une distribution.

Réponse 2 : B. -3 (car $\langle \delta_2, \varphi \rangle = \varphi(2) = -3$).

Chapitre 2 — Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$

← Revenir aux questions du chapitre 2, p. 9

Réponse 1 : B. Pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ dans $\mathbb{R}$.

Réponse 2 : A. $T'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T'$ pour tout ordre de dérivation.

Chapitre 3 — Dérivation des distributions

← Revenir aux questions du chapitre 3, p. 18

Réponse 1 : A. $H(x)$.

Réponse 2 : B. $-\varphi^{(3)}(0)$.

Réponse 3 : A. $6|x|$.

Réponse 4 : B. $-2\delta'_0$.

Réponse 5 : C. $\delta_0 - \delta_1$.

Réponse 6 : A. $e^{|x|}\text{sgn}(x)$.

Réponse 7 : A. $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_n$.

Réponse 8 : D. Si $f \in C^0(\mathbb{R})$ et f n'est pas C^1 , alors f' n'existe pas dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
(Faux)

Réponse 9 : A. $-\text{Pf} \frac{1}{x^2}$.

Réponse 10 : B. une combinaison finie de $\delta_0, \delta'_0, \delta''_0, \dots$

Chapitre 4 — Primitives des distributions

← Revenir aux questions du chapitre 4, p. 25

Réponse 1 : B. $H(x)$.

Réponse 2 : C. $T = C$ (constante).

Réponse 3 : B. $T = Cx + D$.

Réponse 4 : A. $2H(x)$.

Réponse 5 : B. $\delta_0^{(n-1)}$.

Réponse 6 : C. Une infinité.

Réponse 7 : B. $|x| + C$.

Réponse 8 : A. $2H(x)$.

Réponse 9 : C. $\text{vp} \frac{1}{x}$.

Réponse 10 : B. $T = xH(x) + Cx + D$.

Chapitre 5 — Opérations sur les distributions

← Revenir aux questions du chapitre 5, p. 32

Réponse 1 : A. $\langle T, a\varphi \rangle$.

Réponse 2 : C. 0.

Réponse 3 : B. $T = C\delta_0$, $C \in \mathbb{C}$.

Réponse 4 : C. $T = 5x + C$, $C \in \mathbb{C}$.

Réponse 5 : B. $\text{sgn}(x - 1)$.

Réponse 6 : A. $\delta_0 - \delta_1$.

Réponse 7 : B. $a \cdot T$ avec $a \in C^\infty$.

Réponse 8 : B. $e^x H(x) + \delta_0$.

Réponse 9 : C. $m + 1$.

Réponse 10 : B. T est affine : $T = ax + b$.

Chapitre 6 — Convolution des distributions

← Revenir aux questions du chapitre 6, p. 38

Réponse 1 : C. δ_0 .

Réponse 2 : B. Non, il faut une hypothèse sur les supports.

Réponse 3 : B. T' .

Réponse 4 : C. $xH(x)$.

Réponse 5 : A. $\partial^\alpha (T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$.

Réponse 6 : B. $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{D}'$ pour la topologie des distributions.

Réponse 7 : A. $\delta_0^{(n+m)}$.

Réponse 8 : B. $H(x - 1)$.

Réponse 9 : B. La réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant par translation.

Réponse 10 : C. δ_0 .

Chapitre 7 — Applications aux EDP linéaires

← Revenir aux questions du chapitre 7, p. 44

Réponse 1 : B. E vérifie $P(\partial)E = \delta_0$.

Réponse 2 : C. $u = E * F$.

Réponse 3 : B. $\frac{1}{4\pi|x|}$.

CORRECTIONS DES EXERCICES

Chapitre 1 — Notion de distribution

← Accéder à l'exercice, p. 5

Correction — Vérifier qu'une forme est une distribution

1. **Linéarité.** Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned}\langle T, \lambda\varphi + \mu\psi \rangle &= 3(\lambda\varphi + \mu\psi)(0) - (\lambda\varphi + \mu\psi)(1) \\ &= \lambda(3\varphi(0) - \varphi(1)) + \mu(3\psi(0) - \psi(1)) \\ &= \lambda\langle T, \varphi \rangle + \mu\langle T, \psi \rangle.\end{aligned}$$

2. **Majoration.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ compact avec $\text{supp}(\varphi) \subset K$. Alors :

$$|\langle T, \varphi \rangle| = |3\varphi(0) - \varphi(1)| \leq 3|\varphi(0)| + |\varphi(1)| \leq 4 \sup_{x \in K} |\varphi(x)|.$$

C'est bien la majoration avec $C_K = 4$ et $m = 0$. Donc $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. ✓

3. La majoration tient avec $m = 0$ (aucune dérivée de φ n'intervient) : T est d'ordre 0.

4. On reconnaît directement :

$$\langle T, \varphi \rangle = 3\langle \delta_0, \varphi \rangle - \langle \delta_1, \varphi \rangle = \langle 3\delta_0 - \delta_1, \varphi \rangle, \quad \text{donc } T = 3\delta_0 - \delta_1.$$

CHAPITRE 2 — CONVERGENCE DANS $\mathcal{D}'(\Omega)$

Convergence vers le Dirac

← Accéder à l'exercice, p. 9

Correction — Convergence vers le Dirac

1. Par le changement de variable $t = nx$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt = \frac{1}{\pi} [\arctan(t)]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1.$$

2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Avec $t = nx$:

$$\langle T_{h_n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+t^2)} \varphi\left(\frac{t}{n}\right) dt.$$

Comme φ est continue et bornée, et $\varphi(t/n) \rightarrow \varphi(0)$ pour tout t , le théorème de convergence dominée (avec $\frac{1}{1+t^2}$ intégrable) donne :

$$\langle T_{h_n}, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\pi(1+t^2)} = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

Donc $h_n \rightarrow \delta_0$.

CHAPITRE 3 — DÉRIVATION DES DISTRIBUTIONS

Exercice 1 — Dérivation de fonctions par morceaux

← Accéder à l'exercice, p. 19

Correction — Dérivation de fonctions par morceaux

Sauts. f est continue en 0 (les deux membres valent 0) et continue en 1 (les deux membres valent 1). Donc $[f]_0 = [f]_1 = 0$.

La dérivée classique par morceaux est $[f'](x) = 0$ si $x < 0$, $[f'](x) = 2x$ si $0 < x < 1$, $[f'](x) = -1$ si $x > 1$. Les sauts de f' : en 0, $[f']_0 = 2 \cdot 0 - 0 = 0$; en 1, $[f']_1 = -1 - 2 = -3$.

Donc par la formule des sauts :

$$f' = [f'] = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 2x & 0 < x < 1, \\ -1 & x > 1, \end{cases} \quad f'' = [f''] + [f']_1 \delta_1 = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 2 & 0 < x < 1, \\ 0 & x > 1, \end{cases} - 3 \delta_1.$$

On a $[f'']_0 = 2 - 0 = 2$, d'où

$$f'' = 2 \mathbf{1}_{[0,1]} - 3 \delta_1, \quad f''' = 2(\delta_0 - \delta_1) - 3 \delta'_1 = 2\delta_0 - 2\delta_1 - 3\delta'_1.$$

Exercice 2 — Action de $x \delta_0^{(n)}$

← Accéder à l'exercice, p. 20

Correction — Action de $x \delta_0^{(n)}$

$$\langle x^2 \delta_0'', \varphi \rangle = \langle \delta_0'', x^2 \varphi \rangle = (x^2 \varphi)''(0).$$

Or $(x^2 \varphi)'' = 2\varphi + 4x\varphi' + x^2 \varphi''$, donc $(x^2 \varphi)''|_{x=0} = 2\varphi(0)$. D'où $x^2 \delta_0'' = 2\delta_0$.

De même, $\langle x^3 \delta_0'', \varphi \rangle = (x^3 \varphi)''(0)$. Or $(x^3 \varphi)'' = 6x\varphi + 6x^2 \varphi' + x^3 \varphi''$, qui s'annule en 0. Donc $x^3 \delta_0'' = 0$.

Exercice 3 — Dérivée de $|x| \sin x$

← Accéder à l'exercice, p. 20

Correction — Dérivée de $|x| \sin x$

$|x| \sin x$ est continue donc ses dérivées jusqu'à l'ordre où elle reste C^k ne font pas apparaître de Dirac.

$$T' = |x|' \sin x + |x| \cos x = \operatorname{sgn}(x) \sin x + |x| \cos x.$$

Pour T'' , on dérive encore. $\operatorname{sgn}(x)$ a la dérivée $2\delta_0$:

$$T'' = 2\delta_0 \cdot \sin(0) + \operatorname{sgn}(x) \cos x + \operatorname{sgn}(x) \cos x - |x| \sin x = 2\operatorname{sgn}(x) \cos x - |x| \sin x.$$

(Le terme en δ_0 disparaît car $\sin(0) = 0$.)

Exercice 4 — Vérification par deux méthodes

← Accéder à l'exercice, p. 20

Correction — *Vérification par deux méthodes*

Méthode 1 (définition directe).

$$\langle (H \sin x)', \varphi \rangle = - \int_0^{+\infty} \sin(x) \varphi'(x) dx = \varphi(0) + \int_0^{+\infty} \cos(x) \varphi(x) dx$$

par IPP (le crochet vaut $[-\sin(x)\varphi(x)]_0^{+\infty} = 0$ et $\int_0^{\infty} \cos(x)\varphi(x) dx$). D'où $\varphi(0) + \langle H \cos x, \varphi \rangle$.

Méthode 2 (Leibniz). $(H \sin x)' = H' \sin x + H \cos x = \delta_0 \cdot \sin(0) + H \cos x = 0 + H \cos x$.

Attention : $\delta_0 \cdot \sin(x)$ vaut $\sin(0)\delta_0 = 0$. Les deux méthodes donnent le même résultat.

Exercice 5 — Dérivée du peigne de Dirac et série trigonométrique

← Accéder à l'exercice, p. 20

Correction — *Dérivée du peigne de Dirac et série trigonométrique*

La dérivation commute avec les séries convergentes dans $\mathcal{D}'$:

$$\Delta'_a = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_{na} \right)' = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_{na}.$$

On sait (cours, section 4.4.5) que $\sum_{k=1}^{+\infty} \cos(kx) = -\frac{1}{2} + \pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} \delta_{2m\pi}$. En dérivant membre à membre :

$$- \sum_{k=1}^{+\infty} k \sin(kx) = \pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} \delta'_{2m\pi},$$

$$\text{soit } \sum_{n=1}^{+\infty} n \sin(nx) = -\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta'_{2k\pi}.$$

CHAPITRE 4 — PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS

Exercice 1 — Primitives successives de δ_0

← Accéder à l'exercice, p. 26

Correction — *Primitives successives de δ_0*

- Ordre 1 : $T_1 = H(x)$. Vérification : $H' = \delta_0$, et $H(x) = 0$ pour $x < 0$. ✓
- Ordre 2 : $T_2 = xH(x)$. Vérification : $T_2' = H(x) + x\delta_0 = H(x)$, et $T_2'' = \delta_0$. Et $T_2(x) = 0$ pour $x < 0$. ✓
- Ordre 3 : $T_3 = \frac{x^2}{2}H(x)$. $T_3' = xH(x) + \frac{x^2}{2}\delta_0 = xH(x)$, $T_3'' = H(x)$, $T_3''' = \delta_0$. ✓

En général : $T_n = \frac{x^n}{n!}H(x)$ pour $n \geq 0$.

Exercice 2 — Résolution de $T' = H - 1$

← Accéder à l'exercice, p. 26

Correction — *Résolution de $T' = H - 1$*

On cherche une primitive particulière de $f(x) = H(x) - 1$. $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0, \\ 0 & x > 0. \end{cases}$

Une primitive (au sens classique, donc aussi distributionnel) est $F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} -x & x < 0, \\ 0 & x > 0. \end{cases} = -xH(-x)$.

On peut aussi écrire $F(x) = -x + xH(x) = x(H(x) - 1)$. Vérification : $F'(x) = H(x) - 1 + x\delta_0 = H(x) - 1$. ✓

Solution générale : $T = -xH(-x) + C$.

Exercice 3 — Équation de la chaleur et primitive en t

← Accéder à l'exercice, p. 27

Correction — Équation de la chaleur et primitive en t

Convergence vers δ_0 . Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, par le changement $u = x/(2\sqrt{t})$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} \varphi(2u\sqrt{t}) du \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(0)}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \varphi(0).$$

Convergence dominée justifiée car $|\varphi(2u\sqrt{t})| \leq \|\varphi\|_\infty$ et e^{-u^2} est intégrable.

Équation de la chaleur. Pour $t > 0$, Γ vérifie $\partial_t \Gamma = \partial_x^2 \Gamma$ (calcul classique). Donc

$$\partial_t E - \partial_x^2 E = \Gamma(x, 0^+) \delta_0(t) = \delta_0(x) \delta_0(t) = \delta_{(0,0)}.$$

(En utilisant la formule des sauts en $t = 0$ et la convergence $\Gamma(\cdot, t) \rightarrow \delta_0$.)

Exercice 4 — Primitives de la valeur principale

← Accéder à l'exercice, p. 27

Correction — Primitives de la valeur principale

$$\left\langle x \operatorname{vp} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \left\langle \operatorname{vp} \frac{1}{x}, x\varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|t| \geq \varepsilon} \frac{t\varphi(t)}{t} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|t| \geq \varepsilon} \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt = \langle 1, \varphi \rangle.$$

Donc $x \operatorname{vp} \frac{1}{x} = 1$. La primitive de 1 (fonction constante) est x (classiquement), ce qui se vérifie aisément dans $\mathcal{D}'$.

Exercice 5 — Structure des primitives du peigne de Dirac

← Accéder à l'exercice, p. 27

Correction — Structure des primitives du peigne de Dirac

Puisque $H(x - n)' = \delta_n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et que la dérivée commute avec les séries convergentes dans $\mathcal{D}'$, on a

$$\Sigma(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} H(x - n).$$

Pour $x \in [k, k+1)$ avec $k \in \mathbb{Z}$, la somme vaut $k+1$ (les termes $H(x-n)$ avec $n \leq k$ valent 1, les autres 0). Donc $\Sigma(x) = \lfloor x \rfloor + 1$ pour $x \geq 0$.

Vérification : $\lfloor x \rfloor' = \Delta_1$. ✓

CHAPITRE 5 — OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

Exercice 1 — Calcul de dérivées par la définition

← Accéder à l'exercice, p. 33

Correction — Calcul de dérivées par la définition

(a) Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T'_{\text{sgn}}, \varphi \rangle = -\langle T_{\text{sgn}}, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^0 (-\varphi') dx - \int_0^{+\infty} \varphi' dx = \varphi(0) + \varphi(0) = 2\varphi(0).$$

Donc $\text{sgn}'(x) = 2\delta_0$.

(b) Par intégration par parties :

$$\langle |x|', \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 (-\varphi) dx + \int_0^{+\infty} \varphi dx = \langle \text{sgn}(x), \varphi \rangle.$$

Donc $|x|' = \text{sgn}(x)$. Consistance : $\text{sgn}'(x) = 2\delta_0 = |x|''$. ✓

(c) Utilisons la formule des sauts. La fonction $e^x H(x)$ est continue par morceaux avec un saut en 0 :

$$(e^x H)^+ - (e^x H)^- = e^0 - 0 = 1.$$

Donc $(e^x H)' = e^x H + 1 \cdot \delta_0 = e^x H(x) + \delta_0$.

Exercice 2 — Équations algébriques dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

← Accéder à l'exercice, p. 33

Correction — Équations algébriques dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

(a) D'après la proposition fondamentale : $T = C\delta_0$, $C \in \mathbb{C}$.

(b) Comme $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$, l'équation s'écrit $x(T - \text{vp} \frac{1}{x}) = 0$. Donc $T = \text{vp} \frac{1}{x} + C\delta_0$.

(c) Posons $S = xT$. L'équation $x^2T = \delta_0$ devient $xS = \delta_0$. On sait que $x(-\delta'_0) = -x\delta'_0 = -(x\delta_0)' + \delta_0 = 0 + \delta_0 = \delta_0$ (utilisant $x\delta_0 = 0$ et la règle de Leibniz). Donc $S_0 = -\delta'_0$ est solution particulière, et $S = -\delta'_0 + c_1\delta_0$.

On résout ensuite $xT = S = -\delta'_0 + c_1\delta_0$. Par linéarité et les formules de (b) :

$$T = \frac{1}{2}\delta''_0 + c'_1(-\delta'_0) + c_0\delta_0 = \frac{1}{2}\delta''_0 + c_1\delta'_0 + c_0\delta_0, \quad c_0, c_1 \in \mathbb{C}.$$

Exercice 3 — Formule des sauts et dérivées successives

← Accéder à l'exercice, p. 33

Correction — Formule des sauts et dérivées successives

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ (car $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$), et de classe C^1 sur chaque intervalle $] -\infty, 0[,]0, \pi[$ et $]\pi, +\infty[$. Elle admet des discontinuités de sa dérivée classique en 0 et en π , mais pas de saut en valeur.

(a) Puisque f est continue (aucun saut), la formule des sauts donne :

$$f' = T_{f'_{\text{class}}} = \begin{cases} \cos(x) & x \in (0, \pi), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} = \cos(x) (H(x) - H(x - \pi)).$$

(b) La fonction $\cos(x)(H(x) - H(x - \pi))$ présente des sauts en $x = 0$ (saut $= 1 - 0 = 1$) et en $x = \pi$ (saut $= 0 - (-1) = 1$). Donc :

$$f'' = -\sin(x)(H(x) - H(x - \pi)) + 1 \cdot \delta_0 + 1 \cdot \delta_\pi.$$

Comme $-\sin(x)(H(x) - H(x - \pi)) = -f(x)$, on obtient $f'' = -f + \delta_0 + \delta_\pi$.

Exercice 4 — Produit et multiplication C^∞

← Accéder à l'exercice, p. 34

Correction — Produit et multiplication C^∞

(a) On a $x \text{vp}_x \frac{1}{x} = 1$, donc $x^2 \text{vp}_x \frac{1}{x} = x \cdot (x \text{vp}_x \frac{1}{x}) = x \cdot 1 = x$.

(b) Méthode directe : $(x^2 \text{vp}_x \frac{1}{x})' = x' = 1$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Méthode Leibniz : $(x^2 \text{vp}_{\frac{1}{x}})' = 2x \text{vp}_{\frac{1}{x}} + x^2 (\text{vp}_{\frac{1}{x}})'$. Or $(\ln |x|)' = \text{vp}_{\frac{1}{x}}$, et $(\text{vp}_{\frac{1}{x}})' = -\text{Pf}_{\frac{1}{x^2}}$. Donc :

$$(x^2 \text{vp}_{\frac{1}{x}})' = 2x \text{vp}_{\frac{1}{x}} - x^2 \text{Pf}_{\frac{1}{x^2}}.$$

On peut vérifier que $x^2 \text{Pf}_{\frac{1}{x^2}} = 2x \text{vp}_{\frac{1}{x}} - 1$ (par un calcul direct), ce qui redonne bien 1. ✓

Exercice 5 — Distribution à support réduit à un point

← Accéder à l'exercice, p. 34

Correction — Distribution à support réduit à un point

Écrivons $T = \sum_{k=0}^m a_k \delta_0^{(k)}$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle x^2 T, \varphi \rangle = \langle T, x^2 \varphi \rangle = \sum_{k=0}^m a_k (-1)^k (x^2 \varphi)^{(k)}(0).$$

Par la formule de Leibniz, $(x^2 \varphi)^{(k)}(0) = 0 \cdot \varphi^{(k)}(0) + 2k \varphi^{(k-1)}(0) + k(k-1) \varphi^{(k-2)}(0)$.

En particulier pour $k = 0$ et $k = 1$: $(x^2 \varphi)^{(0)}(0) = 0$, $(x^2 \varphi)^{(1)}(0) = 0$.

L'équation $x^2 T = 0$ implique $a_k = 0$ pour $k \geq 2$ (par test sur des φ appropriées). Pour $k = 0$ et $k = 1$, les termes correspondants sont nuls automatiquement. Donc $T = a_0 \delta_0 + a_1 \delta_0'$ avec a_0, a_1 quelconques.

CHAPITRE 6 — CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Exercice 1 — Convolution et dérivation

← Accéder à l'exercice, p. 40

Correction — Convolution et dérivation

(a) Par la propriété de dérivation et le fait que δ_0 est l'élément neutre :

$$\delta_0^{(n)} * H = (\delta_0 * H)^{(n)} = H^{(n)}.$$

Or $H' = \delta_0$, $H'' = \delta_0'$, ..., $H^{(n)} = \delta_0^{(n-1)}$. Donc $\delta_0^{(n)} * H = \delta_0^{(n-1)}$.

(b) Par récurrence. Pour $n = 1$: $H_1 = H$. Pour $n = 2$: $(H * H)(x) = xH(x) = \frac{x^1}{1!}H(x)$. Si le résultat est vrai au rang n , alors

$$H^{*(n+1)} = H^{*n} * H = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H * H.$$

On calcule : $\left(\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}H\right) * H = \int_0^x \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{x^n}{n!}H(x)$, ce qui achève la récurrence.

Exercice 2 — Convolution avec des translations de Dirac

← Accéder à l'exercice, p. 40

Correction — Convolution avec des translations de Dirac

Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle \delta_a * \delta_b, \varphi \rangle = \langle \delta_b, \varphi(a + \cdot) \rangle = \langle \delta_b, x \mapsto \varphi(a + x) \rangle = \varphi(a + b) = \langle \delta_{a+b}, \varphi \rangle.$$

Donc $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$.

Pour $\delta_a * f$: $(\delta_a * f)(x) = \langle \delta_a, f(x - \cdot) \rangle = f(x - a)$. Autrement dit, $\delta_a * f = \tau_a f$ est le translaté de f de quantité a .

Exercice 3 — Calcul explicite de produits de convolution

← Accéder à l'exercice, p. 40

Correction — Calcul explicite de produits de convolution

(a) Posons $f(x) = e^x H(x)$ et $g(x) = H(x)$. Pour $x > 0$:

$$(f * g)(x) = \int_0^x e^{x-y} \cdot 1 dy = e^x \int_0^x e^{-y} dy = e^x(1 - e^{-x}) = e^x - 1.$$

Pour $x < 0$, les supports ne se chevauchent pas, donc $(f * g)(x) = 0$. D'où $e^x H * H = (e^x - 1)H(x)$.

(b) Posons $g(x) = \cos(x)H(x)$. Pour $x > 0$:

$$(H * g)(x) = \int_0^x \cos(y) dy = \sin(x).$$

Pour $x < 0$, le résultat est 0. Donc $H * \cos(x)H(x) = \sin(x)H(x)$.

Exercice 4 — Convolution et la propriété de régularisation

← Accéder à l'exercice, p. 40

Correction — Convolution et la propriété de régularisation

(a) Par définition, $(T * \rho_\varepsilon)(x) = \langle T, \rho_\varepsilon(x - \cdot) \rangle$. Comme $x \mapsto \rho_\varepsilon(x - y)$ est C^∞ en x et à support compact en y uniformément en x , le théorème de dérivation sous le crochet donne $T * \rho_\varepsilon \in C^\infty$.

(b) Pour $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T * \rho_\varepsilon, \psi \rangle = \langle T, \check{\rho}_\varepsilon * \psi \rangle.$$

Comme $\check{\rho}_\varepsilon * \psi \rightarrow \psi$ dans $C_0^\infty(\mathbb{R})$ (classique), et T est continue sur C_0^∞ , on conclut $\langle T * \rho_\varepsilon, \psi \rangle \rightarrow \langle T, \psi \rangle$.

(c) Pour $f \in L_{\text{loc}}^1$, on applique (b) avec $T = T_f$. En fait $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L_{loc}^1 par un argument direct de convergence dominée (théorème d'approximation de l'identité).

Exercice 5 — Convolution et résolution de l'équation $T' - T = \delta_0$

← Accéder à l'exercice, p. 41

Correction — Convolution et résolution de l'équation $T' - T = \delta_0$

On cherche d'abord une solution élémentaire E vérifiant $E' - E = \delta_0$. Posons $E = f(x)H(x)$ avec f à déterminer. Par la formule des sauts :

$$(fH)' = f'H + f(0)\delta_0.$$

L'équation devient $f'H + f(0)\delta_0 - fH = \delta_0$, soit $f(0) = 1$ et $f' - f = 0$ sur $]0, +\infty[$. La solution est $f(x) = e^x$ (avec $f(0) = 1$). Donc $E(x) = e^x H(x)$.

La solution générale de l'équation homogène $T' - T = 0$ est $T = Ce^x$ ($C \in \mathbb{C}$).

La solution générale de $T' - T = \delta_0$ est donc :

$$T = e^x H(x) + Ce^x, \quad C \in \mathbb{C}.$$

CHAPITRE 7 — APPLICATIONS AUX ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

Exercice 1 — Calculer des solutions fondamentales

← Accéder à l'exercice, p. 45

Correction — Calculer des solutions fondamentales

1. E est C^1 par morceaux avec saut $[E(0)] = e^0 = 1$ en 0. Par la formule des sauts :

$$(e^{\lambda x} H)' = \lambda e^{\lambda x} H + [E(0)] \delta_0 = \lambda e^{\lambda x} H + \delta_0.$$

Donc $E' - \lambda E = \delta_0$. ✓

2. Par le théorème de résolution par convolution, $u = E * g$ est solution. Explicitement :

$$(E * g)(x) = \int_{-\infty}^x e^{\lambda(x-y)} g(y) dy.$$

C'est la formule de variation de la constante, retrouvée par la théorie des distributions.

3. $f(x) = |x|$ est continue (saut nul en 0), C^1 par morceaux avec $f'(x) = \operatorname{sgn}(x)$. La formule des sauts donne $(T_{|x|})' = T_{\operatorname{sgn}}$. Puis $g(x) = \operatorname{sgn}(x)$ a un saut $[g(0)] = 1 - (-1) = 2$ en 0, donc $(T_{\operatorname{sgn}})' = 0 + 2\delta_0$. Ainsi $(T_{|x|})'' = 2\delta_0$. ✓

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] H. Boumaza, T. Duyckaerts, E. Schenck, *Théorie des distributions*. Université Sorbonne Paris Nord, 2020. <https://www.math.univ-paris13.fr/~boumaza/cours/2023-2024-CoursDistribution.pdf>
- [2] P.-J. Hormière, *Analyse T4, TD n° 6 : Introduction aux distributions*. Octobre–novembre 2016. https://math.univ-lyon1.fr/~mironescu/resources/maths4_td_6_support.pdf
- [3] Maths – Cnam, *Transformée de Fourier des distributions*. <https://maths.cnam.fr/IMG/pdf/07-11-FourierDistribution.pdf>
- [4] L. Schwartz, *Théorie des distributions*. Hermann, Paris, 1950–1951 (2 volumes). Nouvelle édition : 1997.
- [5] J.-M. Bony, *Cours d'analyse : théorie des distributions et analyse de Fourier*. Éditions de l'École Polytechnique, Palaiseau, 2001.
- [6] C. Zuily, *Éléments de distributions et d'équations aux dérivées partielles*. Dunod, Paris, 2002.
- [7] F. G. Friedlander et M. S. Joshi, *Introduction to the Theory of Distributions*. Cambridge University Press, Cambridge, 2^e édition, 1998.
- [8] J. J. Duistermaat et J. A. C. Kolk, *Distributions : Theory and Applications*. Birkhäuser, Boston, 2010.
- [9] A. H. Zemanian, *Distribution Theory and Transform Analysis*. Dover Publications, New York, 1987 (réimpression de l'édition de 1965).
- [10] G. Grubb, *Distributions and Operators*. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 252, Springer, New York, 2009.