

Вывод ур-я относ. массового расхода горючего, отнесенного к массовому расходу на входе в I контур, через относ. массовый расход горючего, отнесенного к массовому расходу на входе в КС.

$$g_{\text{охл_КС3}} = \frac{G_{\text{охл}}}{G_{\text{КС3}}} = \frac{G_{\text{охл}}}{G_{\text{I}} - G_{\text{охл}} - G_{\text{ут}} + G_{\text{гор}}}$$

$$g_{\text{охл_КС3}} = \frac{G_{\text{охл}}}{G_{\text{I}} - G_{\text{охл}} - G_{\text{ут}} + G_{\text{гор}}} \text{ solve, } G_{\text{охл}} = \frac{g_{\text{охл_КС3}} \cdot (G_{\text{I}} - G_{\text{ут}} + G_{\text{гор}})}{g_{\text{охл_КС3}} + 1} \quad (\text{ТИХОНОВ})$$

$$g_{\text{гор_КС1}} = \frac{G_{\text{гор}}}{G_{\text{КС1}}} = \frac{G_{\text{гор}}}{G_{\text{I}} - G_{\text{охл}} - G_{\text{ут}}}$$

$$g_{\text{гор_КС1}} = \frac{G_{\text{гор}}}{G_{\text{I}} - G_{\text{охл}} - G_{\text{ут}}} \text{ solve, } G_{\text{гор}} = -g_{\text{гор_КС1}} \cdot (G_{\text{ут}} - G_{\text{I}} + G_{\text{охл}})$$

$$g_{\text{гор_КС1}} = \frac{G_{\text{гор}}}{G_{\text{I}} - G_{\text{охл}} - G_{\text{ут}}} \text{ substitute, } G_{\text{охл}} = \frac{g_{\text{охл_КС3}} \cdot (G_{\text{I}} - G_{\text{ут}} + G_{\text{гор}})}{g_{\text{охл_КС3}} + 1} = g_{\text{гор_КС1}} = -\frac{G_{\text{гор}} \cdot (g_{\text{охл_КС3}} + 1)}{G_{\text{ут}} - G_{\text{I}} + G_{\text{гор}} \cdot g_{\text{охл_КС3}}}$$

$$g_{\text{гор_КС1}} = -\frac{G_{\text{гор}} \cdot (g_{\text{охл_КС3}} + 1)}{G_{\text{ут}} - G_{\text{I}} + G_{\text{гор}} \cdot g_{\text{охл_КС3}}} \text{ solve, } G_{\text{гор}} = \frac{G_{\text{I}} \cdot g_{\text{гор_КС1}} - G_{\text{ут}} \cdot g_{\text{гор_КС1}}}{g_{\text{охл_КС3}} + g_{\text{гор_КС1}} \cdot g_{\text{охл_КС3}} + 1}$$

$$G_{\text{гор}} = \frac{G_{\text{I}} \cdot g_{\text{гор_КС1}} - G_{\text{ут}} \cdot g_{\text{гор_КС1}}}{g_{\text{охл_КС3}} + g_{\text{гор_КС1}} \cdot g_{\text{охл_КС3}} + 1} = G_{\text{I}} \cdot \frac{g_{\text{гор_КС1}} - g_{\text{ут}} \cdot g_{\text{гор_КС1}}}{g_{\text{охл_КС3}} + g_{\text{гор_КС1}} \cdot g_{\text{охл_КС3}} + 1}$$

$$g_{\text{гор}} = \frac{G_{\text{гор}}}{G_{\text{I}}} = \frac{G_{\text{I}} \cdot \frac{g_{\text{гор_КС1}} - g_{\text{ут}} \cdot g_{\text{гор_КС1}}}{g_{\text{охл_КС3}} + g_{\text{гор_КС1}} \cdot g_{\text{охл_КС3}} + 1}}{G_{\text{I}}} = \frac{g_{\text{гор_КС1}} - g_{\text{ут}} \cdot g_{\text{гор_КС1}}}{g_{\text{охл_КС3}} + g_{\text{гор_КС1}} \cdot g_{\text{охл_КС3}} + 1}$$

Вывод ур-я Тихонова относ. массового расхода на охлаждение, отнесенного к массовому расходу на входе в I контур, через относ. массовый расход на охлаждение, онесенного к массовому расходу на выходе из КС.

$$g_{\text{охл}} = \frac{G_{\text{охл}}}{G_{\text{I}}} = \frac{\frac{g_{\text{охл_КС3}} \cdot (G_{\text{I}} - G_{\text{ут}} + G_{\text{гор}})}{g_{\text{охл_КС3}} + 1}}{G_{\text{I}}} = \frac{G_{\text{I}} \cdot \frac{g_{\text{охл_КС3}} \cdot (1 - g_{\text{ут}} + g_{\text{гор}})}{g_{\text{охл_КС3}} + 1}}{G_{\text{I}}} = \frac{g_{\text{охл_КС3}} \cdot (1 - g_{\text{ут}} + g_{\text{гор}})}{g_{\text{охл_КС3}} + 1}$$

Вывод термодинамических парамтеров смешения

Ур-е теплового баланса:

$Q + Q_{\text{add}} = Q_{\text{CM}}$

или

$G \cdot C_p \cdot T + G_{\text{add}} \cdot C_{p\text{add}} \cdot T_{\text{add}} = G_{\text{CM}} \cdot C_{p\text{CM}} \cdot T_{\text{CM}} = (G + G_{\text{add}}) \cdot C_{p\text{CM}} \cdot T_{\text{CM}} \Rightarrow$

Температура CM [K]:

$G \cdot C_p \cdot T + G_{\text{add}} \cdot C_{p\text{add}} \cdot T_{\text{add}} = (G + G_{\text{add}}) \cdot C_{p\text{CM}} \cdot T_{\text{CM}} \text{ solve, } T_{\text{CM}} = \frac{C_p \cdot G \cdot T + C_{p\text{add}} \cdot G_{\text{add}} \cdot T_{\text{add}}}{C_{p\text{CM}} \cdot (G + G_{\text{add}})}$

$T_{\text{CM}} = \frac{C_p \cdot g \cdot T + C_{p\text{add}} \cdot g_{\text{add}} \cdot T_{\text{add}}}{C_{p\text{CM}} \cdot (g + g_{\text{add}})}$

Давление CM [Па] как среднемассовое:

$$P_{\text{CM}} = \frac{G \cdot P + G_{\text{add}} \cdot P_{\text{add}}}{G + G_{\text{add}}} = \frac{g \cdot P + g_{\text{add}} \cdot P_{\text{add}}}{g + g_{\text{add}}}$$

Коэф. избытка окислителя CM []:

$$\alpha_{\text{CM}} = \frac{G_{\text{ок}\Sigma}}{G_{\text{гор}\Sigma}} = \frac{G_{\text{ок}} + G_{\text{add}}}{G_{\text{гор}} \cdot l_0(\text{Fuel})} = \frac{g_{\text{ок}} + g_{\text{add}}}{g_{\text{гор}} \cdot l_0(\text{Fuel})}$$

$$L_e = \frac{L_B}{\eta_{PB} \cdot \eta_{Mex}} + \frac{c_{CI}^2 - v^2}{2} + \frac{c_{CII}^2 - v^2}{2} \text{ solve, } L_B \rightarrow \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex} \cdot \left(v^2 - \frac{c_{CI}^2}{2} - \frac{c_{CII}^2}{2} + L_e \right)$$

$$L_{\text{ТЯГ}}(v, c_{CI}, c_{CII}, L_e, \eta_{Mex}, \eta_{PB}, \eta_B, L_B) = L_B \cdot \eta_B + (c_{CI} - v) \cdot v + (c_{CII} - v) \text{ substitute, } L_B = \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex} \cdot \left(v^2 - \frac{c_{CI}^2}{2} - \frac{c_{CII}^2}{2} + L_e \right) = c_{CII} - v - v^2 + v \cdot c_{CI} + v^2 \cdot \eta_B \cdot \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex} - \frac{c_{CI}^2 \cdot \eta_B \cdot \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex}}{2} - \frac{\eta_B \cdot c_{CII}^2 \cdot \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex}}{2} + L_e \cdot \eta_B \cdot \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex}$$

$$\frac{d}{dc_{CI}} L_{\text{ТЯГ}}(v, c_{CI}, c_{CII}, L_e, \eta_{Mex}, \eta_{PB}, \eta_B, L_B) \rightarrow v - c_{CI} \cdot \eta_B \cdot \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex}$$

$$\frac{d}{dc_{CI}} L_{\text{ТЯГ}}(v, c_{CI}, c_{CII}, L_e, \eta_{Mex}, \eta_{PB}, \eta_B, L_B) = 0 \text{ solve, } c_{CI} = \frac{v}{\eta_B \cdot \eta_{PB} \cdot \eta_{Mex}}$$

$$L_e(v, c_{CI}, c_{CII}, m2, L_{BлII}) = m2 \cdot L_{BлII} + \frac{c_{CI}(L_{BлII})^2 - v^2}{2}$$

$$\frac{d}{dL_{BлII}} L_e(v, c_{CI}, c_{CII}, m2, L_{BлII}) = m2 + c_{CI}(L_{BлII}) \cdot \frac{d}{dL_{BлII}} c_{CI}(L_{BлII}) \text{ solve, } \frac{d}{dL_{BлII}} c_{CI}(L_{BлII}) = -\frac{m2}{c_{CI}(L_{BлII})}$$

Баланс энергии II контура:

$$L_{BлII} \cdot \eta_{II} = \frac{c_{CII}(v, \eta_{II}, L_{BлII})^2 - v^2}{2} \text{ solve, } c_{CII}(v, \eta_{II}, L_{BлII}) = \left(\frac{\sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}}}{-\sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}}} \right)$$

$$c_{CII}(v, \eta_{II}, L_{BлII}) = \sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}}$$

$$\frac{d}{dL_{BлII}} c_{CII}(v, \eta_{II}, L_{BлII}) = \frac{\eta_{II}}{\sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}}}$$

Удельная тяга двигателя:

$$R_{yd}(v, c_{CI}, c_{CII}, m2, L_{BлII}, \eta_{II}) = \frac{R_{yдI} + m2 \cdot R_{yдII}}{1 + m2} \left| \begin{array}{l} \text{substitute, } R_{yдI} = c_{CI}(L_{BлII}, m2) - v \\ \text{substitute, } R_{yдII} = c_{CII}(v, \eta_{II}, L_{BлII}) - v \end{array} \right. = -\frac{v - m2 \cdot c_{CII}(v, \eta_{II}, L_{BлII}) + v \cdot m2 - c_{CI}(L_{BлII}, m2)}{m2 + 1}$$

Условие получения max тяги:

$$\frac{d}{dL_{BлII}} R_{yd}(v, c_{CI}, c_{CII}, m2, L_{BлII}, \eta_{II}) = 0$$

$$\frac{d}{dL_{BлII}} R_{yd}(v, c_{CI}, c_{CII}, m2, L_{BлII}, \eta_{II}) = \frac{\frac{d}{dL_{BлII}} c_{CI}(L_{BлII}, m2) + \frac{m2 \cdot \eta_{II}}{\sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}}}}{m2 + 1} \left| \begin{array}{l} \text{substitute, } \frac{d}{dL_{BлII}} c_{CI}(L_{BлII}, m2) = -\frac{m2}{c_{CI}(L_{BлII}, m2)} \\ \text{substitute, } \frac{d}{dL_{BлII}} c_{CII}(v, \eta_{II}, L_{BлII}) = \frac{\eta_{II}}{c_{CII}(L_{BлII})} \end{array} \right. = -\frac{m2 \cdot \left(\sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}} - \eta_{II} \cdot c_{CI}(L_{BлII}, m2) \right)}{\sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}} \cdot (m2 + 1) \cdot c_{CI}(L_{BлII}, m2)} \text{ solve, } c_{CI}(L_{BлII}, m2) = \frac{\sqrt{v^2 + 2 \cdot \eta_{II} \cdot L_{BлII}}}{\eta_{II}}$$

Вывод общего ур-я профилирования Л цилиндрической и конической ступени К

Дано:

(0)

$$\frac{d}{dr}H_T = \frac{d}{dr}\left(\frac{c_a^2}{2}\right) + c_u \cdot \left(\frac{d}{dr}c_u\right) + \frac{c_u^2}{r} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dr}\left(\frac{c_a^2}{2}\right) = -c_u \cdot \left(\frac{d}{dr}c_u\right) - \frac{c_u^2}{r}$$

(00)

Домножим на 2 \Rightarrow

$$\frac{d}{dr}\left(c_a^2\right) = -2 \cdot c_u \cdot \left(\frac{d}{dr}c_u\right) - \frac{2 \cdot c_u^2}{r}$$

(000)

(1)

$$\frac{c_{1u} + c_{2u}}{2} \cdot r^m = \text{const}$$

(2)

$$H_T = \left(c_{2u} \cdot u_2 - c_{1u} \cdot u_1\right) = \left(c_{2u} - c_{1u}\right)u$$

$$u = \omega \cdot r$$

$$u_1 = \omega \cdot r_1$$
$$u_2 = \omega \cdot r_2$$

$$\omega = \text{const}$$
$$\frac{u_1}{r_1} = \frac{u_2}{r_2}$$

$$R = 1 - \frac{c_{1u} + c_{2u}}{u_1 + u_2} = 1 - \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2 \cdot u}$$

$$R = 1 - \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2 \cdot u} - \frac{c_{a2}^2 - c_{a1}^2}{2 \cdot H_T}$$
без допущений

Вывод:

$$c_{1u} = (1 - R) \cdot \omega \cdot r - \frac{H_T}{2 \cdot \omega \cdot r}$$

(c1u)

(2)(3) \Rightarrow

$$c_{2u} = (1 - R) \cdot \omega \cdot r + \frac{H_T}{2 \cdot \omega \cdot r}$$

(c2u)

(3) \Rightarrow

$$\frac{c_{1u} + c_{2u}}{2} = (1 - R) \cdot \omega \cdot r$$

(1):

$$\text{const} = \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2} \cdot r^m = (3) = [(1 - R) \omega \cdot r] \cdot r^m = (1 - R) \omega \cdot r^{m+1} = \left(1 - R_{cp}\right) \omega \cdot r_{cp}^{m+1}$$

$$\Rightarrow (1 - R) \omega = \frac{\left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]}{r^{m+1}}$$

(&)

(&)->(c1u)

$$c_{1u} = (1 - R) \cdot \omega \cdot r - \frac{H_T}{2 \cdot \omega \cdot r} = \frac{\left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]}{r^{m+1}} \cdot r - \frac{H_T}{2 \cdot \omega \cdot r} = \frac{\left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]}{r^m} - \left(\frac{H_T}{2 \cdot \omega}\right)$$

(AB1)

$$A = \left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]$$

$$c_{1u}(r, m, A, B) = \frac{(A)}{r^m} - \frac{(B)}{r}$$

(&)->(c2u)

$$c_{2u} = (1 - R) \cdot \omega \cdot r + \frac{H_T}{2 \cdot \omega \cdot r} = \frac{\left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]}{r^{m+1}} \cdot r + \frac{H_T}{2 \cdot \omega \cdot r} = \frac{\left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]}{r^m} + \left(\frac{H_T}{2 \cdot \omega}\right)$$

(AB2)

$$B = \left(\frac{H_T}{2 \cdot \omega}\right)$$

$$c_{2u}(r, m, A, B) = \frac{(A)}{r^m} + \frac{(B)}{r}$$
Для цилиндрической ступени

$$c_{2u} = \frac{H_T + c_{1u} \cdot u_1}{u_2} = \frac{H_T + c_{1u} \cdot r_1}{r_2}$$

Для конической ступни ступени (см. (3))

(000)

$$\int_{r_{cp}}^r \frac{d}{dr}\left(c_a^2\right) dr = c_a^2 - c_{a.cp}^2 = \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_u \cdot \left(\frac{d}{dr}c_u\right) - \frac{2 \cdot c_u^2}{r} dr$$

$$\Rightarrow c_{a1}^2 - c_{a1.cp}^2 = \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{u1} \cdot \left(\frac{d}{dr}c_{u1}\right) - \frac{2 \cdot c_{u1}^2}{r} dr$$

$$c_{a2}^2 - c_{a2.cp}^2 = \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{u2} \cdot \left(\frac{d}{dr}c_{u2}\right) - \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} dr$$

$$\Rightarrow c_{a1} = \sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{u1} \cdot \left(\frac{d}{dr}c_{u1}\right) - \frac{2 \cdot c_{u1}^2}{r} dr}$$

$$c_{a2} = \sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{u2} \cdot \left(\frac{d}{dr}c_{u2}\right) - \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} dr}$$

(0000)

$$\sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2\,c_{1u}(r,m,A,B)\cdot\left(\frac{d}{dr}c_{1u}(r,m,A,B)\right) - \frac{2\,c_{1u}(r,m,A,B)^2}{r}\,dr \left| \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = -1 \\ \text{substitute, } m = -1 \end{array} \right.} = \sqrt{c_{a1.cp}^2 - 2\cdot A^2\cdot r^2 + 2\cdot A^2\cdot r_{cp}^2 + 4\cdot A\cdot B\cdot \ln(r) - 4\cdot A\cdot B\cdot \ln(r_{cp})}$$

$$\sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2\,c_{2u}(r,m,A,B)\cdot\left(\frac{d}{dr}c_{2u}(r,m,A,B)\right) - \frac{2\,c_{2u}(r,m,A,B)^2}{r}\,dr \left| \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = -1 \\ \text{substitute, } m = -1 \end{array} \right.} = \sqrt{c_{a2.cp}^2 - 2\cdot A^2\cdot r^2 + 2\cdot A^2\cdot r_{cp}^2 - 4\cdot A\cdot B\cdot \ln(r) + 4\cdot A\cdot B\cdot \ln(r_{cp})}$$

$$\sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2\,c_{1u}(r,m,A,B)\cdot\left(\frac{d}{dr}c_{1u}(r,m,A,B)\right) - \frac{2\,c_{1u}(r,m,A,B)^2}{r}\,dr \text{ assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = 0} = \sqrt{2\cdot A^2\cdot \ln(r_{cp}) - 2\cdot A^2\cdot \ln(r) + c_{a1.cp}^2 - \frac{2\cdot A\cdot B}{r} + \frac{2\cdot A\cdot B}{r_{cp}}}$$

$$\sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2\,c_{2u}(r,m,A,B)\cdot\left(\frac{d}{dr}c_{2u}(r,m,A,B)\right) - \frac{2\,c_{2u}(r,m,A,B)^2}{r}\,dr \text{ assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = 0} = \sqrt{2\cdot A^2\cdot \ln(r_{cp}) - 2\cdot A^2\cdot \ln(r) + c_{a2.cp}^2 + \frac{2\cdot A\cdot B}{r} - \frac{2\cdot A\cdot B}{r_{cp}}}$$

$$\sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2\,c_{1u}(r,m,A,B)\cdot\left(\frac{d}{dr}c_{1u}(r,m,A,B)\right) - \frac{2\,c_{1u}(r,m,A,B)^2}{r}\,dr \text{ assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, -1 < m \leq 1, m \neq 0} = \sqrt{c_{a1.cp}^2 + \frac{A\cdot (m-1)\cdot \left(A\cdot r\,r^{2\cdot m}\cdot r_{cp} - A\cdot r\,r_{cp}\cdot r_{cp}^{2\cdot m} - 2\cdot B\cdot m\cdot r\,r^{2\cdot m}\cdot r_{cp}^m + 2\cdot B\cdot m\cdot r^m\cdot r_{cp}\cdot r_{cp}^{2\cdot m} + A\cdot m\cdot r\,r^{2\cdot m}\cdot r_{cp} - A\cdot m\cdot r\,r_{cp}\cdot r_{cp}^{2\cdot m}\right)}{m\cdot (m+1)\cdot \left(r\,r_{cp}\right)^{2\cdot m+1}}}$$

$$\sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2\,c_{2u}(r,m,A,B)\cdot\left(\frac{d}{dr}c_{2u}(r,m,A,B)\right) - \frac{2\,c_{2u}(r,m,A,B)^2}{r}\,dr \text{ assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, -1 < m \leq 1, m \neq 0} = \sqrt{c_{a2.cp}^2 + \frac{A\cdot (m-1)\cdot \left(A\cdot r\,r^{2\cdot m}\cdot r_{cp} - A\cdot r\,r_{cp}\cdot r_{cp}^{2\cdot m} + 2\cdot B\cdot m\cdot r\,r^{2\cdot m}\cdot r_{cp}^m - 2\cdot B\cdot m\cdot r^m\cdot r_{cp}\cdot r_{cp}^{2\cdot m} + A\cdot m\cdot r\,r^{2\cdot m}\cdot r_{cp} - A\cdot m\cdot r\,r_{cp}\cdot r_{cp}^{2\cdot m}\right)}{m\cdot (m+1)\cdot \left(r\,r_{cp}\right)^{2\cdot m+1}}}$$

Вывод общего ур-я профилирования Л цилиндрической и конической ступени Т

(1)

$$\frac{c_{1u} + c_{2u}}{2} \cdot r^m = \text{const}$$

$$\text{const} = \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2} \cdot r^m = (3) = (1 - R) \omega \cdot r \cdot r^m = (1 - R) \omega \cdot r^{m+1} = \left(1 - R_{cp}\right) \omega \cdot r_{cp}^{m+1}$$

$$\Rightarrow \quad (1 - R) \omega \cdot r = \frac{\left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]}{r^m}$$

$$A = \left[\left(1 - R_{cp}\right) \cdot \omega \cdot r_{cp}^{m+1}\right]$$

(2)

$$L_u = c_{2u} \cdot u_2 + c_{1u} \cdot u_1 = \left(c_{2u} + c_{1u}\right) u$$

$$u = \omega \cdot r$$

$$L_u = c_{2u} \cdot \omega \cdot r_2 + c_{1u} \cdot \omega \cdot r_1 = \left(c_{2u} + c_{1u}\right) \omega \cdot r$$

$$c_{1u} = c_{2u} + \frac{L_u}{\omega \cdot r}$$

$$c_{2u} = c_{1u} + \frac{L_u}{\omega \cdot r}$$

$$c_{1u} = (1 - R) \cdot \omega \cdot r + \frac{L_u}{2 \cdot \omega \cdot r} = (1 - R) \cdot \omega \cdot r + \frac{\left(\frac{L_u}{2 \cdot \omega}\right)}{r}$$

$$c_{2u} = -(1 - R) \cdot \omega \cdot r + \frac{L_u}{2 \cdot \omega \cdot r} = -(1 - R) \cdot \omega \cdot r + \frac{\left(\frac{L_u}{2 \cdot \omega}\right)}{r}$$

$$B = \left(\frac{L_u}{2 \cdot \omega}\right)$$

(3)

$$R = 1 - \frac{c_{1u} - c_{2u}}{2 \cdot u}$$

$$u = \omega \cdot r$$

$$R = 1 - \frac{c_{1u} - c_{2u}}{2 \cdot \omega \cdot r}$$

$$c_{1u} = (1 - R) \cdot 2 \cdot \omega \cdot r - c_{2u}$$

$$c_{2u} = -(1 - R) \cdot 2 \cdot \omega \cdot r - c_{1u}$$

$$c_{1u}(r, m, A, B) = \frac{(A)}{r^m} + \frac{(B)}{r}$$

$$c_{2u}(r, m, A, B) = -\frac{A}{r^m} + \frac{(B)}{r}$$

Работа сил трения:

$$L_{тр} = \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1\right) \cdot \frac{c_1^2}{2} = \frac{c_1^2}{2 \cdot \varphi^2} - \frac{c_1^2}{2}$$

Работа гидравлических сил сопротивления:

$$L_{гид} = \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1\right) \cdot \frac{c_1^2}{2} + \left(\frac{1}{\psi^2} - 1\right) \cdot \frac{w_2^2}{2} = \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1\right) \cdot \frac{c_{a1}^2 + c_{u1}^2}{2} + \left(\frac{1}{\psi^2} - 1\right) \cdot \frac{\left(c_{2u} + u_2\right)^2 + c_{2a}^2}{2}$$

Ур-е радиадьного равновесия:

$$\frac{1}{\rho} \cdot \frac{d}{dr} P = \frac{c_u^2}{r}$$

Ур-е Бернулли:

$$\frac{1}{\rho} \cdot dP + d\left(\frac{c_1^2}{2}\right) + d\left(L_{тр}\right) = d\left(H_T\right)$$

$$\frac{1}{\rho} \cdot dP + d\left(\frac{c_2^2}{2}\right) + d\left(L_{гид}\right) + d\left(L_{ст}\right) = d\left(H_T\right)$$

$$0 = \frac{c_1^2}{2} + \int_0^1 \frac{1}{\rho} dP + L_{тр}$$

$$0 = \frac{c_2^2}{2} + \int_0^2 \frac{1}{\rho} dP + L_{гид} + L_{ст}$$

Допущения:

$$H_T(r) = \text{const}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{dr} H_T(r) = 0$$

$$\varphi(r) = \text{const}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{dr} \varphi(r) = 0$$

$$\psi(r) = \text{const}$$

$$\frac{d}{dr} \psi(r) = 0$$

$$0 = \frac{c_1^2}{2} + \int_0^1 \frac{1}{\rho} dP + L_{Tp} = \frac{c_1^2}{2} + \int_0^1 \frac{1}{\rho} dP + \frac{c_1^2}{2 \cdot \varphi^2} - \frac{c_1^2}{2} = \frac{c_1^2}{2 \cdot \varphi^2} + \int_0^1 \frac{1}{\rho} dP = \frac{c_{a1}^2 + c_{u1}^2}{2 \cdot \varphi^2} + \int_0^1 \frac{1}{\rho} dP = \frac{1}{\varphi^2} \cdot \left(\frac{c_{a1}^2}{2} + \frac{c_{u1}^2}{2} \right) + \int_0^1 \frac{1}{\rho} dP$$

$$0 = \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{\varphi^2} \cdot \left(\frac{c_{a1}^2}{2} + \frac{c_{u1}^2}{2} \right) + \int_0^1 \frac{1}{\rho} dP \right] = \frac{1}{\varphi^2} \cdot \left(c_{a1} \cdot \frac{d}{dr} c_{a1} + c_{u1} \cdot \frac{d}{dr} c_{u1} \right) + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{d}{dr} P = \frac{1}{\varphi^2} \cdot \left(c_{a1} \cdot \frac{d}{dr} c_{a1} + c_{u1} \cdot \frac{d}{dr} c_{u1} \right) + \frac{c_{u1}^2}{r}$$

$$\frac{1}{\varphi^2} \cdot \left(c_{a1} \cdot \frac{d}{dr} c_{a1} + c_{u1} \cdot \frac{d}{dr} c_{u1} \right) + \frac{c_{u1}^2}{r} = 0 \qquad \frac{d}{dr} \left(\frac{c_{a1}^2}{2} \right) = -c_{u1} \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{u1} \right) - \varphi^2 \cdot \frac{c_{u1}^2}{r} \qquad \frac{d}{dr} c_{a1}^2 = -2 \cdot c_{u1} \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{u1} \right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{u1}^2}{r}$$

$$\int_{r_{cp}}^r \frac{d}{dr} c_{a1}^2 dr = c_{a1}^2 - c_{a1.cp}^2 = \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{u1} \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{u1} \right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{u1}^2}{r} dr \qquad c_{a1} = \sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{u1} \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{u1} \right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{u1}^2}{r} dr} \tag{c.a1}$$

$$0 = \frac{d}{dr} c_{a2}^2 + \frac{d}{dr} c_{u2}^2 + \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1 \right) \cdot \psi^2 \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{a1}^2 + \frac{d}{dr} c_{u1}^2 \right) + \psi^2 \cdot \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} + \left(1 - \psi^2 \right) \cdot \frac{d}{dr} \left(2 \cdot c_{u2} \cdot u + u^2 \right) \qquad \frac{d}{dr} c_{a2}^2 = \frac{d}{dr} c_{u2}^2 - \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1 \right) \cdot \psi^2 \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{a1}^2 + \frac{d}{dr} c_{u1}^2 \right) - \psi^2 \cdot \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} - \left(1 - \psi^2 \right) \cdot \frac{d}{dr} \left[2 \cdot c_{u2} \cdot \omega \cdot r + (\omega \cdot r)^2 \right]$$

$$\int_{r_{cp}}^r \frac{d}{dr} c_{a2}^2 dr = c_{a2}^2 - c_{a2.cp}^2 = \int_{r_{cp}}^r -\frac{d}{dr} c_{u2}^2 - \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1 \right) \cdot \psi^2 \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{a1}^2 + \frac{d}{dr} c_{u1}^2 \right) - \psi^2 \cdot \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} - \left(1 - \psi^2 \right) \cdot \frac{d}{dr} \left[2 \cdot c_{u2} \cdot \omega \cdot r + (\omega \cdot r)^2 \right] dr = \int_{r_{cp}}^r -\frac{d}{dr} c_{u2}^2 - \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1 \right) \cdot \psi^2 \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{a1}^2 + \frac{d}{dr} c_{u1}^2 \right) - \psi^2 \cdot \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} - \left(1 - \psi^2 \right) \cdot \frac{d}{dr} \left[2 \cdot c_{u2} \cdot \omega \cdot r + (\omega \cdot r)^2 \right] dr$$
$$c_{a2} = \sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -\frac{d}{dr} c_{u2}^2 - \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1 \right) \cdot \psi^2 \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{a1}^2 + \frac{d}{dr} c_{u1}^2 \right) - \psi^2 \cdot \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} - \left(1 - \psi^2 \right) \cdot \frac{d}{dr} \left[2 \cdot c_{u2} \cdot \omega \cdot r + (\omega \cdot r)^2 \right] dr} = \sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -\frac{d}{dr} c_{u2}^2 - \left(\frac{1}{\varphi^2} - 1 \right) \cdot \psi^2 \cdot \left[\frac{d}{dr} \left[c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{u1} \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{u1} \right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{u1}^2}{r} dr \right] + \frac{d}{dr} c_{u1}^2 \right] - \psi^2 \cdot \frac{2 \cdot c_{u2}^2}{r} - \left(1 - \psi^2 \right) \cdot \frac{d}{dr} \left[2 \cdot c_{u2} \cdot \omega \cdot r + (\omega \cdot r)^2 \right] dr} \tag{c.a2}$$

$\sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \cdot c_{1u}(r,m,A,B) \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{1u}(r,m,A,B)\right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{1u}(r,m,A,B)^2}{r} \, dr}$	$\left \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = -1 \\ \text{substitute, } m = -1 \\ \text{simplify} \end{array} \right.$	$= \frac{\sqrt{B^2 \cdot r^2 - B^2 \cdot r_{cp}^2 - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 + B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^2 + A^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^4 - A^2 \cdot r^4 \cdot r_{cp}^2 + r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a1.cp}^2 + A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^4 - A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^4 \cdot r_{cp}^2 - 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r) + 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r_{cp})}}{r \cdot r_{cp}}$
$\sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \, c_{2u}(r,m,A,B) \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{2u}(r,m,A,B)\right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{2u}(r,m,A,B)^2}{r} \, dr}$	$\left \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = -1 \\ \text{substitute, } m = -1 \\ \text{simplify} \end{array} \right.$	$= \frac{\sqrt{B^2 \cdot r^2 - B^2 \cdot r_{cp}^2 - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 + B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^2 + A^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^4 - A^2 \cdot r^4 \cdot r_{cp}^2 + r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a2.cp}^2 + A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^4 - A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^4 \cdot r_{cp}^2 + 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r) - 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r_{cp})}}{r \cdot r_{cp}}$

$\sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \, c_{1u}(r,m,A,B) \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{1u}(r,m,A,B)\right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{1u}(r,m,A,B)^2}{r} \, dr}$	$\left \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = 0 \\ \text{simplify} \end{array} \right.$	$= \frac{\sqrt{B^2 \cdot r^2 - B^2 \cdot r_{cp}^2 - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 + B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^2 + r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a1.cp}^2 - 2 \cdot A \cdot B \cdot r \cdot r_{cp}^2 + 2 \cdot A \cdot B \cdot r^2 \cdot r_{cp} + 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r \cdot r_{cp}^2 - 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp} - 2 \cdot A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r) + 2 \cdot A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r_{cp})}}{r \cdot r_{cp}}$
$\sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \, c_{2u}(r,m,A,B) \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{2u}(r,m,A,B)\right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{2u}(r,m,A,B)^2}{r} \, dr}$	$\left \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, m = 0 \\ \text{simplify} \end{array} \right.$	$= \frac{\sqrt{B^2 \cdot r^2 - B^2 \cdot r_{cp}^2 - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 + B^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^2 + r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a2.cp}^2 + 2 \cdot A \cdot B \cdot r \cdot r_{cp}^2 - 2 \cdot A \cdot B \cdot r^2 \cdot r_{cp} - 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r \cdot r_{cp}^2 + 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp} - 2 \cdot A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r) + 2 \cdot A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \ln(r_{cp})}}{r \cdot r_{cp}}$

$\sqrt{c_{a1.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \, c_{1u}(r,m,A,B) \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{1u}(r,m,A,B)\right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{1u}(r,m,A,B)^2}{r} \, dr}$	$\left \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, -1 < m \leq 1, m \neq 0 \\ \text{simplify} \end{array} \right.$	$= \frac{\sqrt{B^2 \cdot m + B^2 \cdot m^2 + m \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a1.cp}^2 + A^2 \cdot m \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m^2 + m^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a1.cp}^2 - A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} + A^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m + 2 \cdot A \cdot B \cdot m \cdot r_{cp}^{1-m} - A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m}}}{r \cdot r_{cp}}$
$\sqrt{c_{a2.cp}^2 + \int_{r_{cp}}^r -2 \, c_{2u}(r,m,A,B) \cdot \left(\frac{d}{dr} c_{2u}(r,m,A,B)\right) - 2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{c_{2u}(r,m,A,B)^2}{r} \, dr}$	$\left \begin{array}{l} \text{assume, } r_{cp} > 0, r \geq 0, -1 < m \leq 1, m \neq 0 \\ \text{simplify} \end{array} \right.$	$= \frac{\sqrt{B^2 \cdot m + B^2 \cdot m^2 + m \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a2.cp}^2 + A^2 \cdot m \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m^2 + m^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot c_{a2.cp}^2 - A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} + A^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} - B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m - 2 \cdot A \cdot B \cdot m \cdot r_{cp}^{1-m} - A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m}}}{r \cdot r_{cp}}$

$\frac{1}{r_{cp}})$
 $\frac{1}{r_{cp}})$

$n \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} + A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m - A^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m - \frac{B^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2}{r^2} + 2 \cdot A \cdot B \cdot m^2 \cdot r_{cp}^{1-m} - A^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m - \frac{B^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^2} - \frac{2 \cdot A \cdot B \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^{m+1}} + \frac{B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2}{r^2} - \frac{2 \cdot A \cdot B \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2}{r^{m+1}} + A^2 \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m + \frac{B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^2} - 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^{1-m} + \frac{4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^{m+1}}$
$m \cdot (m + 1)$
r_{cp}

$n \cdot r_{cp}^{2-2 \cdot m} + A^2 \cdot \varphi^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m - A^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m - \frac{B^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2}{r^2} - 2 \cdot A \cdot B \cdot m^2 \cdot r_{cp}^{1-m} - A^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m - \frac{B^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^2} + \frac{2 \cdot A \cdot B \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^{m+1}} + \frac{B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2}{r^2} + \frac{2 \cdot A \cdot B \cdot m^2 \cdot r_{cp}^2}{r^{m+1}} + A^2 \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2 \cdot \left(\frac{1}{r^2}\right)^m + \frac{B^2 \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^2} + 4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^{1-m} - \frac{4 \cdot A \cdot B \cdot \varphi^2 \cdot m \cdot r_{cp}^2}{r^{m+1}}$
$m \cdot (m + 1)$
r_{cp}