

Найти функцию  $u = u(x_1, x_2) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , которая удовлетворяет уравнениям:

$$\Delta u + k_1^2 u = 0, x_2 \geq -h_1, \quad (1)$$

$$\Delta u + k_2^2 u = 0, x_2 < -h_1 \quad (2)$$

и граничным условиям:  $A$  на верхней границе,  $B$  между слоями и  $C$  на нижней границе, где

$$A_1 : u(x_1, 0) = q(x_1) = e^{i\alpha x_0}$$

$$A_2 : \frac{\partial u(x_1, 0)}{\partial x_2} = q(x_1) = e^{i\alpha x_0}$$

$$B_1 : u(x_1, -h_1 + 0) = u(x_1, -h_1 - 0), \mu_1 \frac{\partial u(x_1, -h_1 + 0)}{\partial x_2} = \mu_2 \frac{\partial u(x_1, -h_1 - 0)}{\partial x_2}$$

$$B_2 : \frac{\partial u(x_1, -h_1 + 0)}{\partial x_2} = \frac{\partial u(x_1, -h_1 - 0)}{\partial x_2} = 0$$

$$B_3 : \mu_1 \frac{\partial u(x_1, -h_1 + 0)}{\partial x_2} = \mu_2 \frac{\partial u(x_1, -h_1 - 0)}{\partial x_2} = \kappa (u(x_1, -h_1 - 0) - u(x_1, -h_1 + 0))$$

$$B_4 : u(x_1, -h_1 + 0) - u(x_1, -h_1 - 0) = 0, u(x_1, -h_1) = \nu \left( \mu_1 \frac{\partial u(x_1, -h_1 + 0)}{\partial x_2} - \mu_2 \frac{\partial u(x_1, -h_1 - 0)}{\partial x_2} \right)$$

$$C_1 : u(x_1, -h_2) = 0$$

$$C_2 : \frac{\partial u(x_1, -h_2)}{\partial x_2} = 0$$

Ещё есть соотношения  $k_i = \frac{\omega}{c_i}, c_i = \sqrt{\frac{\rho}{\mu_i}}$ , их надо просто в программе зафиксировать, чтобы менять параметры и смотреть что получится, не надо их при самом решении раскрывать.

В итоге надо показать ему основные выкладки + сделать программу на любом языке, чтобы можно было быстро менять разные параметры типа  $h_1, h_2$  и получать решение в виде графиков. Как я понял, надо на графиках показать, что граничные условия выполняются и сделать график самой функции  $u$  на какой-нибудь полосе  $x_{\min} \leq x_1 \leq x_{\max}, 0 \geq x_2 \geq -h_1 - h_2$ .

Также контур, по которому ведётся интегрирование, проходит через точки  $K_0 = (0, 0), K_1 = (\frac{\min(k_1, k_2)}{4}, 0), K_2 = (\frac{\min(k_1, k_2)}{4}, -\delta i), K_3 = (\max(k_1, k_2) + 1, -\delta i), K_4 = (\max(k_1, k_2) + 1, 0), K_5 = (G, 0)$  в комплексной плоскости, где  $\delta$  – маленькое число от 0.01 до 0.1 (надо на месте подбирать),  $G$  – достаточно большое число (до 10000), чтобы приблизить несобственный интеграл.