

Programmazione lineare intera

Ricerca Operativa

Giovanni Righini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Ottimizzazione nel discreto

Esistono diverse classi di problemi di ottimizzazione con **variabili discrete**:

- IP: integer programming
- BP: binary programming
- MIP: mixed-integer programming
- CO: combinatorial optimization

Considereremo solo modelli lineari: **Integer Linear Programming (ILP)**.

Per ottimizzare nel discreto possiamo:

- selezionare “buone” *formulazioni lineari* e migliorarle fino a poterle risolvere un problema di PLI come problema di PL;
- *scomporre* il problema in sotto-problemi più piccoli e più facili;
- eseguire una *enumerazione implicita* delle soluzioni.

Ottimalità

Dato un problema di ottimizzazione discreta P

$$z^* = \max\{z(x) : x \in X \subseteq \mathcal{Z}^n\}$$

l'ottimalità si dimostra calcolando un *upper bound* \bar{z} e un *lower bound* \underline{z} , tali che

$$\underline{z} \leq z^* \leq \bar{z}.$$

- Se P è un problema di minimizzazione, \bar{z} è un bound priale e \underline{z} è un bound duale.
- Se P è un problema di massimizzazione, \underline{z} è un bound primale e \bar{z} è un bound duale.

La differenza $\bar{z} - \underline{z}$ è detta **gap di ottimalità**.

Quando $\bar{z} - \underline{z} = 0$ si ha la *garanzia di ottimalità*.

Bounds primali

Un **bound primale** \bar{z} è dato dal valore della funzione obiettivo $z(x)$ in una qualsiasi soluzione ammissibile $\bar{x} \in X$.

$$\bar{z} = z(\bar{x}), \quad \bar{x} \in X.$$

Bounds primali possono essere calcolati in vari modi:

- con algoritmi euristici o meta-euristici (ricerca locale, GRASP,...);
- con algoritmi di approssimazione con garanzia: in tal caso si ha anche un bound duale.

Per alcuni problemi di ottimizzazione discreta è difficile anche trovare una soluzione ammissibile (cioè calcolare un bound primale).

Bounds duali

Un **bound duale** è dato dal valore della funzione obiettivo $z(x)$ in corrispondenza di una soluzione super-ottima \bar{x} . Quindi in generale \bar{x} non è ammissibile.

Ci sono due tecniche principali per calcolare un bound duale per un problema P :

- risolvere all'ottimo un **rilassamento** R di P ;
- trovare una soluzione ammissibile al **duale** D di P .

Rilassamenti

Dato un problema

$$P = \min\{z_P(x) : x \in X(P)\}$$

un problema

$$R = \min\{z_R(x) : x \in X(R)\}$$

è un **rilassamento** di P se valgono le seguenti due condizioni:

- $X(P) \subseteq X(R)$
- $z_R(x) \leq z_P(x) \quad \forall x \in X(P)$.

[In caso di massimizzazione, le disequazioni vanno invertite.]

Corollario: $z_R^* \leq z_P^*$.

Ci sono molti tipi diversi di rilassamento.

Un rilassamento è tanto migliore quando più il suo valore ottimo z_R^* è vicino a z_P^* .

Rilassamento lineare continuo

Quando P è un problema di ottimizzazione discreta

$$P) \min\{z(x) : x \in X, x \in \mathcal{Z}_+^n\},$$

il suo *rilassamento continuo* C è ottenuto da P trascurando le condizioni di integralità:

$$C) \min\{z(x) : x \in X, x \in \mathbb{R}_+^n\}.$$

Quando P è un problema di ottimizzazione *lineare* discreta

$$P) \min\{cx : Ax \leq b, x \in \mathcal{Z}_+^n\},$$

il suo rilassamento continuo LP

$$LP) \min\{cx : Ax \leq b, x \in \mathbb{R}_+^n\}$$

è un problema di programmazione lineare (che sappiamo come risolvere molto efficacemente).

Se $x_{LP}^* \in \mathcal{Z}_+^n$, allora $x_P^* = x_{LP}^*$.

Rilassamenti combinatori

Il rilassamento combinatorio C di un problema di ottimizzazione combinatoria P è ancora un problema di ottimizzazione combinatoria, ma tipicamente molto più facile da risolvere.

Esempio 1:

- P : il TSP asimmetrico;
- C : il problema di matching bipartito di costo minimo.

Esempio 2:

- P : il TSP simmetrico;
- C : il problema dell'1-albero ricoprente di costo minimo.

Rilassamento Lagrangeano

Il rilassamento Lagrangeano LR di un problema di ottimizzazione (lineare discreto) P si ottiene rimuovendo alcuni vincoli e aggiungendo all'obiettivo termini di penalità per la loro violazione.

$$P) \min\{z(x) : Ax \leq b, x \in X \subseteq \mathcal{Z}_+^n\}$$

$$LR) \min\{z_{LR}(x, \lambda) = z(x) + \lambda(Ax - b) : x \in X \subseteq \mathcal{Z}_+^n\}$$

con $\lambda \geq 0$.

metto + perchè sto minimizzando. La penalità è lambda

Esso soddisfa entrambe le condizioni per essere un rilassamento:

- Vincoli: $\{x : Ax \leq b, x \in X\} \subseteq \{x : x \in X\}$
- Obiettivo:
 - $Ax - b \leq 0$ per tutte le soluzioni ammissibili per P ;
 - $\lambda(Ax - b) \leq 0$ per tutte le soluzioni ammissibili per P ;
 - $z_{LR}(x, \lambda) = z(x) + \lambda(Ax - b) \leq z(x)$ per tutte le soluzioni ammissibili per P .

Rilassamento surrogato

Il rilassamento surrogato S di un problema di ottimizzazione (lineare discreto) P si ottiene sostituendo un insieme di vincoli con una loro combinazione convessa.

$$P) \quad \min\{z(x) : Ax \leq b, x \in X \subseteq \mathcal{Z}_+^n\}$$

$$S) \quad \min\{z(x) : \lambda^T Ax \leq \lambda^T b, x \in X \subseteq \mathcal{Z}_+^n\}$$

con $\lambda \geq 0$.

Esso soddisfa le due condizioni per essere un rilassamento:

- Vincoli: $Ax \leq b$ implica $\lambda^T Ax \leq \lambda^T b$ (ma non viceversa).
- Obiettivo: banale, perché non cambia.

Rilassamenti e bounds

I rilassamenti lineare, Lagrangeano e surrogato possono fornire in generale bounds diversi.

In caso di minimizzazione valgono le seguenti relazioni:

$$z_{LP}^* \leq z_{LR}^* \leq z_S^* \leq z^*.$$

Con z_{LR}^* e z_S^* qui si indicano i migliori bounds ottenibili dal rilassamento Lagrangeano e surrogato, scegliendo cioè nel modo migliore i moltiplicatori λ .

Dualità

La seconda tecnica per ottenere un bound duale consiste nel calcolare una soluzione ammissibile per il problema duale di P o per il duale di un suo rilassamento.

Problema lineare duale:

Tolgo la condizione di integralità

$$P)z^* = \min\{cx : Ax \geq b, x \in \mathbb{Z}_+^n\}$$

$$D)w^* = \max\{yb : yA \leq c, y \in \mathbb{R}_+^m\}$$

formano una coppia primale-duale debole.

Non ci possono essere due edge con un vertice in comune

Problema duale combinatorio:


Il problema del massimo matching e il problem del *minimum vertex cover*

$$P)z^* = \max\{1x : Ax \leq 1, x \in \mathcal{B}_+^{|E|}\}$$


$$D)w^* = \min\{1y : yA \geq 1, y \in \mathcal{B}_+^{|V|}\}$$

dove A è la matrice di incidenza di un grafo $G = (V, E)$, formano una coppia primale-duale debole.

Esempio



$$z^* = 4 \quad w^* = 4$$



$$z^* = 1$$

$$z_{LP}^* = z\left(\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]\right) = \frac{3}{2}$$


$$w_{LP}^* = w\left(\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]\right) = \frac{3}{2}$$

$$w^* = 2$$

Il minimo vertex cover, così come il massimo matching richiede 4 vertici, bastano quelli per coprire tutti i vertici del grafo. Non sempre sono uguali, infatti a dx il matching è 1 mentre il minimo vertex cover è 2.

Formulazioni lineari

I problemi di ottimizzazione (lineare) discreti *non* hanno una formulazione unica.



Formulazioni

Dal momento che non sono uniche, ha senso


- *confrontare* formulazioni,
- *migliorare* formulazioni.

Una formulazione migliore si traduce in un algoritmo più efficiente.

La **formulazione ideale** di un **problema di programmazione lineare discreta** è quella che consente di risolverlo come se fosse un problema di **programmazione lineare nel continuo**.

Formulazione ideale

La formulazione di un problema di programmazione lineare corrisponde ad un *poliedro*.



I vincoli della **formulazione ideale** corrispondono al *guscio convesso* delle soluzioni intere.

Guscio convesso (*convex hull*)

Dato un insieme discreto

$$X = \{x_1, \dots, x_t\} \text{ with } x_i \in \mathbb{R}^n \forall i = 1, \dots, t,$$

il suo *guscio convesso* è il poliedro

$$\text{conv}(X) = \{x \in \mathbb{R}^n : x = \sum_{i=1}^t \lambda_i x_i, \sum_{i=1}^t \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \forall i = 1, \dots, t\}.$$

è la combinazione
convessa dei punti estremi.
Lamda è un coefficiente
non negativo.

E' un *poliedro* i cui punti estremi sono elementi dell'insieme discreto X .

Data una formulazione P e l'insieme discreto X delle sue soluzioni ammissibili, vale la relazione

$$X \subseteq \text{conv}(X) \subseteq P.$$

Polyhedral combinatorics

In generale

- non conosciamo la formulazione ideale dei problemi di ottimizzazione lineare intera;
- il numero dei vincoli del guscio convesso può crescere esponenzialmente con la dimensione dell'istanza.

Conosciamo la formulazione ideale solo per alcuni particolari problemi di ottimizzazione discreta: il problema del cammino minimo su grafo, il problema del matching bipartito di costo minimo, il problema dell'albero ricoprente di costo minimo,...

La disciplina che studia come selezionare e migliorare le formulazioni lineari dei problemi di PLI è la *polyhedral combinatorics*.

Scelta della formulazione: esempio

In molti problemi di ottimizzazione discreta con vincoli di capacità (Bin Packing Problem, Facility Location Problem,...), ci sono vincoli di questa forma:

\mathcal{N} è l'insieme di oggetti mentre

\mathcal{M} è un insieme di contenitori

$x_{ij}=1$ significa che ho messo i dentro j

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} x_{ij} \leq |\mathcal{N}| y_j \quad \forall j \in \mathcal{M},$$

capacità del contenitore
 N vale 1 se y si usa, 0 altrimenti

che esprime una condizione logica che lega le variabili x e y :

$$\begin{cases} \exists (i, j) \in \mathcal{N} \times \mathcal{M} : x_{ij} > 0 & \Rightarrow y_j = 1 \\ \exists j \in \mathcal{M} : y_j = 0 & \Rightarrow x_{ij} = 0 \quad \forall i \in \mathcal{N}. \end{cases}$$

se ij vale 1 significa per forza che
ho messo un oggetto in j

La stessa condizione può essere espressa con

$$x_{ij} \leq y_j \quad \forall i \in \mathcal{N}, \forall j \in \mathcal{M}. \quad (2)$$

La formulazione (1) richiede $|\mathcal{M}|$ vincoli.

La formulazione (2) richiede $|\mathcal{M}| |\mathcal{N}|$ vincoli.

detti vincoli di capacità

Queste due formulazioni non sono equivalenti per quanto riguarda il rilassamento continuo, infatti definiscono poliedri diversi. Per il solutore è meglio la seconda, ma come facciamo a capire quale è meglio?

Scelta della formulazione: esempio

Sommando tra loro i vincoli (2) per ogni $i \in \mathcal{N}$ si ottiene

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} x_{ij} \leq \sum_{i \in \mathcal{N}} y_j \quad \forall j \in \mathcal{M}$$

tutti i lambda sono uguali a 1

cioè proprio i vincoli (1): $\sum_{i \in \mathcal{N}} x_{ij} \leq |\mathcal{N}| y_j \quad \forall j \in \mathcal{M}$.

Quindi ogni vincolo (1) è un vincolo *surrogato* di alcuni vincoli (2).

I vincoli (2) implicano i vincoli (1) ma non viceversa.

Ci sono soluzioni che soddisfano (1) ma violano (2):

$$\begin{cases} x_{ij} = 1 & \forall j \in \mathcal{M}, \forall i \in \mathcal{N} : i \in [k(j-1) + 1, \dots, kj] \\ y_j = 1/|\mathcal{M}| & \forall j \in \mathcal{M} \end{cases}$$

dove $k = |\mathcal{N}|/|\mathcal{M}|$.

I vincoli (2) generano una **migliore formulazione** rispetto ai vincoli (1).

Il poliedro con i vincoli (2) contiene il poliedro con i vincoli (1).

Algoritmi “cutting planes”

Dato un problema di PLI

$$P^{(k)} = \max\{cx : Ax \leq b, x \in \mathcal{Z}_+^n\}$$

consideriamo il suo rilassamento continuo

$$L^{(k)} = \max\{cx : Ax \leq b, x \in \mathbb{R}_+^n\}$$

(Cutting planes)

e la sua soluzione ottima $x^{*(k)}$. Quindi, generiamo un insieme di *disuguaglianze valide* $Qx \leq q$ tali che.


- $Qx \leq q \quad \forall x \in \mathcal{Z}_+^n : Ax \leq b$
- $Qx^{*(k)} > q$ (rendere inammissibile il punto frazionario)

e otteniamo così una formulazione più stretta

$$P^{(k+1)} = \max\{cx : Ax \leq b, Qx \leq q, x \in \mathcal{Z}_+^n\}.$$

Si ottiene così un nuovo poliedro con una formulazione più stretta dato che ha dei vincoli in più

Disuguaglianze valide: esempio



Perchè sto tagliando ma non sto ottimizzando dall'altra parte, l'ottimizzazione rimane comunque il pallino rosso.

La disequazione (1) è valida ma inutile: non "taglia" x^* .

La disequazione (2) non è valida: "taglia" alcune soluzioni ammissibili intere.

La disequazione (3) è valida e utile.

La disequazione (4) è anche *facet defining*.

Procedura di Chvátal-Gomory

Consideriamo un problema di PLI con insieme ammissibile

$$X = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$$

condizione di integralità + vincoli lineari

dove A ha m righe e n colonne.

Scegliamo un vettore $u \in \mathbb{R}_+^m$:

- $\sum_{j=1}^n ua_j x_j \leq ub$ è valida perché $ax \leq b$ e $u \geq 0$. (sto moltiplicando a sx i vincoli)
- $\sum_{j=1}^n \lfloor ua_j \rfloor x_j \leq ub$ è valida perché $x \geq 0$. (arrotondo per difetto i coeff del primo membro)
- $\sum_{j=1}^n \lfloor ua_j \rfloor x_j \leq \lfloor ub \rfloor$ è valida perché x è intero. (arrotondo per difetto anche il termine noto)

Ogni disuguaglianza valida può essere generata con questa procedura in un numero finito di passi.

L'efficacia della procedura dipende dalla scelta di u .

Algoritmi “cutting planes”

Gli algoritmi “cutting planes” iterativamente risolvono il rilassamento continuo L di un problema discreto P e rafforzano la sua formulazione generando ulteriori vincoli (*cutting planes*), in modo tale che la soluzione ottima del rilassamento continuo all’iterazione k diventi inammissibile all’iterazione $k + 1$.

- Pro:
 - se i piani di taglio sono generati in modo efficace, l’algoritmo può garantire di trovare la soluzione ottima discreta senza fare ricorso ad altre tecniche (ad es. enumerazione implicita);
 - una formulazione più stretta, anche se non ideale, può fornire *bounds duali* più efficaci in un algoritmo branch-and-bound.
- Contro:
 - è necessaria una procedura apposita per generare iterativamente disuguaglianze valide e utili: è chiamata *algoritmo di separazione*. Se il problema originale è difficile (*NP-hard*), anche il problema di separazione lo è.

Algoritmi “cutting planes”: pseudo-codice

Begin

$t:=0$; $P^{(0)}:=P$; [P è il rilassamento continuo]

repeat

$z^{*(t)}:=\max\{cx : x \in P^{(t)}\}$

$x^{*(t)}:=\operatorname{argmax}\{cx : x \in P^{(t)}\}$

if $x^{*(t)} \notin \mathcal{Z}^n$ **then**

Genera una disuguaglianza valida $\pi x \leq \pi_0 : \pi x^{*(t)} > \pi_0$

$P^{(t+1)}:=P^{(t)} \cap \{x : \pi x \leq \pi_0\}$

$t := t + 1$

end if

until $(x^{*(t)} \in \mathcal{Z}^n) \vee$ (no inequalities found)

End

t = indice iterazione

se la disuguaglianza non è intera procedo iterativamente.

Si esce dal ciclo quando trovo l'ottimo nel discreto oppure non si riesce a trovare una disuguaglianza valida.

Algoritmi “cutting planes”

Dopo ogni iterazione $z^{*(t)}$ è un bound duale valido.

Può capitare che non venga trovata nessuna disuguaglianza valida se l'algoritmo di separazione è ristretto a cercarla all'interno di specifici sottinsiemi di disuguaglianze con una struttura particolare, che non bastano per descrivere completamente il guscio convesso del problema di PLI.

Tagli di Gomory

Data una soluzione frazionaria x^* del rilassamento continuo di un problema di PLI, si utilizza la procedura di Chvátal-Gomory sul vincolo associato ad una variabile frazionaria: si ottiene così una disuguaglianza valida violata da x^* .

Dato un problema di PLI

obiettivo: vincoli, variabili, condizioni di integralità

$$P) \max\{cx : ax = b, x \geq 0, x \in \mathbb{Z}^n\}$$

ed il suo rilassamento continuo

$$LP) \max\{cx : ax = b, x \geq 0\}$$

siano x^* e z^* la soluzione ottima di LP e il suo valore.

$$z^* = \bar{a}_{00} + \sum_{j \in N^*} \bar{a}_{0j} x_j^*$$

a segntato indica (riga, colonna) del tableau

$$\begin{cases} x_{B^* i}^* + \sum_{j \in N^*} \bar{a}_{ij} x_j^* = \bar{a}_{i0} & \forall i = 1, \dots, m \\ x^* \geq 0 \end{cases} \quad (3)$$

dove B^* e N^* sono gli indici delle variabili in base e fuori base in x^* .

Tagli di Gomory

Se x^* non è intero, esiste almeno un vincolo \hat{i} tale che \bar{a}_{i0} non è intero.

Eseguendo la procedura di Chvátal-Gomory su di esso si ottiene:

$$x_{B^*\hat{i}} + \sum_{j \in N^*} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x_j \leq \lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor.$$

Sottraendo questa disuguaglianza dal vincolo di uguaglianza

$$x_{B^*\hat{i}} + \sum_{j \in N^*} \bar{a}_{ij} x_j^* = \bar{a}_{i0}$$

si ottiene il **taglio di Gomory**:

$$\sum_{j \in N^*} f_{ij} x_j \geq f_{i0}$$

dove $f_{ij} = \bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor$ e $f_{i0} = \bar{a}_{i0} - \lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor$.

Anche la variabile di slack/surplus associata a questa disuguaglianza è intera.

Un esempio


$$\begin{aligned}\text{maximize } z &= 4x_1 - x_2 \\ 7x_1 - 2x_2 &\leq 14 \\ x_2 &\leq 3 \\ 2x_1 - 2x_2 &\leq 3 \\ x &\geq 0 \text{ (integer)}\end{aligned}$$

Risolvendo il rilassamento continuo, si ottiene $B^* = \{1, 2, 5\}$,

$N^* = \{3, 4\}$:

$$\begin{aligned}z &= \frac{59}{7} - \frac{4}{7}x_3 - \frac{1}{7}x_4 \\ x_1 &+ \frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4 = \frac{20}{7} \\ x_2 &+ x_4 = 3 \\ -\frac{2}{7}x_3 + \frac{10}{7}x_4 + x_5 &= \frac{23}{7} \\ x &\geq 0\end{aligned}$$

Un esempio



Un esempio

$$\begin{aligned} z &= \frac{59}{7} - \frac{4}{7}x_3 - \frac{1}{7}x_4 \\ x_1 + \frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4 &= \frac{20}{7} \\ x_2 + x_4 &= 3 \\ -\frac{2}{7}x_3 + \frac{10}{7}x_4 + x_5 &= \frac{23}{7} \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Dal primo vincolo si genera un taglio di Gomory:

$$x_1^* = \frac{20}{7} \Rightarrow \frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4 \geq \frac{6}{7}.$$

La sua variabile ausiliaria è

$$s_1 = -\frac{6}{7} + \frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4.$$

Un esempio

Dai vincoli

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4 &= \frac{20}{7} \\ x_2 + x_4 &= 3\end{aligned}$$

si ottiene

$$\begin{aligned}x_3 &= -7x_1 + 2x_2 + 14 \\ x_4 &= -x_2 + 3\end{aligned}$$


e l'equazione del taglio di Gomory

$$\frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4 \geq \frac{6}{7}$$

si può riscrivere come

$$x_1 \leq 2.$$

Un esempio




Un esempio

Ri-ottimizzando si ottiene:

$$\begin{aligned} z &= \frac{15}{2} - \frac{1}{2}x_5 - 3s_1 \\ x_1 \quad \quad \quad &+ s_1 = 2 \\ x_2 \quad \quad -\frac{1}{2}x_5 + s_1 &= \frac{1}{2} \\ x_3 \quad \quad -x_5 - 5s_1 &= 1 \\ x_4 + \frac{1}{2}x_5 - s_1 &= \frac{5}{2} \\ x, s &\geq 0 \end{aligned}$$

Un esempio



Un esempio

$$\begin{aligned} z &= \frac{15}{2} - \frac{1}{2}x_5 - 3s_1 \\ x_1 \quad \quad \quad + s_1 &= 2 \\ x_2 \quad \quad - \frac{1}{2}x_5 + s_1 &= \frac{1}{2} \\ x_3 \quad \quad - x_5 - 5s_1 &= 1 \\ x_4 + \frac{1}{2}x_5 - s_1 &= \frac{5}{2} \\ x, s &\geq 0 \end{aligned}$$


Dal secondo vincolo si può generare un taglio di Gomory:

$$x_2^* = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}x_5 \geq \frac{1}{2} \Rightarrow x_1 - x_2 \leq 1.$$

La sua variabile ausiliaria è

$$s_2 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_5.$$

Un esempio



Un esempio

Ri-ottimizzando ancora, si ottiene:

$$\begin{array}{rcll} z = 7 & -3s_1 - s_2 & & \\ x_1 & +s_1 & & = 2 \\ x_2 & +s_1 - s_2 & & = 1 \\ x_3 & -5s_1 - 2s_2 & & = 2 \\ x_4 & -s_1 + s_2 & & = 2 \\ x_5 & & -2s_2 & = 1 \end{array}$$

$$x, s \geq 0$$

Ora la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera e quindi è anche la soluzione ottima discreta.

Un esempio

