

PARAMEDIKŲ RP GIDAS



Turinys

Žmogaus apžiūra ir gydymas.....	2
Žmogaus be sąmonės gydymas ir prikėlimas	4
Atviro lūžio operacija	7
Kulkos pašalinimas	9

Žmogaus apžiūra ir gydymas

Tikslas: apžiūrėti žmogaus sužeidimus ir juos išgydyti


Tipinė situacija: *jūs budite ligoninėje, pas jus ateina žmogus ir prašo gydymo.*

Jūsų veiksmai:


Paprašote, kad pilietis nusiimtu drabužius ir kaukę (*jei užsidėjęs*). Kai pilietis nusirengė, vedate pelę ant žmogaus, kad atsirastų baltas rutuliukas:



Kai atsiranda rutuliukas, spaudžiate „E“ klavišą. Paspaudus atsiranda kelios lentelės ir pasirenkate „Apžiūrėti“



Paspaudus „Apžiūrėti“ atsidaro toks meniu:



Šiuo atveju pas žmogų matome pažeistą krutinę ir dešinę ranką. Apskaičiuokime kainą:

P.S šiuo būdu antrą kartą to pačio žmogaus sužeidimus yra draudžiama apžiūrėti, todėl naudojame komandą „/diagnozuoti“

Kiekvieno sužeidimo kaina:

100\$ (pagal pavyzdį sužeidimai kainuotų 200\$)

Jei žmogus turi kraujo/HP mažiau negu 75%, kaina:
300\$

Jei žmogus turi kraujo/HP daugiau negu 75%, kaina:
100\$ (pagal pavyzdį šis variantas tinka)

Jei žmogui trūksta labai nedaug HP (~1-10%), paklauskite ar jam reikės kraujo

Kai apskaičiuavome gydymo kainą, paklausiam ar pilietis sutinka su tokia kaina. Jei sutiko, pasakykite jam savo „Batų Dydį“ / „Paypalą“ (tai yra jūsų in-game ID), kad pervestų pinigus.

Jei gavote pinigus, galite pradėti gydymą:

Kaklo įtvaras - gydo galvos sužalojimus

Kūno bintas - gydo krūtinės sužalojimus

Kojos įtvaras - gydo vienos kojos sužalojimus

Rankos įtvaras - gydo vienos rankos sužalojimus

Rašome komandą „/gydyti“ ir pagal sužeidimus pradedame gydymą:


Šiuo atveju naudosisime **1 rankos įtvarą** ir **1 kūno bintą**

Parašius „/gydyti“, atsiras gydymo meniu:



Atsiradus gydymo **menu**, pasirenkame atitinkamą pagal sužalojimą įtvarą, ir spaudžiame **ENTER**.

Pradėjus gydymą atsiras gydymo juosta:




Kai atsirado gydymo juosta, **svarbu** parašyti jūsų veiksmus per **/me** komandą pagal atitinkamą sužalojimą.

Pavyzdžiui, jeigu naudojome **kojos įtvarą**, paprasčiausias būdas būtų prašyti „/me subintuoju koją“, jeigu gydome ranką, tai rašome „/me subintuoju ranką“ arba „/me uždedu rankos įtvarą“ ir t.t. *Kaip jūs gydysite priklausau nuo jūsų fantazijos, svarbiausia, kad jūsų gydymas per daug neatitoltų nuo realybės...*

Gyvybių atstatymas:

Gyvybes patariama atstatinėti gydymo pabaigoje, išgydžius visus sužalojimus. Kad atstatyti gyvybes prieiname prie žmogaus, spaudžiame „F6“ ir „Enter“. Paspaudus atsiras greitosios meniu:



Šiuo atveju mums prireiks tik dviejų pasirinkimų:

„Pagydyti mažas žaizdas“ ir „Pagydyti rimtas žaizdas“

„Pagydyti mažas žaizdas“ atstato **25HP (100\$)**

„Pagydyti rimtas žaizdas“ atstato **100HP (300\$)**

Paspaudus ant atitinkamo pasirinkimo, būtinai per **/me** komandą parašome mūsų veiksmus. Paprasčiausias būdas būtų: „/me sulašinu kraujo“, *priklausau nuo jūsų fantazijos*

Pabaigus gydymą, būtinai paklauskite žmogaus, ar jis gerai jaučiasi, galite pasiūlyti nusipirkti medikamentų...

Gydymo metu nepamirškite naudoti /me ir /do komandų!

Žmogaus be sąmonės gydymas ir prikėlimas

Tikslas: patikrinti pulsą, išgydyti žmogaus sužalojimus, ir jį prikelti

Tipinė situacija: *prie jūsų guli žmogus be sąmonės*

Jūsų veiksmai:

Pritupiate prie žmogaus ir tikrinate pulsą

**kaip atsitūpti rasite skyriaus pabaigoje*

/me tikrinu pulsą

/do ar randu pulsą?

Jei pulso nėra, bandykite atlikti širdies masažą

/me atlieku širdies masažą

/do ar atsiranda pulsas?

Jei pulsas vistiek neatsiranda, galite suleisti adrenalino į veną (nepatartinta naudoti, nes šis vaistas kenkia širdžiai)

/me dezinfekuojų veną, ir suleidžiu adrenalino

/do ar atsiranda pulsas?

Jei net po adrenalino pulsas neatsiranda, konstatuojame žmogui mirtį

/me konstatuoju mirtį ir iškviečiu morgo darbuotojus

Konstatavę mirtį, vežate kūną prie bažnyčios

Jei vis dėl to pas žmogų yra pulsas, tikrinate žmogaus sužalojimus

/me nuimu drabužius ir apžiūriu kūną

/do kokius sužeidimus matau?

Dažniausi atsakymai: nubrozdinimai, sumušimai, lūžis, šautinė žaizda...

Paprasčiausi gydymų pavyzdžiai:

Nubrozdinimus užtenka paprasčiausiai dezinfekuoti

/me dezinfekuojų nubrozdinimus

/do ar padeda?

Sumušimus galima patepti tepalu ar uždėti ledo

/me gydomuoju tepalu patepu sumušimus

/do ar padeda?

/me uždedu ledo ant sumušimų

/do ar padeda?

Lūžis. Jei per /do žmogus atsakė, kad pvz; *rankos lūžis*, per /do paklauskite ar lūžis atviras, ar vidinis. Jei lūžis atviras, skaitykite skyrių apie *atviro lūžio operaciją*. Jei lūžis vidinis, viską atlikite vietoje:

/me dezinfekuojau veną ir suleidžiu nuskausminamųjų

/do ar suveikia?

/me atsargiai bandau atstatyti (-) kaulą į vietą

/do ar pavyksta?

/me uždedu langetę ant (-)

Šautinė žaizda. Per /do paklauskite ar kulka liko viduje. Jei kulka liko viduje, skaitykite skyrių apie *kulkos pašalinimą*. Jei kulka perėjo kiaurai, viską galite atlikti vietoje:

/me dezinfekuojau veną ir suleidžiu nuskausminamųjų

/do ar suveikia?

/me nuvalau kraują nuo šautinės žaizdos

/me dezinfekuojau šautinę žaizdą

/me įveriu siūlą į adatą ir siūnu šautinę žaizdą


/do ar pavyksta? Ar tvirtai laikosi?

Išgydę visus sužalojimus, galite pradėti žmogaus prikėlimą:

/me duodu įkvėpti amoniako

/do ar bunda?


Jei per /do atsakė, kad bunda, spauskite **“F6”** klavišą, ir pasirinkite **“Prikelti Žaidėją”**




Kai žmogus atsistojo ant kojų, būtinai paklauskite ar jis gerai jaučiasi, ar reikėtų dar papildomos apžiūros.

Kaip atsitūpti?:

Nueikite į GTA nustatymus, tuomet į keybindings skiltį ir pasirinkite "FiveM"



Atsidarę "FiveM" skiltį pamatysite kelis pasirinkimus:



*Ir nusistatykite jums patogiausią klavišą
pritupimui (dažniausiai naudojamas „Z“ klavišas)*

*Gydant nepamirškite naudoti "/me", "/do" komandas,
naudokites logika ir nebijokite fantazuoti :)*

Atviro lūžio operacija

Operacijos tikslas: atstatyti lūžusį kaulą į vietą ir sutvirtinti jį

Tipinė situacija: *lūžusi koja*

Prieš operaciją nueikite prie instrumentų stalo ir užsidėkite naujas pirštines

/me užsidedu naujas pirštines

Užsidėję naujas pirštines, suleiskite žmogui migdomųjų į veną ir uždėkite deguonies kaukę

/me dezinfekuojau veną ir suleidžiu migdomųjų

/do ar migdomieji suveikia?

/me uždėdu deguonies kaukę

Jei viskas pavyko, nueikite prie instrumentų stalo ir pasiimkite vatos tamponą ir dezinfekcines priemones. Pasiėmę priemones, nueikite prie žmogaus, dezinfekuokite lūžio vietą ir nuvalykite kraują

/me pasiėmu vatos tamponą ir dezinfekcines priemones

/me dezinfekciniu priemonių pagalba dezinfekuojau lūžio vietą ir nuvalau kraują

Jei viskas pavyko, nueikite prie instrumentų stalo ir pasiimkite skalpelį. Pasiėmę skalpelį, prapjaukite odą ties lūžiu

/me pasiėmu skalpelį

/me atsargiai bandau prapjauti odą ties lūžiu

/do ar pavyksta?

Jei pavyko prapjauti, galite dar kartą nuvalyti kraują. Tuomet nueikite prie instrumentų stalo, pasiimkite titanine plokštelę ir varžtus. Pasiėmę reikmenis grįžkite pas žmogų ir bandykite sutvirtinti kaulą varžtais ir plokšte.

/me pasiėmu titanine plokštelę ir varžtus

/me atsargiai bandau atstatyti kojos kaulą į vietą

/do ar pavyksta?

/me bandau sutvirtinti kojos kaulą varžtais ir plokšte

/do ar pavyksta?

Jei pavyko atstatyti ir sutvirtinti kaulą, reikės visą tai užsiūti. Nueikite prie instrumentų stalo, pasiimkite adatą ir siūlą, tuomet grįžkite prie žmogaus ir pradėkite siūvimą.

/me įveriu siūlą į adatą ir bandau užsiūti pjūvį ties kojos lūžiu

/do ar pavyksta?

/do ar siūlai tvirtai laikosi?

Jei pavyko užsiūti, nueikite prie instrumentų stalo ir pasiimkite gipsą. Pasiėmę gipsą mirkykite jį į vandenį ir uždėkite jį ant lūžusios galūnės.

/me pasiėmu gipsą ir mirkau jį į vandenį

/me uždėdu įtvarą ant rankos

/do ar pavyksta?

Jei pavyko uždėti įtvarą, galite nuimti deguonies kaukę ir pradėti gaivinimą.

/me nuimu migdomąją kaukę

/me paplekšnoju per veidą ir duodu įkvėpti amoniako

/do ar bunda?

Kai žmogus pabudo, paaiškinkite jam kas įvyko, *jei buvo lūžus koja, pasiūlykite atsigulti į ligoninę keliem mėnesiam reabilituotis. Jei nesutiko, parekomenduokite sėdėti namie, mažiau vaikščioti ir pasiūlykite jam ramentus.*

Kulkos pašalinimas

Operacijos tikslas: pašalinti kulką iš šautinės žaizdos

Tipinė situacija: *šautinė žaizda krutinėje*

Prieš operaciją nueikite prie instrumentų stalo ir užsidėkite naujas pirštines

/me užsidedu naujas pirštines

Užsidėję naujas pirštines, suleiskite žmogui migdomųjų į veną ir uždėkite deguonies kaukę

/me dezinfekuojau veną ir suleidžiu migdomųjų

/do ar migdomieji suveikia?

/me uždedu deguonies kaukę

Jei viskas pavyko, nueikite prie instrumentų stalo ir pasiimkite vatos tamponą ir dezinfekcines priemones. Pasiėmę priemones, nueikite prie žmogaus, dezinfekuokite šautinę žaizdą vietą ir nuvalykite kraują

/me pasiėmu vatos tamponą ir dezinfekcines priemones

/me dezinfekciniu priemonių pagalba dezinfekuojau šautinę žaizdą ir nuvalau kraują

Jei viskas pavyko, nueikite prie instrumentų stalo ir pasiimkite pincetą. Pasiėmę pincetą grįžkite prie žmogaus ir bandykite išimti kulką.

/me pasiėmu pincetą

/me atsargiai bandau išimti kulką iš šautinės žaizdos

/do ar pavyksta?

Išėmę kulką, paklauskite per “/do”, ar liko kulkos skeveldru. Jei liko, bandykite išimti ir jas.

/me atsargiai bandau išimti kulką skeveldras

/do ar pavyksta?

Jei pavyko išimti kulką, dar kartą nuvalykite kraują ir dezinfekuokite šautinę žaizdą. Tai atlikę, galite pradėti siūvimą. Nueikite prie instrumentų stalo, pasiimkite adatą ir siūlą, tuomet grįžkite prie žmogaus ir pradėkite siūvimą.

/me įveriu siūlą į adatą ir bandau užsiūti šautinę žaizdą

/do ar pavyksta?

/do ar siūlai tvirtai laikosi?

Jei pavyko užsiūti, galite pradėti gaivinimą.

/me nuimu migdomąją kaukę

/me paplekšnoju per veidą ir duodu įkvėpti amoniako

/do ar bunda?

Kai žmogus pabudo, paaiškinkite jam kas įvyko, pasiūlykite atsigulti į ligoninę keliem mėnesiam reabilituotis. Jei nesutiko, parekomenduokite sėdėti namie ir mažiau judėti.

Šis gidas skirtas tiktai paramedikam. Čia buvo parodyti paprasčiausi gydymo būdai ir operacijos. Ateityje privalėsite plėsti **RP** žinias ir rašyti ilgesnes/detalesnes **“/me”**, **“/do”** komandas. Kaip ir minėjau nebijokite ir nepamirškite naudotis logika ir įjungti fantaziją :)