

Befund-Zusammenfassung

Patient: **Patrick Wydra** | Behandelnde Ärztin: **Dr. Gramsch** | Befunde: IMD-Labor Juni 2026 + BioScan Mai 2026
Erstellt: 06.07.2026

1. Kritische Laborwerte im Überblick

Parameter	Ihr Wert	Referenz	Bewertung
Vitamin D (25-OH)	9,1 ng/ml	30–100 ng/ml	SCHWERER MANGEL
Homocystein	13,9 µmol/l	< 10 µmol/l	ERHÖHT
Selen	79,0 µg/l	85–200 µg/l	ERNIEDRIGT
Zink	4,3 mg/l	5,0–15,0 mg/l	ERNIEDRIGT
Candida (Darm)	erhöht	negativ	ERHÖHT
Dysbiose-Index	> 2	< 1	GESTÖRT

⚠ **Wichtigster Befund:** Vitamin D 9,1 ng/ml ist medizinisch als *schwerer Mangel* einzustufen (Normalwert mind. 30 ng/ml). Dies beeinträchtigt Immunsystem, Stimmung, Muskelkraft und Knochendichte erheblich. Eine sofortige hochdosierte Substitution ist in der Regel notwendig.

2. Therapiepläne Dr. Gramsch (20.05. + 09.06.2026)

Therapieplan 1 (20.05.2026)

- Antifungale Therapie gegen Candida (Dauer lt. Plan)
- Darm-Aufbau-Protokoll: Probiotika + Präbiotika
- Supplementierung Spurenelemente (Selen, Zink)
- Ernährungsumstellung: zuckerreduziert, weißmehlarm

Therapieplan 2 (09.06.2026)

- Anpassung der Supplementierung nach Kontroll-Labor
- Vitamin D Hochdosis-Einleitung (genaue Dosis mit Arzt abstimmen)
- B-Komplex (B6, B12, Folsäure) zur Homocystein-Senkung
- Fortsetzung Darm-Sanierung mindestens 6–8 Wochen
- Kokosnussöl täglich als natürliches Antimykotikum

3. Fragen für den nächsten Termin

1. **Vitamin D:** Welche genaue Tagesdosis IE empfehlen Sie bei 9,1 ng/ml? Kombiniert mit K2 (MK-7)?

2. **Homocystein 13,9:** Brauche ich einen B6+B12+Folsäure-Komplex? Welche Dosierung und wie lange?
3. **Selen:** Selenomethionin oder Natriumselenit? Wie viel mcg täglich, wie lange?
4. **Zink:** Welche Form (Bisglycinat?), wie viele mg täglich, Einnahmedauer?
5. **Candida + Dysbiose:** Antifungale Diät für wie lange? Welche Probiotika-Stämme (Lactobacillus, Bifidobacterium) + KBE empfehlen Sie?
6. **Wechselwirkungen:** Welche Supplements darf ich NICHT gleichzeitig einnehmen?
7. **Kontroll-Labor:** Wann soll Vitamin D neu gemessen werden? Welche Werte dann?
8. **Priorität:** Wenn ich nicht alles auf einmal anfangen kann — was ist die wichtigste erste Maßnahme?

4. Ernährungsempfehlungen (bei Candida + Dysbiose)

4a. Gemüse: roh vs. gegart

Roh essen (Enzyme + Vit C)	Dünsten/Blanchieren (besser bei Dysbiose)
Gurke, Tomate, Paprika, Karotte, Radieschen, Feldsalat	Brokkoli, Blumenkohl, Zucchini, Spinat, Mangold
150–200 g pro Mahlzeit	200–300 g pro Mahlzeit (Volumen schrumpft beim Garen)

Empfehlung: Täglich beides — eine Mahlzeit roh, eine Mahlzeit gegart.

4b. Was meiden (mindestens 6–8 Wochen bei Candida)

- Zucker, Süßigkeiten, Honig, Agavensirup
- Weißmehl, Weißbrot, normale Nudeln, Croissants
- Fruchtsäfte, Softdrinks, Alkohol
- Obst: nur kleine Mengen erlaubt (Handvoll Beeren/Tag)
- Pilze (Champignons in kleinen Mengen okay, andere meiden)

4c. Günstige Lebensmittel

- **Proteine:** Hühnchen, Pute, Lachs (2–3x/Woche), Eier (täglich okay)
- **Öle:** Olivenöl (kalt 3 EL/Tag), Kokosnussöl zum Braten (antifungal)
- **Antifungal-Gewürze:** Knoblauch (1–2 Zehen täglich), Oregano, Ingwer
- **Präbiotika:** Zwiebeln, Lauch, Topinambur, grüner Spargel (nähren gute Darmbakterien)
- **Komplexe Kohlenhydrate:** Quinoa, Süßkartoffel, Hülsenfrüchte (kleine Portionen)
- **Nüsse:** Walnüsse (10–12 Stück/Tag) — gut für Homocystein und Omega-3

4d. Beispiel-Tagesplan

7–8 Uhr 3 Eier (Rührei) in Kokosnussöl · 100 g Champignons · 1–2 Scheiben Dinkelknäckebrot · Grüntee oder Wasser

12–13 Uhr	150 g Hähnchenbrust oder Lachs (gegrillt/gedünstet) · 250 g gedünstetes Gemüse (Brokkoli + Zucchini) · 100 g Quinoa oder Süßkartoffel · 2 EL Olivenöl · 1 Knoblauchzehe
15–16 Uhr	10–12 Walnüsse · Handvoll Heidelbeeren oder Erdbeeren
18–19 Uhr	Großer Rohkost-Salat (200 g): Gurke, Paprika, Karotte, Tomate · 120 g Pute oder Thunfisch · Dressing: Olivenöl + Zitrone + Salz + Knoblauch

5. Supplement-Schema (nach Arzt-Rücksprache dosieren!)

Supplement	Zeitpunkt	Hinweis
Vitamin D3 + K2 (MK-7)	Morgens zum Frühstück	Fettlöslich — immer mit Essen! K2 verhindert Kalk-Ablagerung
B-Komplex (B6+B12+Folsäure)	Abends	Senkt Homocystein · B12 als Methylcobalamin bevorzugt
Zink (Bisglycinat)	Mittags mit Essen	NICHT gleichzeitig mit Calcium oder Eisen nehmen
Selen (Selenomethionin)	Morgens nüchtern oder zum Frühstück	Organische Form (Selenomethionin) besser resorbierbar
Probiotika (Darm)	Morgens nüchtern oder 30 Min vor dem Essen	Stämme: Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium longum · mind. 10 Mrd. KBE

⚠ **Wichtig:** Genaue Dosierungen bitte ausschließlich mit Dr. Gramsch absprechen. Diese Zusammenfassung basiert auf den vorliegenden Laborbefunden (IMD-Labor Juni 2026 + BioScan Mai 2026) und dient als Gesprächsgrundlage für den nächsten Arzttermin — kein Ersatz für medizinische Beratung.