

## LISTA 2 – INTERPOLAÇÃO E SISTEMAS LINEARES

1. Determine o polinômio interpolador de grau  $\leq 2$  de uma certa função  $f$  nos seguintes pontos tabelados:

$x_i$	1	-1	2
$f(x_i)$	0	-3	4

2. A tabela abaixo mostra a população (em milhões) do Brasil de 1960 a 2010.

Ano	1960	1970	1980	1990	2000	2010
População	72.7759	96.0604	121.7404	149.6483	174.5049	195.2102

Estime a população do Brasil no ano 1975, usando interpolação cúbica (de grau 3).

3. Considere os polinômios reais  $p(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$  e  $r(x)$ , sabendo-se que estes polinômios satisfazem as seguintes condições interpolatórias:

$$\begin{aligned} p(-2) = r(-2) = 31 \quad p(-1) = r(-1) = 5 \quad p(0) = r(0) = 1 \\ p(1) = r(1) = 1 \quad p(2) = r(2) = 11 \quad \text{e} \quad r(3) = 30 \end{aligned}$$

Escreva uma expressão da forma  $r(x) = p(x) + c\phi(x)$  de modo a relacionar os polinômios interpoladores  $r$  e  $p$ . Indique a expressão de  $\phi$  e calcule o valor da constante  $c$ . Justifique.

**Resp:**  $r(x) = p(x) - 31/120(x+2)(x+1)x(x-1)(x-2)$ .

4. Considere a função real  $y(t) = \frac{A}{2}t^2 + Bt + C$  da qual se conhecem os valores a seguir tabelados

$t$	0.2	0.3	0.4	0.5
$y(t)$	0.940	0.655	0.577	0.706

- a) Aplique o método de interpolação de Newton para determinar os valores de  $A, B$  e  $C$ . **Resp:**  $A = 20.70, B = -8.025$  e  $C = 2.131$ .
- b) Sendo  $s$  um ponto arbitrário do intervalo  $[0.2, 0.5]$ , qual é o valor máximo do erro absoluto de interpolação que se comete ao calcular um valor aproximado de  $y(s)$  por interpolação linear (isto é, com polinômios de grau não superior a 1)? Justifique. **Resp:** 0.025875.
5. Seja  $h(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$
- a) Efetuando cálculos exatos, determine o polinômio que interpola a função  $h$  nos pontos  $-1, 0, 1$  e  $2$ . **Resp:**  $p(x) = x^3/12 - x^2/2 - x/12 + 1$
- b) Use o polinômio anterior para estimar o valor de  $h(5\pi/24)$  e obtenha um majorante do respectivo erro de interpolação.
- Resp:**  $|f(5\pi/4) - P_3(5\pi/4)| \leq 0.025$

6. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$

$x_i$	1	2	3	5
$f(x_i)$	0.9	0.7	0.6	0.5

- a) Utilizando a fórmula de Newton com diferenças divididas, determine uma expressão para o polinômio  $p$ , de menor grau e interpolador de  $f$ , nos 3 nós mais próximos de 4. Calcule um valor aproximado de  $f(4)$ .

**Resp:**  $f(4) \simeq 0.5333 \dots$

- b) Supondo que

$$\max_{x \in \mathbb{R}} |f^{(n+1)}(x)| \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N},$$

apresente um majorante para o erro absoluto que se comete ao aproximar  $f(2.5)$  por  $P_2(2.5)$ .

**Resp:**  $|f(2.5) - P_2(2.5)| \leq 0.403$

7. Considere uma função de variável real  $f$ , tal que

$$f(1) = 1, \quad f(x) = f(x-2) + (x-1)^2, \quad x > 0.$$

- a) Determine o polinômio que interpola  $f$  em  $x = 1, x = 3$  e  $x = 5$ .  
b) Mostre que  $f[x, x+2, x+4, x+6] = \frac{1}{6}$ ,  $\forall x \geq 1$ . Com base nesta igualdade e admitindo que  $f \in C^3([1, \infty[)$ , mostre que  $f$  é um polinômio e determine o seu grau.

8. Determinar um valor aproximado do ponto no intervalo  $[0, 1]$ , onde  $3/2 \sin(x) = e^{-x}$ .

**Resp:**  $x = 0.44200$

9. Considere a tabela a seguir:

$x$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$y = e^x$	1	1,1052	1,2214	1,3499	1,4918	1,6487

Obtenha uma aproximação para o valor de  $x$  que satisfaz  $e^x = 1,3165$ , usando interpolação quadrática. Usar a fórmula de Newton para obter  $P_2(y)$ . Construir a tabela de diferenças divididas. Estimar o erro cometido.

10. Resolva o sistema linear

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -8 & 8 \\ -6 & 3 & -15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix}$$

usando fatorização  $LU$  (fatorização de Doolittle).

**Resp:**  $x_3 = -2, x_2 = -1$ , e  $x_1 = 3$

11. Aplique o metodo de Gauss-Seidel para resolver

$$\begin{cases} 9x_1 - 3x_2 + x_3 = 2 \\ -2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 - 7x_3 = 3 \end{cases}$$

considerando um erro absoluto de  $\epsilon = 0.04$  e  $X^{(0)} = [3 \ 3 \ -1]^T$ .

12. Considere o sistema linear

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = -1 \end{cases}$$

- a) Verificar a possibilidade de aplicação do método de Gauss-Siedel, usando o Critério de Sassenfeld.
- b) Se possível, resolvê-lo pelo método do item (a) com  $X^{(0)} = [0.5 \ 0.5 \ 0.5]^T$  e obtendo o resultado com erro absoluto  $< 10^{-2}$ .

13. Considere os seguintes sistemas de equações lineares

$$(I) \begin{cases} -9x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 11 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 = -2 \end{cases} \quad \text{e} \quad (II) \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 3 \end{cases}$$

- a) Resolva os sistemas dados usando o método de Decomposição  $LU$  que considerar mais apropriado.
- b) Será possível obter a fatorização de Cholesky para a matriz dos coeficientes dos sistemas dados? Justifique.
- c) Caso haja convergência garantida, resolva os sistemas dados pelo Método Iterativo de Gauss-Siedel com  $X^{(0)} = [0.1 \ 0.2 \ 0.5]^T$  e  $\epsilon = 0.01$ .

14. Dados os sistemas lineares

$$(I) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \\ -x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases} \quad (II) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 9 \\ -x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_3 = 3 \end{cases} \quad (III) \begin{cases} 2x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + 3x_2 = 6 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 4, \end{cases}$$

estude a convergência do método de Gauss-Seidel para cada um dos sistemas dados usando o critério do raio espectral. Mostre que, reordenando as equações e incógnitas, podemos fazer com que o critério de Sassenfeld seja satisfeito, mas não o critério das linhas. Resolva-os.

15. a) Seja a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Se aplicarmos o método de Jacobi-Richardson a um sistema  $AX = b$ , com  $b$  qualquer, poderemos garantir convergência desse método?

b) Se

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

pode-se garantir que o método de Jacobi-Richardson é convergente?

16. Considere o sistema linear  $AX = b$ , sendo

$$A = \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

- a) Diga, justificando, se o método de Jacobi-Richardson é convergente para a solução do sistema dado. Em caso afirmativo, inicie o processo usando  $X^{(0)} = [100 \ -100]^T$  e faça 3 iterações usando o método de Jacobi-Richardson.
- b) Fazendo  $X^{(0)} = [0 \ 0]^T$  e efetuando cálculos exatos, obtenha a iterada  $X^{(2)}$  bem como o erro absoluto  $\|X^{(2)} - X^{(1)}\|_\infty$

17. Considere o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 &= 0 \\ x_1 &= 5 \end{cases}$$

cuja solução é  $X = [5 \ 5 \ 9]^T$ .

- a) Escreva um sistema equivalente, de modo que o método de Jacobi-Richardson seja aplicável. Justifique. Obtenha a fórmula iteradora que lhe permite calcular aproximações de  $X$  por esse método.
- b) Fazendo  $X^{(0)} = [1 \ 1 \ 1]^T$ , calcule  $X^{(3)}$ .