

EDO

por
Abílio Lemos

Universidade Federal de Viçosa
Departamento de Matemática-CCE
Aulas de MAT 147 - 2022-2

Definição 1

Uma **equação diferencial** é qualquer relação entre uma função e suas derivadas.

Existem dois tipos de equações:

- (1) Equações Diferenciais Ordinárias (EDO): A função y que aparece na equação é uma função de uma variável x . A forma geral da equação é $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$. A **ordem** da equação é a ordem da derivada de ordem superior máxima que aparece na equação;
- (2) Equações Diferenciais Parciais (EDP): A função u que aparece na equação é uma função de uma várias variáveis, $u(x_1, x_2, \dots, x_m)$. A equação é uma relação entre u , as variáveis independentes x_1, x_2, \dots, x_m e as derivadas parciais de u .

Neste curso estudaremos apenas o primeiro caso.

Definição 2

- (i) Uma **solução explícita** da EDO é qualquer função $y(x)$ que satisfaça a EDO em um intervalo $a < x < b$;
- (ii) Uma **solução implícita** da EDO é uma relação $G(x, y) = 0$ que satisfaça a EDO.

As soluções implícitas podem dar origem a infinitas soluções implícitas.

Exemplos

- (1) Mostre que $y(x) = e^{5x}$ e $y(x) = e^{-3x}$ são soluções da EDO $y'' - 2y' - 15y = 0$.
- (2) Mostre que a relação $x + y + e^{xy} = 0$ é solução implícita da EDO $(1 + xe^{xy})y' + 1 + ye^{xy} = 0$.

Pergunta: $y(x) = e^{5x} + e^{-3x}$ é solução da EDO em (1)?

Definição 3

Uma EDO $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ é **linear** se F for uma função linear nas variáveis $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$. Caso contrário dizemos que a EDO é **não linear**.

Exemplo: A EDO $y' = f(x, y)$ é **linear** se pode ser escrita como

$$y' = g(x) - p(x)y.$$

Assim, ela se torna

$$y' + p(x)y = g(x).$$

No caso em que $g(x) = 0$ dizemos que a EDO é homogênea. Isso vale em geral, ou seja, para EDO's lineares de qualquer ordem.

Exemplo: Classifique as EDO's abaixo quanto a ordem e linearidade. Para as lineares classifique quanto a homogeneidade.

(a) $y''' + 2e^x y'' + yy' = x^4$;

(b) $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 2y = \text{sen } x$;

(c) $\frac{dy}{dx} + xy = y \cos x$;

(d) $\frac{d^2 y}{dx^2} + \text{sen}(x + y) = \text{sen } x$;

Exemplo: Em cada um dos itens abaixo, faça o que se pede.

- (1) Considere a EDO que controla o decaimento de uma substância radioativa com o tempo $R(t)$, dada por $\frac{dR(t)}{dt} = -kR(t)$, onde k é uma constante conhecida. Qual a solução do problema?
- (2) Prove que $y(x) = \text{sen } x$ e $y(x) = \text{cos } x$ são soluções de $y'' + y = 0$.
- (3) Mostre que $y(x) = x^2 \ln x$ é solução de $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0, x > 0$;

Definição 4

Uma EDO de 1ª ordem tem a forma :

$$F(x, y, y') = 0 \text{ ou } y' = f(x, y)$$

Obs: Sabemos que uma EDO por si só não estabelece a unicidade da solução, quando esta existe. Por exemplo $y(x) = e^{-x} + ce^{-2x}$ é solução de $y' + 2y - e^{-x} = 0$ para cada $c \in \mathbb{R}$. A família de curvas denominada **curvas integrais** são as soluções da EDO. Para escolher uma curva em particular como solução é necessário colocar uma condição inicial.

Definição 5

Um problema de valor inicial (PVI) é uma EDO com uma condição inicial, ou seja,

$$y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$$

Exemplo: Determine a solução do PVI $y' - 2y = 0, y(\ln 2) = 12$.

Teorema 1

Considere o PVI

$$y' = f(x, y), y(x_0) = y_0. \quad (1)$$

Se $f(x, y)$ e $\partial f / \partial y$ são contínuas no retângulo

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \alpha \leq x \leq \beta, \delta \leq y \leq \gamma\}$$

contendo (x_0, y_0) , então o PVI (??) tem uma única solução em um intervalo I tal que $x_0 \in I$.

Seja f uma função contínua em $I = (a, b)$. Então

$$\int y' dx = \int f(x) dx \Rightarrow y = \int f(x) dx + C, C \in \mathbb{R}.$$

A generalização do caso mais simples é

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (2)$$

onde p e q são funções contínuas em um intervalo $I = (a, b)$. Se fizermos $q(x) = 0$ em (??) obtemos a solução $y(x) = 0$ e uma solução não nula, desde que $y(x) > 0$, é $y(x) = ke^{-\int p(x) dx}$, com $k \in \mathbb{R}$.

Exemplos: Resolva as EDO's ou PVI's abaixo.

- (a) $2y' - \cos^2 x = 0$;
- (b) $y' - y \ln x = 0, y(1) = 1$;
- (c) $y' - \frac{y}{x^2 + 1} = 0, y(0) = e$.

Vamos voltar ao caso geral da EDO em (??) supondo $q(x) \neq 0$. Devemos encontrar uma função μ tal que multiplicado (??) por $\mu(x) \neq 0$, o membro esquerdo de (??) seja a derivada de $\mu(x)y$. Se conseguirmos isso teremos $\frac{d}{dx}(\mu(x)y) = \mu(x)q(x)$, ou seja, $y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)q(x) dx + C \right)$, com $c \in \mathbb{R}$, e assim a EDO está resolvida.

Precisamos, agora, garantir a existência da função μ . Queremos $\frac{d}{dx}(\mu(x)y) = \mu(x)y' + \mu(x)p(x)y$. Supondo $\mu(x) > 0$, obtemos $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$, e essa última igualdade é chamada **fator integrante** que também dá nome a técnica de resolução da EDO. *Exemplo:* Resolva a EDO $xy' + 2y = \sin x, x > 0$.

Definição 6

Uma EDO de 1^{a} ordem **separável** tem a forma:

$$y' = f(x, y) = g(x)p(y),$$

ou seja, a função $f(x, y)$ pode ser separada em um produto de uma função de x por uma função de y .

Se $p(y) \neq 0$, então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)}, h(y) = 1/p(y).$$

Usando $H(y)$ e $G(x)$ como as anti-derivadas de $h(y)$ e $g(x)$, respectivamente, podemos provar que $\int h(y) dy = \int g(x) dx$ e assim resolver a EDO.

Exemplos: 1) Resolva o PVI $\frac{dy}{dx} = \frac{6x^2}{2y + \cos y}, y(1) = \pi$.

2) Resolva o PVI

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y \cos x}{1 + 2y^2}, y(0) = 1.$$

3) Obtenha uma solução implícita e depois uma solução explícita para a EDO $y' = x^2 y$.



LEITHOLD, Louis. *O Cálculo com Geometria Analítica - Vol. II*, São Paulo, Editora Harbra: 1990.



SANTOS, R. J. *Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias*.

<https://www.dropbox.com/s/vcdwzj1jtx85ant/topeqdif.pdf> .