

1. Suponha que, após 10 anos de uso, 40% dos computadores apresentem problemas na placa-mãe, 30% apresentem problemas no HD e 15% apresentam problemas em ambos componentes. Qual a probabilidade que um computador com 10 anos de uso ainda apresente ambos componentes funcionando bem?

R-

Evento A = {apresentar apenas defeito na placa-mãe} = 25%

Evento B = {apresentar apenas defeito no HD} = 15%

$A \cap B$ = {apresentar defeito em ambos} = 15%

$A^c \cup B^c$ = {não apresentar defeito em ambos} = $1 - (A \cup B)$ = 45%

Portanto, a probabilidade de que um computador com 10 anos de uso ainda apresente ambos os componentes em funcionamento é de 45%.

2. Um programa de computador é verificado por 3 testes independentes. Quando existe um erro, esses testes o descobrem com probabilidades 0,2, 0,4, e 0,5, respectivamente. Suponha que o programa contenha um erro. Qual a probabilidade que seja encontrado por pelo menos um dos testes?

R-

Evento A = {erro encontrado no teste 1} = 0.2

Evento B = {erro encontrado no teste 2} = 0.4

Evento C = {erro encontrado no teste 3} = 0.5

$(A \cup B \cup C)$ = {erro encontrado em pelo menos um}

$$= A + B + C - (A \cap B + A \cap C + B \cap C) + A \cap B \cap C$$


$$= 0.2 + 0.4 + 0.5 - (0.2 \cdot 0.4 + 0.2 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.4) + 0.2 \cdot 0.4 \cdot 0.5$$

$$= 1.1 - 0.38 + 0.04$$

$$= 0.76$$

Portanto, a probabilidade que seja encontrado por pelo menos um dos testes é de 76%.

3. Em certa empresa, 60% dos programadores sabem C/C++, 80% sabem Python, e 50% sabem as duas linguagens. Se você selecionar um programador qualquer da empresa, qual a probabilidade que:



a) Não saiba Python?

$$P\{A^c\} = 1 - A = 1 - 0.8 = 0.2$$

b) Não saiba Python nem C/C++?

$$P\{A^c \cup B^c\} = 1 - A \cup B = 1 - 0.9 = 0.1$$

c) saiba C/C++ mas não Python?

$$P\{B\} = 0.1$$

d) saiba Python mas não C/C++?

$$P\{A\} = 0.3$$

e) saiba C/C++, dado que sabe Python?

$$P\{B|A\} = P\{A \cap B\} / P\{A\} = 0.5 / 0.8 = 0.625$$

f) saiba Python, dado que sabe C/C++?

$$P\{A|B\} = P\{A \cap B\} / P\{B\} = 0.5 / 0.6 = 0.833$$

4. Quando o tempo está bom, 80% dos voos chegam na hora marcada. Em caso de mau tempo, apenas 30% chegam na hora marcada. Amanhã, a chance do tempo estar bom é de 60%. Qual a probabilidade de um voo chegar na hora?

Notação: B e R, tempo bom e ruim; C, chegar no horário; CB, chegou no horário com tempo bom; CR, chegou no horário com tempo ruim.

$$P\{B\} = 0.6; P\{R\} = 0.4; P\{C|B\} = 0.8; P\{C|R\} = 0.3$$


$$P\{C|B\} = P\{C \cap B\} / P\{B\} \gg 0.8 = P\{C \cap B\} / 0.6 \gg P\{C \cap B\} = 0.48$$

$$P\{C|R\} = P\{C \cap R\} / P\{R\} \gg 0.3 = P\{C \cap R\} / 0.4 \gg P\{C \cap R\} = 0.12$$

$$P\{C\} = P\{C|B\} + P\{C|R\} = 0.48 + 0.12 = 0.6$$

5. Um fabricante de computador recebe componentes de três fornecedores, S1, S2 e S3. 50% dos componentes provêm de S1, 30% de S2 e 20% de S3. Sabe-se que dos componentes recebidos de S1, 5% chegam com defeito. No caso de S2 e S3, esse valor é de 3% e 6% respectivamente.

Notação: D1, D2, D3, defeito em S1, S2 e S3



a) Que porcentagem de todos esses componentes chegam com defeito?

Como os eventos são independentes, a $P\{D1 \cap D2 \cap D3\} = 0.05 \cdot 0.03 \cdot 0.06 = 0.00009$

b) Um cliente que comprou um computador recentemente reclamou que certo componente veio com defeito. Qual a probabilidade desse componente ter vindo do fornecedor S1?

$$P\{D1\} \cdot P\{S1\} = 0.04559 \cdot 0.5 = 0,022795$$

6. Certa questão de um teste de múltipla escolha é respondida corretamente com probabilidade 0.9 por um estudante que se preparou para o teste. Um estudante que não se preparou chuta qualquer uma

das 4 alternativas, então sua probabilidade de acerto é 1/4. Sabe-se que 80% dos estudantes se prepararam para o teste. Se o estudante Fulano de Tal acertou a questão, qual a probabilidade dele não ter se preparado para o teste?

Pelo teorema do produto das probabilidades,

$$0.2 \cdot 0.25 = 0.05$$

7. Há dois cabos de conexão à internet conectando o ponto A ao B e três conectando o ponto B ao ponto C. Durante o horário de pico, cada cabo tem 0.2 de probabilidade de falhar, independente dos demais.

Notação: A1B, cabo 1 entre A e B funcionando, B1C, cabo 1 entre B e C funcionando, etc.

a) Calcule a probabilidade de haver alguma conexão sem falha entre os pontos A e C.

Probabilidade de uma conexão entre A e B:

$$\gg P\{A1B \cup A2B\} = [0.98 + 0.98 - (0.98^2)] = 0.9996$$

Probabilidade de uma conexão entre B e C:

$$\gg P\{B1C \cup B2C \cup B3C\} = [3 \cdot 0.98 - (3 \cdot 0.98^2) + (0.98^3)] = 0.999992$$

Probabilidade de uma conexão entre A e C:

$$\gg P[(A1B \cup A2B) \cap (B1C \cup B2C \cup B3C)] \\ = 0.9996 \cdot 0.999992 = 0,9995920032$$

b) Qual seria essa probabilidade se um novo cabo, também com probabilidade de falha de 0.2, fosse instalado entre A e B?

Probabilidade de uma conexão entre A e B:

$$\gg P\{A1B \cup A2B \cup A3B\} = [3 \cdot 0.98 - (3 \cdot 0.98^2) + (0.98^3)] = 0.999992$$

Probabilidade de uma conexão entre B e C:

$$\gg P\{B1C \cup B2C \cup B3C\} = [3 \cdot 0.98 - (3 \cdot 0.98^2) + (0.98^3)] = 0.999992$$

Probabilidade de uma conexão entre A e C:

$$\gg P[(A1B \cup A2B \cup A3B) \cap (B1C \cup B2C \cup B3C)] \\ = 0.999992 \cdot 0.999992 = 0.999984$$

c) E se esse novo cabo fosse instalado entre B e C?

Probabilidade de uma conexão entre A e B:

$$\gg P\{A1B \cup A2B\} = [2 \cdot 0.98 - (0.98^2)] = 0.999992$$

Probabilidade de uma conexão entre B e C:

$$\gg P\{B1C \cup B2C \cup B3C \cup B4C\} = [4*0.98 - (6*0.98^2) + (4*0.98^3) - (0.98^4)] = 0.99999984$$

Probabilidade de uma conexão entre A e C:

$$\gg P[(A1B \cup A2B) \cap (B1C \cup B2C \cup B3C \cup B4C)]$$

$$= 0.9996 * 0.99999984 = 0.999599840064$$

d) E se fosse entre A e C?

Probabilidade de uma conexão entre A e B:

$$\gg P\{A1B \cup A2B\} = [0.98 + 0.98 - (0.98^2)] = 0.9996$$

Probabilidade de uma conexão entre B e C:

$$\gg P\{B1C \cup B2C \cup B3C\} = [3*0.98 - (3*0.98^2) + (0.98^3)] = 0.999992$$

Probabilidade de uma conexão entre A e C:

$$\gg P[(A1B \cup A2B) \cap (B1C \cup B2C \cup B3C) \cap (A1C)]$$

$$= 0.9996 * 0.999992 * 0.98 = 0,979600163136$$