

IAD-wzory

Patryk Lisik

21 maja 2018

$$f(x) = w_0 + \sum_{i=1}^c w_i k(\|x - c_i\|, \sigma) \quad (1)$$

w_i jest i-tą wagą

c_i jest i-tym centrum

$$k(d, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot \exp\left(-\frac{d^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2)$$

$$Q(P) = \frac{1}{2P} \sum_{i=0}^P (f(x_i) - y_i)^2 \quad (3)$$

$$w_n(t+1) = w_i(t) - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Q(w(t)) \quad (4)$$

1 Metoda najmniejszego spadku dla wag

$$\frac{\partial}{\partial w_n} Q(P) = \frac{\partial}{\partial w_n} \frac{1}{2P} \sum_{i=0}^P \left(w_0 + \sum_{j=1}^c w_j k(\|x_i - c_j\|, \sigma) - y_i \right)^2$$

ze wzoru na pochodną funkcji złożonej $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ dla $n \neq 0$

$$\frac{\partial}{\partial w_n} Q(P) = \frac{1}{P} \sum_{i=0}^P \left(w_0 + \sum_{j=1}^c w_j k(\|x_i - c_j\|, \sigma) - y_i \right) \cdot w_n$$

zatem

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial w_n} Q(P) = \\ & \begin{cases} w_n(t+1) = w_i(t) - \alpha \frac{1}{P} \sum_{i=0}^P \left(w_0 + \sum_{j=1}^c w_j k(\|x_i - c_j\|, \sigma) - y_i \right) \cdot w_n & \text{dla } n \in \{1, 2 \dots j\} \\ w_n(t+1) = w_i(t) - \alpha \frac{1}{P} \sum_{i=0}^P \left(w_0 + \sum_{j=1}^c w_j k(\|x_i - c_j\|, \sigma) - y_i \right) & \text{dla } n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2 Metoda najmniejszego spadku dla promienia sąsiedztwa

$$\sigma(t+1) = \sigma(t) - \alpha \frac{\partial}{\partial \sigma} Q(\sigma(t)) \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \sigma} Q(P) &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \frac{1}{2P} \sum_{i=0}^P \left(w_0 + \sum_{j=1}^c w_i k(\|x_i - c_j\|, \sigma) - y_i \right)^2 = \\ &= \frac{1}{P} \sum_{i=0}^P \left(w_0 + \sum_{j=1}^c (w_i k(\|x_i - c_j\|, \sigma) - y_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \sigma} k(\|x_i - c_j\|, \sigma) \right) \\ \frac{\partial}{\partial \sigma} k(d, \sigma) &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot \exp\left(-\frac{d^2}{2\sigma^2}\right) = \end{aligned}$$

ze wzoru na iloczyn funkcji $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \sigma} k(d, \sigma) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-\sigma^{-2}) \exp\left(-\frac{d^2}{2\sigma^2}\right) + \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \exp\left(-\frac{d^2}{2\sigma^2}\right) (-2\sigma)^{-3} = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot \exp\left(-\frac{d^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} + (2\sigma)^{-3}\right) = -k(d, \sigma) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} + (2\sigma)^{-3}\right) \end{aligned}$$

stąd

$$\frac{\partial}{\partial \sigma} Q(P) = \frac{1}{P} \sum_{i=0}^P \left(w_0 - \sum_{j=1}^c (w_i k(\|x_i - c_j\|, \sigma) - y_i) \cdot k(\|x_i - c_j\|, \sigma) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} + (2\sigma)^{-3} \right) \right)$$