

問答題

1. 寫出下列方劑的“君藥”：

人參敗毒散

<羌活 獨活>

五苓散

<澤瀉>

越鞠丸

<香附>

溫經湯

<吳茱萸 桂枝>

逍遙散

<柴胡>

蠲痺湯

<羌活 獨活>

固經丸

<龜板 白芍>

二陳湯

<半夏 橘紅>

生化湯

<當歸>

保和丸

<山楂>

2. 寫出下列方劑的“臣藥”

半夏白朮天麻湯

<白朮>

溫膽湯

<枳實>

天麻鉤藤飲

<山梔子 黃芩>

★ 血府逐瘀湯

<赤芍 川牛膝 當歸>

藿香正氣散

<厚朴 陳皮 紫蘇 白芷>

★ 柴葛解肌湯 清里熱

<羌活 白芷 黃芩 石膏>

清胃散 解風寒止頭痛

<升麻>

小建中湯

<白芍 炙甘草>

清氣化痰丸

<黃芩 瓜蒌仁>

<方劑>

四逆散

考過 <柴胡>

八正散

<木通>

血府逐瘀湯

考過 <桃仁 紅花 川芎>

溫膽湯

<竹茹>

平胃散

<蒼朮>

四神丸

<補骨脂>

導赤散

<生地>

止嗽散

<紫菀 百部 白前>

清氣化痰丸

<膽南星>

當歸補血湯

<黃耆>

★ 二陳湯

<茯苓>

★ 固經丸

<黃芩 黃柏>

酸棗仁湯

<川芎>

吳茱萸湯

<生薑>

銀翹散

<薄荷 桔梗 淡豆豉 牛蒡子>

桃核承氣湯

<桂枝>

麻子仁丸

<杏仁 白芍>

當歸六黃湯

<黃連 黃芩 黃柏>

★ 保和丸

<神麴 萊菔子>

3. 寫出下列方劑的共有藥物

★ 銀翹散與桑菊飲

<連翹 薄荷 桔梗 蘆根 甘草>

★ 五苓散與豬苓湯

<澤瀉 豬苓 茯苓>

★ 四物湯與歸脾湯

<當歸>

4. 半夏厚朴湯的藥物組成與劑量為何？

記組成就成 生薑 15g 半夏 9-12g 厚朴 9g 蘇葉 6g 茯苓 12g 生夏厚蘇茯

玉屏風散的藥物組成為何？

騎瘋豬

黃耆 防風 白朮

★ 血府逐瘀湯由四物湯加上桃仁 紅花 桔梗 川牛膝 再加上哪個方劑所組成？

四逆散

小承氣湯再加上哪個藥物就成為大承氣湯？

芒硝

小建中湯是桂枝湯再加上哪一個藥物所組成的？

飴糖

白頭翁湯的藥物所組成為何？

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮

桃核承氣湯是由桃仁 桂枝在加上哪個方劑所組成？

調胃承氣湯

溫膽湯是由二陳湯再加上哪些藥物所組成？

竹茹 枳實

半夏白朮天麻湯是由二陳湯再加上哪些藥物所組成？

白朮 天麻

十全大補湯是由四君子湯與四物湯 再加上哪兩個藥物所組成？

黃耆 肉桂

大承氣湯的藥物組成與劑量為何？

組成劑量都要記 大黃 12g 厚朴 24g 枳實 12~15g 芒硝 9~12g

四逆散的藥物組成與劑量？

組成劑量都要記 柴胡 9~12g 枳實 9~12g 白芍 12~24g 炙甘草 6~9g

當歸補血湯的藥物組成與劑量為何？

黃耆 30g 當歸 6g

丹參飲的藥物組成與劑量？

丹參 30g 檀香 4.5g 砂仁 4.5g

甘麥大棗湯的藥物組成與劑量為何？

組成劑量都要記 浮小麥 9~15g 甘草 9g 大棗 10 枚 9910

生脈散的藥物組成與劑量為何？

組成劑量都要記 人參 9~15g 麥冬 9~12g 五味子 3~6g 993

吳茱萸湯的藥物組成與劑量為何？

吳茱萸 9~12g 生薑 18g 大棗 12 枚人參 9g

五皮散中桑白皮的劑量為何？

15g

八正散中木通的劑量為何？

3~6g

保和丸中神曲的劑量為何？

★ 9~12g

在所有的方劑中如果以黨參來代替人參黨參的劑量應為人參的多少倍？

★ 2~3 倍

5. 過量服用桂枝湯會產生哪些副作用？應該如何來治療？

副作用: 過汗 高熱 口渴 煩躁 用白虎湯加人參來治療

體質壯實者才可以服用的方劑為何？

黃連解毒湯 小活絡丹

哪個方劑長期或大劑量服用會傷脾？

黃連解毒湯: 長期服用傷陰

龍膽瀉肝湯

孕婦不可以服用的方劑為何？

大小八血桃丹生麻:

大承氣湯 小活絡丹 八正散 血府逐瘀湯 桃核承氣湯 丹參飲 生化湯 麻子仁丸

嚴重或急性失血時 不可以使用哪個方劑？

★

四物湯

過量或不慎服用大承氣湯 會出現哪些副作用？

嚴重腹瀉與嘔吐

長期服用小柴胡湯會有哪些副作用？

傷氣引起頭暈 頭痛或牙齦流血

★

過量服用五苓散會有哪些副作用？

眩暈 口淡 納差

長期服用八正散會引起哪些副作用？

★

虛弱 心悸 輕微頭痛 沒有胃口

過量服用四君子湯會有哪些副作用？

口乾 口渴 煩躁

哪個方劑為便秘的病人禁用？

四君子湯

月经过多或有出血體質或正在出血的病人 不可以服用哪個方劑？

血府逐瘀湯 丹參飲 生化湯

6. 寫出下列藥物在方劑中的功效？

桂枝湯 <桂枝 芍藥>

解表 調和營衛

★

柴葛解肌湯 <羌活 白芷>

幫助君藥解表 減輕頭痛

柴葛解肌湯 <黃芩 石膏>

清里熱

白虎湯 <炙甘草 梗米>

益胃生津

★ 龍膽瀉肝湯 <柴胡>

引藥入肝經

真武湯 <白芍>

緩急止痛 利小便

豬苓湯 <阿膠>

利尿不傷陰 滋陰不斂邪

補中益氣湯 <升麻 柴胡>

協助黃耆升提陽氣

橘皮竹茹湯 <生薑>

①和胃 降逆 止嘔 ②防止寒藥(竹茹)傷脾

固經丸 <椿根皮>

清熱 止血 止崩漏 (不是止帶)

消風散 <生地黃 當歸 黑芝麻>

養血(治風先治血，血行風自滅) 養血熄風止痒

保和丸 <連翹>

清熱(食積的熱)

清食積的郁熱

清胃散 <升麻>

清熱解毒

★ 六味地黃丸中所有藥物的功效 即何謂 三補 三瀉

脾肝腎 藥芟熟 扶丹瀉

<腎> 熟地 補腎陰 澤瀉 清腎火

<肝> 山茱萸 補肝 牡丹皮 清肝火

<脾> 山藥 補脾 茯苓 利脾濕

7.哪個方劑為二陳湯的變方?

半夏白朮天麻湯

★ 哪個方劑經過適當加減後 可以由治濕變為治乾? 應如何加減? 請詳述之

二陳湯去半夏換成川貝母+瓜蒌 由治濕痰的方劑變為治燥痰的貝母瓜蒌散

★ 貝母瓜蒌散為何使用川貝母 而不使用浙貝母?

川貝母潤肺燥的功效較佳

二者都治脾胃虛

★ 四君子湯與理中丸最大的區別為何?

四君子湯: 氣虛 舌淡 脈虛細 用茯苓益氣健脾
理中丸: 陽虛 有寒舌淡 脈沉 用干姜溫中散寒

四君 參苓 朮草 理中 參薑 朮草

四君子湯為補氣的基本方 用茯苓益氣健脾 理中丸用乾薑溫中散寒

四逆散的功效主治為何?

少陰四逆之証 柴枳芍甘

透邪解鬱 疏肝理脾:①少陰病(里熱+四肢冷) ②肝胃不合

桂枝湯與玉屏風散在治療特性上有何不同?

同治表虛

玉屏風散：重固攝補虛，止汗，不治風寒，預防感冒

桂枝湯：祛邪解表，治風寒

桂枝湯用於外邪偏盛+營衛不合 玉屏風散用於肺衛氣虛+多汗 不解表

四君子湯與玉屏風散在治療特性上有何不同？

二者都補氣

四君子湯 治脾胃氣虛 玉屏風散 治肺衛氣虛

四君子湯：補脾胃氣虛

玉屏風散：治肺衛氣虛

★ 當歸六黃湯與玉屏風散在治療特性上有何不同？

當歸六黃湯 治陰虛盜汗 玉屏風散 治氣虛自汗

★ 六味地黃丸與左歸丸在治療特性上與藥物組成上有何不同？

六味地黃丸 治療肝腎陰虛，藥物有補有瀉

左歸丸 用來補腎，重在填精益髓，只有使用補益的藥物

黃連阿膠湯與酸棗仁湯在治療特性上有何不同？

黃連阿膠湯 重在清心火、補腎陰（心煩，無法躺下）

酸棗仁 重在養肝血以滋養心（心煩，可以躺下，無法入睡）

★ 膠艾湯與溫經湯在治療特性上有何不同？

膠艾湯 用於補血安胎，治療血虛又有寒象

溫經湯 用於月經不調，治療血瘀又有寒象

在大承氣湯中的藥物應該如何煎煮？

枳實 厚朴 同煎 大黃 後下 芒硝 最後下（關火後下或沖服）

使用止嗽散的脈象為何？

脈浮緩

人參敗毒散與藿香正氣散在症狀上有何差異？

<共同症狀：惡寒發熱 苔白膩>

人參敗毒散：咳嗽有痰或濕疹

藿香正氣散：上吐下瀉

8. 寫出下列病證的最佳治療方劑

★ *女病人最近體重減輕 食慾與食量正常 夜晚發熱 白天覺得身涼 熱退後不出汗 舌紅少苔 脈細數 夜熱早涼，熱退汗不出，有食欲却消瘦，慢性病消耗性疾病

<青蒿鳖甲湯>

★ *病人牙痛 牙齦紅腫出血 口臭 口乾渴 汗出多 舌紅 少苔一

<清胃散> 舌紅苔黃用白虎湯

★ *女病人近日來陰部紅腫搔癢 帶下量多而黃臭 排尿時疼痛 煩躁不安 口稍渴 舌苔黃膩 脈弦滑數

<龍膽瀉肝湯>

*病人牙痛 牙齦紅腫出血 口臭口渴 汗出多 舌紅苔黃乾

<白虎湯>

*病人有膽囊炎 便秘 腹痛不可按壓 按壓疼痛加重 舌苔黃燥有芒刺 脈沉實 服藥後好轉 最近症狀復發而送醫 之前最有可能服用哪個方劑？

<大承氣湯>

*女病人脅肋痛 口苦 口乾舌燥 頭痛眩暈 還時有寒熱往來 月經不規則 經前乳房脹痛 胃口不佳 疲倦 舌淡紅 脈弦虛

<逍遙散>

*一婦女正值經期 總是覺得時有寒熱 咽乾 口苦 眩暈 易怒 心口熱 脅肋痛 嘔吐 沒有食

慾 舌苔薄白 脈弦

<小柴胡湯>

*病人正在服用桂枝湯 他現在有咽喉腫痛 口稍渴 舌尖紅 應改用何方劑最佳?

<銀翹散>

★ *病人咳嗽 咽痛 輕微發熱 舌正常 脈浮數

<桑菊飲+玄參 牛蒡子>

*病人頭痛 頸部僵硬疼痛 惡寒發熱 汗出 乾嘔 口不渴 脈浮緩

<桂枝湯>

★ *病人惡寒發熱 而且發熱越來越重 頭痛 無汗 口渴 心煩失眠 眼眶痛 舌紅苔黃 脈浮微洪

<柴葛解肌湯>

*病人患有嚴重風寒感冒 而且皮膚又有濕疹 舌苔白膩

<人參敗毒散>

*病人便秘 輕微發熱 牙齦腫痛出血 流鼻血 舌紅 脈滑數 便秘+流鼻血->調胃承氣湯

<調胃承氣湯>

★ *病人便秘 大便硬難以排出 尿頻數 舌苔黃乾 脈沉數 便秘+尿頻->麻子仁丸 脾約證

<麻子仁丸>

★ *一老年男病人有慢性便秘 身體虛弱瘦小 皮膚指甲沒光澤 嘴巴乾 總覺得無法解渴 舌乾 脈細

<潤腸丸>

★ *病人胸中煩躁有熱感 口渴想喝冷水 面紅 嘴唇有生瘡潰瘍 尿痛 尿少 尿黃 還有血尿 舌紅 脈數

<導赤散>

*寒熱互結在中焦

<半夏瀉心湯>

*水熱互結在下焦

<豬苓湯>

*瘀熱互結在下焦

<桃核承氣湯>

*外感風寒 內停水濕

<五苓散>

*外感風寒 內傷濕滯

<藿香正氣散>

*外感風寒 鬱而化熱

<柴葛解肌湯>

*病人患有急性前列腺炎

<八正散>

★ *病人有咳嗽，痰中有血絲，說話有喘息聲，喉嚨乾痛，手足心熱，盜汗，舌紅少苔，脈細數

<百合固金湯>

*病人有打嗝、噁心、嘔吐 呼吸氣短 喉嚨乾燥不舒服 嘴巴乾，舌紅乾少苔 脈虛數

<麥門冬湯>

*病人惡寒伴有高熱 無汗 頭頸痛 肢體疼痛沉重 胸悶 鼻塞 咳嗽有痰 舌苔白膩 脈浮數而重取無力

<人參敗毒散>

★*病人惡寒發熱 頭脹痛 胸部悶痛 腸鳴腹痛 腹瀉 沒有食慾 反胃嘔吐 舌苔白膩 脈濡緩

<藿香正氣散>

*病人有腹痛、腹瀉 腹瀉有膿血便 裡急後重 肛門周圍有灼熱感 口渴 舌紅 苔黃 脈弦數

<白頭翁湯>

*病人口渴嚴重 喉嚨乾 情緒煩躁不安 眼睛紅痛 流鼻血 尿時疼痛 淋漓不暢 偶有血尿 舌紅苔黃 脈滑數

尿痛+流鼻血->八正散

<八正散>

★*病人關節疼痛，遇寒加重，遇熱減輕，四肢沉重有麻木感，舌苔白厚，脈遲

<獨痹湯>

风寒湿痹

*病人有間歇性的腹部**痙攣**疼痛，喜溫，喜按壓，面色差，食慾降低，舌淡苔白，脈弦細而遲緩

<小建中湯> 腹部痙攣+喜溫喜按->小建中湯

*病人手腳冰冷而且怕冷，嗜睡而且蜷臥，甚至於一直昏睡，嘔吐，腹瀉有不消化食物，口不渴，舌淡，脈沉細

<四逆湯>

★*病人常有腹痛 腹痛遇寒加重 小便不利 四肢沉重無力而痛 腹瀉 頭暈 心悸 咳嗽 嘔吐 舌淡胖有齒痕 脈沉細無力

<真武湯>

★*病人先有惡寒發熱交替出現的症狀 服西藥後腹瀉嚴重 他現在覺得上腹部脹滿而緊 不覺得痛 乾嘔 腸鳴腹瀉 沒有食慾 舌苔薄膩 脈弦數

<半夏瀉心湯>

上腹部脹滿不通+上吐下瀉+苔薄黃膩+脈弦數->半夏瀉心湯

上吐下瀉+舌苔白膩->平胃散

*在理血劑中 哪個方劑孕婦可以使用? 上吐下瀉+舌苔白膩+惡寒發熱->藿香正氣散

<溫經湯> 第二選: 桂枝茯苓丸 (有血瘀才能用)

★*病人頭昏、眩暈、耳鳴，下背部與腳痠軟無力，遺精，夜晚盜汗，嘴巴、喉嚨乾渴，舌紅剝落苔，脈細數 沒有眼花，用左歸丸

<左歸丸>

*病人肥胖 常覺得眩暈 怕冷 自汗出 喜歡蜷臥 四肢虛弱無力 長期腹瀉 而且都在早晨發生 腹瀉都是不消化食物 **腹部墜脹** 陽萎 下背痛 脈洪虛

<四神丸+補中益氣湯>

*病人有**冠心病心絞痛**

<血府逐瘀湯>

*病人有**風濕性心臟病**

<血府逐瘀湯>

*病人患有**肺腎氣虛**

麥冬，五味子 斂氣助腎納氣，最好是人參蛤蚧散，但是不考，所以用四君子湯+生脈散

<四君子湯+生脈散>

★*病人心悸 失眠 急躁易怒 情緒煩躁不安 頭部胸部與脅肋疼痛 有固定的痛點 而且呈刺痛 舌暗紅有瘀斑

<血府逐瘀湯>

- ★ *女病人有急性下腹部痛 腹部按之有腫塊 尿失禁 夜晚發熱 情緒不安 胡言亂語 口渴 脈沉實
下腹痛+尿失禁->桃核承氣湯
 <桃核承氣湯>
- *女病人產後惡露不下，陰道持續有出血伴有大量血塊，下腹部冷痛，舌淡而紫，脈沉細澀
产后恶露不下：生化湯
 <生化湯>
- ★ *病人咳嗽 氣喘 痰多如水樣 胸悶 呼吸短促乏力 下背部痠痛無力 疲倦 下肢水腫 舌苔白滑
上实：咳嗽痰多，下虚：肾阳虚下背痛-> 苏子降气湯
 <蘇子降氣湯>
- * 病人咳嗽、氣喘，痰多而黃，呼吸費力，惡寒發熱，無汗，舌苔黃膩，脈滑數
★★★ 此处问题不一样：感冒+水样痰+弦脉->杏苏散
 <清氣化痰丸>
- *病人瘡瘍潰爛久不收口
 <十全大補湯>
- *病人與男朋友吵架後 約了朋友在餐廳吃飯 飯後覺得胸部 腹部有脹滿感 脅肋有固定疼痛 噯逆 反胃想吐 還有輕微咳嗽有白痰 舌正常
 <越鞠丸>
- *病人有慢性下腰痛 下肢軟弱無力且有寒冷感 尿多 下腹部緊 舌淡胖 苔濕
 <金匱腎氣丸>
- *愛滋病陽性的病人 疲倦乏力 腹瀉 沒有食慾 體重減輕 不明原因咳嗽 盜汗 舌淡而乾 脈虛細
脾肺气虚+阴虚
 <四君子湯+生脈散>
- *病人長期月經提前 月經量多色淡 經期長 疲倦乏力 眩暈 舌淡
 <歸脾湯>
- *女病人月經量多 月經淋漓不盡 血色淡而清稀無血塊 下背部痠軟無力 面色暗 舌淡 脈細弱
 <膠艾湯>
- *氣虛自汗的治療方劑
 <玉屏風散>
- ★ *陰虛盜汗的治療方劑
 <當歸六黃湯>
- * 女病人經常性有帶下 色白或淡黃 質地稀薄 無臭味 總是覺得疲倦想睡覺 腹瀉 舌淡 脈濡弱
脾虚寒湿带下
 <完帶湯>
- ★ * 病人長期服用安眠藥，總是心悸、失眠，煩躁焦慮不安，胸部有熱感，口舌生瘡，舌紅苔黃乾，脈細數
 <黃連阿膠湯>
- ★ * 病人睡眠不安，有時還會夜晚出汗，精神恍惚，常感到非常憂鬱與哭泣，無法控制自己的情緒，經常哈欠連連，舌紅苔少
 <甘麥大棗湯>
- *木不養心的代表方劑
 <酸棗仁湯>
- *治療憂鬱症的方劑

<甘麥大棗湯 血府逐瘀湯> 氣滯血瘀引起的忧郁症：血府逐瘀湯

*病人頭暈眼花 反胃嘔吐 失眠 心悸 痰多胸悶 口苦 舌苔黃膩 脈弦數

<溫膽湯> 心悸沈眠痰多：溫胆湯

*病人頭痛 眩暈眼花 胸悶 反胃嘔吐 痰多 舌苔白膩 脈弦滑

<半夏白朮天麻湯> 眼花痰多白膩苔->半夏白朮天麻湯

* 病人咳嗽氣喘，痰黃稠難以咳出，胸膈脹悶，噁心想吐，舌紅苔黃膩，脈滑數

<清氣化痰丸> 咳喘+痰黃+苔黃膩->清氣化痰丸

*治療梅尼爾氏綜合症的代表方劑

<半夏白朮天麻湯>

*病人患有甲狀腺功能減退症

<金匱腎氣丸>

*治療膽囊炎的代表方劑

<大承氣湯 保和丸>

*病人對食物反感 沒有食慾 腹脹 反胃 噁逆 打嗝有腐臭味 有時腹瀉 舌苔黃膩 脈滑

<保和丸>

9. 些出下列方劑的加減藥物

★ 桂枝湯：有腹痛時 胸悶 咳嗽 氣喘
<白芍加倍> <去白芍> <+厚朴 杏仁>

★ 桑菊飲：有眼睛紅痛 流眼淚
<+蒺藜 決明子 夏枯草> 白蒺藜 決明子 平肝息風 夏枯草 清熱瀉火藥

★ 柴葛解肌湯：頭痛輕 沒有表證的症狀時
<去羌活 白芷> 白芷辛溫解表
白虎湯：風濕熱關節痛 舌紅苔膩時 ★ 口渴 疲倦 脈大無力時
<+桂枝> <+蒼朮> <+人參> 治療桂枝湯過服的副作用和之救之

龍膽瀉肝湯：肝火犯肺造成的咳嗽咳血

<+牡丹皮 側柏葉> 牡丹皮清熱涼血 側柏葉止血藥

麻子仁丸：痔瘡出血時

<+地榆 槐花>

四逆散：有咳嗽時

<+五味子 乾薑>

逍遙散：煩躁易怒 心悸短氣 尿色深（熱象出現） 血虛嚴重時

<+牡丹皮 山梔子（加味逍遙散）> <+熟地>

★ 五皮散：嚴重腹脹時 有脾虛症狀時
<+萊菔子 厚朴> <+白朮 黨參>

平胃散：寒濕嚴重有寒冷疼痛時

<+肉桂 乾薑>

真武湯：心悸 氣短 咳嗽 有很多水樣痰

<+細辛 五味子>

理中丸：陽虛出血時

<將乾薑換成炮薑 再加上黃耆 當歸 阿膠>

四物湯：血虛子宮有寒時

<+艾葉 香附>

歸脾湯：有上肢麻痺時

月經改變而量多不止時

<+羌活 川芎>

補中益氣湯：有腹痛時

<+五味子 山茱萸> 五味子/山茱萸收澀藥

習慣性流產

<炙甘草加量 再加白芍>

<+杜仲 菟絲子>

六味地黃丸：視力減低 畏光 眼睛痛

<加枸杞子 菊花→杞菊地黃丸>

六味地黃丸：咳嗽 咳血 夜晚出汗

<+麥門冬 五味子→麥味地黃丸>

★ 六味地黃丸：虛火上炎 骨蒸潮熱 口乾 尺脈大

<+知母 黃柏→知柏地黃>

★ 六味地黃丸：糖尿病而有口渴的症狀時

<去澤瀉 + 至少 30g 的天花粉>

越鞠丸：血瘀明顯時

★ 濕明顯時

<+桃仁 紅花>

<+厚朴 茯苓>

桃核承氣湯：有跌打損傷而無法排便時

<+赤芍 三七>

★ 小柴胡湯：陰血嚴重虧虛時

<不用柴胡 改用夏枯草>

★ 血府逐瘀湯：病人現在有出血時 第一選：不用本方；第二選：桃仁紅花川芎減半

<君藥：桃仁 紅花 川芎減半> 或禁用本方

生化湯：嚴重下腹部冷痛時

<+肉桂>

膠艾湯：胎動不安時

脾不統血時

<+乾薑>

<與歸脾湯合用>

溫經湯：氣滯嚴重時

<+香附 烏藥>

★ 玉屏風散：有慢性鼻炎 鼻過敏的症狀時

<+蒼耳子 辛夷花 白芷>

★ 固經丸：月經出血多而嚴重時

<+地榆 仙鶴草> 地榆/仙鶴草止血藥

酸棗仁湯：心悸 睡覺多夢 醒來害怕 舌淡

<+黨參 龍骨> 心胆氣虛

★ 酸棗仁湯：夜晚出汗多

<+牡蠣 五味子>

★ 甘麥大棗湯：有輕微精神分裂症時

<+桂枝 龍骨 牡蠣>

保和丸：腹部脹氣嚴重時

便秘時

<+枳實 厚朴>

<+大黃 檳榔>

吳茱萸湯：早上噁心或嘔吐嚴重時

<+半夏 砂仁>

砂仁芳香化濕藥

★ 生脈散: 有冠狀動脈硬化時

<+炙甘草 丹參 紅花 赤芍>

赤芍活血祛瘀