## 加州州考模擬試題

- 1. 病人來診所時說自己是愛滋病的病人,但是現在沒有任何症狀與不適,此時你該如何處理最適當?
  - A. 繼續治療病人,並報告給相關衛生主管機關
  - B. 將病人轉診給西醫
  - C. 拒絕治療病人,讓病人小心感染其他人
  - D.要求病人先簽署免責證明書後才給予治療
- 2. 病人現在有嚴重耳鳴,最佳的治療耳穴為何?
  - A. 三角窩外上角 B. 對耳屏内側面 C. 對耳輪下腳的末端 D. 對耳屏的尖端
- 3. 關於氣會穴的定位與主治,下列何者正確?
  - A. 前正中線上, 肚臍上4寸。可以治療胸悶、胸痛、氣喘、疲倦乏力
  - B. 在胸前壁的外上方,平第一肋間隙,距前正中線 6 寸。可以治療咳嗽、氣喘、胸痛、胸悶
  - C. 前正中線上,平第四肋間隙,兩乳頭連線之中點。可以治療胸痛、胸悶、乳腺炎、乳少
  - D. 在腹正中線上,臍上6寸。可以治療心悸、胸痛、胸悶、乳房脹痛
- 4. 下列穴位何者可以治療水腫?
  - A. 在腹正中線上, 臍上 2寸 B. 在腹正中線上, 臍下 2寸
  - C. 在腹正中線上, 臍下1寸 D. 在腹正中線上, 臍上1寸
- 5. 病人正在服用理中丸,他現在腹瀉緩解,而且沒有腹痛,只是覺得比較疲倦,此時應該如何加減?
  - A. 將乾薑換成茯苓 B. 將人參的劑量加倍
  - C. 加上黃耆、山藥 D. 加上蒼朮、厚樸
- 6. 陽維脈與陽蹺脈會交會於下列何處?
  - A. 巔頂部位的百會 B. 後枕部位的風池 C. 目內眥的睛明 D. 鼻翼旁的迎香
- 7. 下列何者屬於足太陰經的絡穴?
  - A. 足大趾第一跖趾關節後方, 赤白肉際凹陷處
  - B. 橈骨莖突上方,腕横紋上 1 寸 5 分,肱橈肌與拇長展肌肌腱之間
  - C. 第一跖骨基底前下緣凹陷處,赤白肉際
  - D. 內踝後下方,當跟腱附著部的內側前方凹陷處
- 8. 位於:第一跖骨基底前下緣凹陷處,赤白肉際。這個穴位的正確針刺操作為何? A. 斜刺 0.3-0.5 寸 B. 直刺 0.3-0.5 寸 C. 斜刺 0.5-0.8 寸 D. 直刺 0.5-0.8 寸
- 9. 衝陽、陽池、大陵、太衝都是屬於何種特定穴?
  - A. 原穴 B. 絡穴 C. 輸穴 D. 郄穴
- 10. 位於側腰部,第十二肋骨游離端下緣。這是屬於下列何種特定穴?
  - A. 足太陰募穴 B. 足少陰募穴 C. 足少陽經與帶脈的交會穴 D. 腑會穴
- 11. 在消風散中,哪一個藥物可以將熱由尿排出?
  - A. 澤瀉 B. 苦參 C. 木通 D. 蒼朮
- 12. 使用隔鹽灸最適合治療下列哪些病證?
  - A. 陰虛有熱證 B. 亡陰證 C. 陽實證 D. 亡陽證

- 13. 病人正在服用理中丸,他現在腹瀉緩解,而且沒有腹痛,只是覺得比較疲倦, 此時應該如何處理最適當?
  - A. 改用四君子湯 B. 改用小建中湯 C. 改用補中益氣湯 D. 改用四逆湯
- 14. 陽維脈與陽蹺脈會交會於下列何處?
  - A. 耳朵前部的聽宮 B. 後背肩胛骨附近的臑俞
  - C. 頸部前方的廉泉 D. 後背部第七頸椎下的大椎
- 15. 如果病人有下列哪些情况時不可以服用理中为?
  - A. 脾氣虛有痰濕或食積時 B. 外鳳風寒或體虛有寒時
  - C. 外感有熱或陰虛時 D. 氣虛引起消化道潰瘍出血時
- 16. 關於紅斑性狼瘡症狀的敘述,下列何者正確?
  - A. 面色潮紅,皮膚溫暖濕潤,疲倦乏力,心悸失眠,手指有不自主的細震顫
  - B. 面色蒼白,四肢冰冷乏力,下肢關節僵硬水腫,脫髮,動作緩慢
  - C. 面容呆滯,表情僵硬,雙手會有間歇性的震顫,呈現齒輪性的僵硬
  - D. 面部鼻子附近有紅斑,下肢關節疼痛僵硬,下肢水腫,肢體末端有雷諾氏症
- 17. 病人來診時有輕微頭痛,惡寒無汗,咳嗽有水樣痰,鼻塞,咽喉乾燥,舌苔白乾,脈弦。最佳的治療方劑為何?
  - A. 杏蘇散 B. 貝母瓜蔞散 C. 桑菊飲 D. 小柴胡湯
- 18. 關於疾病侵入人體的順序,下列敘述何者正確?
  - A. 皮部-經脈-絡脈-臟/腑 B. 皮部-絡脈-經脈-臟/腑
  - C. 絡脈-經脈-皮部-臟-腑 D. 皮部-絡脈-經脈-臟-腑
- 19. 關於拔罐的治療作用,下列敘述何者正確?
  - A. 溫陽補虛, 祛濕除寒, 行氣活血, 消腫止痛
  - B. 溫經通絡, 祛濕除寒, 益氣補血, 消腫止痛
  - C. 溫經通絡, 祛濕除寒, 行氣活血, 消腫止痛
  - D. 溫經通絡, 祛濕清熱, 行氣補血, 消腫止痛
- 20. 以下哪一個穴位應該要直刺 0.2-0.3 寸?
  - A. 目正視,瞳孔直下,當眶下緣與眼球之間 B. 口角外側,上直瞳孔
  - C. 瞳孔直下,平鼻翼下緣處,當鼻唇溝外側 D. 瞳孔直下,當眶下孔凹陷中
- 21. 針灸師用足臨泣來治療病人的偏頭痛,還可以配上對側的哪個穴位效果更佳?
  - A. 外關 B. 內關 C. 后溪 D. 合谷
- 22. 病人全身癢,以下哪一個治療穴位有效?
  - A. 屈膝,髕韌帶兩側凹陷中 B. 髕骨内上緣上 3 寸
  - C. 屈肘, 當尺骨鷹嘴的尖端 D. 髕骨上緣正中凹陷處
- 23. 病人經西醫診斷為帶狀疱疹,在胸腹部的皮膚疼痛灼熱有小水泡,針灸治療時可以在局部點刺出血,還可以加上以下哪一些治療穴位?
  - A. 曲池、委中、合谷、三陰交、血海 B. 曲池、委中、合谷、曲澤、血海
  - C. 曲池、委中、太衝、陽陵泉、血海 D. 郄門、委中、合谷、身柱、靈台
- 24. 位於第四腰椎棘突下,約與髂嵴相平。此穴位治療以下哪種疾病最佳?
  - A. 寒濕腰痛 B. 濕熱腰痛 C. 跌打損傷腰痛 D. 腎虛腰痛
- 25. 病人在下列哪一種情況之下不可以服用山豆根?
  - A. 脾胃虛寒 B. 脾胃濕熱 C. 腸胃實熱 D. 肝腎陰虛有虛熱

- 26. 病人有嚴重的關節炎,關節紅腫疼痛,此時應選擇何種治療方法最適當?
  - A. 少針多灸,深刺久留針,再加上皮内針 B. 針刺瀉法,再加上皮膚針扣刺
  - C. 多針少灸,針刺平補平瀉,兼用拔罐法 D. 針刺補法,再加上隔鹽灸
- 27. 病人由於多巴胺缺乏而引起帕金森氏症,此病人最可能出現以下哪一組症狀?
  - A. 神情呆滯冷淡,經常忘記事情,無法記住孫子的名字,常覺得有人要害他, 不能自己吃飯、穿衣服、大小便失禁、容易跌倒
  - B. 面色蒼白,精神萎靡不振,嗜睡,血糖偏低,脖子、胸部、大腿內側皮膚顏 色變黑,下肢輕微水腫,走路很慢,需要他人攙扶
  - C. 面容呆滯僵硬,手肘與腕部彎曲,雙手有間歇性震顫,呈現齒輪性僵硬,休 息時明顯,動作緩慢,身體前傾伴有彎腰屈背的姿勢
  - D. 面容呆滯冷淡,手肘與腕部彎曲,雙手有持續性震顫,呈現齒輪性僵硬,活 動時明顯,動作快速,身體前傾伴有彎腰屈背的姿勢,容易跌倒
- 28. 以下哪一個耳穴降低血壓的作用明顯?
  - A. 耳屏上部隆起的尖端 B. 對耳輪下腳的末端

  - C. 屏間切迹下方 D. 三角窩的外上角
- 29. 病人患有急性痢疾,腹痛,裡急後重,大便黃臭夾雜膿血,肛門灼熱,尿少色 黃,心煩口渴,舌苔黃膩,脈滑數。下列治療穴位何者最佳?
  - A. 天樞、上巨虛、陰陵泉、曲池、合谷
  - B. 天樞、上巨虛、陰陵泉、中脘、氣海
  - C. 內關、足三里、天樞、上巨虛、中脘
  - D. 脾俞、關元、足三里、天樞、上巨虛
- 30. 病人現在有便秘,每 3-5 天才能大便一次,大便像小石難以排出,脅肋、腹部 脹滿疼痛,噯氣頻作,食欲變差,舌苔白,脈弦。下列治療穴位何者最佳?
  - A. 大腸俞、天樞、照海、支溝、曲池、合谷
  - B. 中脘、太衝、上巨虚、天樞、照海、支溝
  - C. 脾俞、足三里、大腸俞、天樞、照海、支溝
  - D. 氣海、上巨虚、天樞、照海、支溝、神闕
- 31. 病人現在有眩量、耳鳴,聽力下降,針灸師決定要以頭皮針來作治療,下列何 者最適當?
  - A. 頂骨結節後下 2 公分,平行正中線長 3 公分的直線
  - B. 耳尖直上 1.5 公分,向後平移 4 公分的直線
  - C. 耳尖直上 1.5 公分, 前後各引 2 公分的水平線, 共計 4 公分
  - D. 在胃區與前後正中線之間,以髮際為中點向前後作4公分長的直線
- 32. 有一位老年男病人長期胃痛、胃潰瘍,按壓疼痛加重,遇熱加重,食後加重, 這個病人最有可能出現以下哪一種舌象?
  - A. 舌中央紅,舌邊紫,苔黃
- B. 舌體瘦小,舌中央紅,苔剝落
- C. 舌紫, 舌中央與舌邊紅紫, 苔薄白 D. 舌紫, 舌中央紫, 苔薄白
- 33. 病人長期胃脘痛,上腹部灼熱疼痛,沒有食欲,下午發熱,口渴不想喝水,最 有可能出現以下哪一種舌象?
  - A. 舌紅, 舌中央更紅, 舌中央剝落苔 B. 舌淡, 舌邊有齒印, 苔白而濕潤
  - C. 舌淡胖, 舌邊腫, 舌苔濕潤 D. 舌紫, 舌中央紫, 苔薄白

- 34. 女病人患有更年期綜合證,經常有潮熱盜汗,眩暈,耳鳴,健忘,夜晚覺得口 乾、口渴,腰酸背痛,骨頭痛,尿少。此病人最有可能出現以下哪一種舌象?
  - A. 舌紅, 舌腫胖, 舌苔薄白而濕潤 B. 舌紅, 舌頭短縮, 舌苔乾而剝落
  - C. 舌淡紅,舌頭瘦小,舌苔薄白 D. 舌淡,舌頭長,舌苔濕而濕潤
- 35. 位於內踝後下方,當跟腱附著部的內側前方凹陷處。這個穴位可以治療以下哪 一些病證?
  - A. 月經不調、痛經、小便不利、目昏花 B. 腰脊強痛、便秘、帶下、癲癇
  - C. 痴呆、足跟痛、便秘、尿潴留、腰脊痛 D. 便秘、尿潴留、月經不調、失眠
- 36. 一位老人在西醫的要求做腳跟對腳尖的站立與步行測試,這是以下哪種疾病的 檢測方法?
  - A. 帕金森氏症 B. 多發性硬化症 C. 老年痴呆症 D. 小腦共濟失調
- 37. 以下哪一條經脈有治療黃疸的功能?
  - A. 足太陰經 B. 足少陰經 C.足厥陰經 D. 手陽明經
- 38. 病人假日時與朋友去海邊沙灘玩水,還在沙灘上躺了一整個下午,回家後有嚴 重的腰痛,這個病人最有可能是以下哪一個致病因素引起的?
  - A. 風濕 B. 寒濕 C. 氣滯血瘀 D. 腎虚
- 39. 有一位懷孕的婦女到診所來看診,她總是噁心、嘔吐,沒有食欲,疲倦乏力, 除了必要的治療之外,應該要如何來調理身體?
  - A. 多吃大棗紅糖水, 少吃蛋白質, 多吃穀類食物, 做有氧舞蹈
  - B. 多喝檸檬蜂蜜水,多攝取高熱量與高蛋白食物,做有氧舞蹈
  - C. 多吃生薑, 少吃辛辣與油膩礙胃的食物, 做氣功
  - D. 多喝米粥,少食高熱量食物,多食生菜沙拉,做氣功
- 40. 病人長期在週末就有頭痛的症狀,此病人做有可能的病變臟腑為何?
  - A. 心 B. 膽 C. 胃 D. 肝
- 41. 當病人出現以下哪一種病證時不可以使用人參敗毒散來做治療?
  - A. 單純外感風熱 B. 外感風寒濕
- - C. 體虛又有皮膚濕疹 D. 素體陽虛又有外感風熱
- 42. 病人經西醫診斷為寄生蟲感染,在他的身體檢查報告上最有可能是以下哪一個 指標會出現異常?
  - A. 嗜鹼性粒細胞 B. 嗜酸性粒細胞 C. 中性粒細胞 D. 天然殺手細胞
- 43. 在臨床上判斷為濕痰,最有可能的臨床表現為何?
  - A. 痰多而濃稠,痰色黃而黏膩,舌色紅而腫胖,脈滑數
  - B. 痰多而清稀,痰色白如水樣,舌色正常,舌邊腫,苔白,脈濡細
  - C. 痰多色白清稀易咳出, 舌色淡胖, 舌苔白膩, 脈滑
  - D. 痰少在胸部深處不易咳出,舌乾而稍紅,苔少,脈細數
- 44. 西藥 Prozac 可以治療憂鬱症,這個藥物的作用機理為何?
  - A. 增加多巴胺的吸收 B. 減少乙酰膽鹼輔脢 A 的吸收
  - C. 促進血清素的吸收 D. 抑制血清素的吸收
- 45. 病人懷疑自己患有甲狀腺疾病,可以做何者血液檢查來幫助診斷?
  - A. 血清 T3、T4 的檢查
- B. GPT 與 GOT 的檢查
- C. 總膽固醇脂與 HDL、LDL 的檢查 D. Cr 與 BUN 的檢查

- 46. 有一中年婦女肚子側面的腹腔内有腫塊,固定不移,平常不覺得疼痛,按壓時稍微柔軟。她最有可能的是以下哪一種問題?
  - A. 血管瘤 B. 脂肪瘤 C. 惡性腫瘤 D. 肝硬化
- 47. 病人現在有嚴重便秘,沒有食欲,腹部脹痛嚴重,腹瀉,嘔吐,腸鳴音亢進,呼吸略為急促。這個病人最有可能是以下哪一種問題?
  - A. 急性闌尾炎 B. 幽門梗阻 C. 急性腸梗阻 D. 腸道易激綜合症
- 48. 病人如果出現長舌,與下列哪一種病因關係最密切?
  - A. 血虚 B. 寒證 C. 水濕停聚 D. 熱證
- 49. 以下哪一個耳穴有降低血壓的作用?
  - A. 在對耳輪上、下腳的耳廓背面呈 Y 型的凹溝中
  - B. 耳背、乳突交界的根部,與耳輪腳同水平
  - C. 耳垂部眼穴的後上方
  - D. 耳甲腔底部, 屏間切迹内
- 50. 有一小男孩現在淋巴腫大,面頰紅腫疼痛,吞咽困難,高熱煩躁,口乾便秘, 小便黃,脈浮數。以下哪一組治療配穴最適當?
  - A. 少商、合谷、天容、内庭、列缺、魚際
  - B. 合谷、曲池、外關、翳風、頰車、大椎
  - C. 合谷、下關、頰車、大迎、地倉、行間
  - D. 上星、合谷、内庭、迎香、風池、尺澤
- 51. 病人到診所時,針灸師檢查發現病人的舌頭腫脹滿口,這個病人最有可能的病因為何?
  - A. 氣血虛衰 B. 肝火亢盛 C. 脾胃濕熱 D. 胃陰虛有熱
- 52. 中年女病人長期患有經前期綜合症,總在月經前 3-5 天所有的症狀更嚴重。平常總會失眠,心情煩躁易怒,頭痛嚴重,脅肋脹悶疼痛,□渴,□苦,便秘大便乾結,舌紅,舌苔黃。以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 逍遙散加上牡丹皮、梔子 B. 大承氣湯 C. 溫膽湯 D. 龍膽瀉肝湯
- 53. 病人長期服用抗生素來治療慢性支氣管肺炎,他的哮喘頻繁發作,經常到醫院接受呼吸治療,他現在有黃綠色的鼻涕和痰,這個病人最有可能出現以下哪一種舌象?
  - A. 舌紅而短小瘦薄 B. 舌紅而腫脹滿口 C. 舌淡而腫胖濕潤 D. 舌淡乾而短縮
- 54. 位於口角外側,上直瞳孔。這個穴位有哪些經脈在此交會?
  - A. 足陽明經、手陽明經、督脈 B. 足陽明經、手陽明經、陽蹺脈
  - C. 足陽明經、足少陽經、陽維脈 D. 足少陽經、陽維脈、陽蹺脈
- 55. 病人體型肥胖,常覺得頭暈目眩,容易累,稍微活動就氣喘吁吁。最近正運用 高蛋白質減肥法(生酮飲食)來降低體重,現在他的頭暈加重,皮膚搔癢,想 吃甜食,此人現在最有可能的問題為何?
  - A. 甲狀腺功能減退症 B. 低血糖症 C. 糖尿病 D. 腎上腺皮質功能亢進症
- 56. 病人右側鼻塞,面部右邊麻木,右嘴角稍微下垂,前幾天還有惡寒發熱,頸部 僵硬疼痛,伴有輕微耳鳴,此人現在最有可能的問題為何?
  - A. 三叉神經痛急性發作 B. 缺血性中風
  - C. 蛛網膜下腔出血 D. 顏面神經麻痺

- 57. 病人長期有毒癮,現在想要戒毒,以下治療耳穴哪一組療效最佳?
  - A. 神門、皮質下、胃、口、下腳端 B. 神門、心、腎上腺、下腳溝、角上
  - C. 三角凹陷、耳迷跟、屏間、肝、腎 D. 胃、口、下腳端、肺、肝
- 58. 病人長期患有甲狀腺功能減退症,常覺得疲倦乏力,嗜睡,腳踝水腫,此人的實驗室檢查報告最有可能出現何種情況?
  - A. TSH下降 B. TSH上升 C. T3、T4上升 D. 總膽固醇脂下降
- 59. 病人現在有黃疸,以下哪一個穴位具有治療的作用?
  - A. 腕橫紋尺側端,尺側腕屈肌腱的橈側凹陷中
  - B. 腕背横紋尺側端,當尺骨莖突與三角骨的凹陷中
  - C. 手背尺側,第五掌骨基底與鉤骨之間的凹陷部
  - D. 腕橫紋上 2 寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
- 60. 以下哪一個穴位的針刺操作為直刺 0.5-0.8 寸?
  - A. 外踝高點上 4 寸,腓骨前緣稍前方,趾長伸肌與腓骨短肌之間
  - B. 外踝高點上3寸,當腓骨前緣
  - C. 第4跖趾關節的後方,小趾伸肌腱的外側凹陷處
  - D. 外踝前上方,趾長伸肌腱外側凹陷中
- 61. 以下哪一個穴位的針刺操作為直刺 0.5-0.8 寸?
  - A. 手厥陰經的絡穴 B. 手少陰經的原穴
  - C. 手厥陰經的郄穴 D. 手少陰經的經穴
- 62. 病人經診斷為單純性甲狀腺腫大,以下哪一個治療方案最適當?
  - A. 半夏+足三里 B. 海藻+扶突 C. 白朮+内關 D. 藿香+膻中
- 63. 甘味藥物會進入以下哪二個臟腑?
  - A. 肝、膽 B. 肺、大腸 C. 脾、胃 D. 心、小腸
- 64. 酸味藥物較易進入人體以下的哪一個組織?
  - A. 肌肉 B. 血液 C. 骨骼 D. 神經
- 65. 以下哪一個定位是屬於手太陰經的募穴?
  - A. 在胸前壁的外上方,平第一肋間隙,距前正中線6寸
  - B. 在腹正中線上, 臍上 6寸
  - C. 在側腹部,第十一肋游離端下際
  - D. 前正中線,平第四肋間隙處,兩乳頭連線的中點
- 66. 病人因為心肌梗塞而住院治療,這個病人最有可能具備以下哪一些致病因素?
  - A. HDL 下降, LDL 下降, 高血糖, 工作壓力大
  - B. HDL 下降, LDL 上升, 高血壓, 久坐工作者
  - C. HDL 上升, LDL 下降, 長期抽菸, 高熱量飲食者
  - D. HDL 上升, LDL 上升, 有家族遺傳史, 體型肥胖者
- 67. 病人在一次車禍中受傷,現在頸部僵硬疼痛,痛及肩膀與肩胛骨周圍,以下哪一個治療穴位最適當?
  - A. 在膕窩橫紋的中央,當股二頭肌腱與半腱肌腱之間
  - B. 腓骨小頭前下方凹陷中
  - C. 陽谷與小海的連線上,腕背橫紋上5寸
  - D. 外踝高點上3寸,當腓骨前緣

- 68. 以下哪一個穴位是足太陽經的募穴?
  - A. 在腹正中線上, 臍上4寸 B. 在腹正中線上, 臍下2寸
  - C. 在腹正中線上, 臍下 3寸 D. 在腹正中線上, 臍下 4寸
- 69. 關於六腑下合穴的位置與所屬相對應的經脈,由近心端到遠心端的排列順序以下哪一個是正確的?
  - A. 足少陽經-足陽明經-手陽明經-手太陽經
  - B. 足少陽經-手陽明經-手太陽經-足陽明經
  - C. 足陽明經-足少陽經-手陽明經-手太陽經
  - D. 手陽明經一手太陽經一足少陽經一足陽明經
- 70. 當心跳每分鐘超過多少次,可以定義為心動過速?
  - A. 90 次/分鐘 B. 100 次/分鐘 C. 120 次/分鐘 D. 80 次/分鐘
- 71. 針灸師因為違反規定而被撤銷執照,多久之後可以申請回復執照?
  - A. 一年 B. 二年 C. 三年 D. 四年
- 72. 病人在治療過程中流了很多血在診所的地板上,此時應該要如何處理最適當?
  - A. 用 1:100 的次氯酸鈉(漂白水)來清潔,再用清水沖洗
  - B. 用乾的紙巾先把血擦乾淨,再用肥皂水來沖洗
  - C. 用消毒用的酒精來清潔,再用紙巾擦乾淨
  - D. 用 1:10 次氯酸鈉 (漂白水)的清潔消毒
- 73. 病人有慢性疼痛,常在家使用大麻止痛。今天他因為關節炎去看針灸,他問針 灸師可以給他一些大麻來幫助止痛,而針灸師也有賣他大麻,此時針灸師與病 人會面對何種情況?
  - A. 針灸師有法律上的責任,可以被撤銷執照,而病人也有法律責任
  - B. 針灸師有法律上的責任,可以被撤銷執照,而病人沒有任何法律責任
  - C. 針灸師沒有法律上的責任,病人也沒有任何法律責任
  - D. 針灸師沒有法律上的責任,只有病人需要擔負法律責任
- 74. 你用拔罐治療病人的背痛,在肺俞附近起了一個大水泡,此時你應該如何處理 最適當?
  - A. 將水泡刺破後, 塗抹燙傷藥膏, 以紗布覆蓋在水泡部位
  - B. 將水泡刺破後,以無菌紗布覆蓋在水泡部位
  - C. 將病人轉診給西醫
  - D. 不需要任何的處理,告訴病人自然會痊癒
- 75. 以下哪一個中藥具有引血、引熱下行的功效?
  - A. 獨活 B. 桔梗 C. 牛膝 D. 車前子
- 76. 有一位正在餵食母乳的婦女,你治療時以下哪一個中藥不應該使用?
  - A. 黄連 B. 丹參 C. 山渣 D. 大黄
- 77. 桑寄生用酒泡制可以增強以下哪些治療功效?
  - A. 可以增強祛風濕,止痺痛的功效 B. 可以增強藥物上行的功效
  - C. 可以增强入肝經與止痛的功效 D. 可以增强入腎與軟堅散結的功效
- 78. 病人到餐廳與朋友聚餐,在吃完飯後約2小時就出現了嚴重的腹痛、腹瀉,腹 瀉是水樣便,稍有低熱。此人最有可能的的致病病原體為何?
  - A. 沙門氏菌 B. 大腸桿菌 C. 志賀氏桿菌 D. 海洋弧菌

- 79. 隔薑灸可以使用的根本依據為何?
  - A. 陰虛 B. 陰實 C. 陽虛 D. 陽實
- 80. 病人到餐廳與朋友聚餐,吃完飯後一切都很正常,第二天出現了嚴重的腹痛、 腹瀉,稍有低熱。此人最有可能的的致病病原體為何?
  - A. 沙門氏菌 B. 幽門桿菌 C. 志賀氏桿菌 D. 隱孢子蟲
- 81. 有一位正在餵食母乳的婦女,治療時以下哪一個中藥不應該使用,以免造成乳 汁減少?
  - A. 麥芽 B. 神曲 C. 半夏 D. 陳皮
- 82. 針灸師治療患有 HIV 陽性病人,治療結束拔針時不小心將針刺病人的針深深的刺入自己的手臂,此時應該要如何處理最適當?
  - A. 立即用力將血擠出,再消毒上藥,如果傷口沒有發炎,則不需要看醫生
  - B. 立即去看西醫報告事故的經過,並開始服用抗愛滋病的藥物
  - C. 立即用酒精消毒, 並服用清熱解毒的中藥
  - D. 立即去看西醫報告事故的經過,並施打 B 型肝炎疫苗與服用抗生素
- 83. 針灸師要治療局背疼痛的病人,病人說喜歡拔罐,覺得效果很好,但是她明天晚上要參加晚宴,此時針灸師應該如何處理最適當?
  - A. 不需要特別向病人說明拔罐的副作用,即可以施行治療
  - B. 治療前先解釋拔罐治療對局背疼痛的功效後,即可以施行治療
  - C. 治療前先解釋拔罐治療對局背疼痛的副作用,經同意後才可以施行治療
  - D. 讓病人先接受針灸與按摩的治療,等下一次再施行拔罐治療
- 84. 一位懷孕的年輕婦女來診,她說有一位針灸師說她有中焦氣滯,她常覺得噁心 反胃,乾嘔,呃逆聲輕而柔,舌稍紅,脈虛數。以下哪一個治療方劑最適當? A. 吳茱萸湯 B. 蘇子降氣湯 C. 貝母瓜蔞散 D. 橘皮竹茹湯
- 85. 病人晚上開著窗戶睡覺,第二天早晨醒來脖子僵硬疼痛,頭痛,這是以下哪一條經脈的經氣受損?
  - A. 足太陽經 B. 足陽明經 C. 手少陽經 D. 手陽明經
- 86. 病人因為風寒引起的脖子僵硬疼痛,頭痛,以下哪一個治療穴位最適當? A. 曲池 B. 列缺 C. 陽陵泉 D. 外關
- 87. 針灸師用足臨泣來治療病人的偏頭痛,還可以配上以下哪個穴位效果更佳?
  - A. 內踝尖下方凹陷中
  - B. 微握拳, 尺側, 第五掌指關節後緣, 遠側掌橫紋頭赤白肉際
  - C. 在腕背横紋上 2 寸, 陽池與肘尖的連線上, 橈骨與尺骨之間
  - D. 橈骨莖突上方,腕横紋上1寸5分,肱橈肌與拇長展肌肌腱之間
- 88. 病人來診時說可能因為睡覺姿勢不良引起頸項僵硬疼痛,而且向肩臂部有放射痛,以下哪一個治療穴位最佳?
  - A. 手背, 腕横紋與掌指關節的中點, 第二、三掌骨及四、五掌骨之間
  - B. 在腕背側橫紋中,指總伸肌腱橈側的凹陷處,陽溪與陽池之間
  - C. 前臂掌面正中腕横紋至肘横紋的中點, 橈骨與尺骨之間
  - D. 手背,第二、三掌骨間,掌指關節後5分
- 89. 愛滋病的病人常出現慢性腹瀉,以下哪一種是最有可能致病的病原體?
  - A. 沙門氏菌 B. 幽門桿菌 C. 志賀氏桿菌 D. 大腸桿菌

- 90. 針灸師治療時引起病人輕微出血並沾染到治療區的檯面,此時應該要如何清潔處理最適當?
  - A. 先噴灑 Lysol後,靜置 5分鐘,然後再用乾淨紙巾擦拭
  - B. 先以 70%的酒精清潔消毒,然後再用乾淨紙巾擦拭
  - C. 先以雙氧水來清潔消毒,然後再用乾淨紙巾擦拭
  - D. 先以肥皂水來清潔消毒,然後再用乾淨紙巾擦拭
- 91. 一位女小提琴演奏家來診所治療頸局背痛,還說朋友告訴她拔罐的治療效果很好,要她一定要試試看。她說明天晚上有一場非常重要的大型音樂會,希望你可以緩解她的疼痛,讓她可以正常的演出。此時你應該要如何處理最適當?
  - A. 立即使用拔罐來治療病人以緩解疼痛
  - B. 請病人立即去看西醫,或去醫院急診
  - C. 不予以拔罐,等下次來治療時再以拔罐治療
  - D. 請病人自行服用止痛藥,表演結束後再以拔罐治療
- 92. 一中年男性常腰痛,而且膝蓋有風濕性關節炎,以下哪一組治療藥物最適當?
  - A. 續斷、杜仲、桑寄生 B. 羌活、獨活、秦艽
  - C. 牛膝、續斷、乳香 D. 杜仲、獨活、牛膝
- 93. 病人有皮膚黃,目黃,尿黃,可以採用以下哪一條經脈來做治療?
  - A 手太陽經 B. 手少陽經 C. 手陽明經 D. 手厥陰經
- 94. 試問 HIPPA 的立法最主要的目的為何?
  - A. 為了平衡病人與醫療人員之間的權利義務
  - B. 為了保護病人所提供的個人資訊與隱私
  - C. 為了規範醫療人員的行為準則,防止濫用各種醫療資源
  - D. 為了共同保護醫療人員與病人雙方的資訊,以防止第三方不當侵犯隱私權
- 95. 針灸師有以下哪一種行為,應視為不符合倫理道德的規範?
  - A. 治療病人後向病人所屬的保險公司申請保險給付
  - B. 治療病人之前先向病人收取自付額
  - C. 以非英文來書寫病例
  - D. 在治療前讓病人填寫知情同意書,不願意簽署者則可以選擇不予以治療
- 96. 一男病人自覺壓力大,血壓偏高,最近常出現偏頭痛,耳鳴,口乾,咽喉乾, 失眠多夢,煩躁易怒,夜晚盜汗,大便乾,舌邊紅,苔薄黃,脈弦。以下哪一 組治療穴位最適當?
  - A. 外關、足臨泣、行間、陽陵泉、肝俞 B. 照海、太溪、關元、腎俞、三陰交
  - C. 足三里、三陰交、腎俞、脾俞、太白 D. 風池、行間、肝俞、腎俞、太溪
- 97. 一年輕女病人到你的針灸診所來做治療,她需要針灸乳房和屁股附近的穴位, 此時你應該要如何處理最適當?
  - A. 在徵求病人的同意後將病人的衣服、褲子拉開到針刺穴位進行針刺
  - B. 在徵求病人的同意後,隔著衣服、褲子直接在針刺穴位進行針刺
  - C. 不必徵求病人的同意,隔著衣服、褲子直接在針刺穴位進行針刺
  - D. 不必徵求病人的同意,直接將病人的衣服、褲子拉開到針刺穴位進行針刺
- 98. 一位 18 個月大的小孩晚上不睡覺,稍有發熱,會哭鬧,最有可能的病因為何?
  - A. 脾胃氣虛 B. 食積 C. 胃熱 D. 蟲積

- 99. 有一對夫妻想要生小孩,但是這個先生常常覺得疲倦,想睡覺,頭暈,雙腳沉重,下腰部與腹股溝經常出汗,大腿內側有大片的濕疹,請問這個病人最有可能的病因為何?
  - A. 上焦有痰濕 B. 中焦氣虛兼有濕熱停聚 C. 下焦濕熱 D. 濕熱下注於膀胱
- 100. 有一個 5 歲的小女孩有過敏性哮喘,長期服用抗生素,最近又因為風寒感冒而來看診,這個病人最有可能出現的舌頭情況為何?
  - A. 長舌 B. 胖大舌 C. 齒痕舌 D. 短舌
- 101. 病人在體檢時測得血壓值為 128/88mmHg, 這是屬於以下哪一種情況?
  - A. 臨界高血壓 B. 正常血壓值 C. 一期高血壓 D. 二期高血壓
- 102. 病人在年度的健康檢查報告上說他患有一期高血壓,醫生並建議病人要開始服 用降血壓藥,請問病人最有可能出現以下哪一個血壓值?
  - A. 138/85mmHg B. 142/92mmHg C. 165/103mmHg D. 145/83mmHg
- 103. 以下哪一種營養素不足會引起原發性高血壓?
  - A. 維生素 C B. 維生素 B12 C. 維生素 D D. 維生素 E
- 104. 有一位中年人患有高血壓,他現在還有肌肉酸痛,你應該建議病人不要食用以下哪一種飲食物?
  - A. 檸檬汁 B. 葡萄柚汁 C. 綠茶 D. 咖啡
- 105. 哪一味中草藥服用過量會引起繼發性高血壓?
  - A. 甘草 B. 當歸 C. 杜仲 D. 大棗
- 106. 有一位懷孕 7 個月的婦女,西醫說她有妊娠高血壓,她躺著量血壓時是正常, 而坐著或站立時量血壓時血壓就升高,且以舒張壓升高為主,試問這是屬於以 下何種高血壓?
  - A. 原發性高血壓 B. 直立性高血壓 C. 腎源性高血壓 D. 肝源性高血壓
- 107. 病人的肩關節疼痛,你要檢測他的肩關節的活動角度,以下哪一項是屬於正常的檢測數據?
  - A. 屈曲 0~150 度,後伸 0~30 度,內收 0~110 度,外旋 0~90 度
  - B. 屈曲 0~180 度,後伸 0~30 度,内收 0~130 度,外旋 0~60 度
  - C. 屈曲 0~180 度,後伸 0~45 度,内收 0~130 度,外旋 0~90 度
  - D. 屈曲 0~150 度,後伸 0~45 度,內收 0~150 度,外旋 0~60 度
- 108. 病人有肘關節僵硬疼痛,疑似網球肘,首先你要檢測肘關節的活動角度是否正常,試問手肘最大的活動角度為多少?
  - A. 屈曲為 160 度, 向外延展為負 15 度
  - B. 屈曲為 180 度,向外延展為負 10 度
  - C. 屈曲為 120 度,向外延展為負 15 度
  - D. 屈曲為 135 度,向外延展為負 10 度
- 109. 病人現在服用西藥的鈣離子阻斷劑,這個病人最有可能的疾病為何?
  - A. 高血壓 B. 骨質疏鬆症 C. 高膽固醇 D. 甲狀腺功能亢進症
- 110. 一女性患者自從 5 年前離婚後開始出現口乾,眼睛乾燥,眼結膜紅腫,唾液腺腫大,吞嚥困難,全身關節疼痛,關節發炎,皮膚乾,有癢疹,此人現在最有可能患有以下哪一種疾病?
  - A. 紅斑性狼瘡 B. 乾燥綜合症 C. 更年期綜合症 D. 多囊性卵巢徵候群

- 111. 病人現在患有夜盲症,而且皮膚表皮有角化、粗糙,最有可能是以下哪一種營養物質缺乏引起的?
  - A. 維生素 D B. 維生素 E C. 維生素 A D. 維生素 B2
- 112. 有一位老先生到診所來,他有皮膚炎,舌炎,輕微的老年痴呆症,慢性腹瀉, 最有可能是以下哪一種營養物質缺乏引起的?
  - A. 維生素 B1 B. 維生素 B6 C. 維生素 B2 D. 維生素 B3
- 113. 以下哪一種維生素缺乏會引起周圍神經病變?
  - A. 維生素 B1 B. 維生素 K C. 維生素 B2 D. 維生素 B3
- 114. 以下哪一種維生素缺乏會引起周圍神經病變,造成四肢末端麻木?
  - A. 維生素 C B. 維生素 B12 C. 維生素 E D. 維生素 A
- 115. 病人經西醫診斷為惡性貧血,他還有胃潰瘍導致的內因子不足,此時應該要建議病人補充以下哪一種維生素?
  - A. 葉酸 B. 生物素 C. 維生素 B12 D. 維生素 B6
- 116. 關於正常成年人膝關節的活動角度,下列敘述何者是正確的?
  - A. 屈曲為 160 度, 過度延展為 0~15 度
  - B. 屈曲為 130 度,過度延展為 0~25 度
  - C. 屈曲為 160 度,過度延展為 0~30 度
  - D. 屈曲為 130 度,過度延展為 0~15 度
- 117. 醫生給病人做 Valgus Stress Test (膝蓋骨外翻應力測試)時呈現疼痛加重,這個病人最有可能是以下哪一個部位損傷?
  - A. 內側枝韌帶 B. 外側枝韌帶 C. 十字韌帶 D. 內外半月板
- 118. 醫生給病人做 Varus Stress Test (膝蓋骨內翻應力測試)時呈現疼痛加重,這個病人最有可能是以下哪一個部位損傷?
  - A. 內側枝韌帶 B. 外側枝韌帶 C. 十字韌帶 D. 內外半月板
- 119. 病人來診時說最近跑步時常感到膝蓋疼痛,檢查時你用雙手握住病人的膝蓋, 拇指置於關節內外緣,其他手指置於膝膕處,將脛骨向前拉,此時脛骨向前滑動,呈現陽性反應,此病人最有可能是以下哪一個部位損傷?
  - A. 後側枝韌帶 B. 外側枝韌帶 C. 十字韌帶 D. 半月板
- 120. 病人主訴有膝關節疼痛,膝蓋屈曲或伸展時有喀喀聲,按壓時疼痛,你覺得是 半月板有撕裂傷,以下哪一個檢測方法可以做為初步的診斷依據?
  - A. Lachman Test B. Posterior Drawer Sign
  - C. Valgus Stress Test D. McMurray Test
- 121. 病人因為下肢靜脈血栓症正在服用法華令鈉 (Warfarin Sodium), 在這種情況之下,病人不應該服用以下哪一種維生素?
  - A. 維生素 K B. 生物素 C. 維生素 B12 D. 維生素 A
- 122. 病人現在有口角炎,弱視,皮脂性皮膚炎,最有可能是以下哪一種營養物質缺乏引起的?
  - A. 維生素 B1 B. 維生素 B2 C. 維生素 B3 D. 維生素 B6
- 123. 你檢查病人發現他的瞳孔對光反應異常,他最有可能是以下哪一些神經損傷?
  - A. 第一、二對腦神經 B. 第三、四對腦神經
  - C. 第二、三對腦神經 D. 第四、六對腦神經

- 124. 有一位中年婦女來診所治療,你檢查時發現她的眼球無法向下、向外轉動,她 最有可能是以下哪一些神經損傷?
  - A. 第二、三、四對腦神經 B. 第四、五、七對腦神經
  - C. 第四、六、九對腦神經 D. 第三、四、六對腦神經
- 125. 有一位國中男生中午跟同學去打籃球後出現急性上腹部疼痛,並伴有噁心、嘔吐,約半小時後疼痛轉移到右下腹部,劇烈疼痛而且持續加重,有壓痛與反跳痛,沒有放射痛,下腹部肌肉非常僵硬,他最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 急性闌尾炎 B. 胰腺炎 C. 急性腸梗阻 D. 膽囊炎
- 126. 以下哪一個關節具有滑膜?
  - A. 手腕關節 B. 膝蓋關節 C. 髋骨關節 D. 肩關節
- 127. 一位老婦人到診所來看診,她說最近半年總是覺得非常疲倦乏力,嗜睡,睡得再久都還是累,常頭暈,低血糖,下肢有輕微水腫,皮膚的顏色變深、變黑, 尤其在腋下、大腿內側、乳房周圍,這位老婦人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 甲狀腺功能減退症 B. 腎上腺皮質功能亢進症
  - C. 腎上腺皮質功能低下症 D. 退黒激素分泌減少症
- 128. 有一位男病人在臀部、大腿、小腿的後面疼痛,有時還有灼熱感,此人最有可能的病變神經為何?
  - A. 第四腰椎神經 B. 第五腰椎神經 C. 第一骶椎神經 D. 第二骶椎神經
- 129. 一中年肥胖男性來診時說最近三個月體重減輕 30 磅,最近常覺得非常口渴, 頭暈,頭痛,尿多,尿頻,視力模糊,皮膚搔癢,此時你應該強烈建議他去做 以下哪一種檢查?
  - A. 糖尿病檢查 B. 甲狀腺功能檢查 C. 心血管疾病檢測 D. 消化道疾病檢測
- 130. 一更年期女性說她最近半年來總是覺得非常疲倦乏力,嗜睡,睡得再久都還是累,常頭暈,健忘,不喜歡跟朋友與親人交流,低血糖,下肢有輕微水腫,皮膚的顏色變深、變黑,尤其在腋下、大腿內側、乳房周圍,此病人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 格雷夫症 B. 愛狄生病 C. 庫欣病 D. 甲狀腺功能減退症
- 131. 有一中年女性最近因為月經不正常而來診治就診,她覺得非常口渴,夜晚睡不安穏,晚上盜汗,頭暈,頭痛,尿多,尿頻,視力模糊,皮膚搔癢,此時你應該強烈建議她去做以下哪一種檢查?
  - A. 促甲狀腺激素(TSH) B. 促腎上腺皮質激素(ACTH)
  - C. 血紅糖化色素(A1C) D. 肌酸肌酶(CK)
- 132. 愛滋病的人常會有腹瀉,以下哪一種是最有可能引起腹瀉的病原體?
  - A. 大腸桿菌 B. 金黃色葡萄球菌 C. 志賀菌 D. 隱孢子蟲
- 133. 你診所有一位 85 歲的病人最近住院,他的女兒說她有其父親的醫療監護權, 打電話向你索取她父親的所有的治療病例資料,此時你應該如何處理最適當?
  - A. 請她提供經法院判定其醫療監護權的文件,並在15天內給出所指定的資料
  - B. 請她提供經法院判定其醫療監護權的文件,並在30天內給出所指定的資料
  - C. 請她提供經第三方公證人認證或法院判定其醫療監護權的文件,並在 15 天 內給出所指定的資料
  - D. 請她提供經公證人認證的醫療監護權文件,並在30天內給出所指定的資料

- 134. 以下哪一種飲食方式會造成高血糖症,高甘油三脂血症與低密度脂蛋白高的高 膽固醇血症?
  - A. 高澱粉食物 B. 高熱量食物 C. 低纖維飲食 D. 高鈣飲食
- 135. 針灸師不慎刺傷病人的小動脈血管,此時應該要如何處理最適當?
  - A. 以乾棉球按壓 30 秒到 1 分鐘 B. 以無菌棉球按壓 2 到 3 分鐘

  - C. 以乾棉球按壓 5 分鐘以上 D. 以無菌棉球按壓 5 分鐘以上
- 136. 針灸師因為刊登廣告自稱 Doctor 而被針灸局判定為非專業行為,他辯稱自己 擁有博士學位,請問針灸師擁有一位哪一個博士學位也不可以稱為 Doctor?
  - A. Chiropractic Doctor (脊骨神經醫學博士)
  - B. Oriental Medicine Doctor (東方醫學博士)
  - C. Naturopathic Medicine Doctor (自然療法醫學博士)
  - D. Homeopathy Doctor (順勢療法醫學博士)
- 137. 女病人正在服用甘麥大棗湯來治療她的問題,這個病人現在最有可能在服用以 下哪一種西藥?
  - A. Prozac (Fluoxetine) B. Inderal (Propranolol)
  - C. Lipitor (Atorvastatin) D. Zeprexa (Olanzapine)
- 138. 女病人有更年期綜合症,情緒非常不穩定,西醫讓她服用 Paxil (Paroxetine) 來 做治療,以下哪一個治療方劑具有替代治療的作用?
  - A. 酸棗仁湯 B.甘麥大棗湯 C. 六味地黃丸 D. 逍遙散
- 139. 男病人有發熱,已經咳嗽一個月都不好,咳嗽越來越頻繁,痰裡有血絲,平時 飲食習慣都正常,並沒有任何改變,他的體重減少十磅,這個病人最有可能患 有以下何種疾病?
  - A. 新冠肺炎 B. 肺氣腫 C. 肺癌 D. 過敏性哮喘
- 140. 病人吃完飯總是嗜睡,食欲差,最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 食積 B. 痰濕阻滯 C. 肝胃不和 D. 脾氣虛
- 141. 病人有右下腹痛,活動或跳動時疼痛加重,按壓後放手時疼痛更嚴重,嘔吐, 噁心,腹部肌肉僵硬,此病人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 闌尾炎 B. 憩室炎 C. 膽囊炎 D. 胰腺炎
- 142. 男病人最近三個月常有下腹部脹痛,疼痛向右肩膀放射,腹痛時伴有噁心、嘔 吐,面色暗黄,平常容易腹瀉,尤其吃油膩食物更常發生,此病人最有可能是 以下哪一個病症?
  - A. 急性腸胃炎 B. 膽道結石 C. 胰腺炎 D. 十二指腸潰瘍
- 143. 一女病人在生完三個孩子後,每天覺得疲倦乏力,心悸,眩暈,面色蒼白,此 時應該要如何治療最佳?
  - A. 補氣 B. 養陰清熱 C. 補血 D. 溫腎助陽
- 144. 一女病人在考完執照後頭痛,來診所看病時坐立不安,手指不斷的拍打桌子, 精神無法集中,常答非所問,這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 痰熱上擾 B. 心火亢盛 C. 肝血虛 D. 肝氣郁結
- 145. 病人最近一直喝水, 視物模糊不清, 皮膚過敏搔癢, 應該要做下列哪種檢查?
  - A. 空腹血紅糖化色素 (A1C) B. 促甲狀腺激素 (TSH)
  - C. 血紅蛋白量 (Hemoglobin) D. 內生肌酐清除率 (Ccr)

- 146. 下列關於臂中定位的敘述何者正確?
  - A. 前臂掌面,腕横紋上4寸,橈側腕屈肌腱兩側
  - B. 前臂掌面正中腕横紋至肘横紋的中點,橈骨與尺骨之間
  - C. 前臂背側,腕背横紋至肘横紋的中點,橈骨與尺骨之間
  - D. 前臂背側,腕背横紋上7寸,橈骨與尺骨之間
- 147. 一個病人有帕金森氏症,坐在病床上接受醫生的檢查,檢查手部時應該會出現 以下何種臨床表現?
  - A. 肌肉張力過強,放鬆時突然消失,無法活動
  - B. 肌肉張力不足, 造成手指震顫鬆弛, 無法自主活動
  - C. 僵硬不能動,為齒輪性僵硬,活動幅度小,呈現靜止性震顫
  - D. 被動運動時範圍突然增大,呈現活動時震顫加重,休息時緩解
- 148. 病人頭痛,剛開始從右側牙齒痛到頭頂,又從頭頂痛到右枕部,再痛到顳部, 最有可能是以下哪些經脈的病變?
  - A. 手陽明經、足陽明經 B. 任脈、陽維脈
  - C. 手少陽經、足少陽經 D. 督脈、陽蹺脈
- 149. 有一男病人打球腰部受傷,又感染風寒邪氣。以前腰椎曾被重物壓傷,X-ray 顯示第五腰椎的椎間盤突出,治療時最佳的局部穴位為何?
  - A. 關元俞、小腸俞 B. 三焦俞、腎俞 C. 大腸俞、膀胱俞 D. 氣海俞、次髎
- 150. 以下何者為帕金森氏症最典型的臨床症狀?
  - A. 活動性震顫 B. 靜止性震顫 C. 持續性震顫 D. 間歇性震顫
- 151. 關於阿膠的煎煮方式,以下何者是正確的?
  - A. 先煎 30 分鐘後再跟其他藥物一起煎煮 B. 關火前 5 分鐘才下
  - C. 先溶解烊化後,再跟其他藥湯一起沖服 D. 關火後才下
- 152. 一位患有愛滋病的病人說他晚上都有低熱,白天就好了。他平常會盜汗,口乾渴,口腔潰瘍,輕微咳嗽,食欲還是正常,體重卻下降,舌紅乾。這個病人可以使用以下哪一個治療方劑最佳?
  - A. 百合固金湯 B. 清胃散 C. 黃連阿膠湯 D. 青蒿鱉甲湯
- 153. 病人患有嚴重失眠,夜晚難以入睡,心悸,頭暈眼花,面色蒼白,心情煩躁不安,常覺得疲勞乏力,夜晚出汗,口乾,咽乾,舌紅乾。這個病人可以使用以下哪一個治療方劑最佳?
  - A. 酸棗仁湯 B. 黄連阿膠湯 C. 甘麥大棗湯 D. 歸脾湯
- 154. 你使用了四物湯、四君子湯,應該再加上以下哪些藥物就會變成十全大補湯? A. 黃耆、桂枝 B. 肉桂、黃耆 C. 桂枝、附子 D. 肉桂、杜仲
- 155. 病人來診所時抱怨喉嚨總是不舒服,像有東西哽住,吞不下去又吐不出來,胸 脅有脹悶感,西醫檢查說一切都正常,他的舌苔濕膩,脈弦滑。這個病人可以 使用以下哪一個治療方劑最佳?
  - A. 半夏瀉心湯 B. 蘇子降氣湯 C. 半夏厚樸湯 D. 二陳湯
- 156. 以下哪一類的食物長期食用會引起脾陽虚?
  - A. 辛辣食物 B. 油膩食物 C. 甜食與糖 D. 牛冷食物
- 157. 一位中年女性說她吃柑橘類水果會引起頭痛加重,最有可能的中醫診斷為何? A. 肝陽上亢 B. 肝血虛 C. 肝火上炎 D. 腎陰虛

- 158. 以下哪一些症狀都與火相關?
  - A. 脅肋脹悶,心動過緩,嗜睡,自汗,腹瀉
  - B. 心動過速,失眠,口渴,口苦,便秘
  - C. 胸痛,心動過速,四肢沉重,尿失禁,口乾
  - D. 乾咳, 盜汗, 心煩胸悶, 失眠, 大便乾
- 159. 女病人有失眠,她不容易入睡,睡著之後睡得好,此病人最有可能的中醫診斷 為何?
  - A. 肝火上炎 B. 腎陰虛 C. 心血虛 D. 食積
- 160. 以下關於真寒假熱與真熱假寒的區別何者是正確的?
  - A. 惡寒加重,身熱漸減,面色蒼白,口渴喜熱飲,此為真寒假熱。而惡寒漸 輕,身熱增盛,面色紅,口渴喜冷飲,此為真熱假寒
  - B. 上腹部冷痛,喜熱飲,尿少,尿黃,此為真寒假熱。胸口煩熱,面紅,口 渴喜冷飲,尿頻,尿清長,此為真熱假寒
  - C. 惡寒發熱,口不渴,尿清長,無汗,此為真寒假熱。惡風發熱,口微渴, 喜冷飲,尿黃,咽喉痛,此為直熱假寒
  - D. 身體熱,面色紅,卻想穿衣蓋被,渴喜熱飲,此為真寒假熱。手腳冰冷, 脈沉,不怕冷,渴喜冷飲,便秘,此為真熱假寒
- 161. 病人頭痛,情緒煩躁易怒,失眠做惡夢,口苦,口渴,脅肋痛,便秘,尿黃, 這個病人最有可能出現以下哪一個舌象?
  - A. 舌紅, 舌邊紅腫, 苔黃

- B. 舌紅,舌邊有裂紋,苔黃厚
- C. 舌紅, 舌尖紅腫有裂紋直到舌尖, 苔黃 D. 舌淡, 舌邊橘色, 苔薄白
- 162. 有一男病人到診所來,說他常有眩暈,視物不清,從小就很敏感與容易緊張, 常會因小小的改變而受到驚嚇,脅肋脹悶,喜歡嘆氣,沒有勇氣與進取心,這 個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 肝血虚 B. 膽氣虛 C. 肝膽濕熱 D. 肝氣郁滯,心氣虛
- 163. 以下哪一個耳穴位於耳垂部?
  - A. 腎上腺 B. 痔核點 C. 面頰區 D. 內分泌
- 164. 病人來診時右眼無法閉合,嘴角下垂,他說西醫的診斷為面神經癱瘓,以下哪 一個治療穴位最適當?

  - A. 對耳屏的尖端 B. 枕、額兩穴的中點
  - C. 屏間切迹外後下方 D. 耳垂部,眼穴的後上方
- 165. 你的診所已經採用電子檔案的管理,以下哪一種檔案儲存方式是符合標準的?
  - A. 儲存在裝有放火牆的軟件裡,還需另外儲存一份在 USB 檔
  - B. 儲存在裝有放火牆的軟件裡,還需另外儲存一份在不同的電腦裡
  - C. 儲存在裝有設定密碼的軟件裡,還需另外儲存一份在 USB 檔
  - D. 儲存一份檔案在可以連接網路的電腦,另外一份儲存在沒有網路的電腦裡
- 166. 西醫診所的護士打電話來索要病人的病例資料,以下哪一種處理方式最適當?
  - A. 確認病人的身分後,直接將病例影印後郵寄給西醫診所
  - B. 先請病人在病例釋出同意書上簽名, 然後再給出病例
  - C. 請病人與西醫診所的負責醫師共同簽署同意書後再給出病例
  - D. 請西醫診所派人到你的診所來,核對身份後再給出病例

- 167. 你的病人在針刺過程中出現頭暈,頭痛,大出冷汗,四肢冰冷,此時你應該要如何處理最適當?
  - A. 先拔針,讓病人平躺,頭稍微墊高 B. 不拔針,讓病人平躺,頭稍微墊高
  - C. 先拔針,讓病人平躺,腳稍微墊高 D. 不拔針,讓病人平躺,腳稍微墊高
- 168. 如果你的病人現在有糖尿病,高血壓,高膽固醇等慢性病,你會建議你的病人 在飲食上應該要如何調整最適當?
  - A. 高鹽、多鉀飲食 B. 高鹽、少鉀飲食
  - C. 低鹽、多鉀飲食 D. 低鹽、少鉀飲食
- 169. 病人因為消化道疾病引起的慢性腹瀉,且瀉下物多是不消化的食物,他也在服用法華令 (Warfarin Sodium),以下哪一個維生素是不適合服用的?
  - A. 維生素 K B. 維生素 B2 C. 維生素 B12 D. 維生素 D
- 170. 病人總是抱怨他的下腹部的兩側疼痛,這個病人最有可能的病變臟腑為何? A. 腎與膀胱 B. 肝與膽 C. 脾與胃 D. 小腸與大腸
- 171. 病人正在服用 Inderal (Prapronolol) 的西藥,這個病人最有可能的病症為何?
  - A. 心動過緩,血壓降低 B. 心動過速,血糖降低
  - C. 心動過速,血壓升高 D. 心動過緩,膽固醇升高
- 172. 病人來診說西醫確診她患有艾迪生病 (Addison's disease) ,這個病人最有可能出現以下哪一組臨床症狀?
  - A. 情緒激動易怒,食欲增加,體重減輕,心悸,面色蒼白,失眠
  - B. 食欲降低,體重增加,少言懶動,脫髮,嗜睡,畏寒
  - C. 食欲略為增加,向心性肥胖,皮膚變薄,下肢水腫,青春痘,血壓升高
  - D. 體重增加, 血糖降低, 表情淡默呆滯, 嗜睡, 皮膚顏色變深、變黑, 乏力
- 173. 病人有心悸,心動過速,以下哪一個治療耳穴最適當?
  - A. 耳甲腔中心凹陷處 B. 耳甲腔底部, 屏間切迹内
  - C. 耳輪腳的消失處 D. 耳屏上部隆起的尖端
- 174. 病人三個月前患有阻塞性中風入院治療,而且他還有心房顫動的問題,平常都有服用法華令鈉的西藥,現在他因為髖關節疼痛到診所來,你應該選擇以下哪一種治療方法最適當?
  - A. 刺血療法 B. 溫針灸 C. 拔罐 D. 直接灸
- 175. 病人有頭痛,疼痛連及後枕部,他還有脅肋痛,下肢外側痛,這個病人最有可能是以下哪些經脈的病變?
  - A. 任脈、帶脈 B. 陰維脈、衝脈 C. 督脈、陽維脈 D. 陰蹺脈、陽蹺脈
- 176. 你的病人在有以下哪一種情況時不可以使用電針治療?
  - A. 惡性高血壓者 B. 腎功能衰竭者 C. 心肌衰弱者 D. 裝有心跳起搏器者
- 177. 病人有顳部疼痛,你要使用足臨泣來做治療,可以加上哪個穴位來增加療效?
  - A. 在腕背横紋上2寸,陽池與肘尖的連線上,橈骨與尺骨之間
  - B. 橈骨莖突上方,腕橫紋上 1 寸 5 分,肱橈肌與拇長展肌肌腱之間
  - C. 在腕背横紋上3寸,陽池與肘尖的連線上,橈骨與尺骨之間
  - D. 在腕背橫紋上5寸,陽池與肘尖的連線上,橈骨與尺骨之間
- 178. 病人現在有口苦,口渴,頭痛,脅肋痛,易怒,以下何者是最佳的治療配穴?
  - A. 膽俞、日月 B. 肝俞、日月 C. 膽俞、期門 D. 肝俞、期門

- 179. 有一男病人中風,因為中風引起的失語症,他還有頸項僵硬疼痛,頭痛,鼻出血,以下哪一組治療穴位最適當?
  - A. 天突、廉泉 B. 通里、廉泉 C. 風府、啞門 D. 風池、豐隆
- 180. 以下哪一種治療穴位的治療特性可以用來說明陰陽互根的關係?
  - A. 虛證取原穴來做治療
- B. 陽腑病取下合穴來做治療
- C. 表裡兩經同病取絡穴來做治療 D. 陰臟病取背俞穴來做治療
- 181. 以下哪一個敘述是足少陰經郄穴的定位?
  - A. 太溪直下1寸,跟骨結節的內側凹陷處
  - B. 內踝後下方,當跟腱附著部的內側前方凹陷處
  - C. 在陰陵泉下 3 寸,陰陵泉與內踝高點的連線上
  - D. 在太溪直上2寸,當跟腱前緣
- 182. 有一位老先生來診時說他都在早晨很早醒來,而且醒來後無法再睡,所以總是 覺得睡眠不足,這個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 肝血虚 B. 膽虚 C. 心陰虚 D. 心腎不交
- 183. 一位 75 歲的退伍軍人最近因為膝蓋疼痛要以輪椅代步,他最近有便秘,請問 這個病人引起便秘最有可能的原因為何?
  - A. 氣滯 B. 胃腸有熱 C. 血虚 D. 腎陽虚
- 184. 有一位在從事建築工地施工的作業員有腰痛,工作結束後的夜晚腰痛加重,有固定痛點,而且疼痛劇烈,坐著或躺下時疼痛會由臀部放射到大腿,這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 氣滯 B. 寒濕 C. 風濕 D. 血瘀
- 185. 一女病人因為胃脘痛與腸躁便秘而來就診,你用中脘、天樞來治療病人,這可以說明何種陰陽的關係?
  - A. 陰陽依存互根 B. 陰陽對立制約 C. 陰陽消長 D. 陰陽轉化
- 186. 脾最喜歡以下的何種身體環境?
  - A. 濕與寒 B. 溫與燥 C. 熱與風 D. 涼與燥
- 187. 病人在晚上兩中工作後引起關節疼痛劇烈,最有可能的病因為何?
  - A. 風 B. 熱 C. 寒 D. 濕
- 188. 病人覺得胸口灼熱,口渴喜冷飲,便秘,尿黃少,針灸師檢查病人時發現他的胸口熱,四肢冰冷,脈沉有力。這個病人最有可能的診斷為何?
  - A. 表寒裡熱證 B. 表熱裡寒證 C. 真寒假熱證 D. 真熱假寒證
- 189. 有一女病人患有甲狀腺功能減退症,體型稍肥胖,常覺得食後腹脹,腹瀉,大 便稀溏有不消化食物,尿少,腳踝水腫,四肢冰冷且怕冷,舌淡胖有齒痕,苔 白而濕潤,脈沉而虛。這個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 脾腎陽虛 B. 濕困脾胃 C. 脾氣虛有濕,肝氣郁滯 D. 心腎陽虛
- 190. 病人有慢性腰痛,長期都有指甲乾脆易斷裂,皮膚乾,頭髮乾,舌淡而乾。這個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 肺燥證 B. 肝血虚 C. 心脾兩虚 D. 腎陰虚
- 191. 有一位女學生非常用功的準備針灸執照考試,在考試結束後失眠,心情煩躁, 坐立不安,無法讓自己平靜下來,這個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷? A. 肝火亢盛 B. 肝郁脾虚 C. 肝血虚有熱 D. 心腎不交

- 192. 病人長期失眠,試問失眠是以下哪兩種物質不協調所引起的?
  - A. 氣與血 B. 精與血 C. 寒與熱 D. 陰與陽
- 193. 依照中醫理論來判斷,以下哪一個臟腑與造血無關?
  - A. 腎 B. 心 C. 脾 D. 肝
- 194. 脾虚的病人最有可能出現以下哪一個臨床症狀?
  - A. □苦 B. □淡 C. □鹹 D. □酸
- 195. 以下關於六淫與七情的敘述,何者正確?
  - A. 六淫-風、寒、暑、濕、燥、火;七情-呼、笑、歌、哭、呻、譫、妄
  - B. 六淫-腦、髓、骨、脈、膽、胞宮;七情-怒、喜、思、憂、悲、恐、驚
  - C. 六淫-風、寒、暑、濕、燥、火;七情-怒、喜、思、憂、悲、恐、驚
  - D. 六淫-風、雷、電、雨、雪、火;七情-呼、笑、歌、哭、呻、愛、恨
- 196. 以下哪兩者的關係可以代表肝腎同源?
  - A. 氣與血 B. 陰與陽 C. 氣與精 D. 精與血
- 197. 女病人上週去做體檢,血液檢查報告顯示為:血小板總數為 13 萬,血紅蛋白量為 8g/dl,空腹血糖為 mg/dl,血壓為 112/76mmHg,白細胞總數為 6000,總膽固醇脂為 180 mg/dl,低密度脂蛋白為 125 mg/dl,他常有腹瀉,食欲差,睡眠不佳,疲倦乏力。依此報告來看,這個病人應該要如何治療最合理?
  - A. 治療貧血 B. 治療糖尿病 C. 治療凝血功能障礙 D. 治療高膽固醇脂
- 198. 病人現在有高血壓與高膽固醇脂,最有可能是過量食用以下哪一類食物?
  - A. 高蛋白質食物 B. 高熱量食物 C. 高鐵、高鈣食物 D. 高纖維質食物
- 199. 女病人長期有下腹部疼痛,最有可能是以下哪一個臟腑的病變?
  - A. 肝 B. 胃 C. 膀胱 D. 肺
- 200. 一年輕女病人常常不吃早餐就到公司工作,而且工作時間長,在這種情況下你會建議病人如何飲食與運動?
  - A. 早餐要吃飽,多攝取高蛋白質,多從事長跑與耗氧性運動
  - B. 早餐要吃飽,多攝取高纖維食物,多從事重量與肌耐力運動
  - C. 三餐要按時吃,營養需均衡,多從事長跑與耗氧性運動
  - D. 三餐要按時吃,營養需均衡,多散步或從事有氧運動
- 201. 一女病人來診時說她患有腎炎,常覺得尿頻,尿急,尿時灼熱疼痛,口乾渴卻水喝不多,下腹部悶痛,舌紅,苔黃膩。這個病人最有可能的中醫診斷為何? A. 膀胱濕熱 B. 肝膽濕熱下注 C. 小腸實熱 D. 脾胃實熱
- 202. 以下關於氣與津液的敘述,何者正確?
  - A. 氣虛引起的尿頻、尿多 B. 氣虛引起白天出汗多
  - C. 津液不足會引起氣虚 D. 津液過多會引起氣機郁滯
- 203. 一位 8 歲的小男孩患有咽喉炎,咽喉紅腫疼痛,有臭味的膿液流出來,高熱, 最有可能引起這個病人咽喉炎的病原體為何?
  - A. 葡萄球菌 B. 酵母菌 C. 鏈球菌 D. 大腸桿菌
- 204. 病人有急性腹痛,你懷疑可能是胰腺炎,以下哪一些檢查項目可以做為確診的 依據?
  - A. 腹部超聲波,紅細胞,尿膽鹽 B. CT Scan,白細胞,血清肌酐
  - C. CT Scan, 白細胞, 血清尿酸 D. 腹部超聲波, 白細胞, 血清脂肪酶

- 205. 有一位中年男病人在公司舉辦的餐會上盡情飲食,還喝了很多酒,返家後出現 劇烈腹痛,腹痛如刀割樣,疼痛會向腰背部放射,高熱,噁心嘔吐,送西醫急 診發現他的白細胞升高,血清澱粉酶比正常值超過8倍,這個病人最有可能是 以下哪一個病症?
  - A. 急性胰腺炎 B. 腸梗阻 C. 膽囊炎 D. 急性肝炎
- 206. 長期抽菸的人最有可能出現以下哪一種病變?
  - A. 代謝性的鹼中毒 B. 代謝性的酸中毒
  - C. 呼吸性的鹼中毒 D. 呼吸性的酸中毒
- 207. 病人長期有血壓高,血脂高,血糖高,而且他還有心律不整的問題,在做完心。 臟手術三個月後停止服用西藥,現在他有輕微的缺血性中風(ATI),這個病人 現在最有可能出現以下哪一組症狀?
  - A. 雙側肢體癱瘓,皮膚感覺障礙,不能言語,大小便失禁,沒有意識
  - B. 雙側肢體癱瘓,皮膚感覺正常,答非所問,尿失禁,意識不清楚
  - C. 一側肢體輕微癱瘓,不能言語,大小便失禁,伴有精神錯亂,意識不清
  - D. 一側肢體輕微癱瘓,不能言語,或答非所問,大小便失禁,意識清楚
- 208. 病人來診所治療,做艾灸治療時不小心燙傷,是二度燙傷而且面積為 5mm, 此時你應該要如何處理最適當?
  - A. 將病人轉送燒燙傷治療中心去急診 B. 將病人送西醫家庭科治療
  - C. 不需要做任何處理,會自行痊癒 D. 塗抹燙傷藥膏,再用無菌紗布包紮
- 209. 病人被送到醫院接受檢查時發現他的膝反射 4+,而且腿部的肌肉僵硬痙攣, 他的神志清楚,這個病人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 中樞神經的脊髓損傷 B. 中樞神經的腦部損傷

  - C. 周圍神經損傷 D. 肌肉與肌腱損傷
- 210. 病人來你的針灸診所求診,你檢查時發現他的膝反射 4+,而且腿部的肌肉僵 硬痙攣,這個病人應該要如何處理或治療最適當?
  - A. 不予以治療,請病人去看神經專科醫師
  - B. 不予以治療,立即轉送急診做詳細檢查
  - C. 可以用針灸治療, 並搭配電針來調節神經與肌肉的協調性
  - D. 可以用拔罐來治療,並搭配深度的肌肉按摩來消失神經、肌肉的僵硬痙攣
- 211. 病人十年前經診斷患有紅斑性狼瘡,最近與朋友出外旅遊後,他的血紅蛋白量 降低,這個病人最有可能出現以下哪一些臨床症狀?
  - A. 頭痛,耳鳴 B. 噁心,嘔吐 C. 眩暈,心悸 D. 四肢冰冷,震顫
- 212. 病人最近跟朋友去大熊山露營,返家後出現發熱,咽喉腫痛,全身關節疼痛, 關節皮膚有紅疹而且有線性樣的延伸像條索狀,這個病人最有可能是以下哪一 個病症?
  - A. 風濕性關節炎 B. 病毒性咽喉炎 C. 過敏性枯草熱 D. 萊姆病
- 213. 小兒流口水,最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 胃熱 B. 脾氣虛 C. 食積 D. 小腸實熱
- 214. 病人患有疝氣,下腹部有經常性疼痛,疼痛會向陰部、睪丸放射,排氣後疼痛 緩解,腹脹,腸鳴,苔薄白,脈沉弦。這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 小陽氣結 B. 小陽氣痛 C. 寒凝肝經 D. 肝氣郁滯,膀胱氣虛

- 215. 病人長期失眠,睡著後會醒來多次,口乾,咽喉乾,陽萎,夜晚盜汗,尿少, 大便乾,這個病人最有可能的舌象為何?
  - A. 舌紅, 舌根紅甚, 苔薄黄 B. 舌深紅, 舌中央有深裂紋, 少苔
  - C. 舌紅, 舌有裂紋, 苔剝落 D. 舌淡而瘦薄, 舌邊橘色, 苔薄白
- 216. 兒童的正常舌象與成年人相比較有何不同?
  - A. 舌色稍紅,舌苔乾而少 B. 舌色稍紅,舌苔濕潤
  - C. 舌色稍淡, 舌苔乾而厚 D. 舌色稍淡, 舌苔濕潤
- 217. 病人有胃脘痛,針灸師診斷為胃瘀血,這個病人最有可能出現以下哪一種疼痛 的情況?
  - A. 胃脘痛遇熱加重 B. 胃脘痛按壓減輕
  - C. 胃脘痛食後減輕 D. 胃脘痛遇寒加重
- 218. 女病人患有腎上腺皮質功能低下症,她非常怕冷,四肢冰冷,最近腹瀉增加, 而且有不消化的食物,口不渴,舌淡胖,苔白滑,脈沉細。這個病人最有可能 的中醫診斷為何?
  - A. 水侮土 B. 火不生土 C. 土乘水 D. 金不生水
- 219. 男病人長期抽菸,昨天來診時有高熱,咳嗽、氣喘,胸部脹悶,痰多,痰是黃綠色,口渴,面紅,覺得熱,舌紅苔黃。這個病人最有可能的中醫診斷為何? A. 木侮金 B. 金侮火 C. 火乘金 D. 火不生土
- 220. 病人總覺得胸悶、胸口灼熱,口渴想喝水,四肢冰冷,腹痛,腹瀉,嘔吐,餓了不想吃。這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 太陰病 B. 少陽病 C. 少陰寒化、熱化同病 D. 厥陰病
- 221. 病人現在白天常想睡覺,甚至於整天昏睡,四肢冰冷而且非常怕冷,腹瀉,尿清長,晚上總是睡不著,口乾,咽喉乾,盜汗,眩暈耳鳴。這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 少陰病 B. 厥陰病 C. 太陽經腑同病 D. 少陽病
- 222. 以下哪一個臟腑具有分清別濁的功能?
  - A. 脾 B. 小腸 C. 腎 D. 膀胱
- 223. 病人來診所,做檢查時他的舌尖往下捲,這個病人最有可能的中醫診斷為何? A. 肺實熱證 B. 肺虛熱證 C. 心虛熱證 D. 心實熱證
- 224. 病人有高血壓,頭痛,依照八綱辨證來做判斷應屬於何種診斷?
  - A. 裡實熱證 B. 表實寒證 C. 裡虛寒證 D. 裡虛熱證
- 225. 有一位 8 歲男孩白天出大汗,他沒有發熱,這個小男孩最有可能出現以下哪一 種脈象?
  - A. 脈虛細 B. 脈洪大 C. 脈浮洪而虛 D. 脈沉弦
- 226. 關於津液生成的過程,下列敘述何者正確?
  - A. 來自於食物與水,由小腸分清別濁,清者送到肺,以潤養肌肉皮膚,濁者 下輸膀胱,再次分清濁
  - B. 來自於食物與水,由脾運化分開,清者送到肺,以潤養肌肉皮膚,濁者下輸小腸,再次分清濁
  - C. 來自於食物與水,由脾運化分開,清者送到肺變成汗,濁者至膀胱成為尿
  - D. 來自於食物與水,由小腸分清濁,清者送到肺變成汗,濁者至膀胱成為尿

- 227. 病人現在有高熱,煩躁不安,口渴,便秘,尿黃少,舌苔黃,這個病人最有可 能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 衛分證 B. 營分證 C. 氣分證 D. 血分證
- 228. 病人患有嚴重高血壓,依照中醫理論來看應該屬於以下哪些診斷?
  - A. 風痰上擾,氣血兩虛,心火上擾 B. 濕阻氣機,肝膽濕熱,肝腎陰虛
  - C. 痰熱擾心,痰濕阳滯,肝陽上亢 D. 陰陽兩虛,肝火亢盛,肝風上擾
- 229. 病人的額頭出大汗,而且是油汗,最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 亡陽證 B. 實熱證 C. 亡陰證 D. 濕熱證
- 230. 病人這幾個月總是覺得不安,非常憂慮未來的生活,他還有呼吸短促,食欲不 佳,疲倦乏力,這些症狀是決定搬離住了三十年的房子後寸開始的,非常害怕 無法適應外州的新環境。病人的情況以中醫理論來解釋以下哪一個最合理?
  - A. 因為過度悲傷損傷脾肺之氣 B. 因為過度憂慮損傷脾肺之氣
  - C. 因為思念過度損傷心脾之氣 D. 因為過度恐懼損傷脾腎之氣
- 231. 病人來診所求診時帶來一份檢查報告,你發現她的血紅蛋白量為 8.5mg/dl,依 照中醫理論來看應該是何種中醫診斷?
  - A. 氣虛 B. 陽虛 C. 血虛 D. 陰虛
- 232. 病人現在有急性嘔吐,以下哪一組治療耳穴最適當?
  - A. 神門、耳尖、胃、皮質下 B. 屏間、下屏尖、對屏尖、三角凹陷

  - C. 神門、心、肝、胃 D. 神門、肝、脾、胃
- 233. 以下哪一個穴位的定位是屬於足少陰經的募穴?
  - A. 在側腰部,第十二肋游離端的下緣
  - B. 在側腹部,第十一肋游離端下際
  - C. 在腹正中線上,臍下2寸
  - D. 乳頭直下,第六肋間隙,前正中線旁開4寸
- 234. 以下哪一個穴位的定位是屬於手少陰經的募穴?
  - A. 在側腰部,第十二肋游離端的下緣 B. 在腹正中線上,臍上6寸
  - C. 在腹正中線上, 臍上4寸 D. 在腹正中線上, 臍下4寸
- 235. 位於腹正中線上,臍上6寸,這個穴位應該如何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.5-1.0 寸,可灸 B. 斜刺 0.5-0.8 寸,可灸
  - C. 直刺 0.3-0.8 寸,可灸 D. 斜刺 0.3-0.5 寸,禁灸
- 236. 依據六腑下合穴的特性可以用來治療以下哪些病症最佳?
  - A. 陰臟疾病 B. 消化道疾病 C. 呼吸系統疾病 D. 陽腑疾病
- 237. 六腑下合穴可以用來治療以下哪些病症最佳?
  - A. 下肢疾病 B. 胸部疾病 C. 上肢疾病 D. 運動系統疾病
- 238. 以下哪一些穴位的位置都位於第四肋間隙相平處?
  - A. 膻中、神封、膺窗、胸鄉 B. 神封、乳中、天池、天溪
  - C. 玉堂、神封、膺窗、輒筋 D. 中庭、步廊、乳根、食竇
- 239. 女病人因為更年期症候群引起夜晚盜汗嚴重,以下哪一組治療穴位最適當?
  - A. 合谷、復溜 B. 太溪、太衝 C. 陰郄、后溪 D. 照海、列缺
- 240. 女病人因為更年期症候群引起咽喉乾、痛,以下哪一組治療穴位最適當?
  - A. 合谷、太衝 B. 太溪、腎俞 C. 魚際、少商 D. 照海、列缺

- 241. 以下哪一個穴位是懷孕婦女可以針刺的?
  - A. 犢鼻下 3 寸, 脛骨前緣旁開一橫指
  - B. 外踝尖與跟腱之間凹陷
  - C. 內踝高點直上3寸,脛骨內側緣後方
  - D. 手背,第一、二掌骨之間,當第二掌骨橈側中點處
- 242. 病人來診時昏迷不醒,大出冷汗,四肢冰冷,呼吸微弱,這個病人應該要如何 治療最適當?
  - A. 取督脈與十二井穴,針刺瀉法 B. 取任脈的穴位,重灸
- - C. 取督脈與陽經的穴位,針刺平補平瀉 D. 取督脈與厥陰經的穴位,重灸
- 243. 以下哪一個穴位的定位是屬於足太陰經的募穴?
  - A. 在側腰部,第十二肋游離端的下緣
  - B. 在腹正中線上, 臍下 2寸
  - C. 在側腹部,第十一肋游離端下際
  - D. 乳頭直下,第六肋間隙,前正中線旁開4寸
- 244. 穴位的定位在側腹部,第十一肋游離端下際,這個穴位應該要如何針刺操作最 適當?

  - A. 直刺 0.7-1.0 寸 B. 斜刺 0.3-0.5 寸
  - C. 向外斜刺 0.5-0.8 寸 D. 直刺 0.5-0.8 寸
- 245. 以下哪一些穴位不可以灸?
  - A. 攢竹、魚腰 B. 列缺、太淵 C. 巨髎、地倉 D. 耳和髎、角孫
- 246. 以下哪一個穴位禁灸?
  - A. 在頸外側部,胸鎖乳突肌後緣,扶突後,與喉結相平
  - B. 喉結旁,頸總動脈搏動處,胸鎖乳突肌的前緣取穴
  - C. 在下頷角後方,胸鎖乳突肌的前緣凹陷中
  - D. 鎖骨內側端的上緣,當胸鎖乳突肌的胸骨頭與鎖骨頭之間
- 247. 以下哪兩個穴位不可以灸,灸後會引起失音、無法說話?
  - A. 風池、腦空 B. 上廉泉、夾承漿 C. 風府、啞門 D. 通里、廉泉
- 248. 以下哪一個穴位的定位是屬於足少陽經的榮穴?
  - A. 在足背第二、三趾的趾縫間,當第二趾跖關節前方凹陷中
  - B. 足小趾第五趾跖關節前方赤白肉際處
  - C. 足第四跖趾關節的後方,第四、五跖骨之間,當小趾伸肌腱的內側緣
  - D. 足背, 第四、五趾的趾縫間, 趾蹼緣之後方赤白肉際處
- 249. 以下哪一個穴位的定位是屬於足陽明經的滎穴?
  - A. 在足背第二、三趾的趾縫間,當第二趾跖關節前方凹陷中
  - B. 足小趾第五趾跖關節前方赤白肉際處
  - C. 足第四跖趾關節的後方,第四、五跖骨之間,當小趾伸肌腱的內側緣
  - D. 足背, 第四、五趾的趾縫間, 趾蹼緣之後方赤白肉際處
- 250. 位於耳朵前方的耳門、聽宮、聽會這三個穴位應該要如何取穴最適當?
  - A. 閉口取穴 B. 張口取穴 C. 仰頭取穴 D. 低頭取穴
- 251. 以下哪些穴位可以治療口眼歪斜,而且針刺操作為斜刺 0.5-1.0 寸?
  - A. 翳明、風池 B. 上廉泉、廉泉 C. 牽正、夾承漿 D. 地倉、下關

- 252. 病人患有慢性膽囊炎,常感到右上腹部痛,以下哪一個治療穴位最佳?
  - A. 足三里下約2寸壓痛處 B. 犢鼻下3寸,脛骨前緣旁開一橫指
  - C. 髕骨上緣正中凹陷處 D. 陽陵泉直下 2 寸壓痛處
- 253. 位於血海上 1 寸,可以治療風疹、濕疹與蟲積,此穴位正確的針刺操作為何?
  - A. 直刺 1.0-1.2 寸 B. 斜刺 0.8-1.2 寸
  - C. 直刺 0.5-1.0 寸 D. 斜刺 0.5-0.8 寸
- 254. 病人因為做運動時不小心造成急性腰扭傷,你決定用腰痛穴來做治療,這個穴 位的正確針刺操作方式為何?
  - A. 由掌心向兩側斜刺 0.5-1.0 寸 B. 由兩側向掌心方向斜刺 0.5-1.0 寸
  - C. 直刺 0.5-0.8寸
- D. 直刺 0.8-1.2寸
- 255. 位於前臂掌面正中腕橫紋至肘橫紋的中點,橈骨與尺骨之間,可以治療上肢癱 瘓、痙攣,這個穴位應該要如何針刺操作最適當?
  - A. 斜刺 0.5-0.8 寸 B. 斜刺 0.8-1.2 寸
  - C. 直刺 1.0-1.2 寸 D. 直刺 0.5-1.0 寸
- 256. 男病人有局部軟組織損傷引起的肩關節疼痛,你已經用了巨骨、曲池、合谷來 做治療,還可以用以下哪一組穴位來替代治療?

  - A. 肩前、支正、陽谷 B. 天井、清冷淵、三陽絡
  - C. 局中俞、局外俞、秉風 D. 局髎、局髃、天宗
- 257. 懷孕婦女到診所來,你在治療時應該避免針刺以下哪一個穴位?
  - A. 外踝尖與跟腱之間凹陷中 B. 外踝直下方凹陷中
  - C. 第五跖骨粗隆下,赤白肉際 D. 足小趾第五趾跖關節前方赤白肉際處
- 258. 有病人來診所,你判斷後決定要用中脘、足三里、內關、上脘來治療病人,這 個病人最有可能的病症為何?
  - A. 胃熱嘔吐 B. 胃寒呃逆 C. 食積胃痛 D. 脾胃濕熱腹瀉
- 259. 病人有食積引起的胃脘脹痛,治療時除了足三里、內關、中脘之外,還可以加 上以下哪一個治療穴位來增加治療的效果?
  - A. 上院 B. 期門 C. 建里 D. 氣海
- 260. 有一小男孩現在患有急性睪丸腫脹疼痛,以下哪一組治療穴位最適當?
  - A. 蠡溝、章門 B. 三陰交、血海 C. 合谷、太衝 D. 太衝、曲泉
- 261. 以下何者為耳穴中的膀胱穴的定位與主治?
  - A. 位於對耳輪下腳的下緣,大腸穴的直上方。主治腰痛,坐骨神經痛
  - B. 位於對耳輪下腳的下緣,小腸穴的直上方。主治遺尿,膀胱炎
  - C. 位於對耳輪上腳的下緣,大腸穴的直上方。主治前列腺炎,腰痛
  - D. 位於對耳輪下腳的上緣,小腸穴的直上方。主治膀胱炎,輸尿管結石
- 262. 如果病人有外感風邪,在治療時為什麼不能使用灸法?
  - A. 容易使風邪而變成熱邪 B. 容易引邪氣入裡
  - C. 容易損傷人體的正氣 D. 容易損傷人體的津液
- 263. 以下哪一個穴位在操作時應該要閉口取穴?
  - A. 耳門 B. 聽宮 C. 下關 D. 聽會
- 264. 一年輕女病人患有急性乳腺炎,以下哪一個治療方案最適當?
  - A. 期門+淡竹葉 B. 食竇+知母 C. 胸鄉+板藍根 D. 天溪+蒲公英

- 265. 以下哪一種病症最適合使用拔罐來做治療?
  - A. 局部性的氣血阻塞 B. 全身性的氣血阻塞
  - C. 局部性的氣血不足 D. 全身性的氣血不足
- 266. 男病人長期從事木工,他現在有肩部軟組織損傷引起的肩關節疼痛,你已經用 了巨骨、肩髃、合谷來做治療,還可以用以下哪一組穴位來替代治療?

  - A. 肩前、支正、陽谷 B. 肩髎、曲池、手五里
  - C. 肩中俞、肩外俞、秉風 D. 天井、肩貞、三陽絡
- 267. 病人經常頭暈、頭痛,西醫建議他服用西藥 Inderal (Prapronolol) 來治療他的問 題,這個藥最有可能造成以下哪些副作用?
  - A. 血糖升高,心率加速 B. 膽固醇降低,心率減慢
  - C. 血壓降低,心率減慢 D. 血糖降低,心率加速
- 268. 病人去西醫處就診,醫師要他服用西藥 Inderal (Prapronolol) 來治療他的問題, 請問這個病人最有可能是有以下哪一些病症?

  - A. 血糖過高與心動過緩 B. 膽固醇過高與心動過緩
  - C. 甲狀腺亢進與心動過速 D. 血壓過高與心動過速
- 269. 病人來診時,你要以聽診器來聽心尖搏動的聲音,應該將聽診器放在病人身上 的哪一個部位最適當?
  - A. 第五、六肋骨之間 B. 第六、七肋骨之間
  - C. 第三、四肋骨之間 D. 第四、五肋骨之間
- 270. 病人的中指與食指部位皮膚感覺障礙,最有可能是損傷以下哪一個神經?
  - A. 第五頸椎神經 B. 第七頸椎神經 C. 第六頸椎神經 D. 第八頸椎神經
- 271. 病人告訴你說他最近的大便顏色變淡,有時候像水泥樣的顏色,這個病人最有 可能是以下哪一種疾病?
  - A. 慢性感染性肝炎 B. 十二指腸潰瘍 C. 膽管阻塞 D. 肝硬化
- 272. 病人現在有肝功能損傷,你會建議病人不要服用以下哪一個西藥?
  - A. Aspirin B. Interferon C. Ibuprofen D. Acetaminophen
- 273. 病人來診時說他有便血,間歇性的便秘,他的食量還算正常,最近二個月瘦了 20磅,你應該要如何處理最適當?
  - A. 詢問病人有無大腸癌病史,建議病人立即去做大腸鏡檢查
  - B. 立即請病人去醫院急診室求診
  - C. 可以先以針灸治療,如果治療 8 週後沒有效果則請病人去看腸胃科醫師
  - D. 請病人不要擔心,針灸與中藥的治療一定會幫助他恢復健康
- 274. 以下哪一些是控制膝反射的神經?
  - A. 第一腰椎神經~第三腰椎神經 B. 第二腰椎神經~第四腰椎神經
  - C. 第五腰椎神經~第二骶椎神經 D. 第二骶椎神經~第四骶椎神經
- 275. 你的診所來了患有糖尿病的病人,除了一般性的治療之外,你應該要多攝取何 種飲食物?
  - A. 高蛋白質食物 B. 高澱粉食物 C. 高纖維食物 D. 低鈉鹽食物
- 276. 病人患有 C型肝炎,以下哪一個治療藥物最適當?
  - A. Havrix (Hepatitis A adult vaccine) B. Zeffix (Lamivudine)

  - C. Hecolin (HEV-239) D. Interferon (peg-interferon)

- 277. 以下哪一個維生素可以幫助皮膚修復再生?
  - A. 維生素 E B. 維生素 A C. 維生素 C D. 維生素 B3
- 278. 病人如果患有十二指腸潰瘍,他最有可能出現以下哪一種類型的疼痛型態?
  - A. 飯後半小時到一小時後疼痛,空腹不痛 B. 空腹痛, 進餐後緩解
  - C. 空腹痛, 飽餐後也痛

- D. 夜間痛,白天疼痛消失
- 279. 以下哪一種維生素又被稱為酰胺酚?
  - A. 維生素 E B. 維生素 B1 C. 維生素 B3 D. 葉酸
- 280. 病人車禍後他的第三腰椎與第四腰椎受傷,這個病人在檢查時最有可能出現以下哪一種情況?
  - A. 跟腱反射亢進 B. 跟腱反射消失 C. 膝反射亢進 D. 膝反射消失
- 281. 病人經西醫診斷為周圍神經病變伴有心力衰竭,這個病人的病症最有可能是以下哪一種維生素缺乏所引起的?
  - A. 維生素 B1 B. 維生素 B2 C. 維生素 B3 D. 維生素 B6
- 282. 病人現在有口角炎,角膜充血,青春痘,弱視,這個病人的病症最有可能是以下哪一種維生素缺乏所引起的?
  - A. 維生素 B1 B. 維生素 B2 C. 維生素 A D. 維生素 B12
- 283. 病人舌頭上的舌苔容易刮除,這最有可能是以下哪一種病菌所造成的?
  - A. 葡萄球菌 B. 嗜血桿菌 C. 念珠菌 D. 大腸桿菌
- 284. 病人懷疑自己有腕管綜合症,以下哪一些檢測方法可以來幫助診斷?
  - A. Bouchard's Test 與 Heberden's Test B. 鼻煙盒測試與 De Quervain's Sign
  - C. Dupuytren's Test 與 Colles' Sign D. Phalen's Test 與 Tinel's Sign
- 285. 以下哪一種檢查方法可以做為岡上肌損傷的輔助診斷?
  - A. 外展對抗阻力測試 B. 內旋對抗阻力測試
  - C. 外旋對抗阻力測試 D. 內收對抗阻力測試
- 286. 如果甲狀腺功能異常時,最有可能會引起以下哪一些疾病?
  - A. Cushing Disease & Addison's Disease B. Cretinism & Graves Disease
  - C. Hypothyroidism & Korsakoff Disease D. Anemia & Leukemia
- 287. 一中年男性患有急性 B 型肝炎,以下哪一種治療方法最適當?
  - A. 服用長效干擾素 (Interferon)
    - B. 採用支持性療法,無特效藥
  - C. 注射 B 型肝炎免疫球蛋白 (HBIG) D. 使用口服肝素 (Heparin) 來治療
- 288. 以下哪一個穴位的定位是屬於足厥陰經的募穴?
  - A. 在側腰部,第十二肋游離端的下緣
  - B. 在腹正中線上, 臍下 2寸
  - C. 在側腹部,第十一肋游離端下際
  - D. 乳頭直下,第六肋間隙,前正中線旁開4寸
- 289. 拔罐治療最適合以下哪一種病症?
  - A. 關節炎 B. 神經性疾病 C. 皮膚病 D. 虛寒性腹瀉
- 290. 病人在以下何種情況時不應該使用拔罐治療?
  - A. 有高血壓 B. 有凝血功能障礙 C. 有低血糖 D. 有甲狀腺功能減退症
- 291. 病人出現以下哪些症狀時不可以使用拔罐治療?
  - A. 高血壓頭痛 B. 孕婦嘔吐 C. 高熱、抽搐痙攣 D. 夜晚盜汗潮熱

- 292. 病人現在有外感風寒引起的咳嗽、氣喘,以下哪一種治療方式最適當?
  - A. 針刺補法 B. 皮膚針扣刺 C. 隔附子餅灸 D. 拔罐法
- 293. 病人咳嗽、氣喘,胸悶,痰黃稠,依據四針技術的治療原則,以下哪一組治療 穴位最適當?
  - A. 瀉尺澤,補魚際 B. 瀉經渠,補魚際
  - C. 瀉魚際,補太淵 D. 瀉經渠,補太淵
- 294. 有一孕婦來診時說她非常怕冷,四肢冰冷,陰道有輕微的不正常出血,以下哪 一個治療方式最適當?
  - A. 使用拔罐法 B. 採用灸法 C. 使用皮膚針 D. 採用三棱針點刺
- 295. 病人有裡虛證,治療時可以採用以下哪一些穴位具有補虛強壯的作用?
  - A. 足三里、太衝、合谷 B. 三陰交、血海、膈俞
  - C. 氣海、足三里、關元 D. 膈俞、懸鐘、三陰交
- 296. 有個女病人有氣血兩虛,你在治療時可以優先考慮以下哪一組治療穴位?
  - A. 合谷、太衝 B. 膈俞、脾俞 C. 氣海、血海 D. 足三里、三陰交
- 297. 有一老先牛到診所來,長期患有慢性支氣管炎,他咳嗽痰多,氣喘,胸痛,頭 量,下肢虚弱乏力,治療時應該使用以下哪一個穴位最適當?
  - A. 外踝尖上8寸,條口外,脛骨前緣旁開二橫指
  - B. 犢鼻下 8 寸, 脛骨前緣旁開一橫指
  - C. 足大趾第一跖趾關節後下方, 赤白肉際凹陷處
  - D. 脛骨內側髁下緣,脛骨內側髁後下方凹陷處
- 298. 有一老先生到診所來,長期患有慢性支氣管炎,他咳嗽痰多,腳踝稍有水腫, 舌苔白膩,治療時採用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 足三里、三陰交、陰陵泉 B. 中脘、陰陵泉、水分

  - C. 太白、脾俞、足三里 D. 豐隆、列缺、委陽
- 299. 病人有習慣性偏頭痛,以下哪一個治療的耳穴最適當?
  - A. 對耳屏外側苗的前下方 B. 對屏尖與輪屏切迹間的中點
  - C. 枕、額兩穴的中點 D. 對耳屏的內側面
- 300. 病人的腰部在工作時不小心壓傷,以下哪一個治療的耳穴最適當?

  - A. 對耳輪下腳的末端 B. 對耳輪部的下 1/3 處
  - C. 對耳輪上腳的下 1/3 處 D. 對耳輪部的上 1/3 處
- 301. 病人有痔瘡,以下哪一個治療的耳穴最適當?
  - A. 耳尖穴與上耳根穴之間 B. 耳輪起點, 近屏上切迹處
  - C. 耳輪結節處
- D. 與對耳屏下腳上緣相平的耳輪處
- 302. 病人長期有痔瘡出血,以下哪一個治療的耳穴最適當?
  - A. 三角窩內, 近耳輪中點的凹陷處 B. 三角窩外側緣的耳輪部
  - C. 對耳輪下腳內 2/3 處
- D. 三角窩的外上角
- 303. 以下哪一個穴位的定位是屬於足少陽經的經穴?
  - A. 外踝高點上3寸,當腓骨前緣
  - B. 崑崙直上7寸,當承山外下方1寸處
  - C. 外踝高點上4寸,腓骨前緣稍前方,趾長伸肌與腓骨短肌之間
  - D. 外踝高點直上5寸,腓骨前緣

- 304. 以下哪一個頭皮針的定位可以治療子宮下垂,下肢癱瘓?
  - A. 前後正中線中點後 0.5 公分為上點, 眉枕線與鬢角髮際前緣的交點為下點做 一連線, 上 1/5 處
  - B. 運動區向後平移 1.5 公分,上 1/5 處
  - C. 在胃區與前後正中線之間,以髮際為中點向前後作4公分長的直線
  - D. 前後正中線兩側旁開 1 公分,平行該線,自感覺區上點後 1 公分平齊處向 前3公分的直線
- 305. 病人中風後引起命名性失語症,可以採用以下哪一個頭皮針來治療?
  - A. 言語二區 B. 言語一區 C. 言語三區 D. 運用區
- 306. 病人現在有急性黃疸,你診斷為濕熱黃疸,除了陰陵泉、足三里、膽俞、肝 俞、至陽等穴位外,還可以加上以下哪一些穴位來增強治療效果?
  - A. 腕骨、俠溪 B. 太衝、陽陵泉 C. 脾俞、陽綱 D. 曲池、大椎
- 307. 病人有哮喘,胸悶,心動過速,你可以使用以下哪一個頭皮針的定位來治療?
  - A. 與枕外粗隆平齊,旁開 1 公分處,向上引 4 公分平行正中線的直線
  - B. 以瞳孔直上的髮際處為起點,向後與正中線平行作2公分長的直線
  - C. 在胃區與前後正中線之間,以髮際為中點向前後作4公分長的直線
  - D. 在胃區外側,以胃區和胸腔區的相同距離向後作 2 公分的直線
- 308. 以下哪一個穴位的定位是屬於髓會穴?
  - A. 外踝高點直上 5 寸,腓骨前緣 B. 腓骨小頭前下方凹陷中
  - C. 第一胸椎棘突下,陶道旁開1寸5分 D. 外踝高點上3寸,當腓骨前緣
- 309. 病人在中風後而造成失明,你可以使用以下哪一個頭皮針的定位來治療?
  - A. 與枕外粗隆平齊,旁開 1 公分處,向上引 4 公分平行正中線的直線
  - B. 以瞳孔直上的髮際處為起點,向後與正中線平行作2公分長的直線
  - C. 在胃區與前後正中線之間,以髮際為中點向前後作4公分長的直線
  - D. 在胃區外側,以胃區和胸腔區的相同距離向後作2公分的直線
- 310. 病人在以下哪一些情況下不可以使用耳針來做治療?

  - A. 耳鳴、耳聾 B. 耳廓凍傷、耳朵炎症
  - C. 耳朵不潔、耳垢過多 D. 懷孕 6 個月後的婦女
- 311. 四神聰應該要如何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.3-0.5 寸 B. 斜刺 0.5-0.8 寸
  - C. 横刺 0.5-1.0 寸 D. 横刺 0.3-0.5 寸
- 312. 位於尾骨尖端直上 2 寸,這個穴位應該要如何針刺最為正確?

  - A. 首刺 0.5-0.8 寸 B. 向上斜刺 0.5-1.0 寸
  - C. 向下横刺 1.0-1.5 寸 D. 向上横刺 1.0-2.0 寸
- 313. 病人現在有黃疸,他平常食欲差,腹瀉,下腹部冷痛,四肢冰冷,舌稍淡,苔 白滑。這個病人除了用陰陵泉、肝俞、膽俞、至陽等穴位來治療之外,還可以 再加上以下哪一些穴位來增強治療作用?
  - A. 足三里、脾俞、陽綱 B. 陽陵泉、足三里、太衝
  - C. 曲池、合谷、水分 D. 三陰交、足三里、氣海
- 314. 病人手腕、手掌部發熱,氣短,最有可能的病變經絡為何?
  - A. 手少陰絡脈 B. 手太陰絡脈 C. 手厥陰絡脈 D. 手太陽絡脈

- 315. 病人患有帶狀疱疹,皮膚灼熱疼痛有小水泡,除了可以在局部點刺出血外,還 可以再加上以下哪一組治療穴位?
  - A. 曲池、委中、合谷、曲澤、血海 B. 靈台、委中、身柱、郄門、合谷
  - C. 血海、太衝、陽陵泉、曲池、委中 D. 合谷、委中、三陰交、血海、曲池
- 316. 可以治療癲狂、神志昏迷、腰脊痛,而且是足陽明經、手陽明經、督脈的交會 穴,這個穴位應該要如何針刺操作最正確?
  - A. 直刺 0.2-0.4 寸 B. 向下斜刺 0.3-0.5 寸
  - C. 向上横刺 0.4-0.6 寸 D. 向上斜刺.03-0.5 寸
- 317. 位於人中溝的上三分之一與中三分之一的交點處,這個穴位是以下哪些經脈的 交會穴?
  - A. 督脈、手陽明經、足陽明經 B. 督脈、足太陽經、足陽明經
  - C. 督脈、足太陽經、足厥陰經 D. 手太陽經、手少陽經、足少陽經
- 318. 以下哪一個穴位的定位是屬於足厥陰經的絡穴?
  - A. 足背,第一、二跖骨結合部之前方凹陷中
  - B. 內踝高點直上5寸,脛骨內側面的中央
  - C. 外踝高點直上5寸,腓骨前緣
  - D. 內踝後下方,當跟腱附著部的內側前方凹陷處
- 319. 病人有疝氣,陰部搔癢,這是以下哪一個經絡的病候?
  - A. 任脈絡 B. 足太陰絡 C. 足厥陰絡 D. 足少陰絡
- 320. 位於內踝高點直上 5 寸,脛骨內側面的中央,這個穴位應該要如何針刺操作最 適當?
  - A. 直刺 0.5-0.8 寸 B. 斜刺 0.3-0.5 寸
  - C. 斜刺 0.5-0.7寸 D. 横刺 0.3-0.5寸
- 321. 以下哪一些穴位都與足太陰經相交會?
  - A. 中府、期門、日月 B. 中極、關元、章門
  - C. 天樞、中脘、巨闕 D. 京門、膻中、石門
- 322. 以下哪一個穴位的定位是屬於手太陰經的募穴?
  - A. 在側腹部,第十一肋游離端的下際
  - B. 在胸前壁的外上方,雲門下1寸,平第一肋間隙,距前正中線6寸
  - C. 在腹正中線上, 臍上6寸
  - D. 乳頭直下,第六肋間隙,前正中線旁開4寸
- 323. 位於在胸前壁的外上方,平第一肋間隙,距前正中線6寸,這個穴位應該要如 何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.5-0.8 寸 B. 向內斜刺 0.5-0.7 寸
  - C. 向外斜刺 0.5-0.8 寸 D. 向外斜刺 0.5-0.8 寸
- 324. 四縫穴在臨床治療時,應該要如何操作最適當?
  - A. 艾柱灸 7-14 壯 B. 點刺出血
  - C. 淺刺 0.1-0.2 寸 D. 點刺,擠出少許黃白色黏液
- 325. 關於手少陰絡脈的病候,下列敘述何者正確?
  - A. 胸膈脹滿,不能說話 B. 咽部腫痛,突然音啞
  - C. 耳聾, 牙齒發冷, 胸膈悶塞不暢 D. 失眠, 盜汗, 心痛, 心悸

- 326. 以下哪一個穴位不可以向內側深刺?
  - A. 上臂內側, 腋紋頭下 3 寸, 當肱二頭肌橈側
  - B. 在胸前壁的外上方, 肩胛骨喙突上方, 鎖骨下窩凹陷處, 距前正中線 6寸
  - C. 鎖骨內側端的上緣,當胸鎖乳突肌的胸骨頭與鎖骨頭之間
  - D. 鎖骨上窩中央,前正中線旁開4寸
- 327. 以下哪一個穴位的定位是屬於手厥陰經的絡穴?
  - A. 腕橫紋上3寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
  - B. 仰掌,在尺側腕屈肌腱之橈側,腕横紋上1寸
  - C. 腕横紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
  - D. 腕橫紋的中央,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
- 328. 以下哪一個定位是屬於八脈交會穴通衝脈的穴位?
  - A. 腕橫紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
  - B. 內踝後下方,當跟腱附著部的內側前方凹陷處
  - C. 第四跖趾關節的後方,小趾伸肌腱的外側凹陷處
  - D. 第一跖骨基底前的下缘凹陷處, 赤白肉際
- 329. 病人突然昏倒,不省人事,兩手固握,牙關緊閉,面紅氣粗,喉嚨有痰鳴聲, 大小便不通, 舌很紅, 苔黃厚膩。以下哪一組治療穴位最適當?
  - A. 百會、湧泉、水溝、豐降、太衝、中衝
  - B. 百會、通天、風府、足三里、風池、太衝
  - C. 水溝、百會、氣海、足三里、內關、合谷
  - D. 合谷、中衝、水溝、勞宮、湧泉、太衝
- 330. 手太陰經的原穴與郄穴這兩穴位的距離為多少?
  - A. 5寸 B. 7寸 C. 9寸 D. 6寸
- 331. 足太陰經的合穴與郄穴這兩穴位的距離為多少?
  - A. 7寸 B. 5寸 C. 3寸 D. 4寸
- 332. 病人患有急性哮喘,以下哪一個治療穴位最佳?
  - A.翳風與風池連線的中點 B. 鼻唇溝上端盡處
  - C. 大椎上2寸, 督脈旁開1寸 D. 大椎旁開5分
- 333. 以下哪一個穴位可以通向督脈?
  - A. 微握拳, 尺側, 第五掌指關節後緣遠側橫紋頭赤白肉際處
  - B. 微握拳,在手尺側,小指掌指關節前的掌指橫紋頭赤白肉際
  - C. 外踝正下方凹陷中
  - D. 在腕背横紋上2寸,陽池與肘尖的連線上,橈骨與尺骨之間
- 334. 可以直接連繫心臟、腦、腎臟的經絡為何?
  - A. 足陽明經 B. 足太陽經 C. 足太陰經 D. 足厥陰經
- 335. 病人有習慣性的偏頭痛,在傍晚時最容易發作,治療時可以使用哪一組穴位最 適當?
  - A. 合谷、內庭 B. 后溪、崑崙 C. 外關、足臨泣 D. 支正、至陰
- 336. 病人長期患有痔瘡,嚴重的時候還會引起出血,選用以下哪一組治療穴位的療 效最佳?
  - A. 長強、四白 B. 天樞、上巨虚 C. 養老、足三里 D. 二白、承山

- 337. 病人有失眠,她還有嚴重的憂鬱症,以下哪一個治療穴位最適當?
  - A. 足背,第一、二跖骨結合部之前方凹陷中
  - B. 内踝高點直上5寸,脛骨内側面的中央
  - C. 腕横紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
  - D. 内踝後下方,當跟腱附著部的內側前方凹陷處
- 338. 如果你用耳穴中的對屏尖來治療腮腺炎,以下哪一種操作手法最適當?
  - A. 點刺出血 B. 灸法 C. 電針 D. 毫針淺刺
- 339. 一孕婦的預產期已經超過十天,此時你應該如何處理最適當?
  - A. 在耳尖點刺出血 B. 重灸至陰穴 C. 按摩局井穴 D. 針刺足三里穴
- 340. 有一位已經超過預產期一週的孕婦到診所來尋求治療,她平常就有氣滯血瘀的問題,請問你可以使用以下哪一組穴位來做治療最適當?
  - A. 氣海、血海、崑崙 B. 足三里、至陰、三陰交
  - C. 合谷、氣海、太衝 D. 三陰交、至陰、合谷
- 341. 有一位女病人來診時說她有便秘,需要針灸治療的幫助,她已經懷孕四個月,你應該使用以下哪一組治療穴位最適當?
  - A. 足三里、曲池、支溝、照海、豐隆 B. 天樞、上巨虚、合谷、曲池、內庭
  - C. 大腸俞、支溝、照海、氣海、二白 D. 三陰交、豐隆、中脘、天樞、行間
- 342. 深刺以下哪一個穴位會損傷橈側返回動脈?
  - A. 在臂外側,屈肘,肘横紋上方1寸,當肱骨邊緣處
  - B. 屈肘,當肘橫紋外端凹陷處,當尺澤與肱骨外上髁連線的中點
  - C. 肩峰前下方,三角肌的上部,上臂外展平舉時,肩前呈現凹陷處
  - D. 在前臂掌側,當尺澤與太淵的連線上,腕橫紋上7寸
- 343. 針刺過深位於內踝高點直上 5 寸,脛骨內側面的中央的穴位,最容易損傷以下哪一種生理組織?
  - A. 脛前動脈 B. 脛後動脈 C. 隱神經 D. 腓腸內側皮神經
- 344. 如果你要用八邪穴來治療病人,此時你應該要如何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.5-0.8 寸 B. 直刺 0.3-0.5 寸
  - C. 斜刺 0.5-0.8 寸 D. 斜刺 0.3-0.5 寸
- 345. 病人因為中風引起下肢癱瘓,無法行走,治療時應該取用以下哪一個頭皮針最適當?
  - A. 運動區上 1/5 B. 運動區下 2/5 C. 足運咸區後 2/5 D. 咸覺區上 2/5
- 346. 以下哪一個穴位的定位是屬於足少陽經的募穴?
  - A. 在側腰部,第十二肋游離端的下緣
  - B. 乳頭直下,第七肋間隙,前正中線旁開4寸
  - C. 在側腹部,第十一肋游離端下際
  - D. 乳頭直下,第六肋間隙,前正中線旁開 4寸
- 347. 如果你要用八風穴來治療病人,此時你應該要如何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.5-0.8 寸 B. 直刺 0.3-0.5 寸
  - C. 斜刺 0.5-0.8 寸 D. 斜刺 0.3-0.5 寸
- 348. 位於第八胸椎棘突下,旁開 1 寸 5 分,這個穴位可以治療以下哪一個病症?
  - A. 疔瘡 B. 黃疸 C. 高血壓 D. 糖尿病

- 349. 病人有失眠,夜晚盗汗,五心煩熱,口乾,咽喉乾,頭暈耳鳴,心悸健忘,腰 痠無力,舌紅少苔,脈細數。治療時你可以使用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 太溪、心俞、神門、三陰交、安眠、腎俞
  - B. 神門、安眠、肝俞、心俞、三陰交、關元、曲泉
  - C. 神門、足三里、安眠、脾俞、心俞、三陰交、隱白
  - D. 胃俞、神門、足三里、安眠、心俞、三陰交、內關
- 350. 病人有癲癇,經常發作,治療時你可以選擇以下哪一些經脈的穴位最適當?
  - A. 手厥陰經、督脈、足太陽經 B. 足厥陰經、督脈、任脈
  - C. 足陽明經、陰蹺脈、陽蹺脈 D. 督脈、足太陰經、足少陰經
- 351. 女病人長期失眠,難以入睡,多夢易驚醒,心悸健忘,疲倦乏力,飲食無味, 食欲不佳,面色蒼白,舌淡苔薄白,脈細弱。治療時你可以使用以下哪一組穴 位最適當?
  - A. 太溪、心俞、神門、三陰交、安眠、腎俞
  - B. 神門、安眠、肝俞、膽俞、三陰交、完骨、行間
  - C. 神門、足三里、安眠、脾俞、心俞、三陰交、隱白
  - D. 胃俞、神門、足三里、安眠、心俞、三陰交、內關
- 352. 病人手腕疼痛,在陽池穴的位置有壓痛,而且活動時疼痛明顯,如果你想要使用遠端取穴的方法來做治療,以下哪一個穴位最適當?
  - A. 陽陵泉 B. 京骨 C. 大鐘 D. 丘墟
- 353. 病人患有慢性癲癇,這個病人在緩解期時可以用以下哪一組穴位來做治療?
  - A. 心俞、印堂、腰奇、神門、三陰交、太溪
  - B. 水溝、間使、太衝、鳩尾、豐隆
  - C. 百會、湧泉、水溝、豐隆、太衝、中衝
  - D. 足三里、豐隆、中脘、關元、申脈、照海
- 354. 病人有以下哪一種情況時不可以使用三棱針來做治療?
  - A. 關節炎 B. 血管瘤 C. 貧血 D. 糖尿病
- 355. 病人有以下哪一種情況時不可以使用灸法來做治療?
  - A. 子宮下垂 B. 低血壓 C. 外感熱病 D. 孕婦陰道不正常出血
- 356. 病人來診時抱怨牙痛嚴重,還說口很渴,覺得熱,出大汗,舌苔黃。治療時你可以使用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 液門、風池、頰車、下關、合谷 B. 頰車、下關、太溪、復溜
  - C. 少商、合谷、内庭、天容、魚際 D. 合谷、内庭、頰車、下關
- 357. 病人有以下哪一種病症時不可以使用三棱針來做治療?
  - A. 血小板減少性紫癜 B. 腎上腺皮質功能亢進症
  - C. 甲狀腺功能減退症 D. 高血壓引起的頭頭、頭暈
- 358. 病人患有三叉神經痛,而且是下頜支疼痛,治療時你可以使用以下哪一組穴位 最適當?
  - A. 陽白、攢竹、太陽、外關 B. 下關、頰車、大迎、合谷、夾承漿
  - C. 四白、顴髎、迎香、合谷 D. 地倉、頰車、翳風、下關、合谷
- 359. 在以下哪一種情況下不可以使用灸法來治療病人?
  - A. 習慣性流產的孕婦 B. 高血壓的老人 C. 孕婦的下腰部 D. 腹瀉的幼兒

- 360. 病人有以下哪一些病症時不適合採用灸法來做治療?
  - A. 虛證、寒證 B. 表證、寒證 C. 裡證、實證 D. 實證、熱證
- 361. 梅花針可以用來治療以下哪一些病症最適當?
  - A. 神經系統疾病、皮膚病 B. 慢性病、疼痛性疾病
  - C. 消化道系統疾病、血液病 D. 臟腑疾病、肌肉骨骼系統疾病
- 362. 有一肥胖女性到診所來,說她非常怕冷,而且總是四肢冰冷,已經結婚 5 年都 無法懷孕。以下哪一組治療穴位與操作手法對病人的問題最有幫助?
  - A. 針刺中極、次髎、三陰交 B. 艾灸神闕、關元
  - C. 在腰部與下腹部走罐 D. 用皮膚針扣刺足三陰經
- 363. 有一年輕女病人來診時說她已經 5 個月沒有來月經,西醫檢查後告訴她沒有懷 孕,她的下腹部脹痛且拒按,胸部、脅肋脹滿,舌邊紫暗有瘀點,脈弦緊。治 療時你可以使用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 關元、腎俞、脾俞、足三里、三陰交、肝俞
  - B. 中極、血海、曲池、曲泉、隱白、太衝
  - C. 歸來、合谷、中極、血海、太衝、三陰交
  - D. 合谷、中極、血海、太衝、地機、次髎
- 364. 以下哪一味中草藥大劑量服用會引起血壓升高與水腫?
  - A. 黄耆 B. 白朮 C. 人參 D. 炙甘草
- 365. 有一懷孕三個月的婦女到診所來,說她最近有輕微且持續的陰道出血,血色紫 暗伴有輕微腹痛,這些症狀在壓力大時加重,你應該使用以下哪一個治療方劑 最適當?
  - A. 桂枝茯苓丸 B. 溫經湯 C. 膠艾湯 D. 生化湯
- 366. 以下哪一味中草藥具有養血補血的功效?
  - A. 山渣 B. 當歸 C. 黃耆 D. 山藥
- 367. 一女病人有嚴重的經前期綜合症,總是月經前煩躁易怒,非常容易生氣,平時 還有脅肋脹痛,頭痛,頭量,口苦,口乾渴,稍有便秘,舌紅。你應該使用以 下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 逍遙散 B. 血府逐瘀湯 C. 龍膽瀉肝湯 D. 四逆散
- 368. 女病人來診時說她最近的陰道分泌物增多,顏色黃,而且質地黏稠有臭味,陰 部紅腫疼痛,而且伴有搔癢,尿時疼痛有灼熱,經期縮短,而色紫紅,舌苔黃 膩。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 八正散 B. 完帶湯 C. 黃連解毒湯 D. 龍膽瀉肝湯
- 369. 以下哪一味中草藥可以清熱涼血,常用來治療月經過多?
  - A. 龜板 B. 鱉甲 C. 槐花 D. 白芍
- 370. 試問玉屏風散與當歸六黃湯的治療特性有何不同?
  - A. 玉屏風散主治陽盛引起的大汗出,當歸六黃湯主治陰盛引起的出汗
  - B. 玉屏風散主治氣虛自汗,當歸六黃湯主治陰虛盜汗
  - C. 玉屏風散主治亡陽引起的油汗,當歸六黃湯主治亡陰引起的黏汗
  - D. 玉屏風散主治表虚引起的汗出,當歸六黃湯主治溫病後期引起的虛熱
- 371. 病人陰虛有熱或血熱時,以下哪一個中草藥不可以用?
  - A. 地榆 B. 側柏葉 C.艾葉 D. 白茅根

- 372. 病人現在有胎動不安,而且下腹部冷,四肢冰冷,你可以使用以下哪一味中草藥來做治療?
  - A. 槐花 B. 三七 C. 仙鶴草 D. 艾葉
- 373. 女病人長期耳鳴,時發時止,勞累則加重,按壓後會緩解,頭暈,腰痠無力,帶下多,脈細弱無力。治療時你可以使用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 翳風、腎俞、命門、俠溪、聽會、太溪、中渚
  - B. 聽宮、行間、俠溪、翳風、中渚、足臨泣
  - C. 風池、合谷、翳風、俠溪、外關、聽會、中渚
  - D. 豐隆、行間、俠溪、風池、耳門、中渚、翳風、肝俞
- 374. 病人正在服用玉屏風散,他現在還出現過敏性鼻炎、鼻塞不通的症狀,鼻子有 濃厚的腥臭味,你可以再加上以下哪些藥物來增加療效?
  - A. 仙鶴草、側柏葉、白茅根 B. 蒼耳子、辛夷花、白芷
  - C. 牡蠣、浮小麥、五味子 D. 陳皮、桔梗、辛夷花
- 375. 有一男病人常感覺胸中煩躁有熱感,口渴想喝冷水,面紅,嘴巴周圍生瘡,尿少,尿痛,尿血,舌紅苔黃,脈數。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當? A. 黃連阿膠湯 B. 八正散 C. 導赤散 D. 黃連解毒湯
- 376. 在電腦公司工作的資深女工程師來診,說她正在服用西藥 Paxil (Paroxetine),你可以使用以下哪一個方劑來做替代性的治療?
  - A. 逍遙散 B. 小柴胡湯 C. 越鞠为 D. 甘麥大棗湯
- 377. 一年輕女性來診時主訴有痛經,月經前 2-3 天即有下腹部脹痛,經行不暢, 量少,色紫暗有血塊,血塊排出後腹痛減輕,胸部、脅肋、乳房脹痛,舌邊紫 有瘀點,脈沉弦。治療時你可以使用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 中極、合谷、血海、地機、太衝、次髎、四滿
  - B. 歸來、氣海、中極、血海、三陰交、地機、次髎
  - C. 足三里、關元、三陰交、腎俞、太溪、復溜
  - D. 肝俞、曲泉、三陰交、足三里、關元、太衝、膈俞
- 378. 中年男性來診時說他有嚴重的失眠、心悸,還伴有焦慮不安,情緒煩躁,胸部有熱感,稍有盜汗,口舌生瘡,口乾,舌紅,脈細數。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 酸棗仁湯 B. 黃連阿膠湯 C. 甘麥大棗湯 D. 導赤散
- 379. 病人正在服用西藥法華令鈉 (Warfarin Sodium) ,以下哪一個中草藥具有相同的治療功效?
  - A. 艾葉 B. 酸棗仁 C. 山楂 D. 山藥
- 380. 有一退休的老先生長期有高血壓,常會有頭痛、頭暈,煩躁不安,耳鳴嗡嗡作響,耳鳴聲音大,面紅,舌紅苔薄乾,脈弦長有力。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 天麻鉤藤飲 B. 龍膽瀉肝湯 C. 瀉心湯 D. 鎮肝熄風湯
- 381. 女病人患有癌症,已經接受了手術與化療。她來診抱怨常在夜晚發熱,早上時候身體覺得冷,退熱時沒有出汗,她的胃口還不錯,體重卻持續的下降,舌紅少苔,脈虛細。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 青蒿鱉甲湯 B. 當歸六黃湯 C. 橘皮竹茹湯 D. 白虎湯

- 382. 以下哪一些中草藥最常使用醋制法?
  - A. 黄芩、川芎 B. 龜板、鱉甲 C. 白朮、蒼朮 D. 款冬花、百部
- 383. 病人正在服用固經丸,她現在的月經出血多而嚴重,應該還要再加上以下哪一 些藥物來做治療?
  - A. 地榆、槐花米 B. 牡丹皮、侧柏葉 C. 仙鶴草、地榆 D. 牡丹皮、赤芍
- 384. 病人最近經常有咳嗽,咳嗽有痰,痰在深處很難咳出,有喘息聲,咽喉乾痛,口乾,舌紅乾少苔,脈細數有力。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當? A. 百合固金湯 B. 杏蘇散 C. 麥門冬湯 D. 貝母瓜蔞散
- 385. 在貝母瓜蔞散中為什麼要使用川貝母而不使用淅貝母?
  - A. 因為川貝母重在潤肺燥,主治痰少難咳出;浙貝母重在清肺熱,主治痰多
  - B. 因為川貝母重在清肺熱,主治痰多;浙貝母重在潤肺燥,主治痰少難咳出
  - C. 因為川貝母重在養肺陰,主治陰虛肺燥;浙貝母重在化痰濕,主治痰多
  - D. 因為川貝母重在降肺氣,主治痰難排出;浙貝母重在軟堅散結,主治痰稠
- 386. 病人現在有高熱,口渴,大汗出,舌很紅,以下哪一組治療的藥物最適當? A. 生地、木通 B. 石膏、知母 C. 知母、黃柏 D. 黄芩、黄連
- 387. 以下哪一種藥物的炮制方法可以改變藥物的苦寒之性?
  - A. 酒制 B. 鹽制 C. 薑汁炮制 D. 附子炮制
- 388. 過量服用桂枝湯最有可能出現以下哪些副作用?
  - A. 頭量,頭痛,血壓升高,牙齦流血
  - B.虚弱,心悸,輕微頭痛,沒有胃口
  - C. 脖子僵硬,頭痛,四肢冰冷,神志錯亂
  - D. 大汗出, 高熱, 口渴, 煩躁
- 389. 針灸師讓病人服用消風散來治療他的病症,而且還特別加上地膚子與薏仁,這是因為這個病人身上的哪一種病邪比較嚴重?
  - A. 濕邪重 B. 風邪重 C. 熱邪重 D. 寒邪重
- 390. 病人有發熱,出汗,口渴,自行服用銀翹散無效。他現在有高熱,煩躁不安, 大汗出,口乾渴,舌紅苔黃。針灸師想給他黃連解毒湯來治療,你覺得使用以 下哪些藥物來做治療更為適當?
  - A. 大黄、芒硝 B. 石膏、知母 C. 知母、黄柏 D. 蘆根、白茅根
- 391. 病人有嚴重的失眠,你診斷為血虛,以下哪一個治療藥物最適當?
  - A. 當歸 B. 熟地黃 C. 酸棗仁 D. 龍眼肉
- 392. 病人現在有下焦出血,以下哪一組治療藥物最適當?
  - A. 蘆根、白茅根 B. 艾葉、阿膠 C. 牡丹皮、側柏葉 D. 地榆、槐花米
- 393. 女病人最近精神狀態非常不穩定,西醫要她服用抗憂鬱症的藥物。她總是覺得喉嚨有異物感,吞之不下,吐之不出,胸悶脹,常會噁心想吐,舌苔白膩。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 半夏厚樸湯 B. 半夏瀉心湯 C. 逍遙散 D. 蘇子降氣湯
- 394. 有一婦女來診時說她最近的體檢報告表示她有嚴重的貧血,常有心動過速,胸悶,失眠,疲倦乏力,月經量很多,顏色淡,經期約 10 到 15 天,稍有腹瀉,脈虛細。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 四物湯 B. 歸脾湯 C. 當歸補血湯 D. 十全大補湯

- 395. 病人有經常性的乾嘔,反胃,舌稍紅。正在服用橘皮竹茹湯,2 週後,病人不覺得疲倦,沒有氣虛的症狀,此時應該要如何來加減藥物最適當?
  - A. 去掉生薑不用 B. 去掉甘草不用 C. 去掉人參不用 D. 去掉陳皮不用
- 396. 病人現在有失眠,煩躁不安無法入睡,心悸,頭暈眼花,夜晚出汗,口乾,咽喉乾,舌紅乾,脈弦細數。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 當歸六黃湯 B. 甘麥大棗湯 C. 黃連阿膠湯 D. 酸棗仁湯
- 397. 以下哪一味藥物為保和丸的君藥?
  - A. 山楂 B. 神曲 C. 半夏 D. 萊菔子
- 398. 具有清熱燥濕,降氣平喘的功效是以下哪一類藥物的治療特性?
  - A. 酸味 B. 苦味 C. 鹹味 D. 辛味
- 399. 有一個懷孕 30 週的婦女來診,主訴有嚴重失眠,她還有便秘的問題,你覺得以下哪一個治療藥物對病人最有幫助?
  - A. 酸棗仁 B. 黑芝麻 C. 柏子仁 D. 火麻仁
- 400. 病人最近有便秘,大便乾硬難以排出,尿頻數,舌苔黃乾,脈沉數。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 調胃承氣湯 B. 潤腸丸 C. 小承氣湯 D. 麻子仁丸
- 401. 如果過量服用五苓散會引起以下哪些副作用?
  - A. 眩量,口淡,食欲差 B. 口乾,口渴,煩躁不安
  - C. 頭暈,頭痛,牙齦流血 D. 虛弱,心悸,輕微頭痛,沒有胃口
- 402. 婦女生產後覺得虛弱,你可以建議她食用以下哪些食物最適當?
  - A. 牛肉湯+杜仲 B. 雞湯+枸杞子 C. 鯽魚湯+黃豆 D. 蔬菜湯+麥芽
- 403. 一女病人來診時說她很疲勞,而且勞累後發熱,自汗,怕冷,不喜歡講話,腹 瀉有水樣便,食量不多,子宮有輕微下垂,舌淡。你應該使用以下哪一個治療 方劑最適當?
  - A. 歸脾湯 B. 當歸補血湯 C. 補中益氣湯 D. 八珍湯
- 404. 病人如果現在有感冒表證,以下哪一個治療的藥物不可以使用?
  - A. 當歸 B. 生地 C. 白芍 D. 阿膠
- 405. 男病人來診時抱怨說他的手指、腳趾冰冷,但是身體溫暖,伴有胸部、上腹部 脹滿,平常情緒不穩定易受刺激,會跟人爭吵,舌紅苔黃,脈弦。你應該使用 以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 四逆散 B. 四逆湯 C. 小柴胡湯 D. 半夏瀉心湯
- 406. 以下哪一個中草藥與西藥的促凝血藥具有相同的治療功效?
  - A. 當歸 B. 蒲黃 C. 丹參 D. 枸杞子
- 407. 針灸師使用半夏瀉心湯來治療病人,這個病人最有可能是以下哪一種病因?
  - A. 瘀熱互結在下焦 B. 痰氣互結在上焦
  - C. 寒熱互結在中焦 D. 水熱互結在下焦
- 408. 男病人由母親陪同前來看診,說他在當軍人的時候參加阿富汗戰爭,之後便出現非常膽小,神經質,疲倦乏力,容易受到驚嚇,每天早上很早醒來就無法再回去睡覺,頭量,視物不清,舌淡。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 溫膽湯加上黃耆、肉桂 B. 十全大補湯加上柴胡、香附
  - C. 逍遙散加上酸棗仁、柏子仁 D. 酸棗仁湯加上黨參、龍骨

- 409. 以下哪項清潔要求不是針灸操作進行時所必要的,但是卻有預防感染的作用?
  - A. 戴手套 B. 針刺前洗手 C. 建立潔淨區 D. 使用一次性針灸針
- 410. 以下哪一些是針灸師的合法執業範圍?
  - A. 脊椎矯正、刮痧、拔罐 B. 亞洲按摩、刮痧、拔罐
  - C. 脊椎矯正、刮痧、皮下注射 D. 亞洲按摩、拔罐、皮下注射
- 411. 針灸師從事以下哪一項業務行為是屬於違法的?
  - A. 指導學員針刺人體 B. 刊登廣告招攬業務
  - C. 為病人做穴位注射 D. 使用礦物產品做中藥的處方
- 412. 合法的病例記載最少應該包括以下哪一些項目?

  - A. 家族史、病名、癒後的評估 B. 過去的病史、家族史、治療計畫
  - C. 用藥記錄、診斷檢查、衛生教育 D. 病名、診斷記錄、治療計畫
- 413. 針灸師想要刊登對於治療癌症的廣告,以下廣告的內容何者最為適當?
  - A. 可以減輕放射線治療或化療的副作用
  - B. 可以在三個月內將癌症腫瘤減小為一半
  - C. 可以用針灸與中藥並治來增強免疫力,讓您不再需要放射線治療與化療
  - D. 祖傳秘方,神奇秘技,保證半年內治癒癌症,無效退費
- 414. 存放使用過針具的廢針桶應該在什麼情況下必須更換?
  - A. 裝滿二分之一時 B. 裝滿四分之三時
  - C. 裝滿三分之二時 D. 裝滿五分之四時
- 415. 當針灸師在以下哪一種情況時,應屬於非專業行為,可能觸法?
  - A. 停止營業沒有事先通知病人 B. 執業的場所沒有聘請接待員
  - C. 在註冊登記以外的地方執業 D. 將無法治療的病人轉診給其他醫生或急診
- 416. 一位針灸師突然想起來上星期看診時,忘了記載一份病例,此時這位針灸師應 該要如何處理最適當?
  - A. 立即打電話詢問病人當天看診的詳細狀況後,再填補在病例上
  - B. 可以不做任何補救的措施,只要在該病人的病例上註記即可
  - C. 只要將治療的方法與穴位,或者開立的處方填補上去即可,並寫上日期
  - D. 盡量回憶看診時的診療記錄,將其填補上去,並寫上填補的日期
- 417. 病人有惡寒發熱 3 天,現在惡寒漸輕,身熱加重,頭痛,頸項僵硬疼痛,肌肉 痛,心煩不眠,眼眶痛,口渴,舌紅苔薄黃,脈浮微洪。你應該使用以下哪一 個治療方劑最適當?
  - A. 柴葛解肌湯 B. 白虎湯 C. 清胃散 D. 黃連解毒湯
- 418. 有一年輕的病人有發熱,微惡風寒,頭痛,咽喉乾,口稍渴,咳嗽,舌尖紅, 苔薄白,脈浮數。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 桑菊飲 B. 銀翹散 C. 柴葛解肌湯 D. 人參敗毒散
- 419. 試問五苓散與豬苓湯這兩個方劑有以下哪一些共有的藥物?
  - A. 豬苓、茯苓、阿膠 B. 澤瀉、豬苓、滑石
  - C. 茯苓、豬苓、澤瀉 D. 白朮、桂枝、茯苓
- 420. 女病人患有腸胃型流行性咸冒,發熱惡寒,頭痛,胸悶痛,反胃嘔叶,腹中腸 鳴腹瀉,沒食欲,舌苔白膩,脈濡。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 人參敗毒散 B. 平胃散 C. 半夏瀉心湯 D. 藿香正氣散

- 421. 以下哪一味中草藥具有補血安胎的功效?
  - A. 桑寄生 B. 枸杞子 C. 杜仲 D. 白朮
- 422. 有一針灸師從病人身上將針取出時不小心把針掉在地板上,此時針灸師應該要如何處理最適當?
  - A. 立即用手將針拾起,直接放入密閉的標有生物危害標誌的容器內
  - B. 用戴手套的手或夾子將針拾起,直接放入密閉的標有生物危害標誌容器內
  - C. 立即用手將針拾起,用酒精消毒針後,再放入密閉不滲漏的一般容器內
  - D. 用戴手套的手或夾子將針拾起,再放入密閉不滲漏的塑料容器內
- 423. 當你在執業過程中發現有虐待的事件時,依據法令規定,你應該在多少時間內 通報有關機關才不會違法?
  - A. 72 小時 B. 48 小時 C. 36 小時 D. 24 小時
- 424. 當你在執業過程中發現有虐待的事件時,依據法令規定,你應該要向有關機關 通報,以下哪一項是屬於法律規定的通報有關機關?
  - A. 州政府的司法檢察單位或州政府的衛生廳
  - B. 當地警察局或社會福利辦公室
  - C. 市府衛生局或各地區的警察局總部
  - D. 縣立衛生局或附有專責處理機構的警察局
- 425. 在執業過程中發現有虐待的事件時,而針灸師並未向有關機關通報時,這時候 會遭受何種法律的處罰?
  - A. 罰款 1000 元,關在縣立監獄 6 個月 B. 罰款 500 元,關在縣立監獄 6 個月
  - C. 罰款 1000 元,關在縣立監獄 1 年 D. 罰款 500 元,關在縣立監獄 1 年
- 426. 在執業過程中發現有虐待的事件時,針灸師要向有關機關通報時,以下哪一些 內容是必須要通報的,例外的是?
  - A. 施虐者的個人資料 B. 被虐待施暴的原因
  - C. 受虐待者的個人資料 D. 受虐者受傷的部位與受傷的程度
- 427. 以下哪一項潔淨方式是預防交叉感染最有效的?
  - A. 戴手套 B. 建立清潔隔離區 C. 洗手 D. 治療完每個病人後立即消毒
- 428. 試問 C型肝炎的潛伏期為多長時間?
  - A. 20~90 天 B. 15~60 天 C. 30~40 天 D. 14~180 天
- 429. 一位 10 歲的小女孩因為過敏來看診,請問這個病人的病例必須要保存多久? A. 年滿 19 歲以後 B. 年滿 18 歲以後 C. 年滿 17 歲以後 D. 年滿 21 歲以後
- 430. 成年病人在看診完後,病人的病例必須要保存多久?
  - A. 4年 B. 7年 C. 5年 D. 12年
- 431. 有一位男病人的女兒來診所要替她父親索取病例資料,此時你應該要如何處理 最適當?
  - A. 將病例資料影印之後讓病人的女兒帶回
  - B. 確認兩者的親屬關係後,將病例資料影印之後讓病人的女兒帶回
  - C. 請其父親在病例釋出同意書上簽名並填寫日期,將病例資料影印讓她帶回
  - D. 請其將病例釋出同意書經法院認證後,再將病例資料影印讓她帶回
- 432. 針灸師如果違反法律,以下哪一個行政法律機構才有撤銷其執照的權利?
  - A. 針灸局 B. 承辦檢察官 C. 一般法院的法官 D. 行政法院的法官

- 433. 你診所的一位患有免疫性疾病的病人,想請西醫配合一起來做治療,此時你應該要如何處置最適當?
  - A. 在徵求病人的同意後,把病人的病例資料影印給西醫
  - B. 在徵求西醫的同意後,把病人的病例資料影印給西醫
  - C. 在徵求病人與西醫的同意後,透過電話方式來共同討論病人的病情
  - D. 病人、針灸師與西醫在一起共同討論病人的病情
- 434. 針灸師具有以下哪一種資格時可以被稱為 Doctor?
  - A. 通過針灸執照考試後 B. 具有東方醫學博士學位
  - C. 具有外國的西醫執照 D. 通過執照考試後,並已經正式申領執照者
- 435. 針灸師被查獲私藏大麻,此時關於針灸執照的處置方式何者是正確的?
  - A. 針灸局先不讓針灸師換照,待聯邦緝毒署最後調查報告出來再決定是否撤 銷其針灸執照
  - B. 針灸局先不讓針灸師換照,待聯邦緝毒署調查報告出來後,呈交法院做審理與判決確定時,再決定是否撤銷其針灸執照
  - C. 針灸局須先讓針灸師換照,待聯邦緝毒署調查報告出來後,呈交法院做審理與判決確定時,再決定是否撤銷其針灸執照
  - D. 針灸局須先讓針灸師換照,待聯邦緝毒署最後調查報告出來再決定是否撤 銷其針灸執照
- 436. 針灸師因為服用非法毒品被捕,此時關於針灸執照的處置方式何者是正確的?
  - A. 針灸局可以立即撤銷此針灸師的執照
  - B. 針灸局可以用行政命令停止針灸師的執業權利, 待法院判決確定後再決定 是否撤銷其執照
  - C. 針灸局可以用行政命令停止針灸師的執業權利,並不讓其更新執照,待法院判決確定後再決定是否撤銷其執照
  - D. 針灸局須待法院判決確定後,才可以依據職權提起撤銷針灸執照的訴訟
- 437. 病人來診時需填寫知情同意書,此同意書需有哪些要件才符合法律的規定?
  - A. 需要有病人的簽名與簽名的日期
  - B. 需要有病人的簽名,不需要簽名的日期
  - C. 需要有病人與保證人的簽名,還要填寫簽名的日期
  - D. 需要有病人與法定代理人的簽名,不需要簽名的日期
- 438. 針灸師的執照被撤銷後,需時多久才可以申請回復執照?
  - A. 2年 B. 3年 C. 4年 D. 5年
- 439. 女病人突然陰道出血,出血量多,淋漓不盡,經色淡紅,質地清稀,總覺得疲倦乏力,氣短懶言,沒有食欲,舌淡苔薄白,脈細弱。治療時你可以使用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 中極、血海、太衝、曲池、隱白、曲泉
  - B. 腎俞、脾俞、三陰交、關元、足三里、太溪
  - C. 百會、關元、隱白、陽池、足三里、三陰交
  - D. 太衝、曲泉、肝俞、關元、三陰交、次髎
- 440. 當你在急救病人施以 CPR 時,按壓胸部的頻率應該如何最適當?
  - A. 60 次/分鐘 B. 80 次/分鐘 C. 120 次/分鐘 D. 100 次/分鐘

- 441. 病人有嚴重腹瀉,腹痛,輕微發熱,噁心,大便是水樣便,這個病人最有可能 的病症為何?致病的病原體為何?
  - A. 為急性腸胃炎,致病菌為大腸桿菌 B. 為急性胃炎,致病菌為幽門桿菌
  - C. 為細菌性痢疾,致病菌為志賀菌 D. 為食物中毒,致病菌為沙門氏菌
- 442. 男病人長期患有胃潰瘍,最近又被檢查出有惡性貧血,這個病人最有可能是以下哪一個原因所造成的貧血?
  - A. 因為胃潰瘍而無法消化吸收營養物質,而引起維生素 B12 缺乏的惡性貧血
  - B. 因為胃潰瘍導致內因子不足,無法與維生素 B12 結合而導致腸道無法吸收
  - C. 因為胃潰瘍出血引起的慢性貧血,進而演變為惡性貧血
  - D. 因為胃潰瘍引起的造血功能障礙,進而形成惡性貧血
- 443. 病人有嚴重的低血糖,最有可能是以下哪一種病症所引起的?
  - A. 胰腺炎 B. 慢性膽囊炎 C. 胰島細胞瘤 D. 十二指腸潰瘍
- 444. 以下哪一個內分泌腺具有調節血鈣的作用?
  - A. 甲狀腺濾泡細胞 B. 腎上腺皮質束狀帶 C. 松果體 D. 甲狀旁腺
- 445. 以下哪一個牛理組織是能量的加工廠?
  - A. 腺粒體 B. 高爾基複合體 C. 核糖體 D. 胸腺小體
- 446. 人體腎上腺素分泌的多寡會如何影響到血壓與體重,以下敘述何者是正確的?
  - A. 分泌增加會升高血壓,增加體重與水腫;分泌減少會降低血壓,減輕體重
  - B. 分泌增加會升高血壓,減輕體重;分泌減少會降低血壓,增加體重與水腫
  - C. 分泌增加會降低血壓,增加體重與水腫;分泌減少會升高血壓,減輕體重
  - D. 分泌增加會降低血壓,減輕體重;分泌減少會升高血壓,增加體重與水腫
- 447. 關於使用兩手觸診肝臟的方法,以下敘述何者是正確的?
  - A. 站在病人左側,右手放在右上腹部與肋緣平行,左手托住病人的右腰部, 病人呼氣時,左手向上推,右手壓向深處,病人吸氣時向上觸摸肝臟
  - B. 站在病人左側,右手放在右上腹部與肋緣平行,左手托住病人的右腰部, 病人吸氣時,左手向上推,右手壓向深處,病人呼氣時向上觸摸肝臟
  - C. 站在病人右側,右手放在右上腹部與肋緣平行,左手托住病人的右腰部, 病人呼氣時,左手向上推,右手壓向深處,病人吸氣時向上觸摸肝臟
  - D. 站在病人右側,右手放在右上腹部與肋緣平行,左手托住病人的右腰部, 病人吸氣時,左手向上推,右手壓向深處,病人呼氣時向上觸摸肝臟
- 448. 病人有肩關節疼痛,彎腰時胸廓突起,此時你應該如何處置最適當?
  - A. 應該為軟組織損傷,可以針灸、拔罐治療
  - B. 應該為肩關節脫位,可以使用手法復位
  - C. 應該是嚴重脊柱側彎引起的,將病人轉送脊骨神經科
  - D. 應該是關節脫位或骨折,將病人轉送西醫做 X-ray 檢查
- 449. 病人最近有腹痛、腹瀉,經西醫確診為結腸炎,以下哪一組臨床症狀最有可能 出現在病人的身上?
  - A. 腹痛,伴有裡急後重,腹瀉為黏液樣便
  - B. 腹痛,輕微發熱,腹瀉嚴重為水樣便
  - C. 腹痛,伴有裡急後重,腹瀉為膿血便
  - D. 腹部燒灼樣痛,按壓疼痛加重,腹瀉、便祕交替出現,有黑血便

- 450. 病人今早突然音啞,最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 肺氣虚 B. 外感風熱 C. 腎陰虚 D. 肝火犯肺
- 451. 病人最近血壓偏高,有偏頭痛,痛在眼睛後面,眩暈,耳鳴時發時止,口乾, 大便乾,失眠,情緒煩躁易怒,舌紅苔薄黃,脈弦。這個病人最有可能是以下 哪一個中醫診斷?
  - A. 肝火上炎 B. 肝風上擾 C. 肝陽上亢 D. 陰虛動風
- 452. 病人有尿頻、尿急、尿時灼熱疼痛,西醫檢查為泌尿道感染引起的腎臟炎,病 人覺得口乾,下腹部悶痛,嘴唇紅乾,沒有潰瘍,舌苔黃厚膩。這個病人最有 可能的中醫診斷為何?
  - A. 小腸實熱 B. 肝膽濕熱 C. 脾胃濕熱 D. 膀胱濕熱
- 453. 病人有尿頻、尿急、尿時灼熱疼痛,還有血尿,西醫檢查為泌尿道感染引起的 腎臟炎,病人覺得□乾渴,胸部不舒有熱感,情緒不安,喉嚨痛,嘴唇紅乾, 舌頭潰瘍,舌苔黃,脈洪數。這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 小腸實熱 B. 肝膽濕熱下注 C. 脾胃有熱下移膀胱 D. 膀胱濕熱
- 454. 病人平常食欲佳, 什麼食物都可以吃很多, 他特別喜歡吃甜食, 尤其是蛋糕與 各種甜點,這個病人最有可能出現以下哪一種問題?
  - A. 會產生熱證, 尤其是肝與胃 B. 阻礙脾的功能而形成濕
  - C. 容易引起脾陽虚
- D. 引起胃陰虛
- 455. 病人最近 2 週總是失眠,做惡夢,心悸胸悶,煩躁不安,口乾渴,昨天開始有 尿痛、尿血,口舌有潰瘍、膿瘡,苔黃乾。這個病人最有可能是以下哪一個中 醫診斷?
  - A. 肝火下移於膀胱 B. 肝膽濕熱下注於任脈、帶脈
  - C. 心火下移於小腸 D. 心火亢盛兼有膀胱濕熱
- 456. 病人現在有腹痛、腹瀉,大便有惡臭,夾雜有膿血便,裡急後重,肛門灼熱, 發熱,汗出,汗出後熱不退,口渴不喜歡喝水,舌苔黃厚膩。這個病人最有可 能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 脾胃濕熱 B. 肝膽濕熱 C. 膀胱濕熱 D. 大腸濕熱
- 457. 肝陽上亢與肝火上炎共同具有以下哪一些臨床症狀?
  - A. 頭痛、眩暈、耳鳴、失眠、易怒 B. 頭痛、口渴、脅肋痛、咽痛、煩躁
  - C. 頭痛、目赤、耳鳴、便秘、尿黄 D. 眩暈、耳鳴、眼乾、口苦、流鼻血
- 458. 有一位婦女來診時說她常覺得疲倦乏力,眩暈,心悸胸悶,她說生完第四個小 孩後就開始有這些症狀,她舌稍淡。這個病人應該要如何治療最適當?
  - A. 清熱 B. 補血 C. 滋陰 D. 溫陽
- 459. 一個小男孩有嚴重的鼻炎、鼻過敏,你會建議他不要食用以下哪一種食物? A. 牛肉 B. 雞肉 C. 乳酪 D. 咖哩
- 460. 病人從小就有氣喘,氣喘發作時無法平躺,呼吸困難,無法從事任何運動,這 個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 肺有痰熱 B. 外感風寒犯肺 C. 脾肺氣虛 D. 腎不納氣
- 461. 男運動員最近因為膝蓋痛來就診,你可以選用以下哪一些局部穴位來做治療?
  - A. 犢鼻、內膝眼、陰陵泉、陽陵泉 B. 足三里、血海、梁丘、風市

  - C. 伏兔、陰市、委中、委陽 D. 浮郄、鶴頂、膝陽關、陽交

- 462. 病人在做甲狀腺檢查時發現有一個腫塊,邊界清楚,做觸診時不容易推動,此時你應該要如何處理最適當?
  - A. 可以在局部點刺出血來治療 B. 轉送西醫做甲狀腺詳細檢查
  - C. 可以用軟堅散結的中藥來治療 D. 將病人轉送醫院急診
- 463. 男病人上廁所後小便總是滴滴答答的尿不乾淨,尿時有輕微疼痛,口渴,舌苔 黃厚。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 導赤散 B. 龍膽瀉肝湯 C. 八正散 D. 豬苓湯
- 464. 有一個病人來診說他有下肢疼痛,疼痛位於腓腸肌內側,還伴有麻木感,這個病人最有可能是以下哪一個神經損傷?
  - A. 第五腰椎神經 B. 第一骶椎神經 C. 第三骶椎神經 D. 第二骶椎神經
- 465. 患有 Addison's Disease 的病人在晚期最有可能出現以下哪一些臨床症狀?
  - A. 體重減輕,血壓降低,脫水,血鉀升高,血糖偏低
  - B. 體重增加, 血壓升高, 水腫, 血鉀降低, 血糖升高
  - C. 體重減輕,血壓升高,水腫,血鉀升高,血糖偏低
  - D. 體重增加, 血壓降低, 脫水, 血鉀降低, 血糖升高
- 466. 以下哪一種維生素又稱為生育酚?
  - A. 維生素 C B. 維生素 E C. 維生素 K D. 維生素 A
- 467. 病人患有心臟病,還有在服用 Warfarin Sodium 與 Aspirin,你會建議他不要食用以下哪一種維生素與食物?
  - A. 維生素 C 與芥藍菜 B. 維生素 E 與花椰菜
  - C. 維生素 K 與甘藍菜 D. 維生素 B12 與菠菜
- 468. 女病人來診時她的指甲是藍綠色,面色白,脈細弱。這個病人最有可能會是以下哪一個診斷與病證?
  - A. 血熱-崩漏 B. 血瘀-月經後期 C. 氣虛-月經先期 D. 血虛-閉經
- 469. 一位針灸師的執照有效期為 2 年,他更新執照時需要多少小時的再教育學分? A. 50 小時 B. 60 小時 C. 45 小時 D. 30 小時
- 470. 一位針灸師為第一次更新執照,他的執照有效期為 18 個月,他更新執照時需要多少小時的再教育學分?
  - A. 50 小時 B. 40 小時 C. 30 小時 D. 25 小時
- 471. 一位針灸師三年前向針灸局申請停止執業,他現在要開始重新執業,請問他需要多少小時的再教育學分才可以獲准重新執業?
  - A. 75 小時 B. 60 小時 C. 50 小時 D. 30 小時
- 472. 一位針灸師二年前向針灸局申請停止執業,他現在要開始重新執業,請問他需要多少小時的再教育學分才可以獲准重新執業?
  - A. 60 小時 B. 30 小時 C. 40 小時 D. 50 小時
- 473. 針灸師決定要變更營業場所,他應該在遷移後的多少時間內通知針灸局?
  - A. 30 天 B. 60 天 C. 15 天 D. 180 天
- 474. 以下哪一種肝炎必須要依附在 B 型肝炎病毒才可能發病?
  - A. E型肝炎 B. D型肝炎 C. A型肝炎 D. C型肝炎
- 475. 以下哪一個時限為 B 型肝炎的潛伏期?
  - A. 14-180 天 B. 15-60 天 C. 45-160 天 D. 15-50 天

- 476. 病人在針刺太衝、地機後出現暈針,針灸師應該要如何處理最適當?
  - A. 先讓病人平躺,腳稍微墊高,並給病人喝少許溫水
  - B. 先將針全部拔出,讓病人平躺,用指甲掐按水溝穴
  - C. 先將針全部拔出,再針灸或按壓足三里穴來緩解
  - D. 先將針全部拔出,再針灸或按壓合谷穴來緩解
- 477. 以下哪一些是 B 型肝炎最為常見的肝外症狀?
  - A. 關節炎、血管炎、腎小球腎炎 B. 關節疼痛、神經炎、腎盂腎炎
  - C. 疲勞、沒有食欲、情緒壓抑 D. 情緒壓抑、腎小球腎炎、神經炎
- 478. 以下何者為 B 型肝炎最有可能的傳染途徑?
  - A. 透過食物與水傳染 B. 透過血液與性行為傳染
  - C. 透過共食與唾液傳染 D. 透過飛沫與皮膚接觸傳染
- 479. 以下哪一種結締組織是位在人體的關節腔內而且沒有上皮樣細胞?
  - A. 基膜 B. 肌膜 C. 滑膜 D. 軸系膜
- 480. 病人現在有頭痛,牙痛,以下哪一組穴位的治療效果最佳?
  - A. 合谷、內庭 B. 外關、足臨泣 C. 太衝、至陰 D. 合谷、列缺
- 481. 病人面色蒼白,疲倦乏力,頭暈,輕微頭痛,躺下來頭痛緩解,夜晚失眠,稍 有潮熱盜汗,口乾,咽喉乾,舌紅無苔。這個病人最有可能是以下哪一個中醫 診斷?

  - A. 陰虛, 由血虛演變而來 B. 陰虛, 由熱盛損傷陰液引起的

  - C. 血虚,由氣虚不能生血造成的 D. 氣血兩虚,由先天不足所引起的
- 482. 病人有水腫,突然發作,剛開始是顏面與眼瞼腫,接著遍及全身,皮膚光亮, 還伴有惡寒發熱,咳嗽、氣喘,小便少,舌苔薄白,脈浮。治療時你可以使用 以下哪一組穴位最適當?
  - A. 陰陵泉、風門、風府、風池、合谷
  - B. 列缺、委陽、合谷、偏歷、陰陵泉
  - C. 脾俞、太白、水分、足三里、陰陵泉
  - D. 腎俞、關元、陰陵泉、復溜、水分
- 483. 一位病人經診斷為陽水,此種問題最有可能的形成原因為何?
  - A. 外感風邪兼有肺氣虛無法通調水道 B. 內風兼有水濕停聚

  - C. 外感風邪兼有水濕積聚不行 D. 內寒兼有脾虛無法運化水濕
- 484. 男病人因為水腫而到你的診所來治療,你診查後決定給他真武湯來做治療,你 還可以使用以下哪一組治療穴位最適當?
  - A. 陰陵泉、太溪、三陰交、腎俞、合谷
  - B. 列缺、委陽、合谷、偏歷、陰陵泉
  - C. 脾俞、太白、水分、足三里、陰陵泉
  - D. 腎俞、關元、陰陵泉、復溜、水分
- 485. 病人不小心跌倒而造成骨頭斷裂,你可以使用以下哪一個治療穴位最適當?
  - A. 第一胸椎棘突下, 陶道旁開 1 寸 5 分
  - B. 約當後髮際正中旁開 1 寸 3 分,斜方肌外緣之後髮際凹陷中
  - C. 第七胸椎棘突下,至陽旁開1寸5分
  - D. 外踝高點上3寸,當腓骨前緣

- 486. 一女性病人來診抱怨最近 2 個月來帶下增多,量多色白或淡黃,質稍黏稠,無 臭味,幾乎每天都如此,面色萎黃,疲倦乏力,食欲差,經常腹瀉,舌淡苔白 膩,脈緩弱。治療時你可以使用以下哪一組穴位最適當?
  - A. 蠡溝、中極、三陰交、太衝、次髎、曲池
  - B. 脾俞、氣海、足三里、陰陵泉、帶脈、白環俞
  - C. 帶脈、復溜、腎俞、關元、陰陵泉、大赫
  - D. 脾俞、腎俞、水分、陰陵泉、氣海、足三里
- 487. 女病人有帶下,你診斷後決定使用氣海、足三里、陰陵泉、帶脈、白環俞這些 穴位來做治療,你還可以搭配以下哪一個治療方劑來增強治療的效果?
  - A. 龍膽瀉肝湯 B. 平胃散 C. 完帶湯 D. 真武湯
- 488. 有一女性患者白天工作非常緊張,晚上還要操持家務與帶小孩,覺得壓力大, 常感到胸部與脅肋有脹悶感,有咳嗽、氣喘,嚴重時會有呼吸困難,舌稍紅。 這個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 火乘金 B. 水不牛木 C. 金乘木 D. 木侮金
- 489. 以下哪一組耳穴用來做為針灸麻醉最適當?

  - A. 肺、神門、交感 B. 神門、肝、屏間
  - C. 交感、皮質下、對屏尖 D. 肺、結節內、緣中
- 490. 病人來診時說腓骨頭附近疼痛,以下哪一個局部治療穴位最適當?
  - A. 膝陽關 B. 犢鼻 C. 足三里 D. 陷谷
- 491. 有一位 6 歲的小男孩有腮腺炎,以下哪一個治療的耳穴最適當?
  - A. 對屏尖與屏輪切迹間的中點 B. 枕、額兩穴的中點
  - C. 對耳屏的尖端
- D. 對耳屏的內側面
- 492. 以下哪一項清潔措施是防止病毒或病菌交叉傳播最有效的方法?
  - A. 接種各種疫苗的注射 B. 在工作時戴口罩
  - C. 治療完病人後立即消毒 D. 洗手
- 493. 下列何者為 E 型肝炎的平均潛伏期?
  - A. 40 天 B. 28 天 C. 60 天 D. 90 天
- 494. 孕婦咸染以下哪一種肝炎時其死亡率最高?
  - A. C型肝炎 B. E型肝炎 C. A型肝炎 D. B型肝炎
- 495. 有一女病人三天前開始來月經,她說比平常提早8天,血量多,約為以前的2 倍,質黏稠,顏色深紅有血塊。這個病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 脾氣虛 B. 肝氣郁滯 C. 血熱 D. 陰虛有熱
- 496. 病人常常在工作完成放鬆心情後有頭痛,尤其在週末的時候最常發生,這個病 人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 外感風熱 B. 寒凝肝脈 C. 肝血虚 D. 肝陽上亢
- 497. 病人有眩暈,耳鳴,健忘,記憶力衰退,夜晚盜汗,口乾,五心煩熱,腰痠背 痛,骨頭疼痛,便秘,舌紅無苔,脈浮虛數。這個病人最有可能是以下哪一個 中醫診斷?
  - A. 腎陰虚 B. 腎精不足 C. 腎氣不固 D. 肝陽上亢
- 498. 男病人突發性的腹部劇烈疼痛, 拒按, 腹瀉, 以下哪一種灸法最適當?
  - A. 隔薑灸 B. 隔鹽灸 C. 隔蒜灸 D. 隔附子餅灸

- 499. 在以下哪一種情況時不應該使用拔罐治療?
  - A. 有嚴重高血壓的老人 B. 局關節紅腫疼痛的年輕人
  - C. 懷孕婦女的腰骶部 D. 糖尿病患者的下腹部
- 500. 有一中年男性,來診時抱怨有性功能障礙,陽萎早洩,平常怕冷,四肢冰冷, 尿多。你在治療時可以採用以下哪一種方法最適當?
  - A. 隔薑灸 B. 隔蒜灸 C. 隔鹽灸 D. 隔附子餅灸
- 501. 病人現在有高血壓,西醫要他服用 Methyldopa 的西藥,這是屬於以下哪一類的藥物?
  - A. 中樞 α 受體激動藥 B. 腎上腺素 β 受體阻斷藥
  - C. 鈣離子拮抗劑 D. 血管緊張素 I 轉化酶抑制劑
- 502. 病人有不明原因引起的肌萎縮症而來求診,在治療時應該選用何經脈上的穴位最為適當?
  - A. 太陰經 B. 陽明經 C. 厥陰經 D. 督脈、任脈
- 503. 女病人在背部新長了疔瘡,應該要採用以下哪一種治療方法最適當?
  - A. 隔薑灸 B. 隔鹽灸 C. 隔蒜灸 D. 隔附子餅灸
- 504. 病人來診時有腹痛、腹瀉,還有關節炎,你覺得應該要採用以下哪一種治療方 法最適當?
  - A. 隔鹽灸 B. 隔附子餅灸 C. 隔蒜灸 D. 隔鹽灸
- 505. 有一小孩子非常瘦小,西醫診斷為營養吸收不良,以下哪一個穴位對此病症會 有幫助?
  - A. 四缝 B. 四白 C. 八風 D. 八邪
- 506. 有一位小男孩五天前有高熱,經服用西藥後現在體溫稍微下降,他的媽媽說今天早上開始他的睪丸水腫,紅腫熱痛,如果要以針灸來治療,以下哪一組治療穴位應該會有幫助?
  - A. 行間、合谷、大椎、曲池、蠡溝、陰陵泉
  - B. 太衝、委中、血海、蠡溝、曲池、曲泉
  - C. 蠡溝、三陰交、陰陵泉、陽陵泉、次髎、中極
  - D. 曲池、豐隆、合谷、外關、列缺、尺澤
- 507. 你的病人長期住在老人安養院,他有輕微的失智症,今天來診時你發現他身上 有多處青紫瘀斑,手腕有深瘀痕,看護說他走路摔倒。治療完這個病人後你應 該要如何處理最適當?
  - A. 請陪伴的看護多注意老人的安全 B. 通知老人安養院的管理人員
  - C. 立即通報給相關的法律行政機構 D. 立即通知病人家屬到安養院瞭解情況
- 508. 病人有慢性咳嗽,痰少而難咳出,氣短乏力,自汗出,口舌乾燥,舌淡紅苔薄乾,脈細數。你應該使用以下哪一個治療方劑最適當?
  - A. 百合固金湯 B. 貝母瓜蔞散 C. 麥門冬湯 D. 生脈散
- 509. 病人有帕金森氏症,手會有不自主的震顫,以下哪一個治療的頭皮針最適當?
  - A. 運動區向前平移 1.5 公分
  - B. 與枕外粗隆平齊, 旁開 3 公分處, 向下與正中線平行作 4 公分長的直線
  - C. 耳尖直上 1.5 公分, 前後各引 2 公分的水平線, 共計 4 公分
  - D. 頂骨結節後下2公分,平行正中線長3公分的直線

- 510. 你要使用電針來治療病人,為什麼不可以用銀針?
  - A. 銀針會電解,電解後會斷針 B. 銀針會電解,電解後會產生毒性
  - C. 銀針會氧化,氧化後會斷針 D. 銀針會氧化,氧化後會產生毒性
- 511. 以下哪一個人體的部位對電針刺激最為敏感?
  - A. 腰背部 B. 胸腹部 C. 肘膝以下的部位 D. 肘膝以上的部位
- 512. 病人有以下哪些情況時,不應該使用電針來治療?
  - A. 病人正在配戴供氧呼吸器 B. 病人正在配戴血壓監測記錄儀
  - C. 病人有嚴重的心肌缺損 D. 病人裝有心跳助搏器
- 513. 針灸師可以使用電針來治療病人,以下哪一些病症使用電針治療的效果最佳?
  - A. 中風後引起偏癱後遺症,各種肌肉疼痛麻木,關節炎
  - B. 老年人腦部病變引起的帕金森氏症、失智症、失用症
  - C. 泌尿道系統引起的炎症,老年性的尿失禁或尿崩症
  - D. 自律神經失調引起的失眠、盜汗、潮熱與情緒不安
- 514. 以下哪一項是電針最主要的治療作用?
  - A. 增強肌肉的興奮性 B. 增強主穴的治療效果
  - C. 增強每個穴位的連結 D. 增強治療效果的持續性
- 515. 以下哪一個維生素的功效與西藥 Warfarin Sodium 有擷抗的作用,不應該一起服用?
  - A. 維生素 A B. 維生素 B2 C. 維生素 K D. 維生素 D
- 516. 位在肩關節的轉機軸上,對肩關節的活動有著穩定的作用,這是由以下哪一些 肌肉所共同構成的?
  - A. 三角肌、岡上肌、大圓肌、岡下肌
  - B. 小圓肌、肩胛上肌、肩胛下肌、岡下肌
  - C. 岡下肌、肩胛上肌、岡上肌、小圓肌
  - D. 肩胛下肌、岡上肌、岡下肌、小圓肌
- 517. 病人因為腦中風而引起右側下肢偏癱,無法正常行走,以頭皮針來治療時應該 取以下哪一個定位最適當?
  - A. 運動區左側上 1/5 處 B. 運動區右側下 2/5 處
  - C. 感覺區左側上 1/5 處 D. 運動區右側上 1/5 處
- 518. 病人來診時抱怨有坐骨神經痛,以下哪一個治療的穴位最適當?
  - A. 足三里 B. 環跳 C. 陽陵泉 D. 風市
- 519. 股骨大轉子最凸點與骶管裂孔的連線上,中 1/3 與外 1/3 交界處。這個穴位應該要以何種體位來取穴最適當?
  - A. 仰面躺臥 B. 俯身躺臥 C. 側身躺臥, 患側向上 D. 側身躺臥, 健側向上
- 520. 病人有帕金森氏症,此種病症是因為以下哪一個部位出現病變而引起的?
  - A. 下丘腦垂體 B. 邊緣系統 C. 小腦扁桃體 D. 椎體外系統
- 521. 你診斷你的病人有胃火,這個病人最有可能出現以下哪一些臨床症狀?
  - A. 吃得多又容易餓,口渴要喝大量冷水,口臭,牙齦紅腫疼痛出血,黃苔
  - B. 容易餓吃不多,口渴要小口喝溫水,口酸,牙齦紅腫而不痛,剝落苔
  - C. 吃得多又容易餓,口渴要喝大量溫水,口腥臭,牙齦紅腫而不痛,黃苔
  - D. 沒有食欲不想吃,口不渴,渴喜溫水,口淡,牙齦淡白,苔薄白

- 522. 病人經診斷為腎陰虛,這個病人最有可能出現以下哪一種舌象與脈象?

  - A. 舌紅, 苔剝落, 脈浮虚 B. 舌紅有裂紋, 無苔, 脈浮虚而數

  - C. 舌紅, 舌苔無根, 脈浮虛 D. 舌紅, 舌中央裂紋到舌尖, 無苔, 脈細數
- 523. 病人沒有食欲,下午覺得熱,咽喉乾,口渴要小口喝水,這個病人最有可能出 現以下哪一種舌象與脈象?
  - A. 舌紅, 舌中心有深裂紋到舌尖, 無苔, 脈浮虛而數
  - B. 舌稍紅, 舌前部有二道裂紋, 苔剝落而乾, 脈浮虛數
  - C. 舌中央紅, 舌中間剝落苔, 右關脈浮虚
  - D. 舌紅有裂紋,無苔,脈浮虛而數
- 524. 你治療完病人的多少時間後才可以與病人交往談戀愛?

  - A. 治療結束後即可以交往 B. 治療結束後一個月才可以交往
  - C. 治療結束後一年才可以交往 D. 治療結束後 6 個月才可以交往
- 525. 以下哪一個穴位的定位是屬於血會穴?
  - A. 第七胸椎棘突下,至陽旁開1寸5分
  - B. 第一胸椎棘突下, 陶道旁開 1 寸 5 分
  - C. 掌後腕橫紋橈側端, 橈動脈橈側凹陷中
  - D. 在側腹部,第十一肋游離端之下際
- 526. 以下哪一個穴位的定位是屬於脈會穴?
  - A. 橈骨莖突上方,腕横紋上1寸5分,肱橈肌與拇長展肌肌腱之間
  - B. 掌後腕橫紋橈側端, 橈動脈橈側凹陷中
  - C. 腓骨小頭前下方凹陷中
  - D. 在腹正中線上, 臍上4寸
- 527. 以下哪一個穴位的定位是屬於足少陽經的原穴?
  - A. 外踝高點直上 5 寸, 腓骨前緣 B. 第五跖骨粗隆下, 赤白肉際
- - C. 外踝前下方,趾長伸肌腱外側凹陷中 D. 外踝高點上5寸,腓骨後緣
- 528. 以下哪一個穴位的定位是屬於足陽明經的絡穴?
  - A. 犢鼻下 3 寸,脛骨前緣旁開一橫指
  - B. 外踝高點直上5寸,腓骨前緣
  - C. 崑崙直上7寸,當承山外下方1寸處
  - D. 外踝尖上8寸,條口外,脛骨前緣旁開二橫指
- 529. 以下哪一個穴位的定位是屬於足少陰經的絡穴?
  - A. 内踝後下方,當跟腱附著部的內側前方凹陷中
  - B. 太溪直下 1 寸, 跟骨結節的內側凹陷處
  - C. 內踝尖與跟腱之間凹陷處
  - D. 內踝高點直上 5 寸, 脛骨內側面的中央
- 530. 病人來診時有上肢疼痛,你可以採用以下哪一個頭皮針的定位來治療?

  - A. 感覺區的下 2/5 處 B. 感覺區的中 2/5 處
  - C. 上肢運動感覺區的中 2/5 處 D. 運動區的上 1/5 處
- 531. 位在臍上 6 寸,巨闕旁開 2 寸的穴位,這個穴位應該要如何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.3-0.7 寸,不可深刺 B. 直刺 0.3-0.8 寸
  - C. 直刺 0.5-0.8寸
- D. 直刺 0.8-1.0寸

- 532. 以下哪一個穴位的定位是屬於手少陰經的絡穴?
  - A. 腕橫紋尺側端, 尺側腕屈肌腱的橈側凹陷中
  - B. 腕横紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
  - C. 仰掌,在尺側腕屈肌腱的橈側,腕横紋上5分處
  - D. 仰掌,在尺側腕屈肌腱的橈側,腕横紋上1寸處
- 533. 以下哪一個穴位的定位是屬於手太陰經的郄穴?
  - A. 在前臂掌側,當太淵與尺澤的連線上,腕橫紋上7寸處
  - B. 微屈肘, 肘横紋上, 肱二頭肌腱橈側凹陷處
  - C. 仰掌, 在尺側腕屈肌腱的橈側, 腕横紋上 5 分處
  - D. 掌後腕橫紋橈側端, 橈動脈橈側凹陷中
- 534. 以下哪一個穴位的定位是屬於陰維脈的郄穴?
  - A. 復溜前約5分,太溪上2寸,脛骨內側緣後方
  - B. 太溪直上 5 寸,腓腸肌肌腹內下方,當太陰與陰谷的連線上
  - C. 太溪直下 1 寸,跟骨結節的內側凹陷處
  - D. 內踝尖下方凹陷中
- 535. 以下哪一個定位是屬於八脈交會穴通陰蹺脈的穴位?
  - A. 外踝正下方凹陷中 B. 復溜前約5分,太溪上2寸,脛骨內側緣後方
  - C. 内踝尖下方凹陷中 D. 第一跖骨基底的前下缘凹陷處,赤白肉際
- 536. 位於外踝前下方,趾長伸肌腱外側凹陷中的穴位,這個穴位應該要如何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.3-0.5 寸 B. 斜刺 0.3-0.5 寸
  - C. 直刺 0.7-1.0 寸 D. 直刺 0.5-0.8 寸
- 537. 定位為:仰掌,在尺側腕屈肌腱的橈側,腕横紋上 1 寸處,這個穴位可以治療以下哪一些病症?
  - A. 胸膈脹滿、不能說話 B. 心悸失眠、盗汗,咽喉乾渴
  - C. 發熱、癲狂、突然音啞 D. 心煩胸悶、腰脊強痛
- 538. 以下哪一組穴位是屬於陰蹺脈、陽蹺脈、陰維脈、陽維脈的郄穴?
  - A. 照海、申脈、內關、外關 B. 交信、跗陽、築賓、陽交
  - C. 照海、跗陽、內關、陽交 D. 交信、申脈、築賓、外關
- 539. 以下哪一個穴位的定位是屬於腑會穴?
  - A. 在側腹部,第十一肋游離端之下際 B. 犢鼻下3寸,脛骨前緣旁開一橫指
  - C. 在腹下中線上, 臍上4寸
- D. 腓骨小頭前下方凹陷中
- 540. 以下哪一個穴位的定位是屬於足太陰經的郄穴?
  - A. 第一跖骨基底的前下缘凹陷處, 赤白肉際
  - B. 內踝高點直上7寸,脛骨內側面的中央
  - C. 內踝尖上 6 寸,當內踝高點與陰陵泉的連線上,脛骨內側緣後方
  - D. 陰陵泉下 3 寸,陰陵泉與內踝高點的連線上
- 541. 一位懷孕二個月的婦女因為嚴重妊娠嘔吐呃逆而來就診,你診斷為胃虛有熱, 並給她橘皮竹茹湯來治療,你還可以加上以下哪些穴位針刺來加強療效?
  - A. 中脘、足三里、公孫、內關 B. 內閣、足三里、三陰交、中脘、內庭
  - C. 太衝、合谷、內關、公孫 D. 膻中、內庭、曲池、足三里、脾俞

- 542. 以下哪一種族群的人最容易罹患Ⅱ型糖尿病?
  - A. 青少年, 胰島素分泌不足者 B. 中老年人, 體型肥胖者

  - C. 年輕人, 體型消瘦且食量大者 D. 中年婦女, 情緒不穩定、神經質者
- 543. 庫欣病 (Cushing Disease) 的病因最常見於以下哪一種激素分泌過多?
  - A. 促甲狀腺激素 (TSH)
- B. 生長激素 (STH)
- C. 促腎上腺皮質激素 (ACTH) D. 促腎上腺皮質激素釋放激素 (CRH)
- 544. 一位患有甲狀腺功能亢進的女病人,在中醫診所治療三個月後覺得幫助不多, 而到西醫處接受放射性藥物的治療,請問她最有可能會出現以下哪種副作用?
  - A. 出現甲狀旁腺功能亢進症 B. 出現甲狀腺中毒性症狀
- - C. 出現腎上腺皮質功能亢進症 D. 出現甲狀腺功能低下症
- 545. 有一位女病人從小就容易緊張,最近又因為工作壓力大而情緒不穩定,最近睡 眠差,常在半夜醒來,食欲差,覺得累,她已經二個月沒有月經,今天早上突 然下腹部劇烈疼痛,有壓痛與反跳痛,全身出冷汗,血壓下降,現已送急診治 療。這個病人最有可能是以下何種病症?
  - A. 異位妊娠 B. 闌尾炎 C. 急性尿路感染 D. 急性憩室炎
- 546. 男病人下腹部疼痛劇烈,伴有高熱,腹部肌肉僵硬痙攣,急送醫院急診。在症 狀剛發生時先有短暫性腹瀉,接著有便秘,他以前做健康檢查時醫生建議他少 吃高纖維食物。你覺得這個病人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 幽門梗阳 B. 急性憩室炎 C. 闌尾炎 D. 急性胰腺炎
- 547. 病人自覺有關節炎而來就診,他的四肢小關節紅腫疼痛,關節周圍有瘤狀樣腫 脹,潰瘍時會有白色石灰樣黏液流出,這個病人最有可能是以下哪一種病症? A. 類風濕性關節炎 B. 風濕性關節炎 C. 痛風 D. 紅斑性狼瘡
- 548. 有一年輕男性因為坐骨神經痛而來針灸診所,你可以使用哪一個穴位並採取哪 一種進針體位來做治療?
  - A. 環跳, 俯臥屈股取穴 B. 足三里, 仰躺平臥取穴
  - C. 環中, 側臥屈股取穴 D. 委中, 俯臥取穴
- 549. 病人長期患有胃潰瘍,這個病人最有可能出現以下哪一種臨床的典型症狀?
  - A. 空腹不痛,用餐後半小時到一小時後疼痛 B. 空腹時痛,用餐後疼痛消失
  - C. 空腹不痛,用餐後也不痛,半夜疼痛明顯 D. 空腹時痛,用餐後也痛
- 550. 女病人因為下腹部劇烈疼痛而到醫院急診,她的疼痛由下腹部環繞到腰部,並 會向陰部與大腿內側有放射痛,疼痛是間歇性的,想排尿時疼痛更嚴重。這個 病人最有可能是以下哪一個病症?
  - A. 膽結石 B. 腎結石 C. 尿道炎 D. 陽道易激綜合症
- 551. 病人來診,你在做腹部檢查時發現有摸得到的搏動性腫塊,這種情況最有可能 是以下哪一種問題?
  - A. 脂肪瘤 B. 纖維瘤 C. 血管瘤 D. 神經結節
- 552. 以下哪一些穴位是足少陽經與帶脈的共同交會穴?
  - A. 章門、五樞、大橫 B. 帶脈、章門、府舍
  - C. 日月、期門、帶脈 D. 帶脈、五樞、維道
- 553. 女性在正常情况下出現體溫升高,這與以下哪一種激素的分泌關係最密切?
  - A. 黃體素 B. 甲狀腺素 C. 催乳素 D. 醛固酮

- 554. 有一年輕女性,體型肥胖,結婚三年都無法懷孕而來求診,她說從青春期開始 月經就不規則,所以就聽從西醫的建議開始服用避孕藥,結婚後才停止服藥。 她現在月經總是延遲或閉經,體重一直緩慢增加,體毛增生,血壓高。這個病 人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 庫欣病 B. 多囊性卵巢症候群
  - C. 經前期綜合症 D. 腎上腺皮膚功能低下症
- 555. 以下哪一項實驗室檢查指標可以檢測腎臟功能是否正常?
  - A. 乳酸脫氫酶 (LDH) B. 肌酸磷酸激酶 (CPK)
  - C. 肌酐清除率 (Cr) D. 血清轉胺酶 (GOT/GPT)
- 556. 以下哪一項實驗室檢查是檢測肝臟功能最敏感的指標?
  - A. 乳酸脫氫酶 (LDH) B. 肌酸磷酸激酶 (CPK)
  - C. 肌酐清除率 (Cr) D. 血清轉胺酶 (GOT/GPT)
- 557. 病人因為多發性關節炎而長期服用西藥。最近這半年來體重明顯增加,出現滿月臉,肩膀肥胖,皮膚變薄,臉上長有很多青春痘,身上多毛,血壓升高,下肢腳踝附近輕微水腫,血糖偏高。這個病人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 庫欣病 (Cushing Disease) B. 阿狄生病 (Addison's Disease)
  - C. 格雷夫症 (Graves Disease) D. 紅斑性狼瘡 (Lupus Erythematosus)
- 558. 病人經診斷為網球肘,這個病人的病變部位為何?
  - A. 肱骨內上髁 B. 肱骨外上髁 C. 尺骨鷹嘴 D. 尺骨莖突
- 559. 有一位老先生被西醫診斷患有帕金森氏症,這是因為人體缺乏以下哪一種物質 而引起的疾病?
  - A. 乙酰膽鹼 B. 血清素 C. 多巴胺 D. 血清膽紅素
- 560. 有一位建築工程師來診,說他的右手前三個手指麻木疼痛,而且有關節活動障礙,晚上疼痛比較嚴重。這個病人最有可能是損傷以下哪一個神經?
  - A. 肌皮神經 B. 尺神經 C. 橈神經 D. 正中神經
- 561. 一中年女性長期因為工作壓力太大而必需服用抗憂鬱症藥物,最近她覺得雙手的關節僵硬疼痛,尤其早晨特別僵硬而有關節功能障礙,關節有輕微變形,呈 梭型樣,這個病人最有可能是以下哪一種病症?
  - A. 類風濕性關節炎 B. 退化性關節炎 C. 風濕性關節炎 D. 萊姆氏關節炎
- 562. 病人來診時抱怨最近經常有心悸,你要使用聽診器來聽心尖搏動的聲音,此時 應該把聽診器置於以下哪個位置最正確?
  - A. 第四、五肋骨之間 B. 第五、六肋骨之間
  - C. 第三、四肋骨之間 D. 第六、七肋骨之間
- 563. 病人有嚴重的維生素 B12 缺乏的貧血,常常感到頭暈、疲倦,你會建議這個病人要多攝取以下哪一種食物?
  - A. 柑橘類水果 B. 新鮮的綠葉蔬菜 C. 動物的肝臟 D. 全穀物製品
- 564. 懷孕婦女在以下哪一個時期施打疫苗的風險最低?
  - A. 懷孕期的任何時候皆可施打疫苗 B. 懷孕期的前 5 個月可施打疫苗
  - C. 懷孕期的任何時候皆不可施打疫苗 D. 懷孕期的後 5 個月可施打疫苗
- 565. 病人經西醫診斷有共濟失調,這個病人最有可能的病變部位在何處?
  - A. 小腦 B. 丘腦 C. 中腦 D. 橋腦

- 566. 病人有庫欣病,他最有可能是長期服用以下哪一種藥物引起的副作用?
  - A. 抗精神失常藥 B. 糖皮質激素藥 C. 調血脂藥 D. 雌激素藥
- 567. 有男病人患有中風, 他最有可能出現以下哪一些臨床症狀?
  - A. 頭痛欲裂,鼻子忽然失去嗅覺,情緒暴躁易怒,四肢不自主的顫抖
  - B. 眩暈嚴重,伴有耳鳴,坐起來或站立時覺得天旋地轉,無法保持平衡
  - C. 頭痛, 一側手腳麻木無力, 視力模糊, 失去平衡感, 神志困惑
  - D. 被動運動時範圍突然增大,呈現活動時震顫加重,休息時緩解,嗜睡
- 568. 位於章門直下,與臍相平的穴位,這個穴位有以下哪些經脈通過?
  - A. 足陽明經、手陽明經 B. 足少陽經、陽蹺脈
  - C. 陰維脈、足厥陰經 D. 帶脈、足少陽經
- 569. 病人有間歇性腹痛,向腰部與下腹部有放射痛,有壓痛,沒有反跳痛,病人在 發病前長期有膽結石,這個病人最有可能是以下哪一個病症?
  - A. 胰腺炎 B. 膽囊炎 C. 腸梗阻 D. 闌尾炎
- 570. 位於乳頭直下,第七肋間隙,前正中線旁開4寸,這個穴位應該要如何針刺操 作最適當?

  - A. 直刺 0.5-0.8寸 B. 斜刺 0.3-0.5寸
  - C. 向外斜刺 0.5-0.8 寸 D. 直刺 0.3-0.5 寸
- 571. 位於兩眉頭連線的中點,這個穴位有以下哪一些特殊治療作用?
  - A. 清熱祛濕,安神止痙 B. 祛濕補氣,安神熄風
  - C. 祛風清熱,安神止痙 D. 祛風清熱,熄風止痙
- 572. 病人來診時有嚴重的腹痛、腹瀉,你診斷為濕熱痢疾,治療時應該取哪些經脈 上的穴位為主?
  - A. 手太陽經,足太陰經 B. 手厥陰經,足陽明經
  - C. 手陽明經, 手太陰經 D. 手陽明經, 足陽明經
- 573. 病人到診所來說他有腹痛與嚴重的腹瀉,腹瀉黃臭,有膿血便,肛門灼熱,里 急後重,針刺治療時應該選擇以下哪些穴位做為治療的主穴?
  - A. 大腸的募穴與下合穴 B. 脾的背俞穴與原穴
  - C. 小腸的募穴與下合穴 D. 脾的背俞穴與胃的下合穴
- 574. 病人胸部脅肋脹痛,咳嗽氣逆,乳汁少,你可以選擇以下哪一個穴位來治療?
  - A. 第五肋間隙中,前正中線旁開 6寸 B. 第四肋間隙中,前正中線旁開 6寸
  - C. 第三肋間隙中, 前正中線旁開 6寸 D. 第二肋間隙中, 前正中線旁開 6寸
- 575. 位於太溪上 5 寸,腓腸肌肌腹內下方,當太溪與陰谷的連線上,這個穴位應該 要如何針刺操作最適當?
  - A. 直刺 0.5-1.0 寸 B. 斜刺 0.5-0.8 寸
  - C. 直刺 0.5-0.7 寸 D. 斜刺 0.7-1.0 寸
- 576. 病人有腹痛到診所來,你懷疑是闌尾炎,應該要如何來做檢查最適當?
  - A. 可以按壓足三里附近是否有敏感點 B. 可以按壓三陰交附近是否有敏感點
  - C. 可以按壓膽囊穴附近是否有敏感點 D. 可以按壓闌尾穴附近是否有敏感點
- 577. 病人現在有腓腸肌痙攣,肌肉僵硬,你可以選用以下哪些藥物來做治療?
  - A. 木瓜、白芍、川牛膝 B. 杜仲、獨活、川牛膝
  - C. 白芍、甘草、生薑 D. 獨活、羌活、桑寄生

- 578. 病人來診時你發現跟腱反射消失,這個病人最有可能是以下哪一個神經病變? A. 第三腰椎神經 B. 第一骶椎神經 C. 第三骶椎神經 D. 第一腰椎神經
- 579. 病人有急性上腹部疼痛到診所來就診,你懷疑他是闌尾炎,此時應該要如何來 做檢查最適當?
  - A. 可以按壓闌尾穴附近是否有敏感點
  - B. 可以按壓肚臍周圍有無疼痛,腰背部有無放射痛
  - C. 可以按壓右下腹部是否有壓痛與反跳痛
  - D. 可以按壓右上腹部是否有疼痛與反跳痛,右側肩膀有無放射痛
- 580. 病人來診時他的眨眼反射消失,最有可能是以下哪些神經出現損傷?
  - A. 第四、六對腦神經 B. 第三、五對腦神經
  - C. 第七、九對腦神經 D. 第五、七對腦神經
- 581. 病人在做棉簽測試時,角膜反射消失,最有可能是以下哪一個神經出現損傷? A. 第五對腦神經 B. 第六對腦神經 C. 第三對腦神經 D. 第四對腦神經
- 582. 病人眼球無法正常向下、向外轉動,最有可能是以下哪些神經出現損傷?
  - A. 第一、二、三對腦神經 B. 第三、四、六對腦神經
  - C. 第三、五、七對腦神經 D. 第五、七、九對腦神經
- 583. 病人的手肘神經反射消失,最有可能出現病變的中樞神經為何? A. 第四頸椎神經 B. 第五頸椎神經 C. 第六頸椎神經 D. 第七頸椎神經
- 584. 病人來診時他的手指、腳趾冰冷,但是身體溫暖,不怕冷,伴有胸部、上腹部 脹滿,情緒非常不安,容易受到刺激,腹瀉,食欲差,舌紅苔黃,脈弦。這個 病人最有可能是以下哪一個中醫診斷?
  - A. 上寒下熱證 B. 表寒裡熱證 C. 真寒假熱證 D. 真熱假寒證
- 585. 病人長期失眠,無法入睡,心悸胸悶,煩躁不安,夜晚出汗,頭暈眼花,口燥咽乾,舌紅乾,脈弦細數。你應該要使用以下哪一組中草藥來做治療?
  - A. 川芎、酸棗仁、茯苓、甘草、知母 B. 黃連、黃芩、阿膠、雞子黃、白芍
  - C. 浮小脈、龍骨、甘草、大棗、牡蠣 D. 香附、川芎、山梔子、蒼朮、神曲
- 586. 病人正服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) ,此病人最有可能是以下哪一個病症? A. 失眠 B. 抑鬱症 C. 多發性硬化症 D. 高膽固醇血症
- 587. 當病原體不斷侵入人體血液,並在血液中繁殖產生毒素,進而引起病人休克, 這應該是屬於以下哪一種休克?
  - A. 毒血性休克 B. 失血性休克 C. 敗血性休克 D. 菌血性休克
- 588. 以下哪一個中草藥是懷孕婦女不可以服用的?
  - A. 山楂 B. 當歸 C. 丹參 D. 三棱
- 589. 以下哪一個中草藥是懷孕婦女不可以服用的?
  - A. 牛膝 B. 當歸 C. 丹參 D. 香附
- 590. 男病人現在有小便不利,發熱,口渴想喝水,心煩不安,失眠,舌暗紅,舌根 黃苔,脈細數。這個病人應該使用以下哪一個方劑來治療最適當?
  - A. 八正散 B. 豬苓湯 C. 導赤散 D. 五苓散
- 591. 病原體不進入血液,只有病原體產生的毒素進入血液中,進而引起休克,這應該是屬於以下哪一種情況?
  - A. 敗血性休克 B. 失血性休克 C. 毒血性休克 D. 菌血性休克

- 592. 女病人長期月經不調與痛經,治療時以下哪一組中草藥對病人最有幫助?
  - A. 熟地黃、當歸 B. 桃仁、紅花 C. 川楝子、郁金 D. 香附、當歸
- 593. 以下哪一個穴位的針刺操作為直刺 0.5-0.8 寸,不可以深刺,禁灸?
  - A. 後髮際正中直上1寸,枕骨粗隆下,兩側斜方肌之間的凹陷中
  - B. 胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷中
  - C. 腕横紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
  - D. 喉結旁,頸總動脈搏動處,胸鎖乳突肌前緣取穴
- 594. 以下哪一個穴位不可以深刺,還不可以向上刺?
  - A. 後髮際正中直上 1 寸, 枕骨粗隆下, 兩側斜方肌之間的凹陷中
  - B. 後髮際正中直上 5 分,第一頸椎下凹陷中
  - C. 胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷中
  - D. 在胸前壁的外上方,雲門下1寸,平第一肋間隙,距前正中線旁開6寸
- 595. 病人現在有視神經炎,西醫要他服用醋酸潑地松 (Prednisone) 這個西藥,這是屬於何種藥物?有什麼樣的副作用?
  - A. 降膽固醇藥,長期服用會引起肝腎功能的損傷,肌肉關節疼痛
  - B. 抗血小板凝結藥,長期服用會引起皮膚紫斑,容易出血,凝血時間延長
  - C. 糖皮質激素藥,長期服用會引起向心性肥胖、浮腫、多毛等症狀的庫欣病
  - D. 雌激素藥,長期服用會引起肥胖、痤瘡、閉經等症狀的多囊性卵巢候群
- 596. 病人經診斷為核黃素缺乏,這個病人最有可能出現以下哪一種舌頭的表現?
  - A. 舌中心有深裂紋直到舌尖,裂紋兩旁舌腫大,還有小裂紋由中心向外放射
  - B. 舌頭兩側有白色隆起像羽毛狀, 舌頭腫大, 舌苔白厚
  - C. 舌頭上長有黃、棕、黑色的變長毛, 舌中央有乾黑苔
  - D. 舌頭深紅萎縮,舌頭光亮無苔,伴有舌頭疼痛
- 597. 病人長期服用 Ibuprofen,請問這個病人最有可能出現以下哪一種舌象?
  - A. 舌頭變薄, 舌頭上有紅點 B. 舌頭變成有斑塊的剝落苔
  - C. 舌頭紅腫

- D. 舌頭出現棕色的厚苔、乾黑苔
- 598. 病人便秘,大便小而細短像羊屎,這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 肝腎陰虛, 脾腎陽虛 B. 肝氣郁結, 腸有熱
  - C. 肝氣犯脾,胃陰虛 D. 大腸濕熱,血虛
- 599. 病人的眼睛有深黑色的點像芝麻子,這個病人最有可能的中醫診斷為何?
  - A. 傷氣 B. 傷陽 C. 傷血 D. 傷陰
- 600. 女病人現正服用西醫開給她的西藥 Norethisterone (Norethindrone) , 這是屬於以下哪一種藥物?會有什麼樣的副作用?
  - A. 降膽固醇藥,長期服用會引起肝腎功能的損傷,肌肉關節疼痛
  - B. 抗血小板凝結藥,長期服用會引起皮膚紫斑,容易出血,凝血時間延長
  - C. 糖皮質激素藥,長期服用會引起向心性肥胖、浮腫、多毛等症狀的庫欣病
  - D. 雌激素藥,長期服用會引起肥胖、痤瘡、閉經等症狀的多囊性卵巢候群