



## CHORLITEJO SEMIPALMEADO

*Charadrius semipalmatus*

Esta ave migratoria visita estacionalmente las zonas inundables y bancos de arena de ríos amazónicos. Es de pequeño tamaño, con plumaje marrón grisáceo en el dorso y vientre blanco, además de una banda negra distintiva en el pecho. El término “semipalmado” hace referencia a la ligera unión entre los dedos de sus patas, lo que le facilita caminar sobre suelos fangosos.

El chorlitejo semipalmado es una de las muchas especies neárticas que migran desde Norteamérica hacia la cuenca amazónica durante el invierno boreal. Este fenómeno ofrece una oportunidad única para hablar sobre las rutas migratorias, los desafíos de conservación a gran escala y la interdependencia de los ecosistemas globales.

Durante su estancia en la Amazonía, se alimenta de pequeños invertebrados, contribuyendo al control de poblaciones de insectos y organismos acuáticos. Su comportamiento activo y su rol como migrante hacen del chorlitejo una especie clave para abordar temas como conectividad ecológica y la importancia de conservar hábitats tanto de origen como de destino.

**Clasificación:** Ave limícola

**Hábitat:** Playas, orillas fangosas y riberas de lagos.

**Comportamiento:** Migratoria; realiza movimientos estacionales entre América del Norte y Sudamérica.

**Alimentación:** Invertebrados acuáticos.

**Estado de conservación:** Vulnerable (UICN).