



Avance Proyecto de Regresión: Magnitud de eventos sísmicos USGS 2024

Primer Semestre 2026

1. Pregunta y contexto

La pregunta de investigación es: **¿Cómo se asocia la magnitud de los eventos sísmicos registrados por USGS durante 2024 con su profundidad, localización geográfica y características técnicas del registro?**

La variable respuesta es la magnitud reportada del evento, `mag`. El enfoque del proyecto es descriptivo-explicativo: se busca estimar asociaciones promedio dentro del catálogo observado, no predecir terremotos futuros ni construir un sistema operacional de alerta. La pregunta es abordable con regresión lineal porque la respuesta es numérica y los predictores candidatos incluyen variables continuas, transformaciones y variables categóricas representables mediante indicadores.

La interpretación de fondo se centra en cómo varía la magnitud reportada según profundidad, posición geográfica y características técnicas del registro sísmico. Una limitación central es que la muestra está truncada a eventos con magnitud al menos 4, por lo que las conclusiones no se extrapolan a sismos menores ni al proceso sísmico completo.

2. Fuente, datos y ética

La fuente es el *USGS Earthquake Catalog*, catálogo oficial y público del *U.S. Geological Survey*. La unidad de observación es un evento sísmico registrado durante 2024 con `mag` mayor o igual a 4. Después de la limpieza inicial se mantienen 14.176 eventos. Los predictores candidatos son `depth`, `latitude`, `longitude`, `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `magType`, `net`, `month`, `hour` y una región aproximada derivada desde `place`.

Campo	Descripción
Fuente	U.S. Geological Survey, Earthquake Catalog API.
Contexto	Eventos sísmicos registrados durante 2024 con magnitud al menos 4.
Unidad de observación	Evento sísmico registrado en el catálogo.
Variable dependiente numérica	Magnitud del evento (mag).
Predictores candidatos	depth, latitude, longitude, nst, gap, dmin, rms, magType, net, month, hour y region_from_place.
Tamaño muestral	14,176 eventos después de la limpieza inicial.
Datos faltantes	dmin (0.37 %); gap (0.37 %); nst (0.36 %); rms (0.01 %)
Dificultades del análisis	Truncamiento por mag ≥ 4 ; asimetría o concentración de magnitudes; valores atípicos; faltantes en variables técnicas; posible colinealidad; dependencia espacial; categóricas con muchas categorías; variables técnicas no necesariamente causales.

Los datos no contienen información personal y el riesgo ético directo es bajo. Aun así, el uso responsable exige evitar conclusiones de seguridad pública, alertas o lenguaje de predicción operacional. Las variables técnicas pueden asociarse con la magnitud reportada, pero no se interpretan como causas físicas directas.

Cuadro 1

Estructura de variables principales en la base analítica

Variable	Tipo	Rol	Justificación de uso
mag	Númerica	Respuesta	Magnitud reportada del evento sísmico.
depth	Númerica	Predictor	Profundidad del evento; variable geofísica básica.
log_depth_plus_1	Númerica	Transformación	Se agrega porque depth puede ser asimétrica y su relación con mag no necesariamente es lineal. La transformación logarítmica reduce el peso de profundidades extremas y permite una relación más estable.
latitude, longitude	Númericas	Predictores	Capturan localización espacial del epicentro.
nst, gap, dmin, rms	Númericas	Técnicas	Resumen cobertura y ajuste del registro sísmico.
magType, net	Categóricas	Indicadores	Permiten comparar diferencias promedio por tipo de magnitud y red de reporte.
region_from_place	Categórica derivada	Apoyo descriptivo	Se agrega para resumir el texto place en una categoría geográfica interpretable. No reemplaza latitud-longitud, pero ayuda a describir regiones frecuentes y posibles diferencias por zona.

3. Limpieza inicial y EDA

La limpieza inicial convierte **time** a fecha-hora UTC, fuerza variables numéricas con **errors="coerce"**, deriva **month**, **hour**, **weekday**, crea **log_depth_plus_1** como una transformación logarítmica de **depth**, y extrae **region_from_place** desde el texto de localización. Se revisan duplicados por **id**, rangos plausibles y faltantes. No se eliminan automáticamente valores atípicos de magnitud o profundidad; para los modelos preliminares se usa eliminación por lista solo en las variables de cada fórmula.

revisión	resultado
Duplicados por id	0 registros involucrados (0 ids duplicados).
Rango observado de mag	4.0 a 7.5
Rango observado de depth	-0.070 a 671.043
Rango observado de latitude	-65.301 a 86.605
Rango observado de longitude	-179.999 a 179.998
Profundidades negativas	1 evento; se reporta y no se elimina automáticamente.
Faltantes principales	dmin: 52 (0.37 %); gap: 52 (0.37 %); nst: 51 (0.36 %); rms: 1 (0.01 %)

La revisión confirma que no hay duplicados por id. Los faltantes principales se concentran en **dmin**, **gap**, **nst** y **rms**, mientras que **mag**, **depth**, **latitude** y **longitude** no presentan faltantes en la base procesada. Las variables categóricas **magType**, **net** y **region_from_place** se agrupan conservando niveles frecuentes y reuniendo categorías escasas como *Other*; esto reduce indicadores con pocas observaciones y mejora la estabilidad de los modelos lineales preliminares.






Figura 1


Distribuciones de covariables candidatas para los modelos. Las numéricas se muestran con histogramas y las categóricas agrupadas con barras; en variables muy asimétricas se usa el rango p1–p99 solo para visualización, sin eliminar observaciones de la base analítica.




(a) Distribución de *mag*.



(b) *mag* y log profundidad.



(c) Ubicación coloreada por magnitud.



(d) Magnitud por *magType*.

Figura 2

EDA principal ligado a la pregunta: distribución de la respuesta, asociación con profundidad transformada, patrón espacial y diferencias promedio por tipo de magnitud.

El EDA está directamente conectado con la pregunta de investigación. La magnitud aparece concentrada cerca del umbral 4 por el filtro de inclusión, por lo que las asociaciones se interpretan dentro de eventos moderados o mayores. El mapa muestra concentración espacial de eventos, lo que justifica incluir latitud y longitud como controles; además, las diferencias promedio por *magType* respaldan incorporar indicadores de tipo de magnitud. Estas relaciones son descriptivas y no se leen como efectos causales.

Las distribuciones de covariables complementan esta lectura: *depth*, *dmin*, *nst*, *gap* y *rms* muestran escalas y asimetrías distintas, lo que respalda revisar transformaciones y diagnósticos; las barras de *magType*, *net* y *región* muestran por qué conviene agrupar niveles poco frecuentes antes de usar indicadores.

4. Plan de modelos

El avance considera una secuencia de modelos lineales interpretables. M1 evalúa la asociación marginal con profundidad transformada; M2 agrega ubicación básica mediante latitud y longitud; M3 incorpora variables técnicas del registro; M4 agrega diferencias promedio por tipo de magnitud; M5 revisa si la

red de reporte captura diferencias adicionales; y M6 permite una relación espacial flexible con términos cuadráticos e interacción latitud-longitud, sin salir del marco de regresión lineal. Estas comparaciones evalúan qué bloque de variables aporta evidencia preliminar, controlando por las demás variables incluidas.

Cuadro 2
Bloques de modelos lineales candidatos

Modelo	Bloque agregado	Propósito estadístico
M1	Profundidad transformada	Evaluar asociación marginal entre magnitud y profundidad.
M2	Ubicación geográfica	Controlar por latitud y longitud del evento.
M3	Variables técnicas	Incorporar cobertura y ajuste del registro sísmico.
M4	Tipo de magnitud	Comparar diferencias promedio según método de magnitud.
M5	Red de reporte	Evaluar diferencias adicionales asociadas a la institución reportante.
M6	Términos espaciales flexibles	Permitir curvatura espacial mediante latitud, longitud, cuadrados e interacción.

modelo	n	parámetros	R2 ajust.	AIC	BIC	RMSE	MAE
M1	14176	2	0.028	12096.022	12111.141	0.371	0.268
M2	14176	4	0.048	11801.695	11831.933	0.367	0.264
M3	14124	8	0.535	1633.633	1694.079	0.256	0.184
M4	14124	15	0.624	-1361.202	-1247.868	0.230	0.170
M5	14124	22	0.625	-1390.252	-1224.028	0.230	0.170
M6	14124	18	0.633	-1688.352	-1552.351	0.228	0.168

La comparación preliminar sugiere mejoras importantes al pasar de modelos puramente geográficos a modelos con variables técnicas y tipo de magnitud. Sin embargo, el modelo final no se escogerá solo por R2 o AIC/BIC: se priorizará interpretabilidad, diagnóstico de supuestos, colinealidad, observaciones influyentes y estabilidad ante categorías agrupadas. Dentro de esta etapa, M4 y M6 son candidatos naturales para diagnóstico inicial.

5. Diagnósticos previstos y siguientes pasos

En el informe final se revisarán residuos contra ajustados, normalidad aproximada mediante QQ-plot e histograma, heterocedasticidad potencial, distancia de Cook, leverage con residuos estudentizados y VIF para predictores numéricos principales. También se evaluará si quedan patrones espaciales en residuos. Dado que los datos son eventos puntuales, un modelo CAR no es el enfoque directo salvo que se agreguen observaciones por áreas o grillas; el foco del curso seguirá siendo regresión lineal múltiple, selección razonada de variables, inferencia y análisis de residuos.

Como análisis de sensibilidad se contrastarán decisiones razonables de transformación y especificación, por ejemplo usar `depth` versus `log_depth_plus_1`, incluir o no variables técnicas con faltantes, y revisar la estabilidad de conclusiones ante observaciones influyentes. Esto permitirá distinguir patrones descriptivos robustos de resultados dependientes de una codificación particular.

6. Reproducibilidad

El notebook `avance_proyecto_regresion.ipynb` genera la base procesada `usgs_earthquakes_2024_mag4_model_re` las tablas en `Plantilla_informe/tables/` y las figuras en `Plantilla_informe/figures/`. El repositorio

del proyecto está disponible en https://github.com/Paul0112/proyecto__regresion. Se documentan versiones de paquetes en `requirements.txt` y `session_info.txt`.

Referencias

1. U.S. Geological Survey. *Earthquake Catalog API*. Disponible en <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>.
2. Python Software Foundation. *Python Language Reference*. Disponible en <https://www.python.org/>. El análisis usa Python para limpieza, visualización y ajuste de modelos.
3. Declaración de herramientas: se usaron herramientas computacionales de Python para limpieza, visualización y ajuste de modelos. Los resultados numéricos provienen de la ejecución reproducible del notebook sobre los datos locales.