

Notes d'Analyse 1

Paul Lasry-Robin

17 novembre 2025

Table des matières

1	Les nombres	2
2	Suites	3
3	Séries	4
4	Fonctions	5
4.1	Rappels	5
4.2	Limites	6
4.3	Calculs de limites	8
4.4	Lim à gauche/droite, limites infinies	11
4.5	Fonctions continues	13
5	Dérivées	17
5.1	Définitions et exemples	17

Chapitre 1

Les nombres

Chapitre 2

Suites

Chapitre 3

Séries

Chapitre 4

Fonctions

4.1 Rappels


Définition 4.1.1 (*Fonction majorées*) . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle. Alors f est majorée sur $A \subseteq D$ si $f(A) = \{f(x) | x \in A\}$ l'est.

De plus, on pose :

$$\sup_{x \in A} f(x) = \sup f(A)$$

Pareil pour inf, max et min (si min et max existent).

Ex : Pour $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ et $A =] - 1, 4[$



Donc $\forall x \in A$:

- $\inf f(x) = \min f(x) = 2$
- $\sup f(x) = 11$

Et max n'existe pas.

4.2 Limites

Ex : $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

$D(f) = \mathbb{R}^*$. On aimerait définir $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 0$.

Il faut deux ingrédients pour conclure que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$:

1. f doit être définie "un peu autour" de x_0
2. $f(x)$ doit "s'approcher" de l lorsque $x \rightarrow x_0$.

Définition 4.2.1 (Fonction définie au voisinage) . Une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ s'il existe $d \in \mathbb{R} > 0$ t.q :

$$]x_0 - d, x_0[\cup]x_0, x_0 + d[\subset D$$

Ex $\frac{\sin x}{x}$: Est définie au voisinage de $x_0 = 0$ même si elle n'est pas définie en 0.

Définition 4.2.2 (Limite d'une fonction) . Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ def au voisinage de x_0 . Alors, f admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite lorsque $x \rightarrow x_0$.

On note : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta_\varepsilon > 0$ t.q. $\forall x \in D \setminus \{x_0\}$, on a :

$$|x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

Ex 1 : Soit $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 132 & x = 0 \end{cases}$, alors $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq 132$ car on s'intéresse seulement au voisinage de 0.

Ex 2 : Soit $f(x) = 5x - 1, x_0 = 0$. Montrons que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 9$.

1. $D(f) = \mathbb{R} \implies f$ est def dans tout voisinage de $x_0 = 2$.
2. Soit $\varepsilon > 0$, on pose $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$ tel que $|x - 2| \leq \delta$.

$$|f(x) - 9| = |5x - 10| = 5|x - 2| \leq 5\delta \leq \varepsilon$$

Comme ε est arbitraire, on a montré que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.q. si } x \in D \setminus \{2\} \text{ et } |x - 2| \leq \delta, \text{ on a :}$$

$$|f(x) - 9| \leq \varepsilon$$

Théorème 4.2.3 (*Limites de fonction et suites*) . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ def au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$. Alors on peut dire que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = l \ \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ t.q. } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$.

Idée : $a_n \rightarrow x_0$ sont les manière de s'approcher de x_0 . Donc $f(x) \rightarrow l$ si $(a_n) \rightarrow l$ pour toutes les façons $(a_n \rightarrow x_0)$ de s'approcher de x_0 .

Ex Redémonstraion de $\lim_{x \rightarrow 2} 5x - 10 = 9$: Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} \setminus \{2\}$ une suite t.q. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$. Alors on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (5a_n - 10) = 5(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) - 10 = 5 \cdot 2 - 10 = 0$$

Comme la suite était arbitraire, on a montré que pour TOUTE SUITE (a_n) :

$$\lim_{x \rightarrow 2} 5x - 10 = 0$$

Corollaire 4.2.4 : Si on a trouvé :

- Une suite $(a_n) \subset D \setminus \{x_0\}$ t.q.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \text{ n'existe pas}$$

- Deux suites $(a_n), (b_n) \subseteq D \setminus \{x_0\}$ t.q. $a_n \rightarrow x_0$ et $b_n \rightarrow x_0$ mais :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

Alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ n'existe pas.

Ex Corollaire : Prenons $f(x) = \cos \frac{1}{x} x_0 = 0$
 $D(f) = \mathbb{R}^* \implies f$ est définie au voisinage de $x_0 = 0$. En effet :

$$a_n = \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0 \quad b_n = \frac{1}{(2n+1)\pi} \rightarrow 0$$

Mais :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(2n\pi) = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \cos((2n+1)\pi) = -1 \end{aligned}$$

Remarque 4.2.5 : On aurait aussi pu considérer la suite :

$$c_n = \frac{1}{n\pi} \rightarrow 0$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(c_n) = \cos(\pi n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \quad \text{qui n'existe pas}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\frac{1}{x})$ n'existe pas.

Propriété 4.2.6 (*Limites de fonctions*) .

Soient $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ définies au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ et telles que : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ existent. Alors :

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_2$, alors $l_1 = l_2$ (Unicité de la limite)

2. $\forall p, q \in \mathbb{R}$ on a :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p \cdot f(x) + q \cdot g(x) = p \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + q \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

4. Si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de x_0 alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

5. Si $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ est t.q.

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

au voisinage de x_0 et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$$

(Théorème des deux gendarmes)

4.3 Calculs de limites

Considérons pour ces exemples $u \in \mathbb{R}$.

0. $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$ où c est une constante.

[Soit $a_n \rightarrow u$. On a $f(a_n) = c \rightarrow c$]

$$\lim_{x \rightarrow u} x = u \quad (f(x) = x)$$

[Soit $a_n \rightarrow u$. On a $f(a_n) = a_n \rightarrow u$]

1. **Polynômes** Exemple (par produit) :

$$\lim_{x \rightarrow u} x^2 = \lim_{x \rightarrow u} (x \cdot x) = \left(\lim_{x \rightarrow u} x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow u} x \right) = u \cdot u = u^2$$

Par récurrence, on montre que $\lim_{x \rightarrow u} x^n = u^n$. *Preuve rapide :*

Init. ($n = 0$) : $\lim_{x \rightarrow u} 1 = 1$.

Hérédité : $\lim_{x \rightarrow u} x^{n+1} = \lim_{x \rightarrow u} (x^n \cdot x) = (\lim_{x \rightarrow u} x^n) \cdot (\lim_{x \rightarrow u} x) = u^n \cdot u = u^{n+1}$.

Donc pour $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow u} P(x) = P(u)$$

2. **Fonctions rationnelles** : $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Si $Q(u) \neq 0$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow u} Q(x) = Q(u) \quad (\text{Point 1})$$

Donc par la propriété 4, on a :

$$\lim_{x \rightarrow u} f(x) = \frac{P(u)}{Q(u)}$$


Ex : Ainsi on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{1 - 1}{1 + 1} = \frac{0}{2}$$

Mais si on a $Q(u) = 0$, il faut faire un travail supplémentaire :

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 1) = -2$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x} = 1$. Démonstration imagée.



$$\frac{\sin(x)}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan(x)}{2} = \frac{\sin(x)}{2 \cos(x)}$$

\hookrightarrow

$\varphi = 2\pi$	$\text{arc} = \pi$
$\alpha = x$	$\text{arc} = \frac{x}{2\pi} \pi = \frac{x}{2}$

Le triangle bleu est plus petit ou égal au triangle orange lui-même plus petit que le rouge.
Ainsi, on a :

$$\begin{aligned}\frac{\sin x}{2} &\leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan x}{2} \\ \Rightarrow \sin x &\leq x \leq \frac{\sin x}{\cos x} \\ \Rightarrow \frac{\sin x}{x} &\leq 1 \leq \frac{1}{\cos x} \\ \Rightarrow \frac{\sin x \cos x}{x} &\leq \cos x \leq \frac{\sin x}{x}\end{aligned}$$

Finalement, comme $\cos x \in [0, 1]$ on a :

$$\cos x \geq \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \geq 1 - x^2$$

Donc

$$\cos x \geq 1 - x^2$$

On a alors la chaîne d'inégalités :

$$1 - x^2 \leq \cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

Ceci est valable pour $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, car toutes les fonctions sont paires.
Par le théorème des deux gendarmes, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

Ex : On peut alors voir :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 1 \cdot 0 = 0$$

Propriété 4.3.1 (*Limites de fonctions composées / changement de variable*) . Soient $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow \mathbb{R}$ t.q. :

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \in \mathbb{R}$
2. $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c \in \mathbb{R}$
3. $f(x) \neq b$ au voisinage de a

Alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$$

Preuve à l'aide des suites. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A \setminus \{a\}$ t.q. $x_n \rightarrow a$.

On pose $y_n = f(x_n)$. Alors $y_n \rightarrow b$ (par 1) et $y_n \neq b$ pour n assez grand (par 3) $\Rightarrow (y_n) \subset B \setminus \{b\}$ et $y_n \rightarrow b \Rightarrow g(y_n) \rightarrow c$ (par 2)

□

Ex 1 : Soit $f(x) = x^{12} - 1$. Alors $\lim_{x \rightarrow 1} \cos(x^{12} - 1)$ vérifie 1 et 2 de la propriété au voisinage de 1 (dès que $x \neq \pm 1$).

Ex 2 : On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{3x^2 + \sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2}{3 + \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^2}{3 + y^2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Attention : La condition 3 est indispensable, regardons un cas où elle n'est pas vérifiée.

Ex 3 : $f(x) = 3$ (constante) et $g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 3 \\ 2 & \text{si } x \neq 3 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} g(3) = 0$.

Mais : on ne peut pas utiliser la prop car $f(x) = 3$ dans le voisinage de 0. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) \neq \lim_{y \rightarrow 3} g(y) = \lim_{y \rightarrow 3} 2 \neq 0$$

Propriété 4.3.2 (Limites de réciproques) . Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ strictement monotone. Soit $u \in [a, b]$ et $v = f(u)$. Alors $f([a, b]) \rightarrow \text{Im}(f)$ est bij, et si $f^{-1}(\text{Im}(f)) \rightarrow [a, b]$ est def au vois de v , alors :

$$\lim_{x \rightarrow v} f^{-1}(x) = u$$

Corollaire 4.3.3 : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow v} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{v}$

Preuve. On pose $f(x) = x^n$, strictement croissante sur $[a, b] \forall b \geq 0$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow u} \sqrt[n]{x} = \lim_{x \rightarrow v} f^{-1}(x) = f^{-1}(v) = \sqrt[n]{v}$$

□

4.4 Lim à gauche/droite, limites infinies

Définition 4.4.1 . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ def. dans un voisinage à gauche (resp. à droite) de $u \in \mathbb{R}$, c'est à dire $[u - d, u[\subseteq D \forall d > 0$ (resp. $]u, u + d] \subseteq D \forall d > 0$).

Alors f admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite à gauche (resp. à droite) lorsque $x \rightarrow u, \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.q.

$$\forall x \in D \setminus \{u\}$$

On a

$$x \in [u - \delta, u[$$

(resp. $x \in]u, u + \delta]$)

$$\implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

Notation : limites à gauche : $\lim_{x \rightarrow u^-}$, limite à droite : $\lim_{x \rightarrow u^+}$

Ex : $f(x) = \frac{|x|}{x}$. Il faut séparer les cas.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1 & x > 0 \\ \frac{-x}{x} = -1 & x < 0 \end{cases}$$

Donc : $\lim_{x \uparrow 0} f(x) = \lim_{x \uparrow 0} -1 = \lim_{x \rightarrow x^-} -1 = -1$ et $\lim_{x \downarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x^+} 1 = 1$.

Propriété 4.4.2 (Limites gauche droite) . Si f est def au voisinage de u , alors :

$$\lim_{x \rightarrow u} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow u^+} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow u^-} f(x) = l$$

Remarque 4.4.3 : Cela montre que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{|x|}{x}$ n'existe pas.

Définition 4.4.4 . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ def au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) c'est à dire $[a, +\infty[\subseteq D$ pour un $a \in \mathbb{R}$ (resp. $] -\infty, a] \subseteq D$).

Alors $f(x)$ admet $l \in \mathbb{R}$ comme limite lorsque $x \rightarrow +\infty$ (resp. $x \rightarrow -\infty$) si $\forall \varepsilon > 0 \exists c \in \mathbb{R}$ t.q. $\forall x \in D$ on a :

$$x \geq c (x \leq c) \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

Notation : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ ou $f(x) \rightarrow l$

Ex : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Preuve avec epsilon. Soit $\varepsilon > 0$. On pose comme $c = \frac{1}{\varepsilon}$. Alors dès que $x \geq 0$ on a :

$$|f(x) - 0| = \frac{1}{x} \leq \frac{1}{c} \leq \varepsilon$$

Comme ε était arbitraire, on a bien montré que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists c \in \mathbb{R} \text{ t.q. } \forall x \in D, x \geq c \implies |f(x) - 0| \leq \varepsilon$$


□

Preuve avec les suites. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite t.q. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Comme (x_n) était arbitraire, c'est vrai pour toute suite. On a donc montré que $\forall (x_n) \rightarrow +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$ □

Remarque 4.4.5 : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l \iff f(x)$ a une asymptote horizontale d'équation $y = l$



Définition 4.4.6 (Divergence vers l'infini) . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ def au voisinage de $u \in \mathbb{R}$. Alors $f(x)$ tends vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) lorsque $x \rightarrow u$ si $\forall A \in \mathbb{R} \exists \delta > 0$ t.q. $\forall x \in D \setminus \{u\}$ on a :

$$|x - u| \leq \delta \iff f(x) \geq A \quad (\text{resp. } f(x) \leq A)$$

Notation : $\lim_{x \rightarrow u} f(x) = +\infty$ (resp. $-\infty$) ou $f(x) \rightarrow +\infty$ (resp. $-\infty$)

Ex : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

Preuve avec epsilon. Soit $A \in \mathbb{R}$. On pose $\delta = \frac{1}{\sqrt{A}}$ (ou $\delta = 1$ si $A < 0$). Alors dès que $|x - 0| \leq \delta$, on a :

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \geq \frac{1}{\delta^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{A}}\right)^2} = A$$

Comme A était arbitraire, c'est bon. □

Remarque 4.4.7 :

- On peut combiner ces limites généralisées. Par exemple :

$$\lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \uparrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$$

- $\lim_{x \rightarrow u^\pm} f(x) = \pm\infty \iff f(x)$ admet une asymptote verticale d'eq $x = u$
- Les propriétés algébriques, le théorème des gendarmes, les limites de composées et réciproques, ainsi que les calculs avec $+\infty$ valable pour les suites restent vrais pour ces limites généralisées.
- Attention aux formes indéterminées :

— $+\infty - +\infty$

— $0 \cdot +\infty$

— $\frac{+\infty}{+\infty}$

— $\frac{0}{0}$

Ex :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{+\infty}{1} = \infty$$

4.5 Fonctions continues

Définition 4.5.1 . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ def au voisinage de $u \in \mathbb{R}$. Alors f est continues en $x = u$ si :

$$\lim_{x \rightarrow u} f(x) = f(u)$$

Remarque 4.5.2 (*Conséquences de la continuité*) : Cela implique trois choses

1. $u \in D \implies f$ def au voisinage de u et en u .
2. la limite $\lim_{x \rightarrow u} f(x)$ existe dans \mathbb{R}
3. tout $f(u) \in \mathbb{R}$

Ex 1 : Les polynômes, les fonctions rationnelles, $\sqrt[n]{x}$, $\sin x$ (toutes les fonction trigo), e^x , $\log x$ etc... sont continues sur leur domaine.

Ex 2 : $f(x) = \frac{x^2+1}{x+1}$ est continues pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On voit que

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{2^2 + 1}{2 - 1} = 5 = f(2)$$

Mais $1 \notin D \implies f$ n'est pas continue en $x = 1$.

Remarque 4.5.3 : Si f est continue en $u \in \mathbb{R}$ et si $a_n \rightarrow u$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = f(u)$$

Définition 4.5.4 . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ def au voisinage $\begin{matrix} \text{à droite} \\ \text{à gauche} \end{matrix}$ de $u \in \mathbb{R}$. Alors f est continue $\begin{matrix} \text{à droite} \\ \text{à gauche} \end{matrix}$ en $x = u$ si :

$$\lim_{x \uparrow u} f(x) = f(u)$$

$$\lim_{x \downarrow u} f(x) = f(u)$$

Ex : $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x \geq 0 \\ \frac{\sin(x)}{x} & x < 0 \end{cases} \implies f$ est continue en tout $x \neq 0$. En $x = 0$ on a :

$$\lim_{x \uparrow 0} f(x) = \lim_{x \uparrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \downarrow 0} f(x) \stackrel{x \geq 0}{=} \lim_{x \downarrow 0} (2x + 1) = 1 = f(0)$$

Donc f est continues à gauche et à droite, donc continue en $x = 0$ donc continue sur \mathbb{R}

Propriété 4.5.5 (*Opération sur les fonctions continues*) . Si f et g sont continues en u alors $f + g$, $f \cdot g$, $\alpha f + \beta g$, $\frac{f}{g}$ (si $g(u) \neq 0$) sont aussi continue.
De plus, si f est continue en u et g continue en $f(u)$, alors $(f \circ g)(x)$ est continues en u .

Ex : $\frac{\sin(x^2 + 8x + 1)}{\sqrt{x^2 + 5} + \cos(x)}$ est continue sur tout \mathbb{R}

Définition 4.5.6 (*Prolongement par continuité*) . Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est def au voisinage de u avec $u \notin \mathbb{R}$ et tq $\lim_{x \rightarrow u} f(x) = l \in \mathbb{R}$ alors, le prolongement par continuité de f est :

$$\hat{f} : D \cup \{u\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq u \\ l & \text{si } x = u \end{cases}$$

Ex 1 : $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

$$\hat{f} = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

On appelle cette fonction $\text{sinc}(x)$

Ex 2 : A l'inverse $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ ne peut pas être prolongée par continuité en $x = 0$ car $\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'existe pas.

Définition 4.5.7 (*Fonction continues sur un intervalle*) . Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue (jusqu'au bord) si :

1. $\lim_{x \rightarrow u} f(x) = f(u) \forall u \in [a, b]$
2. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ (f est continue à droite en $x = a$)
3. $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$ (f est continue à gauche en $x = b$)

De manière analogue :

$f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue	si 1 + 2
$]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue	si 1 + 3
$]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue	si 1

Théorème 4.5.8 (*Valeur moyenne – TVI*) . Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors :

$$f([a, b]) = \left[\inf_{x \in [a, b]} f(x), \sup_{x \in [a, b]} f(x) \right]$$

Remarque 4.5.9 : Cela veut dire que f atteint :

- Son inf est son minimum :

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}$$

- Son sup est son maximum :

$$\sup_{x \in [a, b]} f(x) = \max_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}$$

- Toutes les valeurs intermédiaires.

Le min et max n'est pas $\pm\infty$. De plus, $f([a, b])$ est un intervalle fermé.

Preuve que f atteint. Posons $s = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = \sup(f([a, b]))$. On sait qu'il existe une suite $(y_n) \in f([a, b])$ tel que $y_n \rightarrow s$. Ainsi

$$\begin{aligned} & f(x_n) && x_n \in [a, b] \\ \implies & \exists (x_{n_k}) \text{ une sous suite de } (x_n) \text{ t.q. } x_{n_k} \rightarrow u \in [a, b] \\ \implies & f(u) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}) \\ & = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \\ & = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = s \end{aligned}$$

□

Ex : L'équation $\cos(x) = x$ possède une solution $x_0 \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

On pose $f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ qui est continue. On a $f(0) = \cos(0) - 0 = 1 \geq 0$ et $f(\frac{\pi}{2}) =$

$$x \mapsto \cos(x) - x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \leq 0.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires,

$$f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left[\underbrace{\min_{x < 0} f(x)}, \underbrace{\min_{x > 0} f(x)}\right]$$

Ainsi, il existe $x_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $f(x_0) = 0 \iff \cos(x_0) = x_0$

Corollaire 4.5.10 (TVI - 1) : Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ (ou l'inverse), alors il existe $u \in]a, b[$ tel que $f(u) = 0$


Corollaire 4.5.11 (TVI - 2) : Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, où I est un intervalle, alors $\Im(f) = f(I)$ est aussi un intervalle.

Corollaire 4.5.12 (TVI - 3) : Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors f est injective $\iff f$ est strictement monotone.

Preuve du Corollaire 3. \Leftarrow cf. Chap 0.

\Rightarrow Supposons que f n'est pas strictement monotone :

$$\exists u < v < w \text{ t.q. } f(u) < f(v) > f(w)$$



Ainsi, $f(x_1) = y = f(x_2)$, ce n'est donc pas injectif.

□

Chapitre 5

Dérivées

5.1 Définitions et exemples

Définition 5.1.1 (*Dérivée*) . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de x_0 ou en x_0 . Alors f est dérivable ou différentiable en x_0 si la limite

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existe ($\in \mathbb{R}$).

Notation :

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) = \partial_x f(x_0) = \mathcal{D}_x f(x_0) = \dot{f}(x_0)$$

On dit :

- $f'(x_0)$ est la dérivée de f en x_0
- $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable si elle est dérivable en tout $x_0 \in D$.

Remarque 5.1.2 : Le nombre $f'(x_0)$ est la pentes de la tangente à la courbe $y = f(x)$ au point $(x_0, f(x_0))$.

Ex :

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Définition 5.1.3 (*La fonction dérivée*) . La fonction dérivée d'une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction $f' : D(f(x)) \rightarrow \mathbb{R}$ où $D(f') = \{x \in D \mid f \text{ est dérivable en } x\}$

$$x \mapsto f'(x)$$

Ex 1 : $f(x) = x^2$. On a

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x_0 + h) = 2 \cdot x_0. \end{aligned}$$

Ainsi, $f(x) = x^2$ est dérivable pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$. Sa dérivée est $f'(x) = 2x$.

Ex 2 : $f(x) = \sin(x)$, $x_0 \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + h) - \sin(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0) \cos(h) + \cos(x_0) \sin(h) - \sin(x_0)}{h} \\ &= \sin(x_0) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x_0) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\ \Rightarrow \underbrace{-h}_{\rightarrow 0} &= \frac{1 - h^2 - 1}{h} \geq \underbrace{\frac{\cos(h) - 1}{h}}_{\rightarrow 0} \geq \frac{0}{h} = \underbrace{0}_{\rightarrow 0} \\ \Rightarrow \sin(x_0) \cdot 0 + \cos(x_0) \cdot 1 &= \cos(x_0) \end{aligned}$$

\sin est dérivable sur \mathbb{R} et $\sin'(x) = \cos(x)$. De manière analogue : $\cos'(x) = -\sin(x)$

Proposition 5.1.4 : Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

1. Si f est dérivable en x_0 , alors f est aussi continue en x_0
2. f est dérivable en x_0 si et seulement si :

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)}_{\text{équation de la tangente}} + \underbrace{(x - x_0) \cdot \varepsilon(x)}_{\text{reste}}$$

où $\varepsilon(x)$ est une fonction tel que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$. Le **reste** tend plus vite vers 0 que $x - x_0$

Preuve de la proposition.

1. On a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) = f(x_0) - f'(x_0) \cdot 0 = f(x_0)$$

2. Poser $\varepsilon(x) = \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0}$ et calculer la limite lorsque $x \rightarrow x_0$

□

Remarque 5.1.5 : f continues $\not\Rightarrow f$ dérivable.

Ex : $f(x) = |x|$, $x_0 = 0$. Alors f est continue en 0 mais on a

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \downarrow 0} \frac{|h|}{h} = 1 \neq -1 = \lim_{h \uparrow 0} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \uparrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h}$$

Donc la limite n'existe pas, donc f n'est pas dérivable en 0.

Propriété 5.1.6 (*Opérations algébriques*) . Soient $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en $x_0 \in D$. Alors :

1. $(p \cdot f + q \cdot g)'(x_0) = p \cdot f'(x_0) + q \cdot g'(x_0)$
2. $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$
3. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$, si $g(x_0) \neq 0$

Propriété 5.1.7 (*Dérivées de fonction usuelles*) .

0. $f(x) = c \in \mathbb{R} \implies f'(x) = 0$
1. $f(x) = x^n \implies f'(x) = n \cdot x^{n-1}$ pour \mathbb{N}^*

Preuve. Par récurrence sur n .

- $n = 1 : f(x) = x, f'(x) = 1$.
- Supposons vrai pour n , montrons pour $n + 1$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{n+1} = x^n \cdot x \\ f'(x) &\stackrel{\text{Prop 2}}{=} (x^n)' \cdot x + x^n \cdot (x)' \\ &= n \cdot x^{n-1} \cdot x + x^n \cdot 1 = (n + 1) \cdot x^n \end{aligned}$$

□

2. $\sin'(x) = \cos(x), \cos'(x) = -\sin(x)$ et

$$\tan'(x) = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)' \stackrel{\text{Prop 3}}{=} \frac{\sin'(x) \cos(x) - \sin(x) \cos'(x)}{\cos^2(x)} = \dots = \frac{1}{\cos^2(x)} \text{ ou } 1 + \tan^2(x)$$

3. $f(x) = x^{-n}, n \in \mathbb{N}^*, x \neq 0$

$$\implies f(x) = \frac{1}{x^n} \stackrel{\text{Prop 3}}{\implies} f'(x) = -n \cdot x^{-n-1}$$

Propriété 5.1.8 (Dérivées de composées) . Soient $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, deux fonction telles que f est dérivable en x_0 et g est dérivable en $f(x_0)$. Alors :

$$\begin{aligned}(g(f(x_0)))' &= (g \circ f)'(x_0) \\ &= g'(f(x_0)) \cdot \underbrace{f'(x_0)}_{\text{Dérivée interne}}\end{aligned}$$

Preuve. Le quotient est

$$\begin{aligned}&\frac{g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0))}{h} \\ &= \frac{g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0))}{f(x_0 + h) - f(x_0)} \cdot \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}\end{aligned}$$

En prenant la limite lorsque $h \rightarrow 0$, on obtient le résultat voulu. \square

Propriété 5.1.9 (Dérivées des réciproques) . Soit $f : A \rightarrow B$ bijective et dérivable sur A , un intervalle ouvert. Si $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in A$, alors

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Preuve. On admet que f^{-1} est dérivable sur tout B . On dérive l'équation $f(f^{-1}(x)) = x$ des deux cotés :

$$\begin{aligned}1 &= (f \circ f^{-1})'(x) = f'(f^{-1}(x)) \\ \implies \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} &= (f^{-1})'(x)\end{aligned}$$


\square

Ex 1 : $f(x) = \sqrt[n]{x} = f^{-1}(x)$ où $f(x) = x^n$, où $x > 0$

$$\begin{aligned}x &= f(g(x)) = (\sqrt[n]{x})^n \\ \implies 1 &= n(\sqrt[n]{x})^{n-1} \cdot (\sqrt[n]{x})' \\ \implies (\sqrt[n]{x})' &= \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}} = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}\end{aligned}$$

On montre de manière analogue que $\left(x^{\frac{p}{q}}\right)' = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}$ pour tout $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ et on verra que c'est aussi vrai pour tout réel.

Ex 2 : $\arcsin'(x) = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))}, x \in]-1, 1[$



$$x = \cos(\arccos(x)) \\ = \cos(\alpha) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1}$$

$$\Rightarrow \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Définition 5.1.10 . $\lim_{h \downarrow 0} \frac{f(x+h)-f(h)}{h}$ est la dérivée à droite, si $h \uparrow 0$, c'est la dérivée à gauche.

Propriété 5.1.11 . f est dérivable en x_0 si et seulement si les deux dérivées latérales existent et sont égales.

Ex 1 : $f(x) = |x|$. On a :

$$f'_{\text{droite}}(0) = 1 \neq -1 = f'_{\text{gauche}}(0)$$

Donc f n'est pas dérivable en 0.

Ex 2 : $f(x) = \sqrt[3]{x}$. On a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt[3]{h})^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$f'(0)$ n'existe pas, mais les deux dérivées latérales sont égales à $+\infty$.

Définition 5.1.12 (Dérivée d'ordre supérieur) . La dérivée seconde de f est

$$f''(x) = f^{(2)}(x) = (f'(x))'$$

La dérivée d'ordre n de f est définie par récurrence :

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$$

Définition 5.1.13 (Classes de fonctions dérivables) . Soit I un intervalle. Alors


$$D^n(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est } n \text{ fois dérivable sur } I\}$$

$$C^n(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est } n \text{ fois dérivable sur } I \text{ et } f^{(n)} \text{ est continue sur } I\}$$

On pose $C^\infty(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f^{(n)} \text{ existe pour tout } n \in \mathbb{N}\}$.

Remarque 5.1.14 :

- $C^0(I)$ est l'ensemble des fonctions continues sur I .
- Les fonction polynomiales, trigonométriques, exponentielles, logarithmes, rationnelles sont dans C^∞ sur leur domaine de définition.
- $C^0(I) \supseteq D^1(I) \supseteq C^1(I) \supseteq D^2(I) \supseteq C^2(I) \supseteq \dots D^\infty \supseteq C^\infty$



$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = x \cdot |x| = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x & x > 0 \\ -2x & x < 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h| - 0}{h} = 0 & x = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow f'(x) = 2|x| \Rightarrow$ continue sur \mathbb{R}
mais pas dérivable

$$\Rightarrow f \in C^1(\mathbb{R}) \setminus D^2(\mathbb{R})$$

Remarque 5.1.15 :

- $x^n|x|$ est dans $C^n(\mathbb{R}) \setminus D^{n+1}(\mathbb{R})$
- $x|x| \in C^\infty([0, +\infty[)$
 $\in C^\infty(]-\infty, 0])$

Ex $D^1 \setminus C^1$: On a $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$. Alors

$$f'(x) = 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ si } x \neq 0$$

et

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cos\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$