

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3
«**Численное интегрирование**»

по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: **13**

Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

Выполнил:
Саранча Павел Александрович
Группа: Р3209

Санкт-Петербург, 2025 г.

Цель работы: найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

1. Вычислительная реализация задачи

1. Вычислить интеграл, приведенный в таблице 1, точно:

$$\int_1^3 (-2x^3 - 5x^2 + 7x - 13) dx$$

$$F(x) = -\frac{x^4}{2} - \frac{5x^3}{3} + \frac{7x^2}{2} - 13x; F(3) = -93; F(1) = -\frac{35}{3}$$

$$I_{\text{точн}} = F(x) = F(3) - F(1) = -93 + \frac{35}{3} = -\frac{244}{3} \approx -81. (3)$$

2. Вычислить интеграл по формуле Ньютона–Котеса при $n = 6$:

$$h = \frac{b-a}{6} = \frac{(3)-(1)}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx c_6^0 f(a) + c_6^1 f(a+h) + c_6^2 f(a+2h) + c_6^3 f(a+3h) + c_6^4 f(a+4h) + c_6^5 f(a+5h) + c_6^6 f(b)$$

$$\begin{aligned} I_{\text{cotes}} &= ((3)-(1)) \\ &\times \left(\frac{41}{840} f(1) + \frac{216}{840} f\left(\frac{4}{3}\right) + \frac{27}{840} f\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{272}{840} f(2) + \frac{27}{840} f\left(\frac{7}{3}\right) \right. \\ &\left. + \frac{216}{840} f\left(\frac{8}{3}\right) + \frac{41}{840} f(3) \right) = \frac{-244}{3} = -81. (3) \end{aligned}$$

[Решение с помощью WolframAlpha](#)

3. Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при $n = 10$:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{(3)-(1)}{10} = \frac{1}{5}$$

- **Метод средних прямоугольников:**

$$\begin{aligned} I_{\text{ср.пря}} &= h \sum_{i=1}^n y_{i-\frac{1}{2}} = h \cdot \left(f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f\left(a + \frac{5h}{2}\right) + f\left(a + \frac{7h}{2}\right) + \right. \\ &\left. f\left(a + \frac{9h}{2}\right) + f\left(a + \frac{11h}{2}\right) + f\left(a + \frac{13h}{2}\right) + f\left(a + \frac{15h}{2}\right) + f\left(a + \frac{17h}{2}\right) + f\left(a + \frac{19h}{2}\right) \right) = \end{aligned}$$

$$= 0.2(f(1 + 0.1) + f(1 + 0.3) + f(1 + 0.5) + f(1 + 0.7) + f(1 + 0.9) + f(1 + 1.1) + f(1 + 1.3) + f(1 + 1.5) + f(1 + 1.7) + f(1 + 1.9)) = -81.22$$

[Решение с помощью WolframAlpha](#)

- **Метод трапеций:**

$$I_{\text{трапеция}} = h \cdot \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

$$I_{\text{трапеция}} = 0.2 \left(\frac{f(1) + f(3)}{2} + f(1 + 0.2) + f(1 + 0.4) + f(1 + 0.6) + f(1 + 0.8) + f(1 + 1) + f(1 + 1.2) + f(1 + 1.4) + f(1 + 1.6) + f(1 + 1.8) \right)$$

$$= -81.56$$

[Решение с помощью WolframAlpha](#)

- **Метод Симпсона:**

$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + 4 \sum_{i=1}^{n-1} y_{\text{нечёт}} + 2 \sum_{i=2}^{n-2} y_{\text{чёт}} + y_n \right)$$

$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{0.2}{3} (f(1) + 4 * (f(1 + 0.2) + f(1 + 0.6) + f(1 + 1) + f(1 + 1.4) + f(1 + 1.8)) + 2 * (f(1 + 0.4) + f(1 + 0.8) + f(1 + 1.2) + f(1 + 1.6)) + f(3)) =$$

$$= -81.(3)$$

[Решение с помощью WolframAlpha](#)

4. Сравнить результаты с точным значением интеграла:

Точное значение интеграла на интервале вычислено как $-\frac{244}{3} \approx -81.(3)$

1. Для метода **Ньютона–Котеса** при $n = 6$: $I_{\text{точн}} = I_{\text{cotes}} = -81.(3)$, значения совпадают.

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{cotes}}| = \left| -\frac{244}{3} - (-81.33333...) \right| = 0$$

2. Для метода **средних прямоугольников** при $n = 10$: $I_{\text{ср.пря}} = -81.22$.

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{ср.пря}}| = \left| -\frac{244}{3} - (-81.22) \right| = 0.11(3)$$

3. Для метода **трапеций** при $n = 10$: $I_{\text{трапеция}} = -81.56$.

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{трапеция}}| = \left| -\frac{244}{3} - (-81.56) \right| = 0.22(6)$$

4. Для метода **Симпсона** при $n = 10$: $I_{\text{точн}} = I_{\text{Симпсона}} = -81.(3)$, значения совпадают.

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{cotes}}| = \left| -\frac{244}{3} - (-81.33333...) \right| = 0$$

5. Определить относительную погрешность вычислений для каждого метода.


1. Для метода **Ньютона–Котеса**: $R = 0 \rightarrow$ погрешности нет.
2. Для метода **средних прямоугольников**: $\Delta = \frac{|-81.(3)-(-81.22)|}{|-81.(3)|} * 100\% \approx 0.1\%$
3. Для метода **трапеций**: $\Delta = \frac{|-81.(3)-(-81.56)|}{|-81.(3)|} * 100\% \approx 0.3\%$
4. Для метода **Симпсона**: $R = 0 \rightarrow$ погрешности нет.

Как видно из результатов, все методы дали относительно малую погрешность, особенно при использовании формулы Ньютона–Котеса и Симпсона. Наилучший результат был получен при использовании формулы Ньютона–Котеса с $n = 6$ и формулы Симпсона с $n = 10$, при которых значения интеграла полностью совпали.


2. Программная реализация задачи

https://github.com/PaulLocust/comp_math_lab3


Логические схемы методов:




Метод правых прямоугольников




Метод средних прямоугольников



Метод Симпсона



Метод Трапеций



Листинг методов:

```
1 | def rectangle_left(func, a, b, n):
2 |     """
3 |     Метод левых прямоугольников для численного интегрирования.
4 |
5 |     :param func: функция, которую нужно проинтегрировать
6 |     :param a: нижний предел
7 |     :param b: верхний предел
8 |     :param n: количество разбиений
9 |     :return: приближенное значение интеграла
10 |     """
11 |     h = (b - a) / n
12 |     result = 0
13 |     for i in range(n):
14 |         x = a + i * h
15 |         result += func(x)
16 |     return result * h
17 |
```

```

18|
19| def rectangle_right(func, a, b, n):
20|     """
21|     Метод правых прямоугольников для численного интегрирования.
22|
23|     :param func: функция, которую нужно проинтегрировать
24|     :param a: нижний предел
25|     :param b: верхний предел
26|     :param n: количество разбиений
27|     :return: приближенное значение интеграла
28|     """
29|     h = (b - a) / n
30|     result = 0
31|     for i in range(1, n + 1):
32|         x = a + i * h
33|         result += func(x)
34|     return result * h
35|
36|
37| def rectangle_middle(func, a, b, n):
38|     """
39|     Метод средних прямоугольников для численного интегрирования.
40|
41|     :param func: функция, которую нужно проинтегрировать
42|     :param a: нижний предел
43|     :param b: верхний предел
44|     :param n: количество разбиений
45|     :return: приближенное значение интеграла
46|     """
47|     h = (b - a) / n
48|     result = 0
49|     for i in range(n):
50|         x = a + (i + 0.5) * h
51|         result += func(x)
52|     return result * h

```

```

1 | def simpson_rule(func, a, b, n):
2 |     """
3 |     Метод Симпсона для численного интегрирования.
4 |
5 |     :param func: функция, которую нужно проинтегрировать
6 |     :param a: нижний предел
7 |     :param b: верхний предел
8 |     :param n: количество разбиений (должно быть чётным)
9 |     :return: приближенное значение интеграла
10|     """
11|     if n % 2 != 0:
12|         raise ValueError("Количество разбиений n должно быть чётным для метода Симпсона.")
13|
14|     h = (b - a) / n
15|     result = func(a) + func(b)
16|
17|     # Суммируем все элементы с коэффициентами
18|     for i in range(1, n):
19|         coef = 3 + (-1) ** (i + 1)
20|         x = a + i * h
21|         result += coef * func(x)
22|
23|     return result * h / 3
24|

```

```

1 | def trapezoid_rule(func, a, b, n):
2 |     """
3 |     Метод трапеций для численного интегрирования.
4 |
5 |     :param func: функция, которую нужно проинтегрировать
6 |     :param a: нижний предел
7 |     :param b: верхний предел
8 |     :param n: количество разбиений
9 |     :return: приближенное значение интеграла
10 |    """
11 |    h = (b - a) / n
12 |    result = (func(a) + func(b)) / 2 # Начальные значения на концах
отрезка
13 |
14 |    # Суммируем значения функции в серединах трапеций
15 |    for i in range(1, n):
16 |        x = a + i * h
17 |        result += func(x)
18 |
19 |    return result * h

```

Результаты выполнения программы при различных исходных данных:

```

1 | Выберите функцию для интегрирования:
2 | 1. x^2
3 | 2. sin(x)
4 | 3. e^x
5 | 4. 1/x^2
6 | 5. 1/x
7 | 6. 1/sqrt(x)
8 | 7. -2x^3 - 5x^2 + 7x - 13
9 | 8. 10
10 | 9. 1 / sqrt(2x - x^2)
11 | Ваш выбор: 7
12 | Введите начальный предел интегрирования (a): 1
13 | Введите конечный предел интегрирования (b): 3
14 | Введите требуемую точность вычислений: 0.0001
15 |
16 | Выберите метод интегрирования:
17 | 1. Метод левых прямоугольников
18 | 2. Метод правых прямоугольников
19 | 3. Метод средних прямоугольников
20 | 4. Метод трапеций
21 | 5. Метод Симпсона
22 | Ваш выбор: 5
23 |
24 | Метод: simpson

```

```
25| Значение интеграла: -81.33333333333333
26| Число разбиений для достижения требуемой точности: n = 8
27|
28| Хотите попробовать ещё раз? [y/n]:
```

```
1 | Выберите функцию для интегрирования:
2 | 1. x^2
3 | 2. sin(x)
4 | 3. e^x
5 | 4. 1/x^2
6 | 5. 1/x
7 | 6. 1/sqrt(x)
8 | 7. -2x^3 - 5x^2 + 7x - 13
9 | 8. 10
10| 9. 1 / sqrt(2x - x^2)
11| Ваш выбор: 5
12| Введите начальный предел интегрирования (a): -1
13| Введите конечный предел интегрирования (b): 1
14| Обнаружены точки разрыва: [0.0].
15| - Интеграл не существует: функция не сходится на разрывах.
16|
17| Хотите попробовать ещё раз? [y/n]:
```

```
1 | Выберите функцию для интегрирования:
2 | 1. x^2
3 | 2. sin(x)
4 | 3. e^x
5 | 4. 1/x^2
6 | 5. 1/x
7 | 6. 1/sqrt(x)
8 | 7. -2x^3 - 5x^2 + 7x - 13
9 | 8. 10
10| 9. 1 / sqrt(2x - x^2)
11| Ваш выбор: 5
12| Введите начальный предел интегрирования (a): 1
13| Введите конечный предел интегрирования (b): 2
14| Введите требуемую точность вычислений: 0.001
15|
16| Выберите метод интегрирования:
17| 1. Метод левых прямоугольников
18| 2. Метод правых прямоугольников
19| 3. Метод средних прямоугольников
20| 4. Метод трапеций
21| 5. Метод Симпсона
22| Ваш выбор: 1
23|
24| Метод: rectangle_left
25| Значение интеграла: 0.694124696732443
26| Число разбиений для достижения требуемой точности n = 256
```

```
27| Хотите попробовать ещё раз? [y/n]:
```

```
1 | Выберите функцию для интегрирования:
2 | 1. x^2
3 | 2. sin(x)
4 | 3. e^x
5 | 4. 1/x^2
6 | 5. 1/x
7 | 6. 1/sqrt(x)
8 | 7. -2x^3 - 5x^2 + 7x - 13
9 | 8. 10
10| 9. 1 / sqrt(2x - x^2)
11| Ваш выбор: 9
12| Введите начальный предел интегрирования (a): 0
13| Введите конечный предел интегрирования (b): 2
14| Обнаружены точки разрыва: [0.0, 2.0].
15| + Интеграл существует: функция сходится на разрывах.
16| Введите требуемую точность вычислений: 0.01
17|
18| Выберите метод интегрирования:
19| 1. Метод левых прямоугольников
20| 2. Метод правых прямоугольников
21| 3. Метод средних прямоугольников
22| 4. Метод трапеций
23| 5. Метод Симпсона
24| Ваш выбор: 5
25|
26| Метод: simpson
27| Значение интеграла: 3.230894059122111
28| Число разбиений для достижения требуемой точности: n = 2048
29| Хотите попробовать ещё раз? [y/n]:
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены численные методы интегрирования с использованием Python. В результате работы были рассмотрены различные численные методы вычисления определенных интегралов: метод прямоугольников (левых, правых, средних), метод трапеций, метод Ньютона-Котеса и метод Симпсона.

Была реализована программа, позволяющая выбрать одну из предложенных функций, задать пределы интегрирования, точность и начальное значение числа разбиения интервала интегрирования.

Были рассчитаны интегралы различными методами.

Выполнена дополнительная задача по установлению сходимости рассматриваемых несобственных интегралов 2 рода и их вычислению заданными численными методами в случаях, когда подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв в точке a , в точке b или на отрезке интегрирования.