

Key integrals and identities:

$$\left(\frac{a}{2}\right)\delta_{mn} = \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx$$

$$\left(\frac{a}{2}\right)\delta_{mn} = \int_0^a \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx$$

$$0 = \int_0^a \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx$$

$$\frac{a^2}{4} = \int_0^a \left(\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\right)^2 x dx$$

$$\left(\frac{a}{2\pi n}\right)^3 \left(\frac{4\pi^3 n^3}{3} - 2\pi n\right) = \int_0^a \left(\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\right)^2 x^2 dx$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx$$

$$\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}\right) \left(\frac{(2n-1)(2n-3)\cdots(3)(1)}{(2\alpha)^n}\right) = \int_0^\infty x^{2n} e^{-\alpha x^2} dx \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{n!}{\alpha^{n+1}}\right) = \int_0^\infty x^{2n+1} e^{-\alpha x^2} dx \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$2 \sin(x) \sin(y) = \cos(x-y) - \cos(x+y) \quad \rightarrow \quad 2 \sin^2 x = 1 - \cos(2x)$$

$$2 \cos(x) \cos(y) = \cos(x-y) + \cos(x+y) \quad \rightarrow \quad 2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x)$$

$$2 \sin(x) \cos(y) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \quad \rightarrow \quad 2 \sin x \cos x = \sin(2x)$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \quad \rightarrow \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y \quad \rightarrow \quad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

VALUES OF SOME PHYSICAL CONSTANTS

Constant	Symbol	Value
Avogadro's number	N_0	$6.02205 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Proton charge	e	$1.60219 \times 10^{-19} \text{ C}$
Planck's constant	h	$6.62618 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
	\hbar	$1.05459 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
Speed of light in vacuum	c	$2.997925 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
Atomic mass unit	amu	$1.66056 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Electron rest mass	m_e	$9.10953 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Proton rest mass	m_p	$1.67265 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Boltzmann constant	k_B	$1.38066 \times 10^{-23} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$ 0.69509 cm^{-1}
Molar gas constant	R	$8.31441 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
Permittivity of a vacuum	ϵ_0	$8.854188 \times 10^{-12} \text{ C}^2\cdot\text{s}^2\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{m}^{-3}$
	$4\pi\epsilon_0$	$1.112650 \times 10^{-10} \text{ C}^2\cdot\text{s}^2\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{m}^{-3}$
Rydberg constant (infinite nuclear mass)	R_∞	$2.179914 \times 10^{-23} \text{ J}$ 1.097373 cm^{-1}
First Bohr radius	a_0	$5.29177 \times 10^{-11} \text{ m}$
Bohr magneton	μ_B	$9.27409 \times 10^{-24} \text{ J}\cdot\text{T}^{-1}$
Stefan-Boltzmann constant	σ	$5.67032 \times 10^{-8} \text{ J}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}\cdot\text{s}^{-1}$

CONVERSION FACTORS FOR ENERGY UNITS

joule	$\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	eV	au	cm^{-1}	Hz
1 joule = 1	6.022×10^{20}	6.242×10^{18}	2.2939×10^{-17}	5.035×10^{22}	1.509×10^{13}
1 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ = 1.661×10^{-21}	1	1.036×10^{-2}	3.089×10^{-4}	83.60	2.506×10^{12}
1 eV = 1.602×10^{-19}	96.48	1	3.675×10^{-2}	8065	2.418×10^{14}
1 au = 4.359×10^{-18}	2625	27.21	1	2.195×10^5	6.580×10^{15}
1 cm^{-1} = 1.986×10^{-23}	1.196×10^{-2}	1.240×10^{-4}	4.556×10^{-6}	1	2.998×10^{10}
1 Hz = 6.626×10^{-34}	3.990×10^{-13}	4.136×10^{-13}	1.520×10^{-16}	3.336×10^{-11}	1

SOME MATHEMATICAL FORMULAS

Paul

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} \cos (\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos (\alpha + \beta) \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} \cos (\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos (\alpha + \beta) \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} \sin (\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \sin (\alpha - \beta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin (\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos (\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ e^{\pm i\theta} &= \cos \theta \pm i \sin \theta\end{aligned}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!} f''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{3!} f'''(a)(x-a)^3 + \dots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots \quad x^2 < 1$$

$$(1 \pm x)^n = 1 \pm nx \pm \frac{n(n-1)}{2!} x^2 \pm \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 \pm \dots \quad x^2 < 1$$

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}} \quad (n \text{ positive integer})$$

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} dx = \left(\frac{\pi}{4a} \right)^{1/2}$$

$$\int_0^\infty x^{2n} e^{-ax^2} dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} a^n} \left(\frac{\pi}{a} \right)^{1/2} \quad (n \text{ positive integer})$$

$$\int_0^\infty x^{2n+1} e^{-ax^2} dx = \frac{n!}{2a^{n+1}} \quad (n \text{ positive integer})$$

$$\int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx = \int_0^a \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{a}{2} \delta_{nm}$$

$$\int_0^a \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx = 0 \quad (m \text{ and } n \text{ integers})$$

$$1 \text{ J (oule)} = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2 = 1 \text{ C (oulomb)}\cdot\text{V (olt)}$$