

# Atividade 2

## Cadeias de Markov

Paulo Ricardo Seganfredo Campana

29 de julho de 2023

1) Considere o exemplo da cadeia de Markov com dois estados. Se  $X_n, n \geq 0$ , é tal cadeia, calcule

a)  $P(X_1 = 0 \mid X_0 = 0, X_2 = 0)$ .

$$P(X_1 = 0 \mid X_0 = 0, X_2 = 0) = \frac{P(X_0 = 0, X_1 = 0, X_2 = 0)}{P(X_0 = 0, X_2 = 0)} =$$
$$\frac{\pi_0(0)P(0,0)P(0,0)}{\pi_0(0)P(0,0)P(0,0) + \pi_0(0) + P(0,1)P(1,0)} = \frac{(1-p)^2}{(1-p)^2 + pq}$$

b)  $P(X_1 \neq X_2)$ .

$$P(X_1 \neq X_2) = P(X_1 = 0, X_2 = 1) + P(X_1 = 1, X_2 = 0) =$$
$$\pi_1(0)P(0,1) + \pi_1(1)P(1,0) = \pi_1(0)(p-q) + q =$$
$$((1-p-q)\pi_0(0) + q)(p-q) + q$$

2) Seja  $X_n, n \geq 0$ , uma cadeia de Markov com função de transição  $P$ .

a) Mostre que se  $\pi_n$  denota a distribuição da variável aleatória  $X_n$ , então, para  $m \geq 1$ , temos que

$$P(X_n = x_n, X_{n+1} = x_{n+1}, \dots, X_{n+m} = x_{n+m}) = \pi_n(x_n)P(x_n, x_{n+1}) \cdots P(x_{n+m-1}, x_{n+m}).$$

Seja a notação  $[X_0 = x_0, \dots, X_j = x_j] \implies [X = x]_{0, \dots, j}$

$$\begin{aligned} P([X = x]_{n, \dots, n+m}) &= \\ P(X_{n+m} = x_{n+m}, [X = x]_{n, \dots, n+m-1}) &= \\ P(X_{n+m} = x_{n+m} \mid [X = x]_{n, \dots, n+m-1}) P([X = x]_{n, \dots, n+m-1}) &= \\ P(X_{n+m} = x_{n+m} \mid X_{n+m-1} = x_{n+m-1}) P([X = x]_{n, \dots, n+m-1}) &= \\ P(x_{n+m-1}, x_{n+m}) P([X = x]_{n, \dots, n+m-1}) & \end{aligned}$$

Aplicando  $m$  vezes a relação

$$P([X = x]_{n, \dots, n+m}) = P([X = x]_{n, \dots, n+m-1}) P(x_{n+m-1}, x_{n+m})$$

Temos que:

$$\begin{aligned} P([X = x]_{n, \dots, n}) P(x_n, x_{n+1}) \cdots P(x_{n+m-1}, x_{n+m}) &= \\ \pi_n(x_n) P(x_n, x_{n+1}) \cdots P(x_{n+m-1}, x_{n+m}) & \end{aligned}$$

b) Use a parte a) para mostrar que

$$P(X_1 = x_1 \mid X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1 \mid X_2 = x_2).$$

$$\begin{aligned} P(X_1 = x_1 \mid [X = x]_{2, \dots, n}) &= \frac{P([X = x]_{1, \dots, n})}{P([X = x]_{2, \dots, n})} = \\ \frac{\pi_1(x_1) P(x_1, x_2) P(x_2, x_3) \cdots P(x_{n-1}, x_n)}{\pi_2(x_2) P(x_2, x_3) \cdots P(x_{n-1}, x_n)} &= \frac{\pi_1(x_1) P(x_1, x_2)}{\pi_2(x_2)} = \\ \frac{P(X_1 = x_1) P(X_2 = x_2 \mid X_1 = x_1)}{P(X_2 = x_2)} &= \frac{P(X_1 = x_1, X_2 = x_2)}{P(X_2 = x_2)} = P(X_1 = x_1 \mid X_2 = x_2) \end{aligned}$$

3) Seja  $X_n, n \geq 0$ , uma cadeia de Markov sobre o espaço de estados  $\mathcal{S}$ . Para  $y \in \mathcal{S}$  fixo, expresse  $P(X_1 = y)$  em termos da distribuição inicial  $\pi_0(x) = P(X_0 = x)$  e a função de transição  $P(x, y) = P(X_1 = y \mid X_0 = x)$ .

$$\begin{aligned} P(X_1 = y) &= P([X_1 = y] \cap \Omega) = P\left([X_1 = y] \cap \bigcup_{x \in \mathcal{S}} [X_0 = x]\right) = \\ &= P\left(\bigcup_{x \in \mathcal{S}} [X_1 = y \cap X_0 = x]\right) = \sum_{x \in \mathcal{S}} P([X_1 = y \cap X_0 = x]) = \\ &= \sum_{x \in \mathcal{S}} P(X_1 = y \mid X_0 = x) P(X_0 = x) = \sum_{x \in \mathcal{S}} \pi_0(x) P(x, y) \end{aligned}$$

4) Considere a cadeia de Markov de dois estados, com  $p = 1/2$  e  $q = 1/3$ . Suponha que  $X_0 \sim \text{Bernoulli}(3/5)$ , em que  $P(X_0 = 1) = 3/5$ . Use o resultado do exercício 3 para obter a distribuição de  $X_1$ . Veja se a sua resposta é coerente com o visto na aula.

$$\begin{aligned} P(X_1 = y) &= \sum_{x \in \mathcal{S}} \pi_0(x) P(x, y) = \pi_0(0) P(0, y) + \pi_0(1) P(1, y) = \\ &= \frac{2}{5} \begin{cases} 1/2, & \text{se } y = 0 \\ 1/2, & \text{se } y = 1 \end{cases} + \frac{3}{5} \begin{cases} 1/3, & \text{se } y = 0 \\ 2/3, & \text{se } y = 1 \end{cases} = \begin{cases} 2/5, & \text{se } y = 0 \\ 3/5, & \text{se } y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Conferindo com o resultado  $P(X_1 = 0) = (1 - p - q)\pi_0(0) + q$ .

$$P(X_1 = 0) = \frac{1}{6} \frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$$

5) Suponha que temos duas caixas (A e B) e  $2d$  bolas, das quais  $d$  bolas são pretas e as outras  $d$  são vermelhas. Inicialmente,  $d$  bolas são colocadas na caixa A, e as restantes são colocadas na caixa B. Em cada ensaio duas bolas são selecionadas ao acaso, uma da caixa A e a outra da caixa B, e as bolas selecionadas são colocadas nas caixas opostas. Seja  $X_0$  a variável aleatória que representa o número de bolas pretas inicialmente na caixa A, e seja  $X_n, n \geq 1$ , a variável aleatória que representa o número de bolas pretas na caixa A depois do  $n$ -ésimo ensaio. Achar a função de transição da cadeia de Markov  $X_n, n \geq 0$ .

- Seja  $A_p, A_v, B_p, B_v$  as quantidades de bolas de certa cor em certa caixa.
- A quantidade total de bolas numa caixa e de bolas de uma cor é constante.
  - $A_p + A_v = d$
  - $B_p + B_v = d$
  - $A_p + B_p = d$
  - $A_v + B_v = d$
- $A_p$  é a variável de interesse,  $A_p = X_n$ .
- A cada etapa,  $A_p$  só pode aumentar em 1, diminuir em 1 ou permanecer o mesmo.
  - Aumentar: se é escolhido bola vermelha de A e uma preta de B.
  - Diminuir: se é escolhido bola preta de A e bola vermelha de B.
  - Permanecer: se é escolhido bolas de cores iguais de A e B.
- Os eventos de escolha são independentes.

$$P(\text{Aumentar}) = P(A_v) P(B_p) = \frac{A_v}{A_v + A_p} \frac{B_p}{B_v + B_p} = \frac{d - A_p}{d} \frac{d - A_p}{d} = \left( \frac{d - A_p}{d} \right)^2 = \left( 1 - \frac{X_n}{d} \right)^2$$

$$P(\text{Diminuir}) = P(A_p) P(B_v) = \frac{A_p}{A_v + A_p} \frac{B_v}{B_v + B_p} = \frac{A_p}{d} \frac{d - A_v}{d} = \left( \frac{A_p}{d} \right)^2 = \left( \frac{X_n}{d} \right)^2$$

$$P(\text{permanecer}) = 1 - P(\text{Aumentar}) - P(\text{Diminuir}) =$$

$$1 - \left( 1 - \frac{X_n}{d} \right)^2 - \left( \frac{X_n}{d} \right)^2 = \frac{2X_n}{d} \left( 1 - \frac{X_n}{d} \right)$$

$$P(x, y) = \begin{cases} \left( 1 - \frac{x}{d} \right)^2 & , \text{ se } y = x + 1 \\ \left( \frac{x}{d} \right)^2 & , \text{ se } y = x - 1 \\ \frac{2x}{d} \left( 1 - \frac{x}{d} \right) & , \text{ se } y = x \\ 0 & , \text{ caso contrário} \end{cases}$$

6) Considere a *fila modificada* em que, se há clientes na fila aguardando para serem atendidos no início de cada período, tem-se uma probabilidade  $p$  de que um cliente seja atendido nesse período e probabilidade  $1 - p$  de que ninguém seja atendido naquele período. Obtenha a função de transição para essa cadeia de Markov.

Seja  $X_n$  uma fila comum e  $Y_n$  uma fila em que os clientes nunca são atendidos, elas tem função de transição:

$$P(x, y)_X = \begin{cases} f(y) & , \text{ se } x = 0 \\ f(y - x - 1), & \text{ se } x > 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad P(x, y)_Y = \begin{cases} f(y) & , \text{ se } x = 0 \\ f(y - x), & \text{ se } x > 0 \end{cases}$$

A cadeia de Markov de interesse  $Z_n$  é justamente uma cadeia em que alterna entre as cadeias  $X_n$  e  $Y_n$  com probabilidade  $p$ , então:

$$Z_n = \begin{cases} X_n, & \text{com probabilidade } p \\ Y_n, & \text{com probabilidade } 1 - p \end{cases}$$

$$P(x, y)_Z = \begin{cases} f(y) & , \text{ se } x = 0 \\ pf(y - x - 1) + (1 - p)f(y - x), & \text{ se } x > 0 \end{cases}$$

7) O seguinte script simula a ruína do jogador sobre o espaço de estados  $\mathcal{S} = \{0, 1, 2, \dots, d\}$ : A variável `vec` retorna os valores da cadeia  $X_n, n \geq 0$ , enquanto que a variável `cont` retorna o valor da etapa  $n \geq 1$  para o qual a cadeia atinge o estado absorvente  $x = 0$  ou  $x = d$ . O valor `p` determina a probabilidade do jogador ganhar uma determinada aposta. Adaptar o script anterior para simular o *passeio aleatório simples*.

```
# Ruína do jogador
set.seed(75898)
start <- 20 # capital inicial
d <- 60
p <- 0.5
gain <- start
vec <- c(start)
cont <- 0
while (0 < gain && gain < d) {
  cont <- cont + 1
  gain <- gain + sample(c(-1, 1), size = 1, prob = c(1 - p, p))
  vec <- c(vec, gain)
}
```

```

# Passeio aleatório simples
set.seed(75898)
pos <- 0 # posição inicial
d <- 15
p <- 0.4
q <- 0.4
r <- 0.2
stopifnot(p + q + r == 1)
vec <- c(pos)
cont <- 0
while (-d < pos && pos < d) {
  cont <- cont + 1
  pos <- pos + sample(c(1, -1, 0), size = 1, prob = c(p, q, r))
  vec <- c(vec, pos)
}

```

