MONOGRAFIA ACADEMICA - METODOLOGIA, FUNDAMENTACAO E RESULTADOS

Predicao Genomica de Resistencia Antimicrobiana e Estimativa de MIC Ciente da Filogenia:

Catalogos Curados, Unitigs de 31-mers, Predicao Conformal e Explicabilidade TreeSHAP por Locus

Projeto PhyloResistance AI (v1.2.0) | Uso em pesquisa. Nªo substitui o antibiograma.

RESUMO ACADEMICO (ABSTRACT)

A Resistencia Antimicrobiana (AMR) causa diretamente 1,27 milhao de obitos anuais no mundo (Lancet, 2022). Embora o sequenciamento de genoma completo (WGS-AST) permita predizer perfis de susceptibilidade, catalogos estaticos (CARD, AMRFinderPlus, ResFinder) falham diante de mecanismos poligenicos, mutacoes em reguladores de bombas de efluxo e porinas. Em contrapartida, modelos de Machine Learning sobre k-mers avaliados por divisao aleatoria sofrem de confusao filogenetica, memorizando marcadores de linhagem clonal (ex.: E. coli ST131) em vez de determinantes causais (Kavvas et al., 2018). Neste estudo, apresentamos o PhyloResistance AI sob 15 Regras de Rigor Cientifico (REG-01 a REG-15). Avaliando 1.080 testes AST em 360 genomas unicos de E. coli (12 linhagens ST, 7 paises, 2016-2025), mais coortes de K. pneumoniae (N=120), S. aureus MRSA (N=120) e validacao externa NCBI Pathogen Detection (N=100), demonstramos que o modelo B4 (XGBoost F1+F2+F3) supera significativamente o baseline B1 (CARD/AMRFinderPlus) em grupos filogeneticos disjuntos: Ciprofloxacina (AUPRC 0.9621 vs 0.8763), Gentamicina (0.9065 vs 0.8174) e Cefuroxima (0.9335 vs 0.7364), reduzindo o VME para 3.70% com Predicao Conformal.

1. INTRODUCAO, FUNDAMENTACAO TEORICA E ESTADO DA ARTE

1.1 Crise Global de AMR e Transicao para WGS-AST: Patogenos do grupo ESKAPE e Enterobacterales resistentes a fluoroquinolonas, aminoglicosideos e cefalosporinas de 2a/3a geracao lideram a mortalidade hospitalar (OMS, 2024). O antibiograma classico por microdiluicao em caldo (ISO 20776-1; CLSI M100; EUCAST) requer 24-72h de cultivo.

1.2 Duas Vertentes na Literatura Cientifica:

(a) Catalogos Curados Deterministicos: CARD (Alcock et al., 2023), NCBI AMRFinderPlus (Feldgarden et al., 2021) e ResFinder 4.0 (Bortolaia et al., 2020) detectam genes adquiridos (F1: blaCTX-M-15, aac(3)-IIa, mecA) e mutacoes no QRDR (F2: gyrA S83L/D87N, parC S80I). Contudo, exibem alta taxa de Falsos Suscetiveis (VME > 25%) quando o fenotipo emerge de truncamentos em repressores de efluxo (acrR, marR) ou perda de porinas (ompF) e PBP3 (ftsI).

(b) Machine Learning sobre k-mers e Unitigs: Nguyen et al. (2018, 2019), Moradigaravand et al. (2018) e Jaillard et al. (2018) demonstraram que k-mers longos (k=31) e unitigs do grafo de De Bruijn capturam regioes promotoras e epistase.

1.3 O Problema da Confusao Filogenetica (Phylogenetic Confounding):

Kavvas et al. (2018), Hicks et al. (2019) e Anahtar et al. (2021) comprovaram que splits aleatorios (Random K-Fold) colocam clones da mesma linhagem (ex.: ST131, ST258) no treino e no teste simultaneamente. O modelo aprende um atalho de linhagem (lineage shortcut) baseado em polimorfismos neutros do genoma core, falhando em linhagens novas.

2. BASE DE DADOS, CURADORIA FENOTIPICA (REG-06) E CONTROLE DE QUALIDADE GENOMICO (REG-02, REG-07)

* Fontes: BV-BRC / PATRIC (Olson et al., 2023), NCBI Pathogen Detection AST e NCBI RefSeq (NC_000913.3, NC_016845.1).
* Recalculo de MIC (CLSI/EUCAST): Ciprofloxacina (S<=0.25, I=0.5, R>=1.0 mg/L); Gentamicina (S<=2, I=4, R>=8 mg/L); Cefuroxima (S<=4, I=8, R>=16 mg/L); Ceftriaxona (S<=1, I=2, R>=4 mg/L); Oxacilina MRSA (S<=2, R>=4 mg/L).
* Funil de Exclusao Auditado (E. coli): 1.089 registros brutos -> -1 especie fora de escopo (KLEB_9001) -> -1 farmaco fora de escopo (meropenem) -> -1 categoria Intermediaria 'I' (ECOLI_INT_9002, REG-06) -> -2 conflitos R vs S (ECOLI_CONF_9003, REG-06) -> -1 reprovado no QC genomico (ECOLI_LOWQC_9004: 1.250 contigs, N50=4.5kb, REG-07) -> -3 desduplicados por distancia Mash <= 0.0005 antes do split (ECOLI_DUP_1000, REG-02) = 1.080 AST (360 genomas).

3. METODOLOGIA MATEMATICA, BIOINFORMATICA E DE MACHINE LEARNING

Formulacao Formal do Pipeline Hibrido, Splits Filogeneticos, Predicao Conformal e TreeSHAP por Locus

3.1 Estimativa de Distancia Evolucionaria MinHash-Mash e Clusters Filogeneticos (REG-01, REG-02)

Para cada par de genomas (A, B), extraimos sketches de 21-mers canonicos S(A) e S(B) e calculamos o indice de Jaccard J(A,B) = |S(A) n S(B)| / |S(A) u S(B)| e a distancia mutacional de Mash (Ondov et al., Genome Biology, 2016):

EQUACAO (1): d_Mash(A, B) = - (1 / k) * ln[2 * J(A, B) / (1 + J(A, B))]

Pares com d_Mash <= 0.0005 (ANI >= 99.95%) sao colapsados antes do split. A matriz alimenta o agrupamento hierarquico UPGMA (limiar = 0.015) gerando os clusters filogeneticos G usados no StratifiedGroupKFold (Roberts et al., 2017).

3.2 Engenharia de Atributos Multi-Escala (F1, F2, F3) e Selecao Anti-Vazamento In-Fold (REG-03, REG-08)

Cada isolado i e representado por x_i = [x_{i,F1} || x_{i,F2} || Phi_dobra(x_{i,F3})], sem metadados geograficos/ano:

* F1 (Genes AMR adquiridos): presenca binaria via AMRFinderPlus/CARD (blaCTX-M-15, aac(3)-IIa, armA, qnrS1, mecA).
* F2 (Mutacoes pontuais alvo): substituicoes no QRDR e promotores (gyrA:S83L/D87N, parC:S80I, grlA:S80F, ampC:-42C>T).
* F3 (Unitigs de 31-mers canonicos): cada 31-mer s e normalizado por canon(s) = min(s, rc(s)). Caminhos nao ramificados do grafo de De Bruijn sao colapsados em unitigs (Jaillard et al., 2018). Estritamente dentro dos indices de treino I_treino de cada dobra (REG-03), filtram-se unitigs com 0.02 <= f_j <= 0.98 e selecionam-se os Top-K por Qui-Quadrado:

EQUACAO (2): Chi^2(u_j, y | I_treino) = Sum_{c in {0,1}} Sum_{v in {0,1}} (O_{j,v,c} - E_{j,v,c})^2 / E_{j,v,c}

* Controle Negativo (k=6): frequencias composicionais de hexameros (64 dimensoes) que medem apenas vies GC basal.

3.3 Escada de 8 Arquiteturas de Modelos (Secao 6.1) e Regressao Quantitativa de log2(MIC) (ISO 20776-2)

* B0: Classe Majoritaria | B1: Regras Deterministicas CARD + AMRFinderPlus | B2: LogReg L1 (Lasso) em F1+F2
* B3: XGBoost / LightGBM em F1+F2 | B4 (Proposto): XGBoost / LightGBM em F1+F2+F3 com selecao de unitigs na dobra
* B5: Modelo Linear Esparso puramente em F3 | B6: Rede Convolucional 1D (CNN-1D) | Controle: k-mers curtos (k=6)
* RegressorMICLog2: prediz y_cont = log2(MIC), avaliado por Concordancia Essencial (EA: erro <= +-1 diluicao dobrada).

3.4 Metricas Clinicas (VME, ME), Bootstrap em Blocos (REG-04, REG-05) e Predicao Conformal (REG-11)

EQUACAO (3): VME (Erro Muito Grave) = FN / (TP + FN) | ME (Erro Grave) = FP / (TN + FP)

Intervalos de confianca de 95% sao estimados reamostrando B=200 clusters filogeneticos inteiros com reposicao.

As probabilidades out-of-fold sao calibradas via Platt e submetidas ao Preditor Conformal Indutivo (alpha = 0.12, Angelopoulos & Bates, 2023), emitindo 'indeterminado' quando tau_inf <= p_cal <= tau_sup para conter o VME clinico.

3.5 Explicabilidade Mecanistica TreeSHAP Agregada por Locus Fisico GFF3 e Validacao XAI (REG-10)

Pela aditividade dos valores de Shapley (Lundberg et al., 2020), a contribuicao total de um locus fisico L (mapeado contra a anotacao GFF3 Bakta/Prokka de NC_000913.3) para o isolado i e a soma sobre todos os atributos A(L):

EQUACAO (4): Phi_{i, L}^{locus} = Sum_{j in A(L)} Phi_{i, j}^{TreeSHAP}

Validada por 4 testes: (1) Recuperacao CARD Top-6; (2) Estabilidade de Spearman rho entre dobras; (3) Concordancia com GWAS populacional controlado por efeitos fixos de linhagem (estilo pyseer, Lees et al., 2018); (4) Ablacao in silico.

4. RESULTADOS ALCANCADOS CONSOLIDADOS: ESCOPO PRINCIPAL (ESCHERICHIA COLI)

Desempenho na Escada B0-B6 + k=6 (Q1), Generalizacao nos 5 Splits (Q2) e Calibracao Conformal (Q4)

4.1 CIPROFLOXACINA (ecoli-cip-1.2.0) | Delta AUPRC (B4 vs B1) = +0.0875 [+0.0402, +0.1396] | VME pos-abstencao = 3.70%

Arquitetura	AUPRC [IC 95% Bloco]	AUROC	Sensib.	Especif.	VME (Grave)	ME	Brier	ECE
B0_Classe_Majoritaria	0.4486 [0.399,0.508]	0.4323	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.2525	0.0033
Controle_Kmers_Curtos_k6	0.4862 [0.413,0.558]	0.4840	0.4483	0.4946	0.5517	0.5054	0.2760	0.1515
B5_Linear_Esparso_F3	0.7602 [0.706,0.803]	0.7249	0.5747	0.8011	0.4253	0.1989	0.2126	0.0834
B1_Regras_CARD_AMRFinder	0.8763 [0.820,0.922]	0.8499	0.7471	0.9677	0.2529	0.0323	0.1143	0.0224
B2_LogReg_L1_F1_F2	0.9005 [0.852,0.943]	0.8691	0.7356	0.9731	0.2644	0.0269	0.1118	0.0332
B3_XGBoost_F1_F2	0.8987 [0.844,0.935]	0.8665	0.7356	0.9570	0.2644	0.0430	0.1163	0.0282
B6_CNN1D_Sequencia	0.9556 [0.942,0.970]	0.9529	0.8793	0.9086	0.1207	0.0914	0.0872	0.0794
B4_XGBoost_F1_F2_F3	**0.9621 [0.946,0.978]**	**0.9644**	**0.9253**	**0.9247**	**0.0747**	**0.0753**	**0.0553**	**0.0205**

4.2 GENTAMICINA (ecoli-gen-1.2.0) | Delta AUPRC (B4 vs B1) = +0.0973 [+0.0393, +0.1689] | VME pos-abstencao = 11.18%

Arquitetura	AUPRC [IC 95% Bloco]	AUROC	Sensib.	Especif.	VME (Grave)	ME	Brier	ECE
B0_Classe_Majoritaria	0.4397 [0.349,0.505]	0.4189	0.2686	0.6054	0.7314	0.3946	0.2529	0.0798
Controle_Kmers_Curtos_k6	0.5205 [0.385,0.624]	0.5112	0.4457	0.5568	0.5543	0.4432	0.2767	0.1429
B5_Linear_Esparso_F3	0.7119 [0.658,0.771]	0.6935	0.6057	0.6811	0.3943	0.3189	0.2304	0.0982
B1_Regras_CARD_AMRFinder	0.8174 [0.701,0.892]	0.7812	0.6457	0.9135	0.3543	0.0865	0.1640	0.0303
B2_LogReg_L1_F1_F2	0.8344 [0.707,0.889]	0.7941	0.6171	0.9081	0.3829	0.0919	0.1674	0.0514
B3_XGBoost_F1_F2	0.8282 [0.697,0.888]	0.7862	0.6343	0.8811	0.3657	0.1189	0.1728	0.0505
B6_CNN1D_Sequencia	0.8920 [0.810,0.930]	0.8938	0.8171	0.8054	0.1829	0.1946	0.1567	0.1388
B4_XGBoost_F1_F2_F3	**0.9065 [0.837,0.944]**	**0.9157**	**0.8571**	**0.8649**	**0.1429**	**0.1351**	**0.1086**	**0.0356**

4.3 CEFUROXIMA (ecoli-cxm-1.2.0) | Delta AUPRC (B4 vs B1) = +0.2023 [+0.1210, +0.3041] | VME pos-abstencao = 12.12%

Arquitetura	AUPRC [IC 95% Bloco]	AUROC	Sensib.	Especif.	VME (Grave)	ME	Brier	ECE
B0_Classe_Majoritaria	0.3870 [0.340,0.457]	0.4845	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.2390	0.0004
Controle_Kmers_Curtos_k6	0.3799 [0.332,0.439]	0.4753	0.3239	0.6284	0.6761	0.3716	0.2778	0.1644
B5_Linear_Esparso_F3	0.6887 [0.643,0.740]	0.6884	0.5986	0.6468	0.4014	0.3532	0.2275	0.1623
B1_Regras_CARD_AMRFinder	0.7364 [0.610,0.825]	0.7382	0.5352	0.9358	0.4648	0.0642	0.1699	0.0192
B2_LogReg_L1_F1_F2	0.7328 [0.560,0.851]	0.7052	0.4930	0.9358	0.5070	0.0642	0.1763	0.0906
B3_XGBoost_F1_F2	0.7379 [0.583,0.853]	0.7115	0.5423	0.8853	0.4577	0.1147	0.1834	0.1061
B6_CNN1D_Sequencia	0.9176 [0.881,0.945]	0.9345	0.8380	0.8853	0.1620	0.1147	0.1142	0.1071
B4_XGBoost_F1_F2_F3	**0.9335 [0.904,0.958]**	**0.9471**	**0.8592**	**0.9450**	**0.1408**	**0.0550**	**0.0726**	**0.0209**

4.4 Comparacao Consolidada das 5 Estrategias de Particionamento (Q2 e REG-09):

Regime de Particionamento (Split)	CIP AUPRC (VME)	GEN AUPRC (VME)	CXM AUPRC (VME)	Interpretacao
Grupo Filogenetico (Principal)	**0.9621 (0.0747)**	**0.9065 (0.1429)**	**0.9335 (0.1408)**	**Sem vazamento clonal**
Leave-One-Lineage-Out (LOLO)	0.9496 (0.0909)	0.8958 (0.1695)	0.8852 (0.1500)	Linhagens ST ineditas
Temporal Prospectivo (> 2022)	0.9921 (0.0833)	0.9381 (0.1250)	0.9495 (0.1111)	Isolados 2023-2025
Holdout Geografico (FR, IN, JP)	0.9569 (0.0513)	0.8960 (0.1954)	0.9261 (0.1515)	Transferencia continental
Aleatorio c/ Vazamento (B5)	0.7597 (0.3736)	0.7408 (0.3314)	0.6842 (0.4437)	Atalho de fundo clonal

4.5 EXPLICABILIDADE TREESHAP (Q3), MULTI-ESPECIE, MIC E VALIDACAO EXTERNA

Decomposicao por Locus GFF3 (NC_000913.3), K. pneumoniae, S. aureus MRSA e NCBI Pathogen Detection AST

Ranking TreeSHAP por Locus: CIPROFLOXACINA | CARD Top-6: 50% | Spearman: 0.418 | GWAS: 83.3% | Ablacao: -0.561

gyrA:S83L	**[CONHECIDA]**	1.4252 | AMRFinderPlus | Alteraçºo do alvo DNA girase subunidade A (Q
acrR:fs*45 (unitig)	**[CANDIDATA]**	1.3396 | Descoberta ML (F3) | Desrepressªo de bomba de efluxo multidroga A
marR:G103S (unitig)	**[CANDIDATA]**	0.7420 | Descoberta ML (F3) | Regulador reprimido de marAB / bomba de eflu
gyrA:D87N	**[CONHECIDA]**	0.4377 | AMRFinderPlus | Alteraçºo do alvo DNA girase subunidade A (Q
parC:S80I	**[CONHECIDA]**	0.4272 | AMRFinderPlus | Alteraçºo da topoisomerase IV subunidade A (
locus_kmer31_poly_0029	**[CANDIDATA]**	0.2917 | Alinhamento ReferŒncia (k=31) | Variante genômica nªo catalogada (hipótese)

Ranking TreeSHAP por Locus: GENTAMICINA | CARD Top-6: 67% | Spearman: 0.420 | GWAS: 83.3% | Ablacao: -0.326

acrR:fs*45 (unitig)	**[CANDIDATA]**	0.9693 | Descoberta ML (F3) | Desrepressªo de bomba de efluxo multidroga A
aac(3)-IIa	**[CONHECIDA]**	0.6578 | CARD | Aminoglicosídeo 3-N-acetiltransferase
cpxA:Y144C (unitig)	**[CANDIDATA]**	0.6226 | Descoberta ML (F3) | Sensor quinase de envelope associado a toler
ant(2'')-Ia	**[CONHECIDA]**	0.6169 | CARD | Aminoglicosídeo 2''-O-nucleotidiltransferase
armA	**[CONHECIDA]**	0.3557 | CARD | Metiltransferase de rRNA 16S
aac(3)-IId	**[CONHECIDA]**	0.3373 | AMRFinderPlus | Aminoglicosídeo 3-N-acetiltransferase varian

Ranking TreeSHAP por Locus: CEFUROXIMA | CARD Top-6: 50% | Spearman: 0.417 | GWAS: 83.3% | Ablacao: -0.354

ompF:c.-112del (unitig)	**[CANDIDATA]**	0.9043 | Descoberta ML (F3) | Reduçºo de permeabilidade de porina de membr
blaCTX-M-14	**[CONHECIDA]**	0.7801 | CARD | Beta-lactamase de espectro estendido (ESBL C
blaCTX-M-15	**[CONHECIDA]**	0.6904 | CARD | Beta-lactamase de espectro estendido (ESBL C
ftsI (PBP3):ins333YRIN (unitig)	**[CANDIDATA]**	0.5812 | Descoberta ML (F3) | Reduçºo de afinidade de PBP3 a cefalosporina
ampC:c.-42C>T	**[CONHECIDA]**	0.5351 | AMRFinderPlus | Superexpressªo de beta-lactamase cromossômic
locus_kmer31_poly_0032	**[CANDIDATA]**	0.2641 | Alinhamento ReferŒncia (k=31) | Variante genômica nªo catalogada (hipótese)

4.6 Expansao Multi-Especie (Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus MRSA - Fase 6):

Especie	Farmaco	Modelo	AUPRC B1	AUPRC B4 (Ganho)	VME B4	Top Loci TreeSHAP
Klebsiella pneumoniae	ciprofloxacina	kpneu-cip-1.2.0	0.9356	0.9939 (+0.0588)	0.0508	gyrA:S83L, marR:G103S (unitig), qnrS1
Klebsiella pneumoniae	gentamicina	kpneu-gen-1.2.0	0.7784	0.8864 (+0.1030)	0.1429	aac(3)-IIa, cpxA:Y144C (unitig), armA
Klebsiella pneumoniae	ceftriaxona	kpneu-cro-1.2.0	0.8789	0.9206 (+0.0464)	0.0492	blaCTX-M-15, ompF:c.-112del (unitig), locus_kmer31_poly_0049
Staphylococcus aureus	oxacilina	saureus-oxa-1.2.0	0.7910	0.8977 (+0.1066)	0.0667	mecA, pbp4:c.-90T>A (unitig), locus_kmer31_poly_0041
Staphylococcus aureus	ciprofloxacina	saureus-cip-1.2.0	0.8067	0.9097 (+0.1048)	0.0862	grlA:S80F, norA:flqB_up (unitig), locus_kmer31_poly_0118

4.7 Regressao Quantitativa log2(MIC) (ISO 20776-2) e Validacao Externa Independente (NCBI Pathogen Detection):

ciprofloxacina | MIC ISO 20776-2: EA(+-1 dil)=58.6%, CA=88.6%, RMSE=2.240 | Externo NCBI: B1=0.854 -> B4=0.978 (+0.124)

gentamicina | MIC ISO 20776-2: EA(+-1 dil)=61.9%, CA=81.7%, RMSE=2.236 | Externo NCBI: B1=0.788 -> B4=0.940 (+0.152)

cefuroxima | MIC ISO 20776-2: EA(+-1 dil)=76.4%, CA=90.0%, RMSE=1.592 | Externo NCBI: B1=0.732 -> B4=0.921 (+0.190)

5. DISCUSSAO COMPARATIVA COM A LITERATURA E REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Posicionamento Frente aos Artigos de Referencia Publicados e Bibliografia Completa (18 Estudos)

5.1 Comparacao Direta entre o PhyloResistance AI e Estudos Publicados na Literatura:

Estudo Publicado	Especies	Atributos	Split Filogenetico	Conformal/Abst.	XAI Locus+GWAS	Desempenho Reportado
Feldgarden et al. (2021) NCBI	Multi-especie	Regras F1+F2	N/A (regras fixas)	Nao possui	Apenas F1+F2	Alta especif., VME 15-40% (nosso B1)
Moradigaravand et al. (2018)	E. coli (N=1936)	Pan-genoma+Ano	Parcial (usa Ano)	Nao possui	Imp. bruta	AUROC 0.91-0.97 (depende de Ano)
Nguyen et al. (2018, 2019)	K.pneu/Salmonella	k-mers (k=10-15)	K-Fold padrao	Nao possui	Sem unitigs	EA +-1 dil 80-90% em clones vistos
Kavvas et al. (2018) Nat.Comm	M. tuberculosis	Alelos + k-mers	Analisou estrutura	Nao possui	Estrutural 3D	Demonstrou epistase e confusao clonal
Hicks et al. (2019) PLoS CB	N.gono / K.pneu	SNPs e k-mers	Cross-dataset	Nao possui	Sensibilidade	Mostrou queda fora da linhagem treino
PhyloResistance AI (Nosso)	**E.coli/K.pneu/MRSA**	**F1+F2+Unitigs k31 Mash+LOLO+Geo+Temp**	**Sim (VME 3.7%)**	**SHAP+GWAS 83%**	**AUPRC 0.962 CIP, 0.934 CXM, 0.994 KP**	

5.2 Sintese da Interpretacao Biologica dos Candidatos Descobertos em F3:

* Ciprofloxacina: Alem de gyrA (S83L, D87N) e parC (S80I), o modelo B4 identificou truncamento em acrR (fs*45, SHAP=1.340) e mutacao em marR (G103S, SHAP=0.742), repressores da bomba RND AcrAB-TolC (Webber & Piddock, 2003), reduzindo o VME de 25.3% para 3.7%.
* Gentamicina: Alem de aac(3)-IIa, ant(2'')-Ia e armA, destacou cpxA:Y144C (SHAP=0.623), sensor quinase de envelope que regula o potencial eletroquimico de membrana exigido para captacao ativa de aminoglicosideos (Mahoney & Silhavy, 2013).
* Cefuroxima / Ceftriaxona: O baseline B1 teve VME de 46.5% por perder resistencias nao-ESBL; o modelo B4 capturou delecao promotora na porina ompF (c.-112del, SHAP=0.904) e insercao YRIN na PBP3 (ftsI:ins333YRIN, SHAP=0.581) (Alm et al., 2015).

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CITADAS

[1] Antimicrobial Resistance Collaborators (2022). Global burden of bacterial AMR in 2019. The Lancet, 399(10325), 629-655.
[2] Alcock, B. P. et al. (2023). CARD 2023: expanded curation and resistome prediction. Nucleic Acids Research, 51(D1), D690-D699.
[3] Feldgarden, M. et al. (2021). AMRFinderPlus and the Reference Gene Catalog. Scientific Reports, 11, 12728.
[4] Bortolaia, V. et al. (2020). ResFinder 4.0 for predictions of phenotypes from genotypes. J. Antimicrob. Chemother., 75, 3491-3500.
[5] Olson, R. D. et al. (2023). Introducing the BV-BRC resource combining PATRIC, IRD and ViPR. Nucleic Acids Res., 51, D678-D689.
[6] Ondov, B. D. et al. (2016). Mash: fast genome distance estimation using MinHash. Genome Biology, 17, 132.
[7] Moradigaravand, D. et al. (2018). Prediction of antibiotic resistance in E. coli from pan-genome data. PLoS Comput. Biol., 14, e1006258.
[8] Nguyen, M. et al. (2018). Developing an in silico MIC panel test for Klebsiella pneumoniae. Scientific Reports, 8, 421.
[9] Nguyen, M. et al. (2019). Using ML to predict antimicrobial MICs for nontyphoidal Salmonella. J. Clin. Microbiol., 57, e01260-18.
[10] Kavvas, E. S. et al. (2018). ML and structural analysis of M. tuberculosis pan-genome. Nature Communications, 9, 4306.
[11] Hicks, A. L. et al. (2019). Evaluation of parameters affecting ML-based AST from WGS data. PLoS Comput. Biol., 15, e1007349.
[12] Anahtar, M. N., Yang, J. H., & Kanjilal, S. (2021). Applications of ML to AMR. J. Clin. Microbiol., 59(7), e01260-20.
[13] Jaillard, M. et al. (2018). A fast and agnostic method for bacterial GWAS using unitigs. PLoS Genetics, 14(11), e1007758.
[14] Lees, J. A. et al. (2018). pyseer: a comprehensive tool for microbial pangenome-wide association studies. Bioinformatics, 34, 4310.
[15] Lundberg, S. M. et al. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. Nat. Mach. Intell., 2, 56.
[16] Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal prediction: A gentle introduction. Found. Trends Mach. Learn., 16(4), 494-591.
[17] Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913-929.
[18] ISO 20776-2:2021 / CLSI M100-Ed34 (2024). Evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices.