Найдём характеристический полином и, как следствие, спектр оператора:

$$\begin{vmatrix} 19 - \lambda & 8 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & 3 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ -27 & -14 & -4 - \lambda & -3 & -2 \\ -31 & -16 & -8 & -2 - \lambda & -1 \\ -47 & -24 & -12 & -6 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^5 + 15\lambda^4 - 88\lambda^3 + 252\lambda^2 - 352\lambda + 192 = -(\lambda - 4)^2(\lambda - 3)(\lambda - 2)^2 \Rightarrow \sigma_{\varphi} = \left\{ 2^{(2)}, 4^{(2)}, 3^{(1)} \right\}$$

Найдём к собственным значениям оператора собственные вектора:

$$\lambda = 2$$

$$\begin{pmatrix} 17 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -27 & -14 & -6 & -3 & -2 \\ -31 & -16 & -8 & -4 & -1 \\ -47 & -24 & -12 & -6 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 17 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 6 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \xi_1 = 0 \\ \xi_2 = 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \xi_1 = 0 \\ \xi_2 = 0 \\ \xi_3 = -\xi_4/2 \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ \xi_4 \in \mathbb{R} \\ \xi_5 = 0 \end{pmatrix}$$

Собственных векторов недостаточно для базиса. Перед нами оператор нескалярного типа. Найдём к v_1 и v_2 ещё два присоединённых вектора, чтобы дополнить собственные до базиса.

$$\begin{pmatrix} 17 & 8 & 4 & 2 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ -27 & -14 & -6 & -3 & -2 & | & -1 \\ -31 & -16 & -8 & -4 & -1 & | & 2 \\ -47 & -24 & -12 & -6 & -3 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 17 & 8 & 4 & 2 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 10 & 6 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \xi_1 = 0 \\ \xi_2 = 0 \\ \xi_3 = -\xi_4/2 - 0.5 \Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 15 & 8 & 4 & 2 & 1 & | & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ -27 & -14 & -8 & -3 & -2 & | & 1 \\ -31 & -16 & -8 & -6 & -1 & | & 1 \\ -47 & -24 & -12 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 15 & 8 & 4 & 2 & 1 & | & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & | & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -2 & 1 & | & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & | & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & -2 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \xi_1 = -\xi_5 + 1 \\ \xi_2 = \xi_5 - 2 \\ \xi_3 = \xi_5 \\ \xi_5 \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

В базисе $T = \{v_1, u_1, v_2, u_2, v_3\}$ жорданова форма оператора будет выглядеть так:

$$\mathcal{J}_{\varphi} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Тогда значение функции от оператора $f(\varphi) = e^{0.5\varphi}$ вычисляется следующим образом:

$$f(\varphi) = Tf(\mathcal{J}_{\varphi})T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} e & 0.5e & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^2 & 0.5e^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^2 & 0.5e^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e^{1.5} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -15 & -8 & -4 & -2 & -1 \\ 14 & 7 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -e^2 & -0.5e^2 & 0 \\ 0 & 0 & e^2 & -0.5e^2 & -e^{1.5} \\ -e & -1.5e & e^2 & 1.5e^2 & 2e^{1.5} \\ 2e & 2e & e^2 & 1.5e^2 & 2e^{1.5} \\ 2e & 2e & e^2 & 1.5e^2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -15 & -8 & -4 & -2 & -1 \\ 14 & 7 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.5e^2 & 4e^2 & 2e^2 & e^2 & 0.5e^2 \\ 6.5e^2 - 14e^{1.5} & 4e^2 - 7e^{1.5} & 2(e^2 - 2e^{1.5}) & e^2 - 2e^{1.5} & 0.5e^2 - e^{1.5} \\ 28e^{1.5} - 23.5e^2 - 16e & 2(7e^{1.5} - 6e^2 - 4e) & 2(4e^{1.5} - 3e^2 - 2e) & 4e^{1.5} - 3e^2 - 2.5e & 2e^{1.5} - 1.5e^2 - 1.5e^2 \\ 24e - 23.5e^2 & 12(e - e^2) & 6(e - e^2) & 4e - 3e^2 & 2e - 1.5e^2 \\ 16e - 23.5e^2 & 4(2e - 3e^2) & 2(2e - 3e^2) & 2e - 3e^2 & 2e - 1.5e^2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 62.81 & 29.56 & 14.78 & 7.39 & 3.69 \\ -14.71 & -1.82 & -3.15 & -1.57 & -0.79 \\ -91.65 & -47.67 & -19.35 & -11.04 & -6.20 \\ -108.40 & -56.05 & -28.02 & -11.29 & -5.65 \\ -130.15 & -66.92 & -334.6 & -16.73 & -5.65 \end{pmatrix}$$