

ИНСТРУКЦИЯ № 20.

Удаление периферического венозного катетера

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПВК удаляют по истечении срока постановки или при наличии признаков инфицирования в месте его постановки.

2. ОСНАЩЕНИЕ

2.1. Медицинская мебель:

столик манипуляционный;

стол для проведения дезинфекционных мероприятий.

2.2. Медицинский инструментарий стерильный многоразового применения (ножницы).

2.3. Перевязочный материал стерильный:

шарики марлевые;

салфетки марлевые.

2.4. Перевязочный материал нестерильный (бинт медицинский размером 5x10 см).

2.5. Прочие ИМН (стерильная пробирка).

2.6. СИЗ (перчатки медицинские нестерильные (далее – перчатки)).

2.7. Антисептик для обработки инъекционного поля пациента.

2.8. Химические средства дезинфекции:

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции наружных поверхностей ИМН;

рабочий раствор химического средства дезинфекции для промывания и дезинфекции ИМН, дезинфекции наружных поверхностей ИМН.

2.9. Контейнеры для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции:

«Промывание шприцев и других ИМН»;

«Дезинфекция шприцев и других ИМН»;

«Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».

2.10. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции контейнеры «Физический метод» с указанием наименования ИМН.

2.11. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.24 Инструкции № 1.

2.12. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.25 Инструкции № 1.

2.13. Медицинская документация.

3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.1. Проинформировать пациента о предстоящем удалении ПВК, получить устное согласие на выполнение, предложить занять необходимое положение.

3.2. Проверить целостность упаковок стерильного перевязочного материала, стерильной пробирки, ножниц, их срок годности.

3.3. Обработать руки в соответствии с НПА, надеть перчатки.

3.4. Вскрыть упаковки с салфетками, шариками марлевыми, пробиркой, ножницами.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

3.5. Снять повязку бинтовую и салфетку марлевую, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод».

3.6. Расположить первый и второй пальцы левой руки на крышке дополнительного порта ПВК, осторожно снять правой рукой самоклеющуюся повязку.

3.7. Поместить самоклеющуюся повязку в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод».

3.8. Убрать левую руку с ПВК.

3.9. Взять в левую руку шарик, смочить антисептиком.

3.10. Расположить первый, второй и третий пальцы правой руки на дополнительном порте ПВК, приложить левой рукой шарик к месту венепункции.

3.11. Удалить правой рукой медленным и осторожным движением «на себя» ПВК из вены.

3.12. Прижать шарик к месту венепункции на 3–5 минут.

3.13. Осмотреть ПВК на целостность и наличие в нем тромба (при наличии тромба или подозрении на инфицирование отрезать ножницами конец ПВК, поместить в пробирку и направить в бактериологическую лабораторию на исследование по назначению врача-специалиста).

3.14. Поместить ПВК в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», ножницы – в контейнер «Промывание шприцев и других ИМН», шарик – в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».

3.15. При физическом методе дезинфекции поместить ПВК и другие ИМН в соответствующие контейнеры «Физический метод».

3.16. Осмотреть место венепункции на наличие признаков инфицирования.

3.17. Наложить на место венепункции салфетку марлевую и повязку бинтовую.

3.18. Предупредить пациента о том, что нельзя снимать повязку и смачивать водой место венепункции в течение суток.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.19. Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или поместить их в соответствующий контейнер «Физический метод», обработать руки в соответствии с НПА.

3.20. Зарегистрировать в медицинской документации время, дату и причину удаления ПВК.

3.21. Провести дезинфекцию наружных поверхностей ИМН и последующие этапы дезинфекции ИМН согласно Инструкции № 2.