

ИНСТРУКЦИЯ № 24.

Выполнение инъекций на дому

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинская сестра перед выполнением инъекций на дому должна проверить укладку сумки медицинской сестры участковой.

2. УКЛАДКА СУМКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ

2.1. Медицинский инструментарий стерильный одноразового применения:

иглы размером 0,8х40 мм для набора ЛС;

шприцы объемом 1 мл; 2 мл; 5 мл, 10 мл с иглами размерами 0,4х13–20 мм; 0,6х25–35 мм; 0,8х40 мм.

2.2. Перевязочный материал стерильный (шарики ватные).

2.3. Прочие ИМН:

нож ампульный;

салфетки одноразового применения для проведения подготовительного этапа выполнения манипуляции (далее – салфетка).

2.4. Аптечка по оказанию экстренной медицинской помощи при анафилаксии.

2.5. ЛС, используемые при аварийном контакте с биологическим материалом пациента.

2.6. СИЗ: СО – халат медицинский, головной убор медицинский (шапочка, косынка).

2.7. Антисептик.

2.8. Химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции ампул (флаконов).

2.9. Контейнер с крышкой непрокалываемый с иглоотсекателем (иглосъемником) одноразового применения, заполненный рабочим раствором химического средства дезинфекции примерно на 2/3 объема, для сбора, дезинфекции и транспортировки игл и шприцев с интегрированной иглой в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения (далее – контейнер «Острые ИМН»).

2.10. Контейнер (емкость) с крышкой для сбора и транспортировки шприцев в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения (далее – контейнер «Шприцы»).

2.11. Контейнер (емкость) с крышкой для сбора и транспортировки перевязочного материала, СИЗ в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения (далее – контейнер «Перевязочный материал, СИЗ»).

2.12. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции в укладке должны быть:

контейнер с крышкой непрокалываемый с иглоотсекателем (иглосъемником) одноразового применения для сбора и транспортировки игл и шприцев с

интегрированной иглой в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения (далее – контейнер «Физический метод. Острые ИМН»);

контейнеры (емкости) с указанием наименования ИМН с крышками со вставленными внутрь одноразовыми пакетами для отдельного сбора и транспортировки шприцев, перевязочного материала и других ИМН в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения (далее – контейнеры «Физический метод» с указанием наименования ИМН).

2.13. Контейнеры «Пустые ампулы ЛС» и/или «Пустые флаконы ЛС») для сбора и транспортировки ампул и/или флаконов в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения при введении пациенту наркотических средств и психотропных веществ¹.

2.14. Полотенце.

2.15. ЛС в ампуле (флаконе) по назначению врача-специалиста.

2.16. Растворитель ЛС в ампуле (флаконе) по назначению врача-специалиста (при необходимости).

2.17. Медицинская документация.

3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.1. Проинформировать пациента о предстоящей инъекции, получить устное согласие на выполнение, предложить занять необходимое положение.

3.2. Обработать руки в соответствии с НПА.

3.3. Надеть СО.

3.4. Выложить на визуально чистую поверхность из сумки медицинской сестры участковой салфетку.

3.5. Сверить название и дозу ЛС (раствора для разведения ЛС) на ампуле (флаконе) с записью назначения в журнале учета работы на дому участковой (патронажной) медицинской сестры.

3.6. Проверить:

целостность ампулы (флакона) ЛС и раствора для разведения ЛС,
их внешний вид, срок годности;

целостность упаковок стерильного медицинского инструментария и стерильного перевязочного материала, их срок годности.

3.7. Разместить на салфетке:

ЛС в ампуле (флаконе) по назначению врача-специалиста;

растворитель ЛС в ампуле (флаконе) по назначению врача-специалиста (при необходимости).

шприц с иглой необходимого размера;

иглу;

антисептик;

химическое средство экстренной дезинфекции.

3.8. Выставить на стол контейнеры (емкости):

«Острые ИМН»;

«Шприцы»;

«Перевязочный материал, СИЗ»;

¹Порядок учета, отпуска в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения наркотических средств и психотропных веществ, их введение пациенту на дому, порядок учета и уничтожения использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ осуществляется согласно НПА.

«Пустые ампулы ЛС» («Пустые флаконы ЛС») при введении пациенту наркотических средств и психотропных веществ.

При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции выставить на стол контейнеры:

«Физический метод. Острые ИМН»;

«Физический метод» с указанием наименования других ИМН.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

3.9.Набрать ЛС в шприц из ампулы согласно подпунктам 3.3–3.34 Инструкции № 3 или флакона согласно подпунктам 3.3–3.35 Инструкции № 4².

3.10.Выполнить подкожную инъекцию согласно подпунктам 3.3–3.15 Инструкции № 6.

3.11.Выполнить подкожное введение инсулина согласно подпунктам 3.4–3.34 Инструкции № 7.

3.12.Выполнить внутримышечную инъекцию согласно подпунктам 3.3–3.17 Инструкции № 9.

3.13.Промыть в контейнере «Острые ИМН» иглу со шприцем с помощью поршня.

3.14.Снять иглу со шприца с использованием иглоотсекателя (иглосъемника), оставить ее в контейнере «Острые ИМН», закрыть контейнер крышкой.

3.15.Поместить шприц в разобранном виде в контейнер «Шприцы», шарики, салфетку – в контейнер «Перевязочный материал, СИЗ».

3.16.Закрыть крышкой контейнеры «Шприцы», «Перевязочный материал, СИЗ».

3.17.При физическом методе дезинфекции:

3.17.1. снять иглу со шприца с использованием иглоотсекателя (иглосъемника), оставить ее в контейнере «Физический метод. Острые ИМН», закрыть контейнер крышкой;

3.17.2.поместить шприц в неразобранном виде, шарики, салфетку в соответствующие контейнеры «Физический метод».

3.17.3.закрыть крышкой контейнеры.

3.18.Обработать руки в соответствии с НПА.

3.19.Сложить в сумку медицинской сестры участковой контейнеры «Острые ИМН», «Шприцы», «Перевязочный материал, СИЗ» или контейнеры «Физический метод. Острые ИМН» и «Физический метод» с указанием наименования других ИМН, контейнеры «Пустые ампулы ЛС» («Пустые флаконы ЛС»), антисептик, химическое средство экстренной дезинфекции.

3.20.Зарегистрировать введение ЛС в медицинской документации.

3.21.Наблюдать за пациентом с целью выявления аллергической реакции немедленного типа.

3.22.Снять СО, сложить в сумку медицинской сестры участковой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.23.В амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения в помещении для проведения дезинфекционных мероприятий:

3.23.1.обработать руки в соответствии с НПА, надеть СИЗ;

² Не выполняется при подкожном введении инсулина.

3.23.2.достать из сумки медицинской сестры участковой и выставить на стол для проведения дезинфекционных мероприятий контейнеры «Острые ИМН», «Шприцы» «Перевязочный материал, СИЗ» или контейнеры «Физический метод. Острые ИМН» и «Физический метод» с указанием наименования других ИМН;

3.23.3.открыть крышки контейнеров «Шприцы», «Перевязочный материал, СИЗ» и поместить их вместе с содержимым в контейнеры с перфорированным поддоном, пластиной-гнетом и крышкой, заполненные рабочим раствором химического средства дезинфекции, предназначенные для дезинфекции ИМН в амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения;

3.23.4.выдержать время экспозиции;

3.23.5.достать перфорированный поддон с перевязочным материалом, СИЗ из контейнера «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», отжать ИМН с помощью пластины-гнета;

3.23.6.поместить ИМН в пакет для медицинских отходов;

3.23.7.заполнить, упаковать и промаркировать пакет для медицинских отходов согласно подпункту 3.3.9 Инструкции № 2;

3.23.8.достать перфорированный поддон с цилиндром и поршнем шприца из контейнера «Дезинфекция шприцев и других ИМН», подождать, пока стечет рабочий раствор химического средства дезинфекции;

3.23.9.поместить цилиндр и поршень шприца в пакет для медицинских отходов;

3.23.10.заполнить, упаковать и промаркировать пакет для медицинских отходов согласно подпункту 3.3.9 Инструкции № 2;

3.23.11.слить из контейнера «Дезинфекция острых ИМН» в мойку рабочий раствор химического средства дезинфекции;

3.23.12.закрыть крышкой контейнер «Дезинфекция острых ИМН» и промаркировать его в соответствии с НПА, регламентирующими правила обращения с медицинскими отходами;

3.23.13.снять перчатки, маску, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», снять очки, обработать руки в соответствии с НПА;

3.23.14.доставить пакеты для медицинских отходов и контейнер «Дезинфекция острых ИМН» в место временного хранения медицинских отходов в соответствии с НПА, регламентирующими правила обращения с медицинскими отходами.

3.24.При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции:

3.24.1.промаркировать контейнер «Физический метод. Острые ИМН» в соответствии с НПА, регламентирующими правила обращения с медицинскими отходами, поместить его в соответствующий контейнер для общего сбора медицинских отходов в амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения;

3.24.2.извлечь одноразовые пакеты с другими ИМН из контейнеров «Физический метод» с указанием наименования ИМН, удалить их них воздух, провести герметизацию и поместить в соответствующие контейнеры для общего сбора медицинских отходов в амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения;

3.24.3.заполнить примерно на 3/4 объема контейнеры (емкости) для общего сбора медицинских отходов в амбулаторно-поликлинической организации

здравоохранения, закрыть крышкой, промаркировать в соответствии с НПА, регламентирующими правила обращения с медицинскими отходами;

3.24.4. провести дезинфекцию контейнеров «Физический метод» с указанием наименования ИМН согласно Инструкции № 2;

3.24.5. снять перчатки, маску, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», снять очки, обработать руки в соответствии с НПА;

3.24.6. доставить в соответствии с НПА, регламентирующими правила обращения с медицинскими отходами, промаркированные контейнеры (емкости) для общего сбора медицинских отходов в амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения, в помещение для проведения дезинфекции физическим методом.

3.25. Заполнить книгу учета медицинских отходов установленной формы.