

Aluno (a):

Pedro Paulo Lima Sousa

Nº: 25


Álcool

→ Grupo hidroxila ($-OH$) ligado a carbono saturado




• Reativo + instável + ad (metanol)

• Aplicações: Solventes, bebidas alcoólicas, combustíveis (etanol)



Aldêdo

→ Grupo carbonila ($C=O$) na extremidade da cadeia (carbono primário)



• Reativo + instável + ad (metanol)

• Aplicações: produção de plásticos, formal (conservantes)


Ésteres

→ Grupo acila ligado a um oxigênio ($R-COO-R'$)
• nome do radical + ácido + nome do radical + íd
• Aplicações: produção de furan

Funções

Ésteres

→ Grupo carbonila ($C=O$) entre dois carbonos



• Reativo + instável + on (propanone)

• Aplicações: solventes (acetone), remanentes de amido,

Enóis

→ Hidroxila ($-OH$) ligada diretamente a um anel aromático.
• Enol ou Hidroxila + anel aromático (fenol ou hidroquinona)
• Aplicações: produção de plásticos, fibras, desintegrantes (carilina), e corantes.

Ácidos carboxílicos

→ Carbonila (carbonila + hidroxila) ($-COOH$)

• Ácido + (prefixo + instável + ácido) (ácido acético)

• Aplicações: Vinagre, conservantes de alimentos.

Éter

→ Origem entre dois carbonos ($R-O-R'$)



• menor radical + éter + prefixo radical (metoximetano)

• Aplicações: Solventes inertes, anestésicos