

Teorema das trincas de Serer: Um método polinomial de mapear Grafos Arbitrários

Pedro Stein Serer

14 de outubro de 2025

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições e Notação	3
2.1	Família de trincas válidas	3
2.2	Relação de adjacência entre trincas	3
2.3	Janela deslizante estendida	4
2.4	Representação de caminhos Hamiltonianos via trincas	4
3	O Algoritmo Construtivo	4
4	Teorema das Trincas de Serer	6
5	Prova do Teorema	7
6	Prova de complexidade polinomial	8
7	P vs NP	9
7.1	Definição conceitual	9
7.2	Consequência do Teorema das Trincas de Serer	10
8	Discussão	10
8.1	Garantias do Teorema	10
8.2	Limites da novidade	10

8.3	Próximos passos	11
9	Conclusão	11

Resumo

O objetivo deste trabalho é explorar uma abordagem polinomial para problemas NP-completos envolvendo grafos, apresentando de forma rigorosa um método para mapear grafos arbitrários sem recorrer à força bruta ou gerar caminhos desnecessários, garantindo, de forma eficiente e inteligente, a construção de pelo menos um caminho Hamiltoniano, caso ele exista. Faremos a introdução do **Teorema das Trincas de Serer**, que formaliza a técnica baseada em janelas deslizantes de tamanho 3, permitindo que qualquer Hamiltoniano presente no grafo seja codificado e reconstruído através das trincas válidas de maneira construtiva e polinomial.

1 Introdução

Um dos maiores desafios atuais da Matemática e da Ciência da Computação é a busca por soluções eficientes para problemas NP-completos, como o problema do caminho Hamiltoniano, o caixeiro viajante, a coloração de grafos, entre outros. O problema $P=NP$ pergunta se tais problemas podem ser resolvidos em tempo polinomial (classe P). Embora não exista uma prova formal e nenhum método conhecido, a maioria dos pesquisadores acredita que $P \neq NP$.

Este trabalho tem como objetivo explorar uma abordagem polinomial para o problema NP-completo do caminho Hamiltoniano, demonstrando de forma rigorosa que, para qualquer grafo arbitrário, caso exista um caminho Hamiltoniano, ele pode ser codificado e reconstruído em tempo polinomial, independente da estrutura do grafo. Para isso, apresentamos o **Teorema das Trincas de Serer**, que formaliza a técnica baseada em janelas deslizantes de tamanho 3.

Dessa forma, propomos um método construtivo e determinístico capaz de encontrar pelo menos um caminho Hamiltoniano em grafos arbitrários, caso exista, esperando que este trabalho inspire novas pesquisas e avanços na área de Teoria dos Grafos e Complexidade Computacional.

2 Definições e Notação

Seja $G = (V, E)$ um grafo arbitrário, onde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

é o conjunto de todos os vértices de G . Assumimos uma **ordem arbitrária** dos vértices apenas para indexação.

2.1 Família de trincas válidas

Definimos J como a família de todas as trincas válidas de vértices distintos de G :

$$J := \{(v_i, v_j, v_k) \mid (v_i, v_j) \in E, (v_j, v_k) \in E, i \neq j \neq k \neq i\}.$$

Cada trinca representa um **subcaminho de comprimento 2** no grafo. Essa definição garante que todo grafo, sendo ele simples, dirigido, denso ou desconexo, poderá ter uma família de trincas válidas, possuindo um número finito de caminhos válidos, desde que a entrada esteja fiel ao grafo.

2.2 Relação de adjacência entre trincas

A relação de adjacência $ADJ \subseteq J \times J$ é definida por:

$$ADJ := \{(A, B) \in J \times J \mid A = (v_i, v_j, v_k), B = (v_j, v_k, v_l), v_l \notin \{v_i, v_j, v_k\}, (v_k, v_l) \in E\}.$$

Nota: a restrição $v_l \notin \{v_i, v_j, v_k\}$ evita repetição de vértices ao concatenar, garantindo que sequências de trincas possam representar corretamente caminhos Hamiltonianos. Para grafos não dirigidos, a ordem dos vértices na trinca representa a sequência do caminho, independentemente da direção da aresta. Essa construção assegura que todas as sequências válidas de trincas estejam incluídas em ADJ , permitindo a reconstrução de qualquer caminho Hamiltoniano existente.

2.3 Janela deslizando estendida

Para uma sequência de trincas adjacentes $A_1, \dots, A_k \in J$ tal que

$$(A_j, A_{j+1}) \in ADJ, \quad \forall 1 \leq j < k,$$

definimos a **janela deslizando estendida sem repetição** como a concatenação dos vértices das trincas, adicionando apenas o último vértice de cada trinca subsequente:

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_k := (v_1, v_2, \dots, v_{k+2}),$$

onde cada vértice aparece no máximo uma vez.

A construção de ADJ garante que não serão introduzidos vértices repetidos durante a concatenação. Em grafos com loops ou múltiplas arestas, apenas arestas que contribuem para caminhos de vértices distintos são consideradas. Essa operação é válida para qualquer grafo arbitrário (simples, dirigido, denso ou esparso) e preserva a unicidade de vértices em sequências de trincas, permitindo reconstruir corretamente caminhos Hamiltonianos.

2.4 Representação de caminhos Hamiltonianos via trincas

Definição: Uma sequência de trincas A_1, \dots, A_k representa um Hamiltoniano se:

1. Cada par consecutivo de trincas está conectado: $(A_j, A_{j+1}) \in ADJ$ para todo $1 \leq j < k$;
2. A concatenação via janela deslizando cobre todos os vértices do grafo exatamente uma vez:

$$A_1 \oplus \dots \oplus A_k = (v_1, \dots, v_n), \quad \{v_1, \dots, v_n\} = V.$$

Essa definição garante que qualquer Hamiltoniano existente em G estará codificado em J como uma sequência de trincas válidas conectadas.

3 O Algoritmo Construtivo

Algoritmo 3.1 (Teorema das Trincas de Serer). 1. **Entrada:** O algoritmo recebe um grafo arbitrário $G = (V, E)$ com $|V| = n$, representado na forma de matriz, onde

cada linha segue o formato:

$$G = [\text{'label_vertice'}, \text{'indice_vertice'}, [\text{lista_de_indices_de_conexoes_do_vertice_atual}]].$$

Assim, a estrutura geral pode ser descrita por:

$$G = [V, I, E].$$

A ordem dos vértices é arbitrária e não afeta o funcionamento do algoritmo, desde que a matriz de entrada represente fielmente o grafo. Essa representação pode ser construída em tempo $O(|V| + |E|)$ por meio de uma busca em largura (BFS) ou em profundidade (DFS). Ressalta-se que tais algoritmos são utilizados apenas para gerar a estrutura de entrada, e não para a busca do caminho Hamiltoniano. Qualquer grafo (simples, dirigido, denso ou esparso) pode ser representado nesse formato, pois cada vértice lista suas conexões diretas de forma independente.

2. **Geração das trincas válidas:** Nesta etapa, são geradas todas as trincas (v_i, v_j, v_k) que respeitam a estrutura de adjacência do grafo, formando a família $J \subseteq V^3$. Cada trinca representa um subcaminho de comprimento 2. Tais que as combinações sejam:

$$(v_i, v_j, v_k) \in J \iff (v_i, v_j) \in E \wedge (v_j, v_k) \in E \wedge i \neq j \neq k \neq i.$$

O algoritmo deve gerar todas as combinações possíveis de trincas com base na estrutura do grafo para formar a família J . Isso significa que:

$$C(n, 3) = \frac{n!}{3!(n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

onde n é o número total de vértices no grafo.

Depois de gerar todas as combinações de trincas, o algoritmo deve gerar todas as $3! = 6$ permutações possíveis de cada trinca. Isso significa que para cada combinação de trinca, o algoritmo deve gerar todas as permutações possíveis dos três vértices. O número de permutações de uma trinca é dado por:

$$P = C(n, 3) \times 3! = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \times 6 = n(n-1)(n-2)$$

3. **Filtragem das trincas inválidas:** Após gerar todas as permutações possíveis, o algoritmo filtra as trincas que não respeitam as arestas do grafo, removendo aquelas que não formam subcaminhos válidos. Isso é feito validando cada trinca gerada contra a estrutura de adjacência do grafo.

4.

5. **Construção da relação de adjacência:** A partir da família J , define-se $ADJ \subseteq J \times J$, onde duas trincas A e B são adjacentes se os dois últimos vértices de A coincidirem com os dois primeiros de B , sem repetir vértices já usados.

$$(A, B) \in ADJ \iff A = (v_i, v_j, v_k), B = (v_j, v_k, v_l), v_l \notin \{v_i, v_j, v_k\}, (v_k, v_l) \in E.$$

6. **Construção dos caminhos:** Utilizando a relação ADJ , o algoritmo concatena trincas adjacentes de forma incremental, formando sequências $A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_k$, onde cada vértice aparece no máximo uma vez. Cada sequência resultante representa um caminho válido no grafo.

7. **Saída:** O conjunto final contém todos os caminhos válidos identificados pelo processo construtivo.

8. **Resultado final:** Todos os caminhos válidos do grafo são mapeados e codificados de forma compacta. A reconstrução, através das janelas deslizantes, revela todos os caminhos decodificados, incluindo pelo menos um caminho Hamiltoniano, caso exista.

Nota: o algoritmo evita a geração de caminhos inválidos, restringindo-se apenas aos subcaminhos já existentes no grafo, garantindo eficiência e evitando redundâncias.

4 Teorema das Trincas de Serer

Teorema 4.1 (Teorema das Trincas de Serer). *Seja $G = (V, E)$ um grafo arbitrário e seja J a família de todas as trincas válidas de G . Então, **se existir um caminho Hamil-***

toniano em G , ele pode ser representado como uma sequência de trincas consecutivas em J , conectadas pela relação ADJ , de modo que a concatenação das trincas via janelas deslizantes cobre todos os vértices exatamente uma vez.

O teorema garante:

- Qualquer Hamiltoniano existente esteja invariavelmente codificado em J e pode ser reconstruído;
- A construção é polinomial em função de $|V|$;
- O teorema não afirma a existência de caminho Hamiltoniano, apenas garante que, se existir, ele está contido na codificação via trincas válidas.
- Originalidade construtiva da abordagem baseada em janelas de trincas válidas.

5 Prova do Teorema

Demonstração. Seja $G = (V, E)$ um grafo com $|V| = n$ e suponha que exista um caminho Hamiltoniano

$$H = (v_1, v_2, \dots, v_n),$$

onde $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} = V$ e

$$(v_i, v_{i+1}) \in E \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n-1.$$

Decompondo H em trincas consecutivas:

$$A_1 = (v_1, v_2, v_3), \quad A_2 = (v_2, v_3, v_4), \quad \dots, \quad A_{n-2} = (v_{n-2}, v_{n-1}, v_n),$$

vemos que cada $A_i \in J$, pois todas as trincas respeitam a definição de subcaminho de três vértices consecutivos conectados.

Além disso, pela definição de ADJ , temos

$$(A_i, A_{i+1}) \in ADJ, \quad \forall i = 1, \dots, n-3,$$

porque cada par de trincas consecutivas compartilha exatamente dois vértices consecutivos e mantém a conectividade sem repetir vértices.

Aplicando a operação de janela deslizante estendida:

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_{n-2} = (v_1, v_2, \dots, v_n),$$

obtemos exatamente o caminho Hamiltoniano original.

Portanto, qualquer Hamiltoniano existente em G está **garantidamente codificado** como uma sequência de trincas válidas conectadas em ADJ , e pode ser reconstruído via janelas deslizantes. Desta forma garantindo também a completude do método. \square

6 Prova de complexidade polinomial

Demonstração. Seja $G = (V, E)$ um grafo com $|V| = n$ vértices.

1. Geração das trincas: O número de trincas possíveis é dado por

$$Q = \binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = O(n^3),$$

portanto, a geração da família de trincas J é polinomial em função de n .

2. Construção da relação de adjacência ADJ : Cada trinca é comparada com outras trincas para verificar se satisfazem as condições de adjacência:

- os dois últimos vértices de t_1 coincidem com os dois primeiros de t_2 ;
- o último vértice de t_2 ainda não foi usado em t_1 ;
- existe uma aresta conectando o último vértice de t_1 ao último de t_2 .

Assumindo que cada trinca só gera um número limitado de adjacências (como ocorre em grafos esparsos), a construção de ADJ exige, no pior caso prático, $O(n^2)$ operações.

3. Construção dos caminhos via janelas deslizantes: A concatenação de trincas adjacentes depende de:

- n : número de trincas iniciais,
- k : comprimento máximo de cada caminho ($k \leq n$),
- n_{adj} : número médio de trincas adjacentes por trinca.

No pior caso de grafos esparsos, $n_{adj} = O(1)$ e $k = O(n)$, resultando em

$$O(n \cdot k \cdot n_{adj}) = O(n^2)$$

para a construção de todos os caminhos.

4. Complexidade total: Somando todas as etapas, temos

$$O(n^3) + O(n^2) + O(n^2) = O(n^3),$$

onde o termo dominante é $O(n^3)$. Portanto, a complexidade total do algoritmo continua sendo polinomial em função do número de vértices n .

5. Observação sobre o número de arestas: A quantidade de arestas $|E|$ não altera a ordem assintótica da complexidade. A geração de trincas depende apenas de n , e a validação de cada trinca contra as arestas é feita em tempo $O(1)$, assumindo estruturas de acesso eficiente, como matriz de adjacência ou conjuntos de vizinhos. Dessa forma, a complexidade assintótica é determinada exclusivamente pelo número de vértices n . \square

7 P vs NP

O Teorema das Trincas de Serer fornece um método construtivo para encontrar caminhos Hamiltonianos em grafos arbitrários, caso eles existam. Como demonstrado na Seção anterior, o algoritmo associado é executado em tempo polinomial $O(n^3)$, onde n é o número de vértices do grafo.

7.1 Definição conceitual

Seja:

- NP o conjunto de todas as sequências possíveis de vértices de um grafo G , ou seja, todos os caminhos possíveis.
- P o subconjunto de NP formado apenas pelos caminhos válidos, isto é, caminhos que respeitam as arestas do grafo e, no caso do problema Hamiltoniano, percorrem todos os vértices exatamente uma vez.

O desafio clássico é que, embora seja fácil verificar se um caminho é válido (P), **não existe, até hoje, um método polinomial conhecido para extrair todos os caminhos válidos de NP em grafos arbitrários.**

7.2 Consequência do Teorema das Trincas de Serer

O algoritmo construtivo do Teorema das Trincas de Serer **garante** que:

- Qualquer caminho Hamiltoniano existente em G é codificado em sequências de trincas válidas.
- O caminho pode ser reconstruído de forma polinomial ($O(n^3)$) a partir dessas trincas.

Portanto, o algoritmo fornece uma forma de **extrair o subconjunto** $P \subset NP$ em tempo polinomial. Isso implica que, para o problema do caminho Hamiltoniano, **P pode ser obtido de NP de forma eficiente**, oferecendo uma conexão direta com a questão P vs NP.

8 Discussão

8.1 Garantias do Teorema

O Teorema das Trincas de Serer **garante** que qualquer caminho Hamiltoniano existente em um grafo arbitrário está codificado na família de trincas válidas J e pode ser reconstruído através da concatenação dessas trincas em tempo polinomial $O(n^3)$, onde n é o número de vértices do grafo.

Dessa forma, é possível **extrair P de NP de forma eficiente**, oferecendo uma conexão direta com a questão P vs NP.

8.2 Limites da novidade

O Teorema não afirma a existência de um caminho Hamiltoniano em todos os grafos; ele apenas **garante que, caso tal caminho exista**, ele estará contido na codificação via trincas válidas.

8.3 Próximos passos

É possível **simplificar ainda a estrutura das arestas**, aproximando-a da definição formal de um grafo, e também **otimizar a geração das trincas**. Acredita-se que este método adaptado possa ser implementado em tempo $O(n)$ em casos específicos.

Além disso, é necessário **testar o método de forma mais ampla** em grafos grandes e complexos, avaliando sua eficiência prática e comparando com algoritmos conhecidos de forma empírica.

9 Conclusão

O Teorema das Trincas de Serer apresenta uma abordagem inovadora para o problema do caminho Hamiltoniano em grafos arbitrários, demonstrando que, caso exista um caminho Hamiltoniano, ele pode ser codificado e reconstruído em tempo polinomial $O(n^3)$.

Referências

- [1] Ana Cristina Munaretto, *Descomplicando: Um Novo Olhar Sobre a Matemática Elementar*, Intersaberes
- [2] J.M.S Simões-Pereira, *Grafos e Redes: Teoria e Algoritmos Básicos*, 2013.
- [3] Antônio dos Santos Machado, *Matemática Temas e Metas 3 - Sistemas lineares e Combinatória*, 1986.
- [4] Pedro Serer, *Teorema de Serer*, GitHub repository, <https://github.com/Pedro-Serer/caixeiro-viajante/blob/main/Teorema-das-trincas-de-Serer.py>, 2025.