

# Teoria de Matemáticas de Bachillerato

Pedro Ángel Fraile Manzano

8 de noviembre de 2022



# Contenidos Generales

Apartados del libro	Página
<b>I Prefacios, Repaso y otras consideraciones</b>	<b>5</b>
<b>1. Operaciones sobre los números reales</b>	<b>7</b>
Introducción . . . . .	8
1.1. Estructura de los números reales . . . . .	8
1.2. Potencias y Logaritmos . . . . .	9
1.3. Resolución de ecuaciones exponenciales . . . . .	11
1.4. Resolución de ecuaciones logarítmicas . . . . .	12
<b>2. Polinomios sobre el cuerpo de los reales y ecuaciones</b>	<b>13</b>
2.1. Conceptos básicos . . . . .	14
2.2. Operaciones con polinomios . . . . .	14
2.3. Divisibilidad de polinomios . . . . .	14
<b>3. Ecuaciones polinómicas</b>	<b>15</b>
3.1. Ecuaciones lineales . . . . .	16
3.2. Ecuaciones de 2º grado . . . . .	16
3.3. Ecuaciones de grado mayor que 2 . . . . .	16
<b>4. Inecuaciones</b>	<b>17</b>
4.1. Inecuaciones lineales . . . . .	18
4.2. Inecuaciones no lineales . . . . .	18



# Parte I

## Prefacios, Repaso y otras consideraciones



# Capítulo 1

## Operaciones sobre los números reales

### Índice del capítulo

Introducción . . . . .	8
1.1. Estructura de los números reales . . . . .	8
1.2. Potencias y Logaritmos . . . . .	9
1.3. Resolución de ecuaciones exponenciales . . . . .	11
1.4. Resolución de ecuaciones logarítmicas . . . . .	12

## Introducción

Los distintos conjuntos de números surgen de la necesidad de resolver distintas ecuaciones, es decir, a medida que necesitamos resolver ecuaciones más complejas, más se amplían el campo de números con los que podemos actuar:

### 1.1. Estructura de los números reales

Los números reales tiene estructura de cuerpo y te preguntará ¿ Qué es un cuerpo?

**Definición 1.1.1.** Un cuerpo es una terna  $(\mathbb{K}, +, \cdot)$  donde:

1.  $\mathbb{K}$  es un conjunto de elementos
2.  $+$  es una operación sobre los elementos de  $\mathbb{K}$  que cumple:
  - Es una operación **conmutativa**, es decir, sean  $a, b \in \mathbb{K}$  entonces tendremos que  $a + b = b + a$
  - Es una operación **asociativa**, es decir dados  $a, b, c \in \mathbb{K}$  tenemos que  $a + (b + c) = (a + b) + c$
  - Existe un **elemento neutro**, es decir  $\exists e / e + a = a + e = a \ \forall a \in \mathbb{K}$ .
  - Cada elemento  $a \in \mathbb{K}$  existe un elemento **inverso** que se denota por  $a^{-1}$  de tal manera que  $a + a^{-1} = a^{-1} + a = e$  (*Esto también se da cuando no se cumple la conmutativa*)
3.  $\cdot$  es una operación que cumple lo siguiente
  - Es una operación **asociativa**, es decir dados  $a, b, c \in \mathbb{K}$  tenemos que  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
  - Existe un **elemento neutro** para esta operación  $\exists e / e \cdot a = a \cdot e = a \ \forall a \in \mathbb{K}$ .
  - Para todo elemento  $a \in \mathbb{K}$  entonces  $\exists a^{-1} / a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$  (*Esto es lo que distingue un cuerpo a un anillo*)
  - $\cdot$  es **distributivo** respecto de  $+$  es decir,  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$



**Aclaración 1:** Aunque se denoten como  $+$ ,  $\cdot$  no tenemos por qué usar las definiciones habituales de la suma y la multiplicación. Por ejemplo, la suma y producto de números reales no son iguales que las mismas operaciones para las matrices (*quedarnos con ese nombre.*)

**Aclaración 2:** De esta manera que tenemos que lo que llamamos en los números reales la resta es la suma por el inverso y la división es el producto por el inverso.

**Ejercicio Propuesto.** Demostrar que  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{C}$  son cuerpos

## 1.2. Potencias y Logaritmos

**Definición 1.2.1.** Podemos definir las potencias como  $a^n = \overbrace{a \cdot \dots \cdot a}^{n \text{ veces}}$ . Una vez entendido esto tenemos las siguientes propiedades

### Propiedades

$$1. a^1 = a \text{ y } a^0 = 1 \text{ para cualquier } a \in \mathbb{R}$$

$$2. a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$3. a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$4. \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$5. (a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$6. \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$7. (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$8. \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

### Demostración

1. Para la primera demostración no hace falta más que decir que estamos “poniendo” sólo una  $a$  y que  $a^0 = 1$  es básicamente proveniente del álgebra  $\mathbb{Z}$  modular.
2. En este caso, tenemos que al utilizar la propiedad 3 quedará más clara pero si nosotros tenemos  $a^1 \cdot a^{-1} = a^0 = 1 \Rightarrow a^{-1} = \frac{1}{a}$

3. Ahora tenemos que  $a^n \cdot a^m = \overbrace{a \cdot \dots \cdot a}^{n \text{ veces}} \cdot \overbrace{a \cdot \dots \cdot a}^{m \text{ veces}} = \overbrace{a \cdot \dots \cdot a}^{n+m \text{ veces}} = a^{m+n}$
4. Si combinamos la propiedad 2 y 3 queda probado  $\frac{a^n}{a^m} = a^n \cdot \frac{1}{a^m} = a^n \cdot a^{-m} = a^{n-m}$
5. Este se debe a que estamos multiplicando paquetitos del producto de  $n$   $a$ 's, es decir,  $(a^n)^m = \overbrace{a^n \cdot \dots \cdot a^n}^{m \text{ veces}} = \underbrace{\overbrace{a \cdot \dots \cdot a}^{n \text{ veces}} \cdot \dots \cdot \overbrace{a \cdot \dots \cdot a}^{n \text{ veces}}}_{n \text{ veces}} = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \cdot m \text{ veces}} = a^{mn}$
6. Haciendo un razonamiento análogo pero con el producto lo tenemos
7. Tenemos lo siguiente  $(a \cdot b)^n = \overbrace{a \cdot b \cdot \dots \cdot a \cdot b}^{n \text{ veces}} = \underbrace{\overbrace{a \cdot \dots \cdot a}^{n \text{ veces}} \cdot \overbrace{b \cdot \dots \cdot b}^{n \text{ veces}}}_{n \text{ veces}} = a^n \cdot b^n$
8. Utilizando un razonamiento similar al anterior lo tenemos cambiando únicamente  $b$  por  $b^{-1}$

**Definición 1.2.2.** Definimos el logaritmo de  $b \in \mathbb{R}^+$  en base  $a > 0$  de la siguiente manera

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b \quad (1.1)$$

Esta definición nos permite "traducir" de logaritmos a potencias y es lo que se utiliza para demostrar las siguientes propiedades

**Propiedades:** Sean  $P, Q, a \in \mathbb{R}^+$

1.  $\log_a 1 = 0$
2.  $\log_a a = 1$
3.  $\log_a (P \cdot Q) = \log_a P + \log_a Q$
4.  $\log_a \left( \frac{P}{Q} \right) = \log_a P - \log_a Q$
5.  $\log_a P^n = n \cdot \log_a P$

**Ejercicio Propuesto.** Se propone al lector la demostración de estas propiedades utilizando la definición de logaritmos y las propiedades de las potencias.

## 1.3. Resolución de ecuaciones exponenciales

**Definición 1.3.1.** Podemos definir una ecuación exponencial como aquella que tiene la incógnita en el exponente

## 1.4. Resolución de ecuaciones logarítmicas

**Definición 1.4.1.** Podemos definir una ecuación exponencial como aquella que tiene la incógnita dentro de un logaritmo.

## Capítulo 2

# Polinomios sobre el cuerpo de los reales y ecuaciones

### Índice del capítulo

2.1. Conceptos básicos . . . . .	14
2.2. Operaciones con polinomios . . . . .	14
2.3. Divisibilidad de polinomios . . . . .	14

### 2.1. Conceptos básicos

### 2.2. Operaciones con polinomios

### 2.3. Divisibilidad de polinomios



# Capítulo 3

## Ecuaciones polinómicas

### Índice del capítulo

3.1. Ecuaciones lineales . . . . .	16
3.2. Ecuaciones de 2º grado . . . . .	16
3.3. Ecuaciones de grado mayor que 2 . . . . .	16

### 3.1. Ecuaciones lineales

### 3.2. Ecuaciones de 2º grado

### 3.3. Ecuaciones de grado mayor que 2





# Capítulo 4

## Inecuaciones

### Índice del capítulo

4.1. Inecuaciones lineales . . . . .	18
4.2. Inecuaciones no lineales . . . . .	18

#### 4.1. Inecuaciones lineales

#### 4.2. Inecuaciones no lineales