UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA · FACULTAD DE INGENIERÍA

Modelado Numérico del Resurgimiento de 'Rosa Pastel' en Spotify México (2023)

Ajuste de Curvas (Mínimos Cuadrados), Búsqueda de Raíces (Bisección vs. Newton-Raphson) y Diferenciación Numérica

Autores: Pedro Gatti · Facundo Grillo · Gonzalo Marin | Docente: Ing. Carlos Arnaudo
Ingeniería Informática · Comisión 46324 · Octubre 2026

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

El fenómeno de 'Rosa Pastel' y su relevancia en Ingeniería

El caso 'Rosa Pastel' (Belanova)

• Canción electropop mexicana lanzada como sencillo en 2006 (álbum Dulce Beat).

• En 2023 experimentó un fuerte resurgimiento en plataformas de streaming a partir de un trend masivo en TikTok ('sueños frustrados', julio 2023).

• En Spotify México las reproducciones semanales pasaron de 1.1 M a un pico de 4.17 M en julio.

• El volumen total acumulado a lo largo de 2023 llegó a 132,9 millones de reproducciones en el mercado mexicano.

Relevancia en Ingeniería

• Plataformas de streaming: Modelar cuantitativamente la evolución temporal de la demanda permite anticipar picos de consumo.

• Infraestructura cloud y redes CDN: Estimar ritmos de crecimiento ayuda a dimensionar preventivamente servidores y servicios de distribución de contenido.

• Naturaleza de los datos: Las mediciones de telemetría son discretas (semanales) y presentan variaciones naturales.

• Rol de los métodos numéricos: Brindan el marco formal para deducir un modelo analítico continuo, localizar hitos acumulados y calcular tasas de cambio instantáneas.

DATOS EXPERIMENTALES

Datos Reales: 47 Semanas de Spotify México en 2023

Serie Temporal de Telemetría:


• Fuente oficial: kworb.net (track 6Z0ybnsUBhbZ9ZjPW64eoF), que recopila los charts semanales del Top 200 de Spotify México.

• Alcance: Exclusivamente streams de Spotify México en el Top 200 semanal oficial.

• Rango: 47 semanas consecutivas de 2023 (t = 0 al 26/01/2023 hasta t = 46 al 14/12/2023).

• Acumulado anual: 132,9 millones de streams.

• Hito de 100M: Cruzado entre la semana 35 (99.60 M) y la semana 36 (102.74 M), fines de septiembre de 2023.



REGRESIÓN POLINÓMICA

Método 1: Ajuste de Curvas por Mínimos Cuadrados

Modelo Continuo Cúbico: $S(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2 + c \cdot t + d$

• Justificación del grado 3: Permite capturar la concavidad positiva inicial (aceleración por el trend de TikTok) y la posterior concavidad negativa (inflexión y estabilización hacia fin de año).

Coeficientes obtenidos (Mínimos Cuadrados sobre 47 semanas):
$a = -0.000839$ | $b = 0.076977$ | $c = 1.081162$ | $d = 2.072898$

Ecuación del modelo ajustado:
$S(t) = -0.000839 \cdot t^3 + 0.076977 \cdot t^2 + 1.081162 \cdot t + 2.072898$

Evaluación estadística de la bondad de ajuste:
- Suma de cuadrados de los residuos: Sr = 36.9406
- Suma total de cuadrados respecto a la media: St = 79,137.5830
- Coeficiente de determinación: $R^2 = 0.999533$ (99.95% de la varianza explicada)
- Error estándar de la estimación: Sy/x = 0.9269 millones de streams

BÚSQUEDA DE RAÍCES

Método 2: Búsqueda de Raíces — El Hito de 100 Millones

Planteo del Problema

Se busca determinar la semana t* en que la canción superó 100 millones de streams en Spotify México:

$f(t) = S(t) - 100.0 = 0$

$f(t) = -0.000839 \cdot t^3 + 0.076977 \cdot t^2 + 1.081162 \cdot t - 97.927102 = 0$

Condición de parada exigida:
$|Ea\%| < 10^{-4}\ \%$ (0.0001% de error relativo)

Intervalo inicial [35, 36]:
- Datos: S(35) = 99.60 M < 100 < S(36) = 102.74 M
- Modelo: f(35) = -1.7584 < 0, f(36) = +1.6162 > 0
- Hay cambio de signo (Bolzano).

Resultados Comparados

1. Método de Bisección (Método Cerrado):
- Intervalo inicial: [35.0, 36.0]
- Convergencia lineal (factor 0.5 por paso).
- 15 iteraciones requeridas.
- Raíz hallada: t* = 35.520172 semanas.

2. Método de Newton-Raphson (Método Abierto):
- Estimación inicial: t_0 = 35.0 semanas.
- Derivada $f'(t) = -0.002517 \cdot t^2 + 0.153954 \cdot t + 1.081162$
- Convergencia cuadrática.
- 3 iteraciones requeridas (5 veces más rápido).
- Raíz hallada: t* = 35.520148 semanas.

Control por interpolación lineal: t = 35.127 sem.
Diferencia: 2.75 días (error de ajuste ±0.93 M).

CONVERGENCIA


Comparativa: Bisección (Lineal) vs. Newton-Raphson (Cuadrática)

Análisis de Convergencia:

• Bisección: 15 iteraciones.
- Método cerrado, muy robusto.
- Incondicionalmente convergente si Bolzano se cumple.
- Orden lineal: divide el intervalo a la mitad en cada ciclo.

• Newton-Raphson: 3 iteraciones.
- Método abierto por tangentes sucesivas.
- Orden cuadrático: duplica aproximadamente los dígitos exactos en cada paso.
- Requiere derivada analítica y una buena aproximación inicial.

• Coincidencia en la raíz: $t^* \approx 35.520$ semanas.
- Fecha estimada: fines de septiembre / 1 de octubre de 2023.



DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA

Método 3: Diferenciación Numérica y Pico de Demanda


Ritmo Semanal de Streams (dS/dt):

- Esquemas de diferencias finitas (h = 1 semana):
  - Adelante y atrás: error O(h).
  - Centrada: error $O(h^2)$, mejor aproximación teórica.

- Pico según el modelo (S''(t) = 0):
  - t_pico = -b / (3a) = 30.59 semanas (fines de agosto 2023).
  - Ritmo del modelo: 3.436 M streams/semana.

- Pico real en los datos observados:
  - Semana 26 (27/07/2023): 4.171 M streams.
  - Coincide con el auge de TikTok de julio 2023.

- Efecto de suavizado del modelo:
  - El polinomio cúbico desplaza el pico ~4 semanas y atenúa su valor.



ANÁLISIS CRÍTICO

Limitaciones del Modelo Numérico

1. Discrepancia con Datos Puntuales

La cúbica por mínimos cuadrados no pasa exactamente por los puntos. Por eso la raíz del modelo (t = 35.52) difiere ~2.75 días de la interpolación lineal directa entre las semanas 35 y 36 (t = 35.13).

2. Suavizado del Pico de Demanda

Al ajustar un único polinomio para 47 semanas, el modelo atenúa los cambios bruscos: desplaza el pico de la semana 26 a la semana 30.6 y subestima su magnitud máxima (3.44 vs. 4.17 M streams/sem).

3. Alcance de los Datos Relevados

Los datos cubren únicamente los charts semanales del Top 200 de Spotify México (kworb.net). No contemplan otras plataformas (YouTube, Apple Music), otros países ni escuchas fuera del chart.

4. Imposibilidad de Extrapolación

El modelo cúbico solo es válido dentro del rango de 2023 ($t \in [0, 46]$). Dado que su coeficiente cúbico es negativo (a = -0.000839), extrapolar fuera del año haría tender los streams acumulados a $-\infty$.

SÍNTESIS FINAL

Conclusiones del Proyecto Integrador

Principales Aprendizajes y Conclusiones:

1. Ajuste confiable: La regresión polinómica cúbica ofreció una muy buena aproximación global (R^2 = 0.9995, Sy/x = 0.927 M) para representar la acumulación de reproducciones a lo largo del año.

2. Eficiencia comparada de raíces: Newton-Raphson demostró ser 5 veces más rápido que Bisección (3 iteraciones frente a 15) para alcanzar la tolerancia de 10^{-4} %, convergiendo a la misma raíz ($t^* \approx 35.52$ semanas).

3. Validación del modelo: La discrepancia de 2.75 días respecto a la interpolación lineal directa confirma la coherencia física y estadística del ajuste dentro del error estándar.

4. Dinámica del consumo: La diferenciación numérica reveló que el pico real de streams ocurrió en la semana 26 (fines de julio de 2023, 4.171 M), y evidenció cómo el modelo cúbico suaviza la respuesta temporal.

5. Aporte a la ingeniería: El modelado numérico permite convertir datos discretos de telemetría en funciones continuas útiles para dimensionar infraestructura y servidores de streaming ante variaciones de demanda.

¡Muchas Gracias por su atención!

¿Preguntas o Consultas?

Pedro Gatti · Facundo Grillo · Gonzalo Marin
Taller de Métodos Numéricos · UCC 2026