

## Prova calculo 2A universidade federal fluminense

Calculo
Universidade Federal Fluminense (UFF)
1 pag.



## Departamento de Matemática Aplicada **VR** de Cálculo II-A - Prof. Sérgio Almaraz Turma C1 - 09/11/09

Aluno:

- A prova vale 10 pontos e tem duração de 1h 50min.
- Não é permitido sair da sala durante a prova.
- Respostas sem uma justificava correta não serão consideradas.
- A resposta final deve ser dada a **caneta**.
- As respostas **não precisam** ser dadas na ordem abaixo, mas cada resposta deve ser **numerada** de acordo com a questão correspondente.
- Sugerimos que as respostas, assim como todo o desenvolvimento, sejam feitos em folha(s) de papel **anexa**(s).
- 1) Calcule as seguintes integrais indefinidas:

(a) [1,0 pt] 
$$\int \frac{1}{x} (\ln x)^2 e^{(\ln x)^3} dx$$
;

**(b)** [1,5 pt] 
$$\int \frac{x}{(x-1)(x^2-1)} dx$$
;

(c) [1,5 pt] 
$$\int x\sqrt{1+2x}dx$$
.

2) Resolva as equações:

(a) [1,0 pt] 
$$\frac{dy}{dx} + y + xysen(x^2) = 0$$
;

**(b)** [1,0 pt] 
$$x \frac{dy}{dx} + 3(\ln x)^2 y = 3(\ln x)^2$$
.

- 3) [1,5 pt] Sabendo que  $y_1(x) = x$  é uma solução de  $x^2y''-3xy'+3y=0$ , utilize o método da **redução de ordem** para encontrar uma **segunda solução**  $y_2(x)$  tal que  $y_1$  e  $y_2$  sejam linearmente independentes.
- 4) (a) [1,0 pt] Resolva o problema de valor inicial abaixo:

$$\begin{cases} y''-2y'+y=0, \\ y(0)=1, y'(0)=0. \end{cases}$$

(b) [1,5 pt] Encontre a solução geral de  $y''-2y'+y=xe^x$ .