Agente de calidad del aire del Valle de Aburrá: HMM, clasificador propio y agente LLM con RAG

SI3003 – Inteligencia Artificial · Universidad EAFIT · Proyecto final 2026-2


William Alberto Villa · Pablo José Benítez

1. Problema

En el Valle de Aburrá el PM2.5 es el contaminante que más afecta la salud y el que suele definir el Índice de Calidad del Aire (ICA). La topografía de un valle estrecho y las temporadas de transición (febrero–abril, octubre–noviembre) producen episodios en los que el promedio diario supera la norma nacional de 37 µg/m³ (Res. 2254 de 2017). SIATA publica las mediciones, pero un ciudadano rara vez sabe qué significa el número del día, qué esperar mañana ni qué recomiendan las autoridades. Construimos un MVP que (i) estima el régimen latente de contaminación y pronostica la categoría del día siguiente por estación con modelos implementados por el equipo y (ii) los expone mediante un agente LLM que consulta datos, modelos y normativa, y responde con citas, dentro de un dashboard interactivo.

2. Datos

PM2.5 horario de SIATA – AMVA (archivo oficial `EntregaData1/Datos_SIATA_Aire_pm25.json`): 21 estaciones (19 poblacionales y 2 de tráfico), 21-feb-2019 → 20-feb-2020, 183 981 registros. El script de descarga prueba la URL oficial, luego un espejo público y por último la copia del repositorio (plan B). Al verificar el acceso (12-nov-2026) la URL oficial respondió, pero ya publica otro periodo, 2023-07-31 → 2024-07-30 (184 485 registros, solo 74.9 % válidos frente a 97.3 % del periodo usado). Por eso el proyecto fija una copia versionada: una descarga nueva se guarda aparte y no reemplaza los datos con que se entrenó y evaluó. Limpieza: se descartan centinelas (−9999), banderas de calidad > 2.5 y valores fuera de 0–500 µg/m³ (queda el 97.3 %); promedio diario con ≥ 18 h válidas (75 % de representatividad) → 7 525 días-estación. La clase objetivo es *Buena* (≤12), *Aceptable* (12–37) o *Dañina* (>37 µg/m³), con la misma regla de redondeo del ICA. Solo el 3.3 % de los días-estación supera la norma. El EDA (Fig. 1) muestra el pico de feb–mar 2019, un episodio en agosto de 2019 (16-ago: 84 % de estaciones sobre la norma), menor PM2.5 los domingos (17 vs 21–22 µg/m³ entre semana) y una autocorrelación diaria alta, que hace de la persistencia una línea base exigente.




PM2.5 mensual y días-estación sobre la norma (todas las estaciones).

Corpus RAG (8 documentos, 43 fragmentos): Res. 2254/2017 (norma, ICA y niveles de prevención/alerta/emergencia), POECA del AMVA (Acuerdo Metropolitano 04/2018 y plan de acción municipal), recomendaciones de salud por color del ICA (SIATA, Cornare), guías OMS 2021, geografía del valle y red SIATA, y la metodología del propio proyecto. Son resúmenes parafraseados con la URL de la fuente oficial.

3. Parte 1: HMM y clasificador (implementación propia)

HMM gaussiano. Modelamos log(PM2.5) diario de cada estación con un HMM de 3 estados y emisiones gaussianas, con parámetros compartidos entre estaciones. Implementamos en NumPy el algoritmo forward-backward con escalado, Baum-Welch sobre múltiples secuencias, Viterbi en espacio logarítmico, marginalización de días faltantes (verosimilitud de emisión = 1) y la predicción a un paso $P(s_{t+1} \mid y_{1:t}) = \alpha_t A$, que integrada sobre los intervalos de cada clase da un pronóstico probabilístico. Los estados aprendidos tienen medias de 11.5, 17.7 y 30.0 µg/m³ y alta persistencia (duración esperada 17, 13 y 18 días); los llamamos *Bajo, Moderado* y *Elevado*. Las pruebas automáticas verifican la verosimilitud y Viterbi contra la enumeración exhaustiva de secuencias, la monotonía de EM y la recuperación de parámetros en datos simulados.

Clasificador del día siguiente. Regresión logística multinomial (Adam, L2, pesos de clase) y Naive Bayes gaussiano, ambos propios. Variables en el día *t*: log-PM2.5 de *t* y *t−1*, media de 3 días, cambio diario, media regional, **probabilidades filtradas del HMM** (causales, sin fuga de información), fin de semana y mes (seno/coseno) del día objetivo. **Protocolo:** entrenamiento hasta 31-oct-2019 y prueba 1-nov-2019 → 20-feb-2020 (2 238 casos, 68 con norma excedida). Los pesos de clase y L2 se eligen con validación temporal en los últimos 5 meses del entrenamiento (F1-macro; desempate fijado de antemano por log-loss). Adicionalmente evaluamos con ventana creciente en 6 meses (sep-2019 → feb-2020), reentrenando el HMM en cada pliegue. Líneas base: persistencia (mañana = hoy), climatología (frecuencias de entrenamiento) y el HMM solo.




Estados latentes filtrados del HMM en Itagüí – Casa de Justicia.

4. Parte 2: agente LLM con RAG

El agente sigue un **loop manual** (Clase 12): el LLM recibe el mensaje del sistema, el contexto del tablero (estación y fecha), el historial y los esquemas de 5 herramientas; si pide herramientas, se ejecutan y su resultado vuelve como mensaje `tool`; el ciclo termina con una respuesta o al llegar a **Tmáx = 6** pasos, en cuyo caso se fuerza la respuesta con `tool_choice="none"`. Herramientas: `get_pm25` (medición diaria, serie, categoría ICA; intento opcional en vivo con respaldo histórico), `predict_tomorrow` (modelos de la Parte 1), `estado_regional` (porcentaje de estaciones poblacionales sobre la norma y nivel indicativo con el criterio del 50 % de estaciones del art. 12 de la Res. 2254), `listar_estaciones` y `search_docs` (RAG). **Errores:** toda excepción de una herramienta se devuelve como `{"error": ...}` para que el LLM corrija argumentos (por ejemplo una fecha fuera del histórico); si el proveedor LLM falla, se reintenta una vez y luego responde un router determinista con las mismas herramientas, avisando al usuario. **RAG:** fragmentación por secciones, embeddings TF-IDF (palabras 1–2 gramas sin tildes con stopwords + n-gramas de caracteres) u opcionalmente `sentence-transformers`, índice FAISS de producto interno y expansión de consulta con un tesauro del dominio. **Citas:** cada fragmento y herramienta trae un código (`[POECA]`, `[SIATA-DATOS]`, `[MODELO]`…) que el LLM debe incluir; se extraen y se muestran con su URL. LLM por defecto: Groq `openai/gpt-oss-120b`.

5. Resultados

Modelo (periodo de prueba)	Exact.	F1-macro	Exact. bal.	Recall exced.	Log-loss
Regresión logística + HMM	0.768	0.574	**0.737**	**0.838**	0.522
Regresión logística sin HMM (ablación)	0.783	0.583	0.732	0.838	0.530
Naive Bayes + HMM	0.641	0.484	0.736	0.912	2.093
HMM solo	0.834	0.449	0.454	0.000	**0.413**
Persistencia	0.831	**0.594**	0.593	0.441	—
Climatología	0.849	0.306	0.333	0.000	0.529



Comparación con las líneas base en el periodo de prueba.

La regresión logística detecta el **84 %** de los días-estación que superan la norma frente al 44 % de la persistencia y mejora la exactitud balanceada (0.74 vs 0.59), a costa de falsas alarmas (precisión 0.26 vs ≈0.46), por lo que su F1-macro queda ligeramente por debajo de la persistencia en esta partición. En la validación de 6 meses supera a la persistencia en F1-macro (0.525 vs 0.511) y en exactitud balanceada (0.558 vs 0.506). El HMM solo ofrece las probabilidades mejor calibradas (log-loss 0.413 vs 0.529 de la climatología) y su log-verosimilitud por observación en prueba (−0.17) supera ampliamente a una gaussiana i.i.d. (−0.47), aunque nunca predice la clase minoritaria por *argmax*. **La ablación muestra que las probabilidades del HMM no mejoran apreciablemente al clasificador**; su aporte es el pronóstico probabilístico y la interpretación del régimen que el agente comunica.

RAG: en 20 consultas fijas, hit@3 = 1.00, hit@1 = 0.85 y MRR = 0.93 (hit@1 = 0.80 sin expansión). **Agente:** con 15 preguntas fijas (datos, pronóstico, episodio regional, normativa, salud, errores intencionales) se mide si llamó a las herramientas esperadas, si citó la fuente esperada y si incluyó el dato clave. Con Groq `openai/gpt-oss-120b` la corrida se hizo cuando la descarga había reemplazado los datos por el periodo 2023-2024, así que las 6 preguntas con fechas de 2019 recibieron «fecha fuera del histórico» y solo las otras 9 son válidas (las respuestas guardadas se volvieron a puntuar tras corregir dos fallas del evaluador: citas con corchetes 【 】 y guiones Unicode).

Agente (15 preguntas)	Herramienta	Cita	Contenido	Las 9 sin fechas de 2019 (herr. / cita / cont.)
LLM `gpt-oss-120b` + herramientas	93 %	73 %	67 %	89 % / **100 %** / **100 %**
Router determinista (línea base)	93 %	87 %	80 %	89 % / 78 % / 78 %

En las preguntas válidas el LLM cita siempre la fuente y da el dato correcto, donde el router falla al recuperar la guía de la OMS o al responder sobre colegios. Errores observados del LLM: en P10 resolvió la fecha inválida sin llamar a `get_pm25`, y en P12 atribuyó el HMM a SIATA en vez de al proyecto. Las 6 preguntas que dependen de los datos 2019 quedan pendientes de una nueva corrida (`python evaluation/run_eval_agente.py --backend llm`).

6. Limitaciones y trabajo futuro

Un solo año de histórico sin meteorología (lluvia, viento, altura de mezcla) limita el pronóstico; con solo 68 casos positivos en prueba las métricas de la clase *Dañina* son inestables y la selección de hiperparámetros quedó en empate técnico. El HMM con parámetros compartidos hace que estaciones con nivel base alto pasen más tiempo en el estado *Elevado*, cuya media (30 µg/m³) está en categoría Aceptable: no equivale a un episodio crítico oficial. La primera corrida de la evaluación con el LLM se hizo sin querer sobre el periodo 2023-2024 (la descarga había sobrescrito los datos), lo que produjo errores de «fecha fuera del histórico»; se corrigió el script y la evaluación ahora verifica el periodo antes de correr, pero la evaluación del LLM sobre preguntas de datos y pronóstico sigue pendiente. El tesauro del RAG y las preguntas de evaluación fueron escritos por el mismo equipo (riesgo de sobreajuste), y la comprobación de contenido por palabras clave es aproximada. Como trabajo futuro: reentrenar con el periodo 2023-2024, añadir covariables meteorológicas (SIATA/Open-Meteo), un HMM con efectos por estación o una red bayesiana lluvia–viento–PM2.5, y evaluación del agente con

usuarios. **El sistema es informativo: no es consejo médico, legal ni de seguridad, ni un pronóstico o declaratoria oficial de SIATA o del AMVA.**

Fuentes: SIATA – AMVA; Res. 2254 de 2017 (MinAmbiente); Acuerdo Metropolitano 04 de 2018 (POECA); OMS, *Global air quality guidelines* (2021). Uso de IA generativa: ver `DECLARACION_IA.md`.