

InBody270

[InBody270]

ID 0921951250 身高 176cm 年齡 21 性別 男性 檢測日期/時間 2025.11.23. 16:20

身體組成分析

佔有我身體的大部份	身體總水重 (L)	35.5 (38.3~46.9)
形成肌肉	蛋白質重 (kg)	9.5 (10.3~12.5)
讓骨骼強壯	礦物質重 (kg)	3.18 (3.55~4.33)
積存過多的能量	體脂肪重 (kg)	8.4 (8.2~16.4)
以上的總和	體重 (kg)	56.6 (57.9~78.3)


肌肉脂肪分析

	低	正常	高
體重 (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %	56.6	
骨骼肌重 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	26.9	
體脂肪重 (kg)	40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520 %	8.4	


肥胖分析

	低	正常	高
體質指數 (kg/m ²)	10.0 15.0 18.5 22.0 24.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0	18.3	
體脂肪率 (%)	0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0	14.8	

部位別肌肉分析



部位別脂肪分析



身體組成歷程紀錄

	25.11.15 13:51	25.11.23 16:20
體重 (kg)	56.7	56.6
骨骼肌重 (kg)	26.9	26.9
體脂肪率 (%)	15.1	14.8

InBody 評分

68/100分

* 總評分反應身體組成的評估值。
肌肉發達的人得分可能超過 100 分。

體重控制

目標體重 68.2 kg
體重控制 +11.6 kg
脂肪控制 +1.9 kg
肌肉控制 +9.7 kg

身體平衡評估

上半身 ☒ 平衡 ☐ 輕度失衡 ☐ 嚴重失衡
下半身 ☒ 平衡 ☐ 輕度失衡 ☐ 嚴重失衡
上-下半身 ☐ 平衡 ☒ 輕度失衡 ☐ 嚴重失衡

腰臀圍比

0.82 | 0.80 0.90

內臟脂肪級別

級別 3 | 低 10 高

研究參數

除脂體重 48.2 kg (52.1~63.7)
基礎代謝率 1412 kcal (1305~1513)
肥胖度 83% (90~110)
SMI 7.0 kg/m²
建議的熱量攝取 2766 kcal

運動的熱量消耗

高爾夫球	100	槌球	108
走路	113	瑜伽	113
羽毛球	128	桌球	128
網球	170	自行車	170
拳擊	170	籃球	170
健行	185	跳繩	198
有氧運動	198	慢跑	198
足球	198	游泳	198
日本劍道	283	短柄牆球	283
壁球	283	跆拳道	283

* 依據您現在的體重
* 假設運動時間為 30 分鐘

阻抗

	右臂	左臂	軀幹	右腿	左腿
Z(Ω) 20 kHz	392.8	396.0	30.9	308.7	307.4
100 kHz	349.7	355.6	26.8	272.6	272.3

210~190



不均衡的身體組成，各種不同疾病之成因

檢測您的身體組成以最精確之身體組成分析儀InBody，並始終維持健康。


InBody以舉世最先進之直接分段多頻生物電阻抗分析技術(DSM-BIA)精確地反映您的身體組成狀況。

身體組成

人體主要由四種成份組成：身體水份、蛋白質、礦物質及脂肪。這些成份於健康個體內彼此間相互平衡得當。然而，一旦失衡，將出現以下病症：

- 過量體脂肪— 肥胖
- 不平衡水份— 水腫
- 礦物質缺乏— 骨質疏鬆
- 蛋白質缺乏— 營養不足

檢視您的健康狀況以一目瞭然之體重/肌肉重/脂肪重條狀圖型式：



基礎代謝率(BMR)

休息狀態下用以維持基本生命機能之最小能量需求。相同身高體重下，肌肉量較多者，基礎代謝率較高。

肌少症風險指標

亞洲肌少症小組(AWGS)2019對肌少症肌肉質量不足及肌力不足標準定義為：

SMI (四肢骨骼肌質量指數 Skeletal Muscle Index)：

男性 < 7 kg/m²；女性 < 5.7 kg/m²

握力：男性 < 28 kg；女性 < 18 kg

部位別肌肉量評估

用以評估各個部位之肌肉發達狀況。肌肉量愈多，身體就愈健康。如其值低於正常範圍，透過肌力訓練以鍛鍊出均衡之更多肌肉量。



部位別脂肪評估

它反映了各個部位之脂肪分布。縱使身高、體重及脂肪量相同，不同之脂肪分布造就不同之體型。視過量脂肪囤積部位而定，可區分為上半身肥胖或下半身肥胖。




* 部位別脂肪量係估算值。

肌肉—脂肪控制

依據個體目前之身體組成分析結果，經縝密之計算所得之量值，它是成就理想肌肉—脂肪均衡所需之個別調控量。(+)為增量，(-)為減量。

腹部肥胖分析




內臟脂肪程度

肥胖診斷

① 身體質量指數BMI：身體質量指數(kg/m²)係一用以評估肥胖度之指數，由體重(kg)除以身高之平方(m²)計算而來。由於僅考量體重與身高，BMI用於肥胖診斷不過只及於外表的地步而已。

② 體脂肪率：體脂肪率不僅考量體重，也計入體脂肪量於體重所佔之比率，以評估肥胖度。只有體重未必能定義肥胖，反倒是肌肉量愈多體重愈增。體脂肪率在肥胖診斷較之體重更為重要也更受重視。

③ 腰臀圍比(WHR)：腰圍與臀圍之比值被利用來判定腹部肥胖，因為它密切相關於腹部脂肪。WHR值如女性大於0.85，男性大於0.90，被視為腹部肥胖。就成人而言，腹部肥胖多半由於內臟脂肪之囤積，這將增高游離脂肪分子在血管中之濃度而導致肥胖相關疾病，諸如高血壓、心血管疾病及糖尿病等。



<InBody 腰臀圍比之量測部位>

腰圍：肚臍線

臀圍：最突出部位