
题目描述
365. 水壶问题
已解答
中等
相关标签
相关企业
有两个水壶，容量分别为 x 和 y 升。水的供应是无限的。确定是否有可能使用这两个壶准确得到 target 升。
你可以：
装满任意一个水壶
清空任意一个水壶
将水从一个水壶倒入另一个水壶，直到接水壶已满，或倒水壶已空。
576
628
4 人在线
代码
通过
全部提交记录
通过 32 / 32 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.06.13 22:07
分析
写题解
执行用时分布
3 ms
击败 14.93%
消耗内存分布
8.28 MB
击败 38.06%
100%
测试用例
测试结果


题目描述
1631. 最小体力消耗路径
已解答
中等
相关标签
相关企业
提示
你准备参加一场远足活动。给你一个二维 rows x columns 的地图 heights，其中 heights[row][col] 表示格子 (row, col) 的高度。一开始你在最左上角的格子 (0, 0)，且你希望去最右下角的格子 (rows-1, columns-1)（注意下标从 0 开始编号）。你每次可以往 上，下，左，右 四个方向之一移动，你想要找到耗费 体力 最小的一条路径。
一条路径耗费的 体力值 是路径上相邻格子之间 高度差绝对值 的 最大值 决定的。
请你返回从左上角走到右下角的最小 体力消耗值 。
581
522
6 人在线
代码
提交记录
通过
全部提交记录
通过 76 / 76 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.06.13 22:05
分析
写题解
执行用时分布
75 ms
击败 59.95%
消耗内存分布
25.21 MB
击败 64.31%
8%
6%
测试用例
测试结果


题目描述
416. 分割等和子集
已解答
中等
相关标签
相关企业
给你一个 只包含正整数 的 非空 数组 nums 。请你判断是否可以将这个数组分割成两个子集，使得两个子集的元素和相等。
示例 1:
输入: nums = [1,5,11,5]
输出: true
解释: 数组可以分割成 [1, 5, 5] 和 [11] 。
示例 2:
2.6K
1.5K
95 人在线
代码
提交记录
通过
全部提交记录
通过 147 / 147 个通过的测试用例
猪猪 提交于 2026.06.13 22:03
分析
写题解
执行用时分布
63 ms
击败 70.74%
消耗内存分布
109.15 MB
击败 5.04%
6%
测试用例
测试结果