

# Opinnäytteen otsikko

Oscar Escartín

**Perustieteiden korkeakoulu**

Kandidaatintyö

Espoo 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

**Vastuuopettaja**

Prof. Oscar Kivinen

**Työn ohjaaja**

Prof. Oscar Kivinen

Copyright © 2026 Oscar Escartín

The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University.  
All other rights are reserved.



---

**Tekijä** Oscar Escartín

---

**Työn nimi** Opinnäytteen otsikko

---

**Koulutusohjelma** Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

---

**Pääaine** Matematiikka ja systeemitieteet

---

**Pääaineen koodi** SCI3029

---

**Vastuupettaja** Prof. Oscar Kivinen

---

**Työn ohjaaja** Prof. Oscar Kivinen

---

**Päivämäärä** 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

---

**Sivumäärä** 59+3

---

**Kieli** Suomi

---

**Tiivistelmä**

Tiivistelmässä on lyhyt selvitys kirjoituksen tärkeimmästä sisällöstä: mitä ja miten on tutkittu, sekä mitä tuloksia on saatu.

Tämän opinnäytteen tiivistelmäteksti kirjoitetaan opinnäytteen luettavan osan lomakkeen lisäksi myös pdf-tiedoston metadataan \thesisabstract-makron avulla (katso yllä). Kirjoita tähän luettavaan tiivistelmälomakkeeseen menevä teksti. Tässä saa olla erikoismerkkejä kuten kreikkalaiset kirjaimet ja rivinvaihto- ja kappaleenjako-merkit. Tämän tekstin on muuten oltava sama kuin metedatatiivistelmän teksti.

Jos tiivistelmäsi ei sisällä erikoismerkkejä eikä kaipaa kappaleenjakoja, voit hyödyntää makroa \abstracttext joka käyttää ylläantamaasi metedata-kelpoista tiivistelmää (katso kommentti alla).

---

**Avainsanat** Avainsanoiksi valitaan kirjoituksen, sisältöä keskeisesti, kuvaavia, käsitteitä

---

---

**Author** Oscar Escartín

---

**Title** Thesis template

---

**Degree programme** Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

---

**Major** Matematiikka ja systeemitieteet

---

**Code of major** SCI3029

---

**Teacher in charge** Prof. Oscar Kivinen

---

**Advisor** Prof. Oscar Kivinen

---

**Date** 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI** **Number of pages** 59+3 **Language** Finnish

---

**Abstract**

Your abstract in English. Keep the abstract short. The abstract explains your research topic, the methods you have used, and the results you obtained.

---

**Keywords** Resistor, resistance, temperature

---

# Sisällys

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tiivistelmä</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>Tiivistelmä (englanniksi)</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>Sisällys</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>1 Johdanto</b>                                           | <b>7</b>  |
| <b>2 Differentiaaligeometriaa</b>                           | <b>8</b>  |
| 2.1 Sileät monistot . . . . .                               | 8         |
| 2.2 Tangenttiavaruus . . . . .                              | 10        |
| 2.3 Vektoriavaruuden suunnistus . . . . .                   | 11        |
| 2.4 Suunnistus monistossa . . . . .                         | 12        |
| <b>3 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet</b>   | <b>13</b> |
| 3.1 Affinit algebralliset käyrät kompleksitasossa . . . . . | 13        |
| 3.2 Singulariteetit ja säännöllisyys . . . . .              | 16        |
| 3.3 Projektiivinen avaruus . . . . .                        | 18        |
| 3.4 Projektiiviset käyrät . . . . .                         | 19        |
| <b>4 Algebrotopologiset määritelmät</b>                     | <b>22</b> |
| 4.1 Kimput . . . . .                                        | 22        |
| 4.2 Kuidut . . . . .                                        | 23        |
| 4.3 Putket . . . . .                                        | 24        |
| 4.4 Homologiaa pintapuolisesti . . . . .                    | 26        |
| 4.5 Homologia (aksiomaattinen yritys) . . . . .             | 29        |
| 4.6 Kuidutetut avaruudet . . . . .                          | 30        |
| <b>5 Solmut ja linkit</b>                                   | <b>36</b> |
| 5.1 Perusmääritelmät . . . . .                              | 36        |
| 5.2 Torussolmut . . . . .                                   | 38        |
| 5.3 Pujonta . . . . .                                       | 39        |
| <b>6 Pujoskaavio</b>                                        | <b>40</b> |
| 6.1 Pujoskaavion synty . . . . .                            | 40        |
| 6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia . . . . .                 | 44        |
| 6.3 Monimutkainen esimerkki . . . . .                       | 46        |
| <b>7 Algebralliset käyrät ovat solmuja</b>                  | <b>47</b> |
| 7.1 Käyrän Puiseux-sarja . . . . .                          | 47        |
| 7.2 Solmujen ja polynomien yhteys . . . . .                 | 52        |
| <b>8 RPI-kaaviot äärettömyydessä</b>                        | <b>56</b> |
| 8.1 Algebrallisen käyrän pujoskaavio . . . . .              | 56        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>9 Yhteenveto</b>                           | <b>58</b> |
| <b>A Esimerkki liitteestä</b>                 | <b>60</b> |
| <b>B Toinen esimerkki liitteestä</b>          | <b>61</b> |
| <b>C Matemaattisten lauseiden todistukset</b> | <b>62</b> |

# 1 Johdanto

Merkintätapoja.

- $\approx$  homeomorfismi
- $\mathbf{L}, S$  linkki ja solmu
- $N(\mathbf{L}), N(S)$  linkin ja solmun putkiympäristö
- $M_i, L_i$  linkin osasen pituus- ja leveyspiiri
- $\#$  topologisten monistojen yhtenäinen summa
- muuta?

Tämä ei ole työn oikea johdanto vaan pikemminkin kooste prof. Kiviselle työn osioista.

Osiot 2-5 taustoittavat aihepiirin. 6 ja 7 esittelevät tärkeimmät konstruktiot, pujoskaaviot ja Puiseux-parit. Kappale 8 Dehn-kirurgiasta muuttuneen turhaksi työn edetessä, mutta ajattelin että pujosten asettaminen laajempaan 3-monistojen kirurgian kontekstiin olisi kiva. 9 palvelee päälauseen todistamista.

Kirjoitin kappaleen 3 ensimmäisenä ja se on ehkä naiivein. Paljon aikaa käytetään putkiympäristön rakentamiseen, mikä on vähän turhaa; olisin voinut vain määritellä näin:

**Määritelmä 1.1.** Linkin  $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$  putkiympäristö on kokoelma  $\{U_i\}_{i=1}^n$ , siten että  $U_i$  ovat keskenään erillisiä ja jokainen on  $S_i$ :n ympäristö.

Homologia esitetään epämuodollisesti, mutta rönsyävästi. Luulin aluksi, että homologisilla  $n$ -palloilla on keskeinen rooli teoriassa, mutta ne ovat vain yleistyksen asemassa (kun on  $n > 2$  muuttujaa). Polynomien tutkimisessahan piirretään vain  $S^3$ -palloja. Tajusin aika myöhään, että vääntyneet torukset ja niiden singulaariset ja säännölliset kuidut ovat keskeisessä asemassa. Lisään nämä kappaleeseen 3, mikä pelastaa sen turhuudelta.

Kappale 2 on peruskauraa ja melkein valmis, pl. käsite *local frame*. Onko jotain yksinkertaista tapaa määritellä tämä? Luin Leen kirjaa ja en nopeasti hoksannut asiaa, joten jätin myöhemmälle.

Kappale 4 on mielestäni hyvä, mutta siellä on lopussa virhe kuvassa 8. Virhe koskee sitä, että äärettömyyden yli mentäessä tapahtuisi kiertoa (ei tapahdu). Luulen, että se tarvitsee vielä pari lisäsivua siitä, miten käytännössä lasketaan käyriä äärettömyydessä.

Solmuteoria-kappaleen 5 on minimimäärä on ehkä valmis, mutta tuntuu kuin paljon puuttuisi. Pääosin siksi etten osaa vielä solmuteoriaa kunnolla.

Pujoskaavio-kappale 6 on pahasti kesken, koska en vieläkaan ymmärrä pujoskaavioita kunnolla. Olen varmaan puolet edistymisestääni saanut tällä viikolla (27.7.-2.8.), mutten ehdi kirjoittaa kunnolla mitään.

Puiseux-sarja-kappale 7 on vasta alussa, mutta teoriassa valmis, sillä Kollárin todistus on niin hyvä. Minun pitää vielä sisäistää se kunnolla ja kirjoittaa omin

sanoin. Vaikeimmaksi osuudeksi jäänee ymmärtää selittää, miksi Puiseux-sarja antaa iteroidun torussolmun.

Kappale 9 RPI-kaavioista on hädin tuskin alussa. En ole oikein päässyt alkuun Neumannin todistuksen lukemisessa, koska olen käyttänyt paljon aikaa pujoskaavioiden ymmärtämiseen.

Jälkiviisaana sanon, että jonkin verran aikaa on tullut tuhlattua homologiaan parissa purnaamiseen ja yleisesti pään hakkaamiseen seinään pujoskaavioiden kanssa. Olen tähän mennessä ymmärtänyt pujoskaaviot jo varmaan viidellä tavalla väärin, ja väärinymmärryksen selättäminen on aina vaikeaa ja hidasta.

Lisähuomautus: laittamiesi viimeisten paperien ansiosta minulla alkaa olla sellainen kutina, että palapeli valmistuu, tajuan pujoskaaviot. Kuudes kerta toden sanoo!

**Lause 1.2.** (i) *Pelkistetty algebrallinen käyrä  $V \subset \mathbb{C}^2$  jollakin upotuksella  $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$  määrittää RPI-pujoskaavion  $\Omega$   $V$ :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee  $n_\infty(V) = n$ , missä  $n$  on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi  $\deg(V) = \ell_{\text{root}}$ , jossa  $\ell_{\text{root}}$  on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos  $V$  on säännöllinen käyrä,  $\Omega$  on säännöllinen (määritelmä???) pujoskaavio.*

(ii) *Linkki on jonkin äärettömyyslinkin (joka voidaan valita säännölliseksi (määritelmä???), jopa hyväksi (määritelmä???) osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.*

**Ajatus.** Lause on sangen tiukasti muotoiltu, mutta sen ydinajatus on seuraava.

- i Minkälainen solmu tai pujoskaavio algebrallisella käyrällä on?
- ii Millä ehdoilla algebralliset käyrät vastaavat linkkejä ja pujoskaavioita yksi yhteen?

## 2 Differentiaaligeometriaa

Käyrien muodostamien linkkien tutkimiseen tarvitaan (sileiden) monistojen teoriaa. Monistot ovat geometrisia rakenteita, jotka muistuttavat paikallisesti euklidista avaruutta, mutta yleistyvät avaruuksiin, jotka ovat *globaalisti vääntyneitä*, mikä ilmenee paremmin pian. Algebrallisten solmujen kannalta tämä on olennaista, sillä solmujen tutkimista helpottaa niiden upottaminen monistoon. Tässä työssä noudatetaan lähteen [Lee, 2012] merkintätapoja.

*Huomautus 2.1.* Tässä osiossa, kuten kirjallisuudessa yleisesti, käsitellään  $\mathbb{R}$ -monistoja, vaikka työ muuten käsittelee  $\mathbb{C}$ -käyriä. Monistojen teoria sellaisenaan ei kuitenkaan välitä skalaareiden reaalisuudesta ja isomorfia  $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$  sallii teorian siirtämisen kompleksiluvuille.

### 2.1 Sileät monistot

Sileiden monistojen määrittely on jotakuinkin teknistä niiden ymmärrettävyyteen verrattuna. Monistoja voi ajatella  $n$ -ulotteisina pintoina, jotka  $d$ -ulotteiseen,  $d > n$ ,



Kuva 1: Yhtälön  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6\,371^2$  määrittämä monisto.

avaruuteen upotettuna näyttävät paikallisesti  $n$ -ulotteisilta tasoilta, mutta saattavat globaalisti olla vääntyneitä.

Sileä monisto on sellainen monisto, joka ei ole missään kohdin “rutussa”, jolloin sen pinnalla voi integroida ja derivoida käyriä. Esimerkiksi maapalloa voi mallintaa sileänä 2-ulotteisena monistona.

**Määritelmä 2.2.** Olkoon  $M$  topologinen avaruus.  $M$  on  $n$ -ulotteinen topologinen monisto, jos

- $M$  on Hausdorff-avaruus,
- $M$  on  $N_2$ -numeroituva avaruus eli sen topologialla on numeroituva kanta  $\mathcal{D} = \{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ , jossa  $U_i \subset M$  on avoin ja
- $M$  on paikallisesti euklidisesti  $n$ -ulotteinen: kaikilla  $p \in M$  on avoin ympäristö  $U \subset M$ , joka on homeomorfinen johonkin  $\mathbb{R}^n$ :n avoimeen osajoukkoon  $V \subset \mathbb{R}^n$ .


*Huomautus 2.3.* Usein kirjoitetaan “olkoon  $M^n$  monisto” tai “olkoon  $M$   $n$ -monisto”, joilla tarkoitetaan, että  $M$  on  $n$ -ulotteinen monisto.

**Määritelmä 2.4.** Olkoon  $M^n$  monisto.  $M$ :n koordinaattikartta on pari  $(U, \varphi)$ , jossa  $U \subset M$  on avoin ja  $\varphi : U \rightarrow \hat{U}$  on homeomorfismi avoimeen joukkoon  $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$ . Koordinaattikartan koordinaattikuvaus on  $\varphi$ .

**Esimerkki 2.5.** Yleisesti algebrallinen hyperpinta  $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0$ ,  $\nabla f \neq 0$ , määrittää  $n$ -ulotteisen moniston  $\mathbb{R}^{n+1}$ :ssä.

**Määritelmä 2.6.** Jos  $U \subset \mathbb{R}^n$ ,  $V \subset \mathbb{R}^m$ , funktio  $f : U \rightarrow V$  on sileä, jos sen jokaisella komponenttifunktiolla on jatkuvat asteen  $n$  osittaisderivaatat kaikilla  $n \in \mathbb{N}$ .

**Määritelmä 2.7.** Kuvaus  $f : A \rightarrow B$  on diffeomorfismi, jos  $f$  on bijektio ja  $f$  ja  $f^{-1}$  ovat sileitä.



Kuva 2: Abstrakti 2-monisto ja kaksi sileästi yhteensopivaa karttaa.

**Määritelmä 2.8.** Moniston  $M$  *atlas*  $\mathcal{A}$  on kokoelma karttoja  $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$  siten, että karttojen lähtöjoukot peittävät moniston  $M$ : kaikille  $p \in M$  on olemassa  $i \in I$ , jolle  $p \in U_i$ . Jos koordinaattikartat ovat pareittain sileästi yhteensopivia, eli

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

tai  $U_i \cap U_j = \emptyset$ , niin  $\mathcal{A}$  on *sileä atlas*.

**Määritelmä 2.9.** Monisto  $M$  on *sileä monisto*, jos sillä on sileä atlas.

## 2.2 Tangenttiavaruus

Keskeinen osa sileiden monistojen motivaatiota on derivoimisen mahdollistaminen avaruuksissa, jotka ovat globaalisti kaarevia. Tyypillisesti ajatellaan 1- tai 2-monistoa, käyrää tai pintaa, joka kuitenkin aina elää kolmiulotteisessa avaruudessa. Mitä jos käyrä ei olekaan upotettu  $\mathbb{R}^3$ :een? On helppo tottua ajatukseen, että monisto on upotettu isompaan avaruuteen, mutta moniulotteisemmissa monistoissa tilanne ei ole enää selvä. Esimerkiksi jos maailmankaikkeutta mallinnettaisiin monistona, mihin avaruuteen se upotettaisiin?


Alunperin derivointi määriteltiin käyrille  $\mathbb{R}^2$ :ssa tangenttien avulla. Jos monistolla ei ole ympäröivää avaruutta, minne sen tangenttisuora, -taso tai -avaruus upotettaisiin? Selvästikään tangentti ei sellaisenaan yleisty monistoille ja tarvitaan tarkempi määritelmä; sellainen, jonka ymmärtäisi myös moniston “sisällä” elävä olio. Tangenttiavaruuden määrittely alkaa derivaatan yleistyksestä derivaatiosta.

**Määritelmä 2.10.** Olkoon  $M$  sileä  $n$ -monisto ja  $p \in M$ . Olkoon  $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$  lineaarinen kuvaus. Jos se tyydyttää Leibniz-säännön

$$v(fg) = f(p)vg + g(p)vf, \quad \text{kaikille } f, g \in C^\infty(M),$$

niin  $v$  on *derivaatio*  $p$ :ssä.

Yleisyydestään huolimatta derivaatiota kannattaa ajatella minä tahansa moniston pinnan suuntaisena vektorina, joka on kiinnitetty pisteeseen  $p$ . Luonnollisesti seuraa, että kaikki mahdolliset tällaiset vektorit, eri suuntaiset ja pituiset, muodostavat monistoa  $p$ :ssä sivuavan vektoriavaruuden. Tätä kutsutaan tangenttiavaruudeksi.



Kuva 3: Maapallon (kuva 1) tangenttiavaruus noin Helsingin kohdalla.

**Määritelmä 2.11.** Kaikkien derivaatioiden joukko  $p$ :ssä, merkitään  $T_p M$ , on  $M$ :n tangenttiavaruus  $p$ :ssä. Jos  $v \in T_p M$ , niin  $v$  on *tangenttivektori*  $p$ :ssä.

Joissakin tapauksissa hyödyllinen on myös konsepti, joka niputtaa kaikki tangenttiavaruudet yhteen.

**Määritelmä 2.12.** Moniston  $M$  *tangenttikimppu* on erillinen yhdiste

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M.$$

## 2.3 Vektoriavaruuden suunnistus

Toisin kuin tutuissa vektoriavaruuksissa  $\mathbb{R}^3 \cong \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$ , yleisessä vektoriavaruudessa  $V$  ei ole päivän selvää tapaa määrittää ”positiivista” tai ”negatiivista” suuntaa.

**Esimerkki 2.13.** Olkoon  $V$  2-ulotteinen vektoriavaruus, jonka kanta on  $\{\sin \theta, \cos \theta\}$ . Kumpi suunnistetuista kannoista  $(\sin \theta, \cos \theta)$  ja  $(\cos \theta, \sin \theta)$  on positiivinen? Huomaa, että kyseessä on funktioiden, jotka voidaan esittää sinin ja kosinin lineaariyhdistelyinä, vektoriavaruus, ja  $\theta$  on vain yleinen muuttuja, eikä saa mitään arvoja.

Vektoriavaruuden tai moniston oikeaoppinen suunnistus voidaan kuitenkin kääntää muodollisiksi matemaattisiksi ilmaisuiksi *differentiaalimuotojen* avulla. Aloitetaan kuitenkin hyvin määritellyistä suunnistuksista.

**Määritelmä 2.14.** Olkoon  $V$  reaalin  $n$ -vektoriavaruus. Kaksi suunnistettua kantaa  $(e_1, \dots, e_n)$  ja  $(f_1, \dots, f_n)$  ovat *yhtäpitävästi suunnistettuja*, jos niiden muuntomatriisille, jonka määrittää yhtälö

$$e_i = B_i^j f_j,$$

pätee  $\det(B_i^j) > 0$ .

Tämä muuntomatriisi määrittää ekvivalenssirelaation, joka jakaa kannat kahteen joukkoon.

**Lemma 2.15.** *Vektoriavaruuden yhtäpitävä suunnistus on sen kantojen ekvivalenssirelaatio, jolla on tasan kaksi ekvivalenssiluokkaa.*

*Todistus.* Olkoot  $K_\alpha = \{\alpha_i\}_{i=1}^n$  ja  $K_\beta = \{\beta_i\}_{i=1}^n$  kaksi suunnistettua kantaa. Olkoon  $B$  muuntomatriisi, joka määrittää yhtälön

$$\alpha_i = B_i^j \beta_j.$$

Merkitään  $K_\alpha \sim K_\beta$ , jos  $\det(B) > 0$ . Tällöin  $\sim$  on ekvivalenssirelaatio, sillä

- $K_\alpha \sim K_\alpha$ , sillä  $\det(I) = 1 > 0$ ,
- Jos  $K_\alpha \sim K_\beta$ , niin  $\det(B) > 0$ , jolloin  $\det(B^{-1}) = 1/\det(B) > 0$ , joten  $K_\beta \sim K_\alpha$  ja
- Jos  $K_\alpha \sim K_\beta$  ja  $K_\beta \sim K_\gamma$ , niin  $\det(B) > 0$  ja  $\det(C) > 0$ , jolloin  $\det(BC) = \det(B)\det(C) > 0$ , joten  $K_\alpha \sim K_\gamma$ .

Jos  $\det(B) > 0$ , niin  $K_\alpha$  ja  $K_\beta$  ovat yhtäpitävästi suunnistettuja. Jos  $\det(B) < 0$ , niin  $K_\alpha$  ja  $K_\beta$  eivät ole yhtäpitävästi suunnistettuja. Tapaus  $\det(B) = 0$  on mahdoton, sillä silloin  $K_\alpha$  tai  $K_\beta$  ei olisi kanta. Siispä kaikkien suunnistettujen kantojen joukoille  $\{K_\alpha\}$  pätee

$$\frac{\{K_\alpha\}}{\sim} = \{1, -1\}.$$

□

Matemaatikon tehtäväksi jää määritellä toinen näistä luokista “positiiviseksi” ja toinen “negatiiviseksi”. Tämän jälkeen voidaan määritellä suunnistus vektoriavaruudessa.

## 2.4 Suunnistus monistossa

Moniston  $M$  suunnistus määritellään sen tangenttiavaruuden suunnistuksen kautta.

**Määritelmä 2.16.** Olkoon  $M$  sileä  $n$ -monisto.  $M$ :n *pisteittäinen suunnistus* on suunnistuksen valinta jokaiselle tangenttiavaruudelle  $T_p M$ ,  $p \in M$ .

Sellaisenaan tämä ei ole järkevä hyödyllinen määritelmä, sillä suunnistus voi vaihdella pisteestä toiseen. Toivottavaa olisi etenkin, että moniston sileillä alimonistoilla (käyrillä), suunnistus ei vaihtelisi positiivisen ja negatiivisen välillä.

Moniston globaalin suunnistuksen määrittelemiseksi tarvitaan vielä pari konseptia. Intuitiivisesti moniston suunnistukseen liittyy aina jonkinlainen jatkuva “virtaus”, joka määrittää positiivisen suunnan. Määritellään tämä virtaus vektorikenttien avulla.

**Määritelmä 2.17.** Moniston  $M$  *vektorikenttä*  $X$  on sileä kuvaus  $X : M \rightarrow TM$ , jossa  $TM$  on moniston  $M$  tangenttikimpu, siten että

$$\pi \circ X = \text{id}_M,$$

jossa  $\pi : TM \rightarrow M$  on tangenttikimpuun projektiokuvaus  $\pi : T_p M \mapsto p$ . Vektorikenttä  $X$  on konkreettisesti kuvaus  $p \mapsto X_p$ , kun  $X_p$  on jokin derivaatio  $p$ :ssä.

On hyvä huomata, ettei edellä määritetty vektorikenttä ole vielä *sileä*, eikä sileyden käsitettä vektorikentälle määritelty itse asiassa lainkaan. Lee [Lee, 2012] perehdyttää kappaleessa 8 asiaan perinpohjaisesti ja tässä työssä tyydytään vain konseptuaaliseen ajatukseen sileästä ja jatkuvasta vektorikentästä.

**Määritelmä 2.18.** Olkoon  $M$  sileä  $n$ -monisto. Olkoon  $(e_1, \dots, e_n)$  järjestetty vektorikenttien  $e_i$   $n$ -monikko, jossa vektorikentät  $e_i$  on määritelty avoimessa joukossa  $U \subset M$ . Jos kaikissa pisteissä  $p \in U$  rajoitteet  $e_i|_p$  muodostavat  $T_p M$ :n kannan, niin  $(e_1, \dots, e_n)$  on *paikallinen kehys*  $U$ :ssa. Jos  $U = M$ , niin  $(e_1, \dots, e_n)$  on *globaali kehys*.

Paikallinen kehys on siis jokin moniston avoin osajoukko, johon voi määrittää vektorikentän, jonka virtaus ”täyttää” kaikki moniston  $n$  ulottuvuutta.

**Määritelmä 2.19.** Olkoon  $(e_i)$  tangenttikimpuun  $TM$  paikallinen kehys. Tällöin  $(e_i)$  on (*positiivisesti*) *suunnistettu*, jos  $(e_1|_p, \dots, e_n|_p)$  on (positiivisesti) suunnattu  $T_p M$ :n kanta kaikilla  $p \in U$ .

Pisteittäinen suunnistus on *jatkuva*, jos jokainen  $p \in M$  on jossakin suunnistetussa kehyksessä.

Moniston  $M$  *suunnistus* on jatkuva pisteittäinen suunnistus.

Toisin sanoen  $M$  on suunnistettu, jos sillä on olemassa avoin peite  $\mathcal{D} = \{U_p\}_{p \in M}$ , jossa jokainen  $U_p$  on sikäli erityinen, että se on paikallinen kehys. Tätä peitettä voikin ajatella avoimen peitteen asemesta erilaisena  *$n$ -ulotteisen virtauksen peitteenä*.


Selvästi jos monistolla on kaikissa pisteissä  $n$ -ulotteinen virtausalkio, jonka suunta ja muoto on yhdenmukainen läheisten pisteiden virtausalkioiden kanssa, on mielekästä sanoa monistolla olevan (globaali) ”suunnistus”.

### 3 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet

Tämän osion tarkoituksena on esitellä tiiviisti algebrallisten käyrien, projektiivisten avaruuksien ja projektiivisten käyrien määritelmän sanaston kiinnittämiseksi. Kiinnostunut lukija löytää huolellisemman tarkastelun esimerkiksi Gathmannin algebrallisen geometrian luentomuistiinpanoista [Gathmann, 2026].

#### 3.1 Affinit algebralliset käyrät kompleksitasossa

Affini algebrallinen käyrä kompleksitasossa on määritelty polynomin nollakohtien joukkona. Algebrallinen käyrä eroaa polynomista siten, että algebrallinen käyrä on jonkin polynomin nollakohtajoukko.



Kuva 4: Parabolinen pinta  $f(x, y) - z = 0$  ja algebrallinen käyrä  $f(x, y) = 0$ .

**Määritelmä 3.1.** Jos  $f \in \mathbb{C}[x, y]$  on ei-vakio polynomi, niin sen affiini algebrallinen käyrä  $C$  on

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \mid f(x, y) = 0\}.$$

Yleisesti  $n$ -ulotteinen algebrallinen hyperpinta on  $n + 1$ -ulotteisen polynomin nollakohtajoukko. Kuvassa 4 havainnollistetaan tätä 2-pinnalla ja sen  $xy$ -tasoon jättämällä ellipsillä.

**Määritelmä 3.2.** Olkoon  $S \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  joukko polynomeja.  $S$ :n (*affiini*) *varisto* on

$$V(S) := \{x \in \mathbb{K}^n : f(x) = 0 \text{ kaikille } f \in S\}.$$

Vastaavasti jos  $X \subset \mathbb{K}^n$  on mikä tahansa joukko,

$$I(X) := \{f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] : f(x) = 0 \text{ kaikille } x \in X\}$$

on  $X$ :n *ideaali*.

Tästä lähtien polynomia  $f$  vastaavaa käyrää voidaan merkitä vain  $V(f)$ .

**Määritelmä 3.3.** Olkoon  $V(f)$ ,  $f \in \mathbb{C}[x, y]$  algebrallinen käyrä. Kirjoitetaan

$$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^N a_{ij} x^i y^j, \quad N \in \mathbb{N}, a_{ij} \in \mathbb{C}.$$

Tällöin  $V(f)$ :n tai  $f$ :n aste on  $\deg(V(f)) = \deg(f) = \max\{i + j\}$ .

Varistot ja ideaalit tarjoavat tärkeän yhteyden käyrien tai pintojen geometrian ja abstraktin algebran välillä. Eräs tärkeä huomio koskee variston käyttäytymistä yhdisteiden suhteen. Olkoot  $S, T \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  kaksi kokoelmaa polynomeja. Tällöin

$x \in V(S) \cup V(T)$  kuuluu molempien polynomijoukkojen piirtämään hyperpintaan täsmälleen silloin, kun  $x$  on  $S$ :n ja  $T$ :n polynomien nollakohta. Toisin sanoen

$$V(S) \cup V(T) = V(S \cap T).$$

Jos  $S = \{f\}$  ja  $T = \{g\}$ , niin ehto muuntuu muotoon

$$V(f) \cup V(g) = V(\{f\} \cap \{g\}) = V(fg),$$

missä  $fg$  on vain polynomien tulo. Erityisen hyödyllistä tämä voi olla polynomin pelkistymättömyyden hahmottamisessa.

**Määritelmä 3.4.** Olkoon  $f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ . Polynomi  $f$  on pelkistymätön, jos kaikille  $g, h \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  siten, että  $f = gh$  pätee  $g \in \mathbb{K}$  tai  $h \in \mathbb{K}$ .

Polynomi on siis pelkistymätön jos sitä ei voi kirjoittaa kahden epävakion polynomin tulona, tai jos sen varistoa ei voi kirjoittaa kahden variston yhdisteenä!

Eräs myöhemmin hyödyllinen erityistapaus on  $n$ -pallo  $\mathbb{S}^n$ .

$$\begin{aligned} \mathbb{S}^n &= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \\ &= V(x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1) \end{aligned}$$

Intuitiivisesti lienee selvää, että tapauksessa  $n = 0$  pallo  $\mathbb{S}^0$  pelkistyy, mutta tapauksissa  $n = 1, 2$  pallon ei pitäisi pelkistyä, koska ympyrää tai pallopintaa ei voi hajoittaa pienempiin osiin. Tämä on mahdollista todistaa kaikille  $n > 0$ .

**Lemma 3.5.** Olkoon  $n > 0$  kokonaisluku. Tällöin  $n$ -pallon  $\mathbb{S}^n$  määrittelevä polynomi

$$s_n(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1$$

on pelkistymätön.

*Todistus.* Polynomin  $s_n$  aste on  $\deg s_n = 2$ . Oletetaan, että  $s_n$  on pelkistyvää. Tällöin on olemassa kaksi polynomia  $f, g \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  siten, että  $s_n = fg$  ja  $f, g$  eivät kumpikaan ole vakioita.

Tutkimalla asteita huomataan, että

$$\begin{aligned} \deg s_n &= \deg f + \deg g \\ 2 &= \deg f + \deg g. \end{aligned}$$

Koska  $\deg f, \deg g > 0$  niin  $\deg f = \deg g = 1$ . Siis  $f$  ja  $g$  ovat hypertasoja, muotoa  $c_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$ . Tällöin

$$\mathbb{S}^n = V(s_n) = V(f) \cup V(g)$$

on kahden hypertason yhdiste. Intuitiivisesti ottaen tämä on mahdotonta, sillä  $n$ -pallolla on  $n$ -ulotteista kaarevuutta jokaisessa pisteessä, mutta hypertaso on  $n$ -ulotteisesti litteä jokaisessa pisteessä.

Täsmällisesti tämä voidaan muotoilla normaalivektorin avulla. Litteän pinnan normaalivektori on pisteestä riippumatta saman suuntainen, kun taas kaarevan pinnan normaalivektori riippuu pisteestä. Normaali voidaan laskea gradientin avulla. Kirjoitetaan

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n a_i x_i^2, \quad g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n b_i x_i^2.$$

Tällöin normaalit ovat

$$\begin{aligned} \vec{n}_{s_n} : \nabla s_n &= [2x_1, \dots, 2x_n]^T \\ \vec{n}_f : \nabla f &= [a_1, \dots, a_n]^T \\ \vec{n}_g : \nabla g &= [b_1, \dots, b_n]^T. \end{aligned}$$

ja selvästi on olemassa  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$  siten, että

$$\begin{aligned} \vec{n}_{s_n}(x_1, \dots, x_n) &\neq \vec{f}(x_1, \dots, x_n), \quad \text{ja} \\ \vec{n}_{s_n}(x_1, \dots, x_n) &\neq \vec{g}(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Siispä  $s_n = fg$  on ristiriita, joten  $s_n$  on pelkistymätön. □

### 3.2 Singulariteetit ja säännöllisyys

Käyrän  $V(f)$  paikallinen muoto pisteessä  $p = (a, b) \in V(f)$  määrittyy  $f$ :n osittaisderivaattojen avulla.

**Määritelmä 3.6.** Käyrän  $V(f)$  piste  $p = (a, b) \in V(f)$  on *singulaarinen*, jos  $f$ :n osittaisderivaatat häviävät pisteessä  $p$ :


$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \quad \text{ja} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0.$$

Tällöin voidaan myös sanoa, että käyrä on *singulaarinen*.


**Määritelmä 3.7.** Jos vähintään yksi osittaisderivaatoista ei ole nolla  $p$ :ssä, niin piste on *säännöllinen*. Jos kaikki käyrän pisteet ovat säännöllisiä, niin käyrä on *säännöllinen*.

Säännöllisessä pisteessä implisiittifunktiolause takaa, että käyrä näyttää paikallisesti (kompleksimielessä,  $\dim_{\mathbb{C}}$ ) 1-ulotteiselta monistolta<sup>1</sup>, ja on mahdollista määrittellä yksikäsitteinen tangenttisuora. Kuvassa 5 on havainnollistettu singulaarisuutta. Singulaarinen käyrä voi leikata itseään tai muodostaa kärjen. Koska polynomit ovat kaikissa pisteissään derivoituvia, on singulaarisen käyrän kokonaisderivaatan oltavat huonosti käyttäytyvässä pisteessä nolla.

<sup>1</sup>Oikea termi olisi *varisto*, joka tiiviiden vuoksi jätetään määrittelemättä. Työn tarpeisiin monisto riittää hyvin.



Kuva 5: Yksi epäsingulaarinen käyrä ja kaksi singulaarista. Vasemmalta oikealle käyriä määrittävät yhtälöt ovat  $y^2 - x^3 - x^2 - 1 = 0$ ,  $y^2 - x^3 - x^2 = 0$  ja  $y^2 - x^3 = 0$ .



Kuva 6: Projektiivisessä tasossa kaksi yhdensuuntaista suoraa leikkaavat äärettömyydessä.

### 3.3 Projektiivinen avaruus

Avaruudella  $\mathbb{K}^n$  on geometrinen rajoitus: kaksi erillistä suoraa leikkaavat yleensä yhdessä pisteessä, paitsi jos ne ovat yhdensuuntaisia. Käsitteiden yhtenäistämiseksi käyttöön otetaan projektiivinen avaruus, joka lisää tavalliseen vektoriavaruuteen  $\mathbb{K}^n$  matemaattisesti hyvin määritellyn “horisontin”.

$\mathbb{K}$ -rakenteinen  $n$ -ulotteinen projektiivinen avaruus  $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$  määritellään joukoksi, joka koostuu avaruuden  $\mathbb{K}^{n+1}$  vektorisäteistä (eli niiden ekvivalenssiluokista), jotka kulkevat origon kautta.

**Määritelmä 3.8.** Olkoon  $(Z_0, \dots, Z_n) \in \mathbb{K}^{n+1} - \{0\}$ . Määritellään ekvivalenssirelaatio  $\sim$  seuraavasti:

$$(Z_0, \dots, Z_n) \sim (\lambda Z_0, \dots, \lambda Z_n) \quad \text{kaikille } \lambda \in \mathbb{K}^*.$$

Tällöin

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{K}) := \frac{\mathbb{K}^{n+1} - \{0\}}{\sim}.$$

Ekvivalenssiluokan edustaja merkitään homogeenisilla koordinaateilla  $[Z_0 : \dots : Z_n]$ .

**Asetus.** Jatkossa tarkastellaan yksinomaan kompleksista projektiivista avaruutta  $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ . Lisäksi merkitään  $\mathbb{P}^n$  pidemmän  $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$  sijasta.

Poikkeus tehdään havainnollistavien kuvien kohdalla, jotka piirretään reaaliseseen tasoon. Kompleksitasossa on liikaa ulottuvuuksia.

Projektiivisen avaruuden idea on tuoda tavalliseen avaruuteen  $\mathbb{K}^n$  myös “horisontti”, joka ajaa äärettömyyden virkaa. Kuvassa 6 on piirretty kaksi yhdensuuntaista suoraa tavalliseen  $\mathbb{R}$ -tasoon sekä projektiiviseen tasoon  $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ . Äärettömyys ei ole yksi piste, vaan kokonainen “horisonttiviiva” ja suorat leikkaavat suoraan katsojan edessä. Havaintoa siitä, että projektiivisessä tasossa äärettömyys on tasoa ympäröivä horisontti, tarkastellaan täsmällisemmin seuraavassa esimerkissä ja lemmassa.

**Esimerkki 3.9.** Tapauksissa  $n = 1$  ja  $n = 2$

- $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  (Riemann-pallo)
- $\mathbb{P}^2 \cong \mathbb{C}^2 \cup \mathbb{P}^1$ .  $\mathbb{P}^2$ :n koordinaatit ovat  $[X : Y : Z]$ , ja  $\mathbb{P}^1$  on joukko pisteitä, joilla  $Z = 0$ .

Jos tarkastellaan projektiivisten avaruuksien ulottuvuuksia reaalimielessä ( $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$ ), niin  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^1) = 2$  ja  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^2) = 6$  (vai 4?).

Esimerkin 3.9 kaava yleistyy itse asiassa kaikille  $n \in \mathbb{N}$ .

**Lemma 3.10.** *Projektiivinen avaruus on erillinen yhdiste  $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$ .*

*Todistus.* Tarkastellaan  $\mathbb{P}^n$ :n pistettä  $[Z_0 : \dots : Z_n]$ , jolla on  $n$  koordinaattia. Jos  $Z_n \neq 0$ , niin piste voidaan esittää muodossa

$$[Z_0 : \dots : Z_n] \sim \left[ \frac{Z_0}{Z_n} : \dots : \frac{Z_{n-1}}{Z_n} : 1 \right] \in \mathbb{C}^n.$$

Jos taas  $Z_n = 0$ , niin piste kuuluu  $\mathbb{P}^{n-1}$ :een. Tällöin saadaan jako  $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$ .  $\square$

Yleisen projektiivisen avaruuden  $\mathbb{P}^n$  “sisus” on  $\mathbb{C}^n$  ja “kuori äärettömyydessä”  $\mathbb{P}^{n-1}$ , joka induktiivisesti kuortaan lukuunottamatta muistuttaa  $\mathbb{C}^{n-1}$ :tä. Tämä antaa mielekkään upotuksen  $\mathbb{C}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ , jossa  $\mathbb{C}^n$  upotetaan bijektiivisesti pelkästään  $\mathbb{P}^n$ :n “sisukseen”.

Työlle relevantissa 2-ulotteisessa tapauksessa avaruus  $\mathbb{C}^2$  voidaan nähdä paikallisena karttana (tai tiheänä avoimena joukkona) projektiivisessä tasossa  $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ . Tyypillinen upotus määritellään seuraavasti:

$$\begin{aligned} \iota : \mathbb{C}^2 &\hookrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{C}) \\ (x, y) &\mapsto [x : y : 1] \end{aligned}$$

Pisteet  $\mathbb{P}^2$ :ssa, jotka eivät kuulu tämän upotuksen kuvaan, ovat muotoa  $[X : Y : 0]$ . Näiden pisteiden joukko muodostaa projektiivisen suoran  $\mathbb{P}^1$ , jota kutsutaan *suoraksi äärettömyydessä* tai *äärettömyyssuoraksi*. Lemman 3.10 hengessä  $\mathbb{P}^2 = \mathbb{C}^2 \sqcup \mathbb{P}^1$ .

Edellinen upotus ei ole kaikissa tilanteissa optimaalinen tai toimiva, mutta pääidea on, että upottaminen on erittäin helppoa.


### 3.4 Projektiiviset käyrät

Projektiivisessä tasossa  $\mathbb{P}^2$  klassinen polynomi  $f(x, y)$  ei ole hyvin määritelty, koska homogeeniset koordinaatit ovat ekvivalentteja skalaarikertoimen suhteen. Tämän vuoksi on käytettävä *homogeenistä* polynomia  $F(X, Y, Z)$ , eli polynomia, jossa kaikilla monomeilla on sama aste  $d$ . Yhtälö  $F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^d F(X, Y, Z) = 0$  on tällöin riippumaton valitusta edustajasta.

**Määritelmä 3.11** (Homogenisointi). Polynomi  $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$  voidaan *homogenisoida* määrittelemällä

$$F(X, Y, Z) = Z^d f\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right),$$

missä  $d$  on polynomin  $f$  aste.



Kuva 7: Paraabeli  $\mathbb{R}^2$ :ssa ja  $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ :ssa, jossa se muistuttaa ellipsiä.

**Määritelmä 3.12.** Projektiivinen algebrallinen käyrä  $\mathcal{C}$  määritellään homogeenisen polynomin  $F(X, Y, Z)$  nollakohtien joukkona:

$$\mathcal{C} = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2 \mid F(X, Y, Z) = 0\}.$$

*Huomautus 3.13.* Polynomin homogenisointi sallii luonnollisesti käyrän tarkastelun myös äärettömyysuoralla. Projektiivinen käyrä  $\mathcal{C}$  on aina suljettu ja kompakti, koska se on suljettu alijoukko projektivisessa avaruudessa  $\mathbb{P}^2$ , joka on itsessään kompakti.

Algebrallisen käyrän homogenisointi sallii varsin mielenkiintoisia näkökulmia tuttujen käyrien tarkasteluun. Jos tasoon piirtää paraabelin  $y = x^2$ , käyrä hajaantuu kohti äärettömyyttä  $y$ -akselin molemmin puolin. Hajaantuminen on kuitenkin symmetristä  $y$ -akselin molemmin puolin (koska  $x^2 = (-x)^2$ ). Toisin sanoen käyrä hajaantuu molemmissa haaroissaan *asymptoottisesti samankaltaisesti* eli molemmissa haaroissaan paraabeli lähestyy käytökseltään kahta yhdensuuntaista suoraa.


**Esimerkki 3.14** (Projektiivinen paraabeli). Paraabelin yhtälö on  $f(x, y) = y - x^2 = 0$ , jonka homogenisoitu muoto on  $F(X, Y, Z) = YZ - X^2 = 0$ . Konvention mukaan horisontti vastaa pisteitä, joilla  $Z = 0$ . Yhtälö äärettömyydessä on siis  $0Y - X^2 = 0$ , jolloin pakosti  $X = 0$ . Koska piste  $[0 : 0 : 0]$  on kielletty, niin  $Y \neq 0$ .

Homogeeninen paraabeli leikkaa siis äärettömyysuoran pisteessä  $[0 : Y : 0] \sim [0 : 1 : 0]$ . Tässä pisteessä käyrän osittaisderivaatat ovat

$$\frac{\partial F}{\partial X} = -2X, \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = Z, \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = Y.$$

Pisteessä  $[0 : 1 : 0]$  osittaisderivaatat ovat  $(0, 0, 1)$ , joten käyrä on säännöllinen. Tangenttisuora pisteessä  $[0 : 1 : 0]$  on siis  $Z = 0$ , eli äärettömyysuora. Tämä tarkoittaa sitä, että paraabelin molemmat haarat yhtyvät tangentialisesti äärettömyydessä.

Koska projektiivisessa avaruudessa pisteet ovat suorien ekvivalenssiluokkia, tarkoittaa asymptoottinen samankaltaisuus hajaantumisessa sitä, että haarat yhtyvät horisontissa. Tämä on piirretty kuvaan 7. Sulkeutuuko algebrallinen käyrä aina äärettömyydessä? Ei välttämättä. Kartioleikkauksista hyperboli antaa vastaesimerkin.



Kuva 8: Hyperboli  $\mathbb{R}^2$ :ssa ja  $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ :ssa.

Annetuista esimerkeistä hyperboli on itse asiassa kiinnostavin, sillä se paljastaa jotakin oleellista projektiivisen avaruuden rakenteesta, nimittäin sen, että avaruutta ympäröivä horisontti ei ole yksinkertaisesti vain ympyrä. Tilannetta havainnollistetaan jokseenkin monimutkaisessa kuvassa 8. Kuvassa vasemmalla on esitetty hyperboli tutussa reaalitasossa. Kuvaan on lisäksi merkitty kaksi asymptoottisuoraa  $h_1$  ja  $h_2$ , joita kohti hyperboli suppenee neljässä eri suunnassa.

**Esimerkki 3.15** (Projektiivinen hyperboli). Hyperbolin yhtälö on  $f(x, y) = x^2 - y^2 + 1 = 0$ , jonka homogenisoitu muoto on  $F(X, Y, Z) = X^2 - Y^2 + Z^2 = 0$ . Horisontti vastaa pisteitä, joilla  $Z = 0$ . Yhtälö äärettömydessä on siis  $X^2 - Y^2 = 0$ . Tällöin

$$\begin{aligned} X^2 - Y^2 &= 0 \\ (X - Y)(X + Y) &= 0, \end{aligned}$$

jolloin  $X = \pm Y$ . Tämä vastaa pisteitä  $[X : Y : 0] \sim [1 : 1 : 0]$  ja  $[X : -Y : 0] \sim [1 : -1 : 0]$ . Nämä pisteet vastaavat hyperbolin kahta asymptoottisuoraa  $h_1$  ja  $h_2$ .  $F$ :n osittaisderivaatat ovat

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 2X, \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = -2Y, \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = 2Z.$$

Tangenttisuorat pisteissä  $[1 : 1 : 0]$  ja  $[1 : -1 : 0]$  ovat siis  $X - Y = 0$  ja  $X + Y = 0$ . Nämä vastaavat suoria  $h_2$  ja  $h_1$ .

Oikealla on päällekkäin kaksi reaalista projektiivista tasoa. Keskitytään ensiksi alempaan tikku-ukkoon. Kuten edellisissä kuvissa, tikku-ukko seisoo origossa ja katsoo horisonttiin. Tämä vastaa vasemmanpuoleisen kuvan ylemmää puolitasoa  $y > 0$ . Hyperboli on piirretty tasaisella viivalla ja se törmää horisonttiin kahdessa pisteessä muodostaen ellipsin. Tikku-ukon avaruuden oikealla puolella on ympyrä, joka esittää positiivisen kiertosuunnan.

Mitä tapahtuu horisontin takana, johon on piirretty katkoviivaa? Siirrytään takaisin vasemmanpuoleiseen kuvaan  $\mathbb{R}^2$ :een. Oletetaan, että tikku-ukko lähtee kävelemään paraabelia pitkin luoteeseen ja että hän saapuu äärettömyyteen. Äärettömyydessä hänen pistettään vastaa asymptoottinen suora  $h_1$ , mutta hän olisi voinut kulkea myös kaakkoon päästäkseen tähän pisteeseen! Toisin sanoen kävelemällä eteenpäin äärettömyyteen ja sen yli, tikku-ukko päätyykin alapuoliseen tasoon ( $y < 0$ ). Jos hän jatkaa matkaa, hän saapuu ennen pitkää takaisin origoon.

Tikku-ukon matkalla avaruus on kuitenkin kääntynyt 180 astetta. Tätä havainnollistavat kuvan oikealla laidalla olevat kiertoympyrät, jotka kääntyvät 180 astetta avaruuden yli mentäessä. Jos origon tienoilta lähtisi armeija tikku-ukkoja ympyrämuodostelmassa kävelemään kohti äärettömyyttä, he päätyisivät ennen pitkää takaisin origoon, mutta heidän ympyränsä olisi nyt kääntynyt 180 astetta alkuperäisestä. Tämä johtuu siitä, että projektiivisessä avaruudessa luode vastaa kaakkoa ja koillinen lounasta. Tilanteen voi onneksi korjata kävelemällä uudestaan äärettömyyden yli.

Projektiivista tasoa ei siis ympäröikään ympyrä, vaan ympyrä jossa kaksi vastakkaisista pistettä ovatkin sama piste. Kyseessä on siis puoliympyrä, mutta miten puoliympyrä voi ympyröidä avaruutta, jossa on kuitenkin ympyrän verran liikkumasuuntia? Jätämme tämän lukijan pohdittavaksi.

## 4 Algebrotopologiset määritelmät

Tässä työssä solmujen ominaisuuksien tutkimiseen tarvitaan topologiaa työkaluja. Tämän osion päätarkoituksena on määritellä harvinaisia, solmuteorialle tyypillisiä konstruktioita ja peruskäsitteistö oletetaan lukijan hallitsemaksi.<sup>2</sup> Algebrallisen topologian käsitteistössä seuraillaan Hatcherin [Hatcher, 2002] kirjaa.

Tämä osio palvelee kahta tarkoitusta: putkiympäristön käsitteen kehittämistä sekä teknisempää todistusta siitä, että kahden homologisen  $n$ -pallon yhteen pujominen<sup>3</sup> tuottaa homologisen  $n$ -pallon. Käyrän putkiympäristöä voi ajatella pienenä käyrää seurailevana täytettynä putkena. Homologisia palloja koskeva lause varmistaa, että kun kaksi eri avaruuksissa elävää solmua pujotaan yhteen, elää tulossolmu myös “hyvänlaatuisessa” avaruudessa.

Formaaleista muotoiluista kiinnostunut lukija voi tutustua osakappaleisiin tarkemmin, mutta niiden sivuuttaminen ei estä lainkaan myöhempiin kappaleisiin perehtymistä.


### 4.1 Kimput

Kuitukimppua voidaan pitää topologisten avaruuksien tulon  $X \times Y$  yleistyksenä sikäli, että se sallii “vääntyneen” tulon. Vektorikimppu on kuitukimppun erityistapaus.

**Määritelmä 4.1** (Kuitukimppu). *Kuitukimppu* on nelikko  $(E, B, \pi, F)$ , missä  $E, B$  ja  $F$  ovat topologiaa avaruuksia ja  $\pi : E \rightarrow B$  jatkuva surjektio, joka tyydyttää

<sup>2</sup>Topologian peruskäsitteistöä tuntematonta lukijaa suositetaan perehtymään esimerkiksi tiiviiseen luentomuistiinpanoon [Koski, 2024] tai syvällisempään johdantoon [Munkres, 2000].

<sup>3</sup>Pujominen määritellään solmuja koskevassa kappaleessa ???



Kuva 9: Möbius-nauha.

paikallisen triviaaliuden ehdon (alla). Sivun 386 alg. top. kirjasta.

*Huomautus 4.2.* Jos  $E$  on muotoa  $A \times B$ , puhutaan “triviaalista  $A$ -kimpusta yli  $B$ :n”.

Kuitukimppun pitää olla paikallisesti triviaali eli muistuttaa tavallista tuloa, mutta globaalisti sen geometria voi olla vääntynyt. Kuva 9 esittää epätriviaalisti vääntynyttä sylinteriä  $\mathbb{S}^1 \times I$ , missä  $I \subset \mathbb{R}$ , eli Möbius-nauhaa.

**Määritelmä 4.3** (Vektorikimppu). Olkoon  $M$  topologinen avaruus. Asteen  $k$   $\mathbb{K}$ -vektori**kimppu**  $M$ :n yli on jatkuvalla surjektiolla  $\pi : E \rightarrow M$  varustettu topologinen avaruus  $E$  siten, että

1. kaikille  $p \in M$  kuitu  $E_p = \pi^{-1}(p)$  yli  $p$ :n voidaan varustaa  $k$ -ulotteisen  $\mathbb{K}$ -vektoriavaruuden rakenteella ja
2. kaikille  $p \in M$  on olemassa  $p$ :n ympäristö  $U \subset M$  ja homeomorfismi  $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{K}^k$  siten, että
  - $\pi_U \circ \Phi = \pi$  (jossa  $\pi_U : U \times \mathbb{K}^k \rightarrow U$  on projektio) ja
  - kaikille  $q \in U$   $\Phi|_{E_q}$  on vektoriavaruusisomorfia  $E_q \cong \{q\} \times \mathbb{K}^k \cong \mathbb{K}^k$ .

**Esimerkki 4.4.** Esimerkiksi pallo ja sen tangenttikimppu muodostavat vektorikimppun  $\pi : TS^2 \rightarrow S^2$ , jossa projektio määritetään  $T_p S^2 \mapsto p$  eli pisteeseen, jossa tangenttiavaruus kiinnittyy palloon. Tässä jokainen kuitu voidaan varustaa 2-ulotteisella  $\mathbb{R}$ -rakenteella.

Pallo ja tangenttikimppu ovat esimerkkejä globaalisti triviaalista vektorikimppusta, jossa ei ole vääntöä. Yleisemmässä vektorikimppujen tapauksessa puhutaan tangenttiavaruuksien sijaan tangenttikuidusta, jossa voi olla globaalia vääntöä.

## 4.2 Kuidut

Siinä missä kuitukimppu yleistää topologisen tulon, kuidutus yleistää kuitukimppun. Kuidutuskonstruktio on hankala käsittää ja se esitetään tässä pääosin vain myöhempiä konstruktioita, putkiympäristöä, varten.

**Määritelmä 4.5** (Homotopinen nosto-ominaisuus). Kuvaus  $\pi : E \rightarrow B$  tyydyttää *homotopisen nosto-ominaisuuden* avaruudelle  $X$ , jos

- kaikille homotopioille  $g : X \times [0, 1] \rightarrow B$  ja
- kaikille kuvauksille  $\tilde{g}_0 : X \rightarrow E$  nostaen  $g_0 = g(\cdot, 0)$ :n, eli  $p \circ \tilde{g}_0 = g_0$ ,

on olemassa homotopia  $\tilde{g} : X \times [0, 1] \rightarrow E$  nostaen  $g$ :n (eli  $g = p \circ \tilde{g}$ ) niin, että  $\tilde{g}_0 = \tilde{g}|_{X \times \{0\}}$ . Kommutoiva kaavio havainnollistaa tilanteen:

$$\begin{array}{ccc} X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{g}_0} & E \\ \downarrow & \nearrow \tilde{g} & \downarrow \pi \\ X \times [0, 1] & \xrightarrow{g} & B \end{array} \quad (1)$$

**Määritelmä 4.6.** *Kuidutus* on kuvaus  $\pi : E \rightarrow B$ , jolla on homotopinen nosto-ominaisuus kaikkien avaruuksien  $X$  suhteen.

**Määritelmä 4.7.** Olkoon  $\pi : E \rightarrow B$  kuidutus. Kuidutus on *paikallisesti triviaali*, jos kaikille  $x \in B$  on olemassa avoin ympäristö  $U \subset B$  ja  $F \subset E$  siten, että

$$\pi^{-1}(U) \approx U \times F.$$

**Määritelmä 4.8.** Jos  $E$  on pohja-avaruuden  $B$  kuitukimppu  $\pi : E \rightarrow B$ , niin *kuitukimppun sektio* on jatkuva kuvaus  $\sigma : B \rightarrow E$  siten, että  $\pi \circ \sigma = \text{id}_B$ .

### 4.3 Putket

**Määritelmä 4.9.** Olkoot  $S, M$ :  $S \subset M$  sileitä monistoja.  $S$ :n *putkiympäristö*  $M$ :ssä on pari  $(\pi, J)$ , jossa  $\pi : E \rightarrow S$  on vektorikimppu ja  $J : E \rightarrow M$  on sileä kuvaus, siten että


- $J \circ 0_E = i$ ,  $i$  on upotus  $S \hookrightarrow M$  ja  $0_E$  nollasektio
- on olemassa avoimet joukot  $U \subset E$ ,  $V \subset M$  siten, että  $0_E[S] \subset U$  ja  $S \subset V$  niin, että rajoitus  $J|_U$  on diffeomorfismi.

Yksinkertainen esimerkki saadaan käyrästä  $\mathbb{R}^3$ :ssa. Sen putkiympäristö on käyrää seuraileva kolmiulotteinen mato, jonka poikkileikkaukset ovat tasojoukkoja, joiden muoto vaihtelee, mutta käyrän suuntaisesti aina sileästi. Käyrän putkiympäristön läpileikkaus ei välttämättä ole täydellinen ympyrälevy keskusakselin (käyrän) ympäri, mutta topologisesti se on aina ympyrälevy. Esimerkki kuvassa 10.

**Lause 4.10** (Putkiympäristölause). *Jokaisella sileän moniston upotetulla sileällä alimonistolla on putkiympäristö.*

*Todistus.* Todistus on vaikea ja löytyy lähteestä ???.

□



Kuva 10: 3-monistoon upotettu suljettu käyrä, jolle piirretty pätkä mielivaltaista putkiympäristöä.

**Määritelmä 4.11.** Olkoon  $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$  polynomikuvaus. Sen kuitua  $f^{-1}(c), c \in \mathbb{C}$  kutsutaan *säännölliseksi*, mikäli jollekin  $c$ :n ympärisölle  $D$  kuvaus  $f|_{f^{-1}(D)} : f^{-1}(D) \rightarrow D$  on paikallisesti triviaali  $C^\infty$ -kuidutus.

Kuitu  $f^{-1}(c)$  on *säännöllinen äärettömyydessä*, jos jollekin  $c$ :n ympäristölle  $E$  ja kompaktille osajoukolle  $K \subset \mathbb{C}^2$  kuvaus  $f|_{f^{-1}(D)-K}$  on paikallisesti triviaali kuidutus.

Jos kaikki  $f$ :n kuidut ovat säännöllisiä äärettömyydessä niin  $f$  on *hyvä*.

*Huomautus 4.12.* “Säännöllinen” ja “säännöllinen äärettömyydessä ja epäsingulaarinen” ovat yhtäpitäviä.

**Ajatus.** Säännöllisyys on matemaattinen muotoilu idealle, että läheiset kuidut “näyttävät samalta” kuin  $f^{-1}(c)$ . Säännöllisyys äärettömyydessä muotoilee tämän samalta näyttämisen äärettömyyden “lähellä”.

## 4.4 Homologiaa pintapuolisesti

Homologia on sisällöltään runsas ja tekninen matematiikan osa-alue, jonka tarkoituksena on tutkia topologisten avaruuksien rakennetta ja reikiä. Homologian ehtisi tässä työssä esitellä vain lyhyesti, mikä ei tee aihepiirille oikeutta syvyytensä vuoksi; siispä aiheen esittely ohitetaan tässä työssä, mutta kiinnostunutta lukijaa ohjataan tutustumaan erinomaiseen Hatcherin materiaaliin [Hatcher, 2002]. Tässä tarkastellaan vain soluhomologiaa, hieman yksinkertaistettua homologian teoriaa.

Tässä aliosiossa esitetään kuitenkin lyhyt motivaatio homologialle sekä määritelmään pari työssä keskeistä käsitettä. Määritelmät tarjoillaan intuitiivisen selityksen kera, homologiaa tuntematonta lukijaa silmälläpitäen.

**Ajatus.** Homologia tutkii topologisten avaruuksien *erilaisuutta* avaruuksien *reikäisyyden* kautta. Reikäisyys on yllättävän vaikeaa määritellä, mutta se auttaa myös yllättävän hyvin erottelemaan avaruuksia toisistaan, esimerkiksi pallon ja toruksen.

**Esimerkki 4.13.** Ympyrä  $\mathbb{S}^1$  ja kahdeksikko eivät ole homologisia. Ympyrä sulkee sisäänsä yhden reiän, kahdeksikko kaksi reikää.

Ympyrän sulkema reikä on olemassa, koska ympyrä muodostaa silmukan. On tärkeää huomata, että silmukka on yksiulotteinen. Korkeamman asteen reiän sulkee sisäänsä  $\mathbb{S}^2$ , joka on kaksiulotteinen. Tämäkin on tosiaan reikä; siihen ei voi päästä kolmiulotteisessa avaruudessa käsiksi kulkematta  $\mathbb{S}^2$ :n pinnan läpi, mutta neljättä ulottuvuutta pitkin reiän läpi voi kulkea koskematta  $\mathbb{S}^2$ :een.

Käytännössä homologiassa lasketaan homologiaryhmiä  $H_n(X)$ , missä  $X$  on topologinen avaruus. Alaindeksi  $n \in \mathbb{Z}$  kertoo, että kyseessä on  $n$ :s homologiaryhmä, joka tavallaan mittaa avaruuden  $n$ -ulotteisia reikiä. Muitakin kuin kokonaislukukertoimia voisi käyttää, mutta tässä työssä rajoitutaan selkeyden vuoksi kokonaislukukertoimiin.

**Esimerkki 4.14.** Ympyrälle  $\mathbb{S}^1$  homologiaryhmät ovat

$$H_i(\mathbb{S}^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 1 \\ 0, & i > 1 \end{cases}.$$

Nollas homologiaryhmä  $H_0$  mittaa avaruuden yhtenäisten komponenttien määrää.  $H_0(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$  tarkoittaa, että ympyröitä voisi olla  $k$  kappaletta liimattuna päällekkäin,  $k \in \mathbb{Z}$  tai nolla, jos  $k = 0$ .

$H_1$  mittaa 1-ulotteisten silmukoiden muodostamien reikien määrää.

$H_n$  mittaa  $n$ -ulotteisten "silmukoiden" jättämien reikien määrää, mutta  $\mathbb{S}^1$ :llä ei ole  $n$ -ulotteisia silmukoita.

**Esimerkki 4.15.** Pallon  $\mathbb{S}^2$  tapauksessa  $H_2(\mathbb{S}^2) = \mathbb{Z}$ , mutta  $H_1(\mathbb{S}^2) = 0$ , koska pallon pinnalle piirretyn ympyrän voi aina kiristää pisteeksi, mutta pinnan sisäänsä sulkevaa huppua ei voi.

Mitä ympyröiden homologiaryhmiin tulee, lukija saattoi huomata jo kaavan, joka todistetaan lemmassa 4.16.

**Lemma 4.16.** *Kaikille  $n$ -palloille  $\mathbb{S}^n$  pätee*

$$\begin{aligned} H_0(\mathbb{S}^n) &= H_n(\mathbb{S}^n) = \mathbb{Z}, \\ H_k(\mathbb{S}^n) &= 0, \quad k \neq n. \end{aligned}$$

*Todistus.* Todistus perustuu *Mayer-Vietoris-jonoon*, joka on hieman edistynyt homologian konstruktio. Tiiviyn vuoksi todistus sivuutetaan, mitä puoltaa se, että tulos on yleisesti tunnettu ja hyväksytty.  $\square$

Kenties tärkein homologian sovellutus tässä työssä on vielä esittelemättä. Vilkaistaan toruksen homologiaryhmiä.

**Esimerkki 4.17.** Toruksella  $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$  on mielenkiintoisempia ryhmiä:

$$H_i(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & i = 1 \\ 0, & i > 2 \end{cases}$$


Ryhmä  $H_1$  selittyy sillä, että toruksen pinnalle voi piirtää kaksi silmukkaa, joita ei voida muuntaa toisikseen: toruksen ison akselin ympäri, sekä toruksen paksuutta pitkin. Tämä on havainnollistettu kuvassa 11

Jos  $S \subset \mathbb{T}^2$  on toruksen pinnalla kulkeva suljettu, itseään leikkaamaton, suunnattu käyrä niin sen voi kuvata yksiselitteisesti toruksen homologia-akseleiden avulla. Tällaiset käyrät ovat tärkeä konstruktio tässä työssä, joten seuraava määritelmä on mielekäs.

**Määritelmä 4.18.** Olkoon  $\mathbf{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$  täytetty torus. Olkoot  $Y, P \subset \mathbf{T}^2$  suunnistettuja, yksinkertaisia, suljettuja käyriä, jotka edustavat ekvivalenssiluokkia

$$\begin{aligned} Y \sim 0, \quad P \sim \mathbb{S}^1 \quad & H_1(\partial \mathbf{T}^2)\text{:ssa}; \\ \ell(Y, \mathbb{S}^1) &= 1, \quad \ell(P, \mathbb{S}^1) = 0, \end{aligned}$$

missä  $\sim$  on isotopiarelaatio (MÄÄRITELMÄ???) ja  $\ell(\cdot, \cdot)$  on käyrien linkkiluku (määritelmä 5.6).



Kuva 11: Toruksen kaksi homologia-akselia.

## 4.5 Homologia (aksiomaattinen yritys)

Tämä on vähän epätoivoinen yritys sisällyttää homologia työhön. Poistetaan tämä ja laitetaan ylempään homologiaosioon pari määritelmää ja lausetta.

Tämän aliosion tarkoitus on kiinnittää työssä käytettävä homologian sanasto. Työn tiivis esitys ei tee oikeutta homologialle ja homologiaa tuntematonta lukijaa suositellaankin sivuuttamaan osio, tai tutustumaan homologiaan Hatcherin kirjan avulla [Hatcher, 2002]. Aliosio on pikemminkin suunnattu homologiaa tuntevalle lukijalle, joka haluaa varmistaa termistön, tai palata työn myöhemmistä osioista tarkistamaan määritelmiä. Sanastossa noudatetaan kuitenkin yleisiä tapoja, joten myös homologiaa tunteva lukija voi sivuuttaa aliosion.

**Määritelmä 4.19.** *CW-kompleksi* on topologinen avaruus  $X$ , joka muodostetaan algoritmisesti:

1. Valitaan diskreetti joukko  $X^0$ , jonka alkioita kutsutaan  $X$ :n *0-soluiksi*.
2. Muodostetaan induktiivisesti  $n$ -luuranko  $X^n$   $X^{n-1}$ :stä liittämällä  $n$ -soluja  $e_\alpha^n$  kuvauksilla  $\varphi_\alpha : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ .  $X^n$  on tekijä-avaruus

$$X^n = \frac{X^{n-1} \sqcup_\alpha D_\alpha^n}{\sim}, \quad (2)$$

missä  $\sim$  on relaatio  $x \sim \varphi_\alpha(x)$ , kun  $x \in \partial D_\alpha^n$ . Joukon  $D_\alpha^n - \partial D_\alpha^n$  kuva tekijä-kuvauksen suhteen ja solu  $e_\alpha^n$  ja ovat homeomorfisia.

3. Jatkamalla prosessia saadaan  $X = \cup_n X^n$  ja se voidaan varustaa heikolla topologialla:  $A \subset X$  on avoin (suljettu) jos ja vain jos  $A \cap X^n$  on avoin (suljettu)  $X^n$ :ssä kaikille  $n \in \mathbb{N}$ .

**Aksiooma 4.20** (Homologia-aksioomat). 1. Jos  $f \cong g : X \rightarrow Y$  niin  $f_\bullet = g_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$ .

2. On olemassa reunahomomorfismit  $\partial : \tilde{h}_n(X/A) \rightarrow \tilde{h}_{n-1}(A)$  määritelty kaikille CW-pareille  $(X, A)$ , siten että jono

$$\cdots \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_n(A) \xrightarrow{i_\bullet} \tilde{h}_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_n(A) \xrightarrow{i_\bullet} \cdots \quad (3)$$

on tarkka. Jonossa  $i$  on inklusio ja  $q$  tekijäkuvaus.

**Määritelmä 4.21.** Pelkistetty homologiateoria antaa epättyhjille CW-komplekseille  $X$  jonon

- abelisia ryhmiä  $\tilde{h}_n(X)$  ja
- homomorfismeja  $f_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$  jokaista CW-kompleksien välistä kuvausta  $f : X \rightarrow Y$  kohden, siten että

$$\begin{aligned} - (fg)_\bullet &= f_\bullet g_\bullet \\ - \mathbb{1}_\bullet &= \mathbb{1}, \end{aligned}$$

siten, että homologia-aksioomat pitävät.

## 4.6 Kuidutetut avaruudet

Ok ilmeisesti kuidutetut torukset on aika tärkeä juttu ja kuidutetut Seifert-monistot (avaruudet?) myös. Tähän tulis selitystä niistä.

<https://ncatlab.org/nlab/files/JankinsNeumann-SeifertManifolds.pdf>

Aloitetaan kuidutettujen avaruuksien käsittely monistojen perustuloksesta, jonka mukaan  $\mathbb{S}^3 = \mathbb{T}^2 \cup \mathbb{T}^2$ . Tulos on kätevä, sillä toruksia on helppo kuiduttaa, kuten kuvassa 12, ja kaksi epätriviaalisti kuidutettua torusta yhdistämällä voi saada epätriviaalisti kuidutetun 3-pallon.

**Lemma 4.22.** *Jos  $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$ , niin  $\mathbb{S}^3 = \mathbb{T}^2 \cup \mathbb{T}^2$ .*

*Todistus.* Helpoin todistus saadaan käyttämällä yleisesti tunnettua kaavaa

$$\partial(X \times Y) = (\partial X \times \bar{Y}) \cup (\bar{X} \times \partial Y).$$

Huomataan lisäksi, että  $\mathbb{D}^4 = \mathbb{D}^2 \times \mathbb{D}^2$  (samoin kuin  $\mathbb{D}^2 = \mathbb{D}^1 \times \mathbb{D}^1$ ). Tällöin koska  $\mathbb{S}^3 \approx \partial \mathbb{D}^4$ ,

$$\begin{aligned} \mathbb{S}^3 &\approx \partial(\mathbb{D}^2 \times \mathbb{D}^2) \\ &= (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2) \cup (\mathbb{D}^2 \times \mathbb{S}^1) \\ &= \mathbb{T}^2 \cup \mathbb{T}^2, \end{aligned}$$

mikä oli haluttu tulos. □

*Huomautus 4.23.* Todistuksessa nähdään, että  $\mathbb{S}^3 = (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2) \cup (\mathbb{D}^2 \times \mathbb{S}^1)$ . On hyvä huomata, että kahdessa tulossa ympyrän  $\mathbb{S}^1$  ja levyn  $\mathbb{D}^2$  paikka vaihtuu. Geometrisesti tämä tarkoittaa sitä, että kaksi torusta  $\mathbb{T}_1^2, \mathbb{T}_2^2$  liimataan yhteen pintojaan myöten siten, että  $\mathbb{T}_1^2$ :n ympäryspiiri osuu  $\mathbb{T}_2^2$ :n pituuspiiriin ja toisin päin.


Työn kannalta olennainen 3-monistojen luokka on Seifert-monistot, joiden keskeinen ominaisuus on hajotelma 1-ulotteisiin kuituihin.

**Määritelmä 4.24** (Seifert-kuidutettu avaruus ja Seifert-monisto). *Seifert-kuidutettu avaruus* on avaruus, joka voidaan esittää erillisten ympyröiden  $\mathbb{S}^1$  yhdisteenä.

*Seifert-monisto* on 3-monisto, jonka voi pujontaoperaatiolla (määritelmä 5.11) rakentaa Seifert-kuidutetuista avaruuksista.

**Esimerkki 4.25.** Sekä onnto että täytetty torus  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$  (kuva 12) ovat Seifert-kuidutettuja avaruuksia.

**Esimerkki 4.26.**  $\mathbb{S}^3$  on Seifert-monisto, koska  $\mathbb{S}^3 = \mathbb{T}^2 \sqcup \mathbb{T}^2$ . Tarkalleen ottaen  $\mathbb{S}^3$  saadaan pujomalla yhteen kaksi triviaalia solmua  $(\mathbb{S}^3, \mathbb{S}^1)$ . Siis  $\mathbb{S}^3$  voidaan hajottaa kahteen joukkoon  $\mathbb{S}^3 - \mathbb{S}^1$ , joille pätee  $\mathbb{S}^3 - \mathbb{S}^1 \approx \text{int } \mathbb{T}^2$ .



Kuva 12: Torus koostuu erillisistä ympyröistä:  $\mathbb{T}^2 = \bigsqcup_{p \in \mathbf{D}^2} \{p\} \times \mathbb{S}^1$ .

**Esimerkki 4.27.** Olkoon  $\mathbf{D}^2 \times [0, 1]$  sylinteri. Varustetaan sylinteri relaatiolla  $(x, 1) \sim (\rho_\alpha x, 0)$ , jossa  $x \in \mathbf{D}^2$  on jokin levyn piste ja  $\rho_\alpha$  on kulman  $2\pi\alpha$ ,  $\alpha \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$  suuruinen käännös keskipisteen  $0 \in \mathbf{D}^2$  ympäri.

Joukko  $\mathbf{D}^2 \times [0, 1] / \sim$  on *vääntynyt torus*. Toruksen kaikki kuidut (määrittelee) ovat vääntyneitä, lukuun ottamatta keskimmäistä kuitua, joka palaa joka kierroksella lähtöpisteeseensä. Keskikuidun tyyppistä kuitua kutsutaan *erityiskuiduksi*. Muita kuituja kutsutaan *tavallisiksi*.

Jos  $\alpha = l/k$ ,  $\text{syty}(l, k) = 1$ , toruksen ympäri täytyy kiertää  $k$  kertaa, jotta pääsee alkupisteeseen. Tällöin toruksen pienempi akseli kierretään  $l$  kertaa. Toisin sanoen tavallinen kuitu on sama kuin  $(k, l)$ -torussolmu<sup>4</sup>! Erityiskuidusta sanotaan, että sen moninkerta on  $k$ . Tämä johtuu juuri siitä, että kun tavallinen kuitu kierretään kokonaan ympäri, on matkalla  $k$  verran 1 toruksen mittaista erityiskuitua.

Tällainen keskiakselinsa ympäri vääntynyt torus osoittautuu algebrallisten solmujen kannalta keskeiseksi konstruktioksi, joten sille on hyvä antaa nimi.

**Määritelmä 4.28.** Esimerkin 4.27 mukainen joukko on *epätriviaalisti kuidutettu torus*.

Edellä on jo esitetty, että  $\mathbb{S}^3 = \mathbf{T}^2 \sqcup \mathbf{T}^2$ , kun  $\mathbf{T}^2$  ovat triviaaleja toruksia, mutta on mahdollista rakentaa  $\mathbb{S}^3$  myös vääntyneistä toruksista, minkä esittelemiseen loppu tästä osiosta käytetään. Yleisempi tapaus epätriviaalisti kuiduttuneesta avaruudesta on Seifert-kuidutus.

**Määritelmä 4.29.** *Seifert-kuidutus* on 3-monisto  $\Sigma$ , jolla on jatkuva kuvaus  $\pi : \Sigma \rightarrow B$  siten, että kaikille  $x \in B$  on olemassa ympäristö  $U_x \subset B$  siten, että  $\pi^{-1}(U_x)$  on isomorfinen jonkin epätriviaalisti kuidutetun toruksen sisukseen.

Seifert-kuidutuksella voi olla erityiskuituja, jotka vastaavat asiayhteyden epätriviaalisti kuidutetun toruksen moninkertojen  $k_i \geq 2$  erityiskuituja.

Työn kannalta erityisen tärkeä Seifert-kuidutuksen erityistapaus on  $\mathbb{S}^3$ :n kuidutus  $\mathbb{S}^1$ -kuiduilla.

**Lause 4.30.** *Olko  $k_1, k_2 \geq 2$  kokonaislukuja siten, että  $\text{syty}(k_1, k_2) = 1$ . On olemassa kuidutus  $\pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ , jolla on täsmälleen kaksi erityiskuitua kertoimilla  $k_1, k_2$ .*

Todistuksessa käytetään yleisiä ryhmäteorian konsepteja ryhmätoimintoa, kierto-rataa ja vakauttajaa.

**Määritelmä 4.31** (Ryhmätoiminto, kiertorata ja vakauttaja). Olkoon  $G$  ryhmä,  $g \in G$  ja  $S$  joukko.  $G$ :n *toiminto*  $S$ :n yli on funktio  $\alpha_g : S \rightarrow S$  siten, että

- $\alpha_e(x) = x$  ja
- $\alpha_g \circ \alpha_h(x) = \alpha_{gh}(x)$ .

Usein merkitään  $\alpha_g(x)$  asemesta vain  $g \wedge x$ . Jos  $s \in S$  niin  $G \wedge s = \{g \wedge s : g \in G\}$  on *kiertorata*  $s$ :n yli. Huomaa, että  $g \wedge s \in S$ . Alkion  $s \in S$  *vakauttaja* on  $G_s = \{g \in G : g \wedge s = s\}$ .

---

<sup>4</sup>Ks. määritelmä 5.8.

*Lauseen 4.30 analyttinen todistus.* Olkoon  $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{C}^2$  tavallinen yksikköpallo:

$$\mathbb{S}^3 = \{z, w \in \mathbb{C} : |z|^2 + |w|^2 = 1\}.$$

Olkoon  $\mathbb{S}^1$ :llä ryhmärakenne, jonka antaa parametrisointi  $e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1$ . Määritellään ryhmätoiminto  $\mathbb{S}^1$ :llä  $\mathbb{S}^3$ :n yli:

$$\alpha_t : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^3 : \alpha_t(z, w) = (t^{k_2}z, t^{k_1}w), \quad t \in \mathbb{S}^1.$$

Tämä ryhmätoiminto antaa  $\mathbb{S}^3$ :lle  $\mathbb{S}^1$ -kuidutuksen. Pistettä  $(z, w) \in \mathbb{S}^3$  vastaava kuitu on kiertorata  $\mathbb{S}^1 \wedge (z, w)$ . Kuidun moninkerta voidaan laskea pisteen vakauttajasta  $\mathbb{S}_{(z,w)}^1 = \{t \in \mathbb{S}^1 : t \wedge (z, w) = (z, w)\}$ .

- Jos  $z = 0$ , niin  $|w| = 1$ . Vakauttajan yhtälö on yksinkertaisesti  $t \wedge (0, w) = (0, w)$  eli  $(0, t^{k_1}w) = (0, w)$ , mikä implikoi  $t^{k_1} = 1$ . Ratkaisut vastaavat asteen  $k_1$  yksikköjuuria, joita on  $k_1$  kappaletta, joten  $\mathbb{S}_{(0,w)}^1 \cong \mathbb{Z}_{k_1}$ . Tämä tarkoittaa, että kiertorata kulkee  $k_1$  kertaa ympäri, joten se vastaa moninkerran  $k_1$  erityiskuitua.
- Jos  $w = 0$  niin identtisellä päättelyllä kiertorata vastaa moninkerran  $k_2$  erityiskuitua.
- Jos  $z \neq 0 \neq w$ , niin vakauttajan alkioit tyydyttävät molemmat yhtälöt  $t^{k_1} = 1$  ja  $t^{k_2} = 1$ . Koska  $\text{sy}(k_1, k_2) = 1$ , on olemassa kokonaisluvut  $n_1, n_2$  siten, että  $k_1 n_2 + k_2 n_1 = 1$ . Kirjoitetaan

$$t = t^1 = t^{k_1 n_2 + k_2 n_1} = (t^{k_1})^{n_2} (t^{k_2})^{n_1} = 1^{n_2} \cdot 1^{n_1} = 1.$$

Koska  $t = 1$  on ainoa ratkaisu, kuitujen moninkerrat ovat tässä tapauksessa 1, eli ne ovat säännöllisiä kuituja.

Siispä tässä  $\mathbb{S}^1$ -kuidutuksessa erityiskuidut ovat tismalleen tasojen  $z = 0$  ja  $w = 0$  suuntaiset kuidut. Määritellään kuvaus

$$\begin{aligned} \pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 &\rightarrow \mathbb{P}^1 \\ (z, w) &\mapsto [z^{k_1} : w^{k_2}]. \end{aligned}$$

Kuvaus on hyvin määritelty, sillä kaikille  $t \in \mathbb{S}^1$  (mistä seuraa  $t \neq 0$ )

$$\begin{aligned} \pi_{k_1, k_2}(t \wedge (z, w)) &= [(t^{k_2}z)^{k_1} : (t^{k_1}w)^{k_2}] \\ &= [t^{k_1 k_2} z^{k_1} : t^{k_1 k_2} w^{k_2}] \\ &= [z^{k_1} : w^{k_2}] \\ &= \pi_{k_1, k_2}(z, w). \end{aligned}$$

Koska  $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{S}^2$ , on kyseessä kaivattu kuvaus  $\pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ . □

Annetaan lisäksi topologinen todistus tuomaan lisäperspektiiviä avaruuden rakenteeseen.

*Lauseen 4.30 topologinen todistus.* Olkoon  $\tilde{\pi} : E \rightarrow \mathbb{S}^2$ ,  $E = \mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1$ ,  $\mathbb{S}^2$ :n triviaali  $\mathbb{S}^1$ -kuidutus. Toisin sanoen, jos  $x \in \mathbb{S}^2$ , niin  $\tilde{\pi}^{-1}(x) \approx \mathbb{S}^1$  on kokonainen ympyrä.

Jos  $\mathbf{D}^2 \subset \mathbb{S}^2$ , niin  $\tilde{\pi}^{-1}[\mathbf{D}^2] \approx \mathbf{T} \subset E$ , missä  $\mathbf{T}$  on täytetty torus. On hyvä huomata, että toruksen poikkilevy on  $\mathbf{D}^2$  ja torus kulkee kohtisuorasti  $\mathbb{S}^2$ :n pinnan läpi.

Olkoon  $\mathbb{S}^1 = \partial\mathbf{D}^2$  edellisen levyn reuna. Tällöin  $\tilde{\pi}^{-1}[\mathbb{S}^1] \approx \mathbb{T} \subset E$ . Toruksen  $\mathbb{T}$  poikkilevy on minkä tahansa  $x \in \mathbb{S}^1$  kuitu  $\tilde{\pi}^{-1}(x)$ ; siis  $\mathbb{T}$ :n ympäryspiiri on  $\mathbf{T}$ :n pituuspiiri ja toisin päin! Toisaalta silti  $\mathbb{T} = \partial\mathbf{T}$ , mutta koska pituus- ja ympäryspiirit ovat vastakkain,  $\mathbb{T}$ :n “sisus” on  $\mathbf{T}$ :n ulkopuoli.

Tavoitteena on päästä kuvaukseen  $\pi : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ . Jos on olemassa jokin hyvä konstruktio  $E \rightsquigarrow \mathbb{S}^3$ , tätä voi käyttää  $\tilde{\pi}$ :n muuntamiseen  $\pi$ :ksi. Lemman 4.22 nojalla  $\mathbb{S}^3$  on kahden toruksen yhdiste, joten yritetään liimata kaksi torusta yhteen sopivalla tavalla.

Olkoot  $\mathbf{D}_i^2 \subset \mathbb{S}^2$ ,  $i = 1, 2$ , kaksi erillistä levyä ( $\mathbf{D}_1 \cap \mathbf{D}_2 = \emptyset$ ) ja  $\mathbf{T}_i$  niitä vastaavat torukset. Olkoot  $\mathbb{S}_i = \partial\mathbf{D}_i$  levyjen reunat ja  $\mathbb{T}_i \subset E$  niitä vastaavat torukset.

Jos  $x_i \in \mathbb{S}_i^1$ , niin määritellään  $Y_i = \tilde{\pi}^{-1}(x_i)$ . Tällöin  $P_i := \mathbb{S}_i^1$  ja  $Y_i$  muodostavat homologiaryhmän  $H_1(\mathbb{T}_i)$  kannan, sillä  $P_i$  vastaa toruksen  $\mathbb{T}_i$  pituuspiiriä ja  $Y_i$  ympäryspiiriä.

Koska  $\text{sy}(k_1, k_2) = 1$ , on Bézout’n lemmän nojalla olemassa kokonaisluvut  $n_1, n_2$  siten, että

$$k_1 n_2 + k_2 n_1 = 1.$$

Tällöin pätee myös  $\text{sy}(k_i, n_i) = 1$ :

$$\begin{aligned} \text{sy}(k_i, n_i) = d &\Rightarrow d \mid k_1 n_2 + k_2 n_1 \\ &\Rightarrow d \mid 1 \\ &\Rightarrow d = 1. \end{aligned}$$

Olkoon  $C_i = k_i Y_i + n_i P_i \subset \mathbb{T}_i$  käyrä. Koska  $\text{sy}(k_i, n_i) = 1$  pätee,  $C_i$  kiertää molemmat toruksen homologia-akselit, jotka kummatkin estävät  $C_i$ :n typistämisen pisteeksi.  $C_i$ :n  $H_1$ -homologialuokka on

$$\begin{aligned} [C_i] &= [k_i Y_i + n_i P_i] \\ &= k_i [Y_i] + n_i [P_i] \end{aligned}$$

Jos pätsi  $[C_i] = 0$ , niin tällöin  $C_i$  eläisi hyvin mahdollisesti  $\mathbb{S}^3$ :ssa, sillä  $\mathbb{S}^3$  on yhdesti yhtenäinen avaruus, jossa ei ole reikiä. Siispä strategiamme on liimata  $\mathbb{T}_i$  täytetyn toruksen  $\mathbf{T}_i$  reunaan vääntämällä torusta  $\mathbf{T}_i$  siten, että

$$[k_i Y_i + n_i P_i] = [0].$$

Jos  $\mathbb{T}_i$  ja  $\mathbf{T}_i$  liimataan yhteen pintojaan pitkin *ilman vääntöä*, osuu pituuspiiri  $P_i \subset \mathbb{T}_i$  jo valmiiksi ympäryspiirin  $\mathbf{Y}_i \subset \mathbf{T}_i$  päälle. Kuitenkin tämä triviaali liimaus jättää ympäryspiirin  $Y_i \subset \mathbb{T}_i$  osumaan pituuspiirin  $\mathbf{P}_i \subset \mathbf{T}_i$  päälle ja  $[\mathbf{P}_i] \neq [0]$ . Tällöin  $H_1$ -homologialuokka olisi

$$\begin{aligned} [C_i] &= k_i [Y_i] + n_i [P_i] \\ &= k_i [\mathbf{P}_i] + n_i [\mathbf{Y}_i] \\ &= k_i \mathbb{Z} + n_i [0] \\ &= k_i \mathbb{Z} \neq [0] \end{aligned}$$

Määritellään tämän liimauksen sijasta diffeomorfismi  $f : \mathbf{T}_i \rightarrow \mathbb{T}_i$  siten, että  $f(\mathbf{Y}_i) = C_i$ . Tärkeää on, että  $f$  tekee liimauksen molemmille toruspareille  $i = 1, 2$  samanaikaisesti. Koska tämä vaikeasti visualisoitava diffeomorfismi identifioi  $C_i$ :n ja ympäryspiirin  $\mathbf{Y}_i$  toisikseen, tulosavaruudessa  $C_i$ -käyrän  $H_1$ -homologialuokka on

$$\begin{aligned}[C_i] &= [k_i Y_i + n_i P_i] \\ &= [\mathbf{Y}_i] = [0].\end{aligned}$$

Nyt kun käsitys oikeaoppisesta liimauksesta on selvillä, on aika liimata torukset yhteen.  $\mathbf{T}_i$  pitää ensin kovertaa avaruudesta, jotta sen vääntäminen ei väännä muuta avaruutta pieleen. Olkoon

$$E^\circ = E \setminus \text{int}(\mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2)$$

kyseinen “koverrettu” avaruus. Seuraavaksi  $E^\circ$  täytetään toruksilla  $\mathbf{T}_i$ , mutta siten, että toruksia väännetään oikein ja ne liimataan edellä määritellyn funktion  $f$  osoittamalla tavalla toruksiin  $\mathbb{T}_i$ . Määritellään täksi avaruudeksi

$$X = (E^\circ \sqcup \mathbf{T}_1 \sqcup \mathbf{T}_2) / \sim,$$

missä  $x \sim y$ , jos  $f(x) = y$  ( $x, y \in E$ ). Liimausoperaatio on tällöin kuvaus

$$L : E^\circ \sqcup \mathbf{T}_1 \sqcup \mathbf{T}_2 \rightarrow X.$$

Määritellään nyt kuvaus  $\pi : X \rightarrow \mathbb{S}^2$  siten, että

- kaikille  $x \in E^\circ$  pätee  $\pi \circ L(x) = \tilde{\pi}(x)$  ja
- kaikille  $x \in \mathbb{T}_i$  pätee  $\pi \circ g(x) = P(x)$ , missä  $P$  on projektio

$$\begin{aligned}P : \mathbf{D}_i^2 \times \mathbb{S}^1 &\rightarrow \mathbf{D}_i^2 \\ (d, s) &\mapsto (d).\end{aligned}$$


Todistetaan lopuksi, että  $X = \mathbb{S}^3$ . Edellä jo todistettiin, että käyrän  $C_i$  homologialuokka on  $X$ :ssä triviaali.

Tässä on looginen hyppy. Miten pääsen  $C_i$ :n homologialuokan triviaaliudesta eteenpäin? Mikä on tämä puuttuva palanen? Alla oleva tieto on kielimallilta, koska en osannut netistä hakea sopivaa tietoa asiaan.


Tämän työn sisällön kannalta kohtuullisilla esitietovaatimuksilla ei ole mahdollista perustella, että  $X$ :n homologiaryhmän  $H_1$  triviaalius on lisäksi riittävä ehto siihen, että liimauksen jälkeinen avaruus olisi  $\mathbb{S}^3$ . On kuitenkin olemassa tuloksia, joiden mukaan avaruutta  $Z \neq \mathbb{S}^3$ , joka on homologinen 3-palloon, ei ole mahdollista konstruoida vain kahdesta niinkin yksinkertaisesta kappaleesta kuin toruksesta. Siispä todellakin  $X = \mathbb{S}^3$ .

Jos  $n_i$  oltaisiin valittu toisin, olisiko  $X'$  ollut sitten erilainen? Vai millainen diffeomorfismi  $X = X'$  olisi olemassa?

Voidaan siis todeta, että  $\pi$  on kaivattu kuvaus  $\pi_{k_1, k_2}$  ja erityiskuidut, joiden moninkerrat ovat  $k_i$ , ovat torusten  $\mathbf{T}_i$  keskiakselit.  $\square$



Kuva 13: Kolme yksinkertaisinta solmua. Ovatko kolmilehdet samoja?



Kuva 14: Kaksi linkkiä, joiden linkkiluvut ovat  $-2$  ja  $3$ .

## 5 Solmut ja linkit

Matematiikassa solmuja tarkastellaan ympyrännäköisinä topologisina olioina, jotka saavat sotkeutua itseensä. Epämuodollisesti määriteltynä matemaattinen solmu on kuin tavallinen solmu, jonka päät on liimattu yhteen. Linkillä tarkoitetaan kappaletta, joka koostuu erillisistä solmuista, jotka voivat olla kietoutuneina toisiinsa. Työssä noudatetaan D. Eisenbudin ja W. D. Neumannin [[Eisenbud ja Neumann, 1985](#)] merkintätapoja ja joitakin peruskäsitteitä lainataan Rolfsenin kirjasta [[Rolfsen, 1976](#)].

### 5.1 Perusmääritelmät


Tässä esitellään solmuihin liittyvät perusmääritelmät. Kuvassa [13](#) on esitetty yksinkertaisia solmuja.

**Määritelmä 5.1.** Topologisen avaruuden  $X$  osajoukko  $S \subset X$  on *solmu*, jos  $S$  on homeomorfinen palloon  $\mathbb{S}^p$ , jollekin  $p \in \mathbb{N}$ .

Solmuja voi myös lomittaa yhteen, jolloin tulosta kutsutaan linkiksi. Kuvassa [14](#) on kaksi esimerkkilinkkiä.

**Määritelmä 5.2.** *Linkki*  $L = (\Sigma, S_1, \cup \dots \cup S_n)$  on pari, jossa  $\Sigma = \mathbb{S}^3$  (tai yleisemmin suunnattu homologinen  $n$ -pallo) ja  $S_i$  solmuja. Joskus merkitään lyhemmin  $S_1 \cup \dots \cup S_n = K$ .

Työssä tärkeää on monimutkaisten solmujen hajottaminen yksinkertaisemmiksi, mutta sitä varten tarvitaan ensin menetelmä yksinkertaisempien solmujen yhdistämiseksi. Kuvassa [15](#) on esitetty alemman määritelmän mukainen yhtenäinen summa.



Kuva 15: Kahden linkin yhtenäinen summa tummalla merkittyä intervallia pitkin.

**Määritelmä 5.3.** Linkkien  $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$  ja  $\mathbf{L}' = (\Sigma', S'_1 \cup \dots \cup S'_m)$  erillinen summa on

$$\mathbf{L} + \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S'_1 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa  $\Sigma \# \Sigma'$  on  $\Sigma$  ja  $\Sigma'$ :n yhtenäinen summa  $S_i$ :tä leikkaamattomien levyjen kautta.

Linkkien *yhtenäinen summa* on

$$\mathbf{L} \# \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', (S_1 \# S'_1) \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \cup S'_2 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa  $\Sigma$ :n ja  $\Sigma'$ :n yhtenäinen summa otetaan kautta levyjen, jotka leikkaavat linkkejä väleissä  $I \subset S_1$  ja  $I' \subset S'_1$ .

Tämä summa ei sellaisenaan vielä yleisty tarpeeksi hyvin, mutta on tarpeellinen yleisemmän pujonnan määrittelyssä myöhemmin. Annetaan vielä pari määritelmää.

**Määritelmä 5.4.** Solmun  $S$  putkiympäristöä merkitään  $N(S)$  ja linkin  $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$  putkiympäristö määritellään  $N(\mathbf{L}) := N(S_1) \cup \dots \cup N(S_n)$ .


**Määritelmä 5.5** (Määritelmä 1: pidän tätä varmuuden vuoksi, mutta ajattelin poistaa). Olkoot  $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$  eli leikkaamattomia sileitä käyriä. Tällöin käyrien *linkkiluku* on

$$\ell(\gamma_1, \gamma_2) := \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1} \frac{\det(\dot{\gamma}_1(s), \dot{\gamma}_2(t), \gamma_1(s) - \gamma_2(t))}{|\gamma_1(s) - \gamma_2(t)|^3}.$$

Riittäisikö tähän vähän epämuodollisempi määrittely, joka perustuu kuviin? Toi integraali on aika tuhti.

**Määritelmä 5.6.** Olkoot  $S, S'$  kaksi solmua. Projisoidaan solmut johonkin tasoon. Annetaan jokaiselle solmujen leikkauskohdalle kerroin  $\pm 1$  kuvan 16 osoittamalla tavalla. Ylitysdata projektioon saadaan tarkastelemalla projektion alkukuvassa leikkauspisteen kuitua. Linkkiluku määritellään

$$\ell(S, S') = \frac{1}{2} \sum \text{leikkauskohtien kertoimet}.$$



Kuva 16: Kaksi positiivista ylitystä ja kaksi negatiivista ylitystä.

## 5.2 Torussolmut

Nyt kun solmujen ja linkkien perussanasto on saatu määriteltyä, voidaan esitellä torussolmut. Työn tarkoituksena on avata algebrallisten käyrien tutkimuksessa luontaisesti esiintyviä solmuja, jotka ovat aina luonteeltaan iteroituja torussolmuja. Siispä työssä huomio voidaan keskittää kokonaan (iteroituihin) torussolmuihin. Aloittakaamme kuitenkin toruksen purkamisesta ympärys- ja pituuspiireihin.

**Määritelmä 5.7.** Olkoon  $S$  solmu ja  $Y$  ja  $P$  suunnistettuja, yksinkertaisia, suljettuja käyriä  $\partial N(S)$ :ssa, jotka edustavat ekvivalenssiluokkia

$$Y \sim 0, \quad P \sim S \quad H_1(N(S))\text{:ssa};$$

$$\ell(Y, S) = 1, \quad \ell(P, S) = 0,$$

missä  $\sim$  on isotopiarelaatio, ts.  $A \sim B$  tarkoittaa, että  $A$  ja  $B$  ovat isotooppisia (määritelmä??), ja  $\ell(\cdot, \cdot)$  mittaa linkkilukua  $\Sigma$ :ssa. Tällöin  $Y$  on  $S$ :n *ympäryspiiri* ja  $P$  *pituuspiiri*.

Nämä toruksen kiertosuunnat mahdollistavat torussolmun määrittelyn.

**Määritelmä 5.8.** Olkoon  $S$  käyrä, jolla on upotus  $S \hookrightarrow \mathbb{T}^2$ . Jos  $S$  on homologinen homologiaryhmään  $pP + qY$ , niin  $S$  on  $(p, q)$ -*torussolmu* ja sitä voidaan merkitä  $S(p, q)$ .

Torussolmu on siis solmu, joka voidaan piirtää toruksen pinnalle. Kuvassa ??? torussolmuja. Torussolmu voidaan määrittää kokonaan kahdella kokonaisluvulla  $p, q$ , jotka kertovat monestiko silmukka kiertyy toruksen kahden eri homologia-akselin ympäri ennen palaamistaan lähtöpisteeseen.

Tarkkasilmäinen lukija saattaa pistää merkille, että konstruktioltaan torussolmu muistuttaa hyvin paljon lauseen 4.30 topologisessa todistuksessa käytettyä liimausmenetelmää. Tämä ei tietenkään ole sattumaa ja tätä käytetään myöhemmin hyväksi solmuoperaatioiden määrittelyssä.

Todistetaan ennen toruslinkkien esittelyä vielä eräs pienehkö torussolmuja koskeva seikka.

**Lemma 5.9.** *Olkoon  $S$   $(p, q)$ -torussolmu, jossa  $p < q$ . Tällöin  $S$  on myös  $(q, p)$ -torussolmu.*

*Todistus.* Koska  $S \subset \mathbb{S}^3$  on torussolmu, se voidaan parametrisoida jonkin toruksen  $\mathbb{T}^2 \subset \mathbb{S}^3$  pinnalle. Tässä parametrisaatiossa toruksen pituuspiiri kierretään  $p$  kertaa ja ympäryspiiri  $q$  kertaa.

Tällöin solmu kiertää toruksen  $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{T}^2$  pituuspiirin  $q$  kertaa ja ympäryspiirin  $p$  kertaa ollen myös  $(q, p)$ -torussolmu.  $\square$

Torussolmuja voi “iteroida” vaihtamalla valmiin torussolmun  $S(p_1, q_1)$  “langan” ohuempaan, joka kiertää itsensä ympäri kuin torussolmu  $S(p_2, q_2)$ .

**Määritelmä 5.10.** Olkoon  $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$  linkki. *Kaapelointi* solmun  $S_i$  suhteen tarkoittaa linkin korvaamista joko linkillä  $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q))$  tai linkillä  $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q) - S_i)$ . Tässä  $dS_i(p, q) = \bigcup_{i=1}^d S_i(p, q)$  on yksittäisten torussolmujen erillinen yhdiste  $\partial N(S_i)$ :ssä. Tuloslinkkiä kutsutaan *iteroiduksi toruslinkiksi*.

Jos linkki sisältää vain yhden komponentin, niin kaapeloinnin tulos on *iteroitu torussolmu*.

Esitellään konkreettinen tapa rakentaa iteroitu torussolmu. Olkoon  $S = S(p_1, q_1)$  torussolmu ja  $\mathbb{T}$  torus, jonka pinnalle se voidaan piirtää. Tällöin  $S$  kulkee  $p_1$  kertaa pituuspiirin ympäri ja  $q_1$  kertaa ympäryspiirin ympäri.

Olkoon  $N = N(S)$  torussolmun putkiympäristö. Piirretään putkiympäristön pinnalle suljettu ja suunnattu käyrä, joka kulkee putkiympäristön pituuspiirin ympäri  $p_2$  kertaa ja ympäryspiirin ympäri  $q_2$  kertaa. Tämä käyrä on iteroitu torussolmu, jonka tunnusluvut ovat  $\{(p_1, q_1), (p_2, q_2)\}$ . Se kulkee pituuspiirinsä ympäri  $p_1 p_2$  kertaa ja ympäryspiirinsä  $q_1 q_2$  kertaa.

### 5.3 Pujonta

Erilaiset solmujen manipulointioperaatiot voidaan yleistää pujontaoperaatioksi, joka muistuttaa laajemmassa kirjallisessa kontekstissa käsiteltävää kirurgiaa ja kahvoja 3-monistoilla. Tätä käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.1.

Pujonnassa molempia solmuja “paksunnetaan hieman”. Tämä vastaa putkiympäristöjen valitsemista solmuille. Paksuntamisen jälkeen tavoitteena on kietoa paksunnetut solmut toisiinsa siten, että pituuspiirit liimataan ympäryspiireihin. Varsinainen tekninen toteutus etenee niin, että molemmat solmut poistetaan omista avaruuksistaan ja solmujen komplementit liimataan yhteen.

**Määritelmä 5.11** (Linkkien pujos). Olkoot  $\mathbf{L} = (\Sigma, K)$  ja  $\mathbf{L}' = (\Sigma', K')$  linkejä. Valitaan komponentit  $S \subset K, S' \subset K'$ . Olkoot  $Y, P \subset N(S_i)$  ja  $Y', P' \subset N(S'_j)$  tyypilliset ympäry- ja pituuspiirit. Määritellään

$$\Sigma'' = (\Sigma - \text{int } N(S)) \cup (\Sigma' - \text{int } N(S'))$$

liimaamalla avaruuksien reunat toisiinsa siten, että samansuuntaisesti päällekkäin liitetään  $Y$  ja  $P'$  sekä  $P$  ja  $Y'$ . Linkki

$$\mathbf{L}'' = (\Sigma'', (K - S) \cup (K' - S'))$$

on  $\mathbf{L}$ :n ja  $\mathbf{L}'$ :n *pujos* ja sitä merkitään

$$\boxed{\mathbf{L}} \begin{array}{c} \text{---} \text{S} \text{---} \end{array} \begin{array}{c} \text{---} \text{S}' \text{---} \end{array} \boxed{\mathbf{L}'}$$

Jos solmut  $S, S'$ , joita pitkin pujos tehdään, ovat kontekstista selvät, on tyypillistä jättää ne merkitsemättä.

Määritelmä on johdonmukainen, sillä  $\Sigma'' = \mathbb{S}^3$ , jos  $\Sigma, \Sigma' = \mathbb{S}^3$  ja homologinen  $n$ -pallo muutoin.

**Lemma 5.12.**  $\Sigma''$  on homologinen  $n$ -pallo.

*Todistus.* Lemman voi todistaa Mayer-Vietoris-jonoon pohjautuvalla argumentilla, joka kuitenkin tuo työn varsinaiseen sisältöön vain vähän lisäarvoa. Lisäksi lauseen 4.30 topologinen todistus sisältää ainesosia tämän ymmärtämiseen työlle relevantissa 3-pallojen tapauksessa, joten todistus sivuutetaan.  $\square$

## 6 Pujoskaavio


Solmuja voi pujoa peräkkäin useita ja monimutkaisilla tavoilla, jolloin solmujen piirtäminen käy nopeasti hyvin vaikeaksi. Monimutkaisten linkkien kuvaamiseen hyödyllinen työkalu ovat pujoskaaviot, jotka ovat tietynlaisia verkkoja. Verkko on matemaattinen olio, joka koostuu silmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. Pujoskaavioissa kaariin liitetään kokonaislukukertoimet, jotka kertovat tietoa solmusta.

Pujoskaavioihin liittyy monta hankalaa ideaa, koska monimutkaisten linkkien esittäminen yksinkertaisesti, mutta yksiselitteisesti, on hyvin vaikeaa. Sen takia tässä kappaleessa pujoskaavioiden rakentamisessa joustetaan matemaattisesta formalismista ja lukijaa kuljetetaan eteenpäin intuitiivisesti.

Tämän kappaleen perimmäinen tarkoitus on palvella lukijaa vakuutuksena siitä, että monimutkaisten linkkien kohdalla on parempi unohtaa linkki, ja tyytyä pujoskaavioon, ja luottaa siihen, että olennaista tietoa ei menetetä.

### 6.1 Pujoskaavion synty

Kappaleen 5 pujoksen määritelmän, torussolmujen ja lauseen 4.30 samankaltaisuus on tarkoituksellista. Pujoskaavion ydinajatus on, että (torus)solmun sijasta ajatellaan avaruuden, johon solmu on upotettu, rakennetta. “Avaruuden  $X$  rakenteella” tarkoitetaan kuidutusta  $\pi : X \rightarrow Y$ , joka kertoo, millä tavoin avaruuden koordinaattiakselit “käyristyvät”. Solmu  $S \hookrightarrow X$  puolestaan on jokin kuitu, jonka kuva  $\pi(S) = y \in Y$  on yksittäinen piste.



Kuva 17: Kaksi torussolmua eri tavoin esitettyinä.

Tällöin pujoskaaviossa riittää antaa informaatiota pelkästään avaruuden erityiskuiduista, sillä nämä määrittävät säännöllisten kuitujen rakenteen. Tämä konstruktio on intuitionvastaisuudesta huolimatta erittäin kätevä. Syy on se, että monistojen teoria on vakiintunutta ja saatavilla oleva työkalupakki on laaja. Tämän ansiosta esimerkiksi torussolmun kaapeloiminen iteroiduksi torussolmuksi voidaan esittää *monistojen kirurgian* avulla.

Monistojen kirurgia on kokoelma erilaisia tekniikoita, joilla äärellisulotteisen moniston voi muuttaa toiseksi  $M \rightsquigarrow N$ , vaikka  $M$  ja  $N$  eivät olisi keskenään diffeomorfisia. Yksinkertaisin esimerkki kirurgiasta on lauseen 4.30 topologisen todistuksen konstruktio  $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1 \rightsquigarrow \mathbb{S}^3$ . Konstruktiossa monistosta  $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1$  “porattiin” kaksi torusta pois, mistä jääneet aukot “täytettiin” vääntyneillä toruksilla.


Määritellään pujoskaavio konstruktion kautta, jonka jälkeen annetaan yksinkertaisia esimerkkejä.

**Konstruktio 6.1.** Kuvassa 17 on esitetty torussolmut  $(2, 3)$  ja  $(2, 7)$  kolmella eri tavalla. Vasemmalta oikealle nämä ovat tavallinen solmuesitys, homologia-akseleittain ja pujoskaaviolla. Pujoskaaviossa on kolmenlaisia komponentteja, jotka on piirretty alle.

$$\bullet^{\alpha} \quad \circ^{\beta} \quad \longrightarrow$$

Tässä  $\alpha, \beta$  ovat joitain kokonaislukuja. Merkitään komponentteja tekstin seassa  $\bullet, \circ, \rightarrow$ . Joissakin tilanteissa on hyödyllistä *juurtaa* kaavio, eli valita mielivaltaisesti jokin silmuista kaavion juureksi. Juurta merkitään  $\bullet$ . Juurtamaton kaavio sisältää vain tyypillisiä silmuja  $\circ$  ja nuolia  $\rightarrow$ .

Palloa  $\circ$  (tai  $\bullet$ ) käytetään kuvaamaan avaruutta, jossa linkki elää. Jos  $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1)$ , niin  $\circ$  on  $\Sigma$ . Tässä työssä  $\Sigma$  on aina  $\mathbb{S}^3$ . Lauseen 4.30 nojalla  $\mathbb{S}^3$  voidaan kuiduttaa jollakin epätriviaalilla tavalla. Tämän vuoksi on tarpeellista esittää pallon  $\circ$  yhteydessä myös tietoa kuidutuksesta. Jos  $k_1, k_2$  ovat kuidutuksen määräävät kokonaisluvut, ts. erityiskuitujen moninkerrat, ilmaistaan tämä pujoskaaviolla



Pallot  $\circ$  voikin itse asiassa jakaa kahteen luokkaan: *lehdiksi*, joilla on vain yksi kaari ja *silmuiksi*, joilla voi olla useampi kaari. Silmu symboloi avaruutta  $\mathbb{S}^3$  ja lehteä puolestaan avaruuden erityiskuitua. Lehden kaarelle voidaan asettaa kokonaisluku, joka kertoo kyseisen erityiskuidun kertaluvun.

Teknisesti ottaen triviaalisti kuidutetun avaruuden pujoskaavioon voitaisiin piirtää lehdet siten, että  $k_1 = k_2 = 1$ , mutta on mielekäästä piirtää kaavioista mahdollisimman minimaalisia. Jos  $k_2 = 1$ , mutta  $k_1 > 1$ , niin avaruudella on vain yksi erituiskuitu, jolloin säännölliset kuidut eivät homologisesti poikkea triviaalista tapauksesta.

Nuolet  $\rightarrow$  vastaavat linkin komponentteja. Nuoli  $\rightarrow$  on *aina* kiinnitetty silmuun  $\circ$  tai  $\bullet$  ja se tarkoittaa jotakin yhtä (mielivaltaista) kuitua avaruudessa, johon se on kiinnitetty. Nuoli voi kuvata säännöllistä kuitua, jolloin sille ei tarvitse antaa kokonaislukua, tai erityiskuitua jolloin sille annetaan kokonaisluku samaan tapaan kuin lehdillekin. On tosin huomattava, että  $\mathbb{S}^3$ :lla voi olla korkeintaan kaksi erityiskuitua.

Yksinkertaisin solmu, epäsolmu  $\bigcirc \hookrightarrow \mathbb{S}^3$  voidaan esittää kaaviolla



jossa  $\circ$  vastaa 3-palloa ja  $\rightarrow$  siihen upotettua epäsolmua. Jos  $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$  ja  $\mathbf{L}' = (\mathbb{S}^3, S_{n+1} \cup \dots \cup S_m)$  ovat linkkejä, niin näiden linkkien pujos komponentteja  $S_i \in \mathbf{L}, S_j \in \mathbf{L}'$  myöden voidaan kuvata kaaviolla

$$\boxed{\mathbf{L}} \rightarrow + \leftarrow \boxed{\mathbf{L}'} = \boxed{\mathbf{L}} \text{---} \boxed{\mathbf{L}'}$$

ja linkeille  $\mathbf{L}, \mathbf{L}'$  voi muodostaa induktiivisesti samoja periaatteita noudattaen omat kaavionsa. Tällaista kaaviota kutsutaan *pujoskaavioksi*.

**Määritelmä 6.2** (Pujoskaavio). Kutsutaan konstruktiossa 6.1 esiteltäjä puuverkkoja *pujoskaavioiksi* ja puuverkkojen erilaisia komponentteja *lehdiksi*, *silmuiksi*, *nuoliksi*, *kaariksi* ja *juuriksi* siten kuin konstruktiossa on kyseisiä sanoja konstruktiossa käytetty.

Olkon  $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$  linkki. Merkitään linkin pujoskaaviota  $\Gamma(\mathbf{L}) = \Gamma(m) = \Gamma(m_1, \dots, m_n)$ , jossa  $m_i$  on solmun  $S_i$  kertaluku. Kertaluvun  $m_i$  positiivisuus tai negatiivisuus kertoo solmun suunnistuksen.

Vastaavasti jos  $\Gamma$  on pujoskaavio, olkon  $\mathbf{L}(\Gamma)$  kaaviota vastaava linkki.

*Huomautus 6.3.* Annetussa pujoskaavion konstruktiossa ainoa keino välittää informaatiota avaruuksien tai käyrien suunnistuksesta on kuituja kuvaavien kokonaislukujen positiivisuus tai negatiivisuus. Täyden tarkkuuden saavuttamiseksi kaavion pitäisi välittää tietoa myös pohja-avaruuden suunnistuksesta. Lauseessa 6.10 kuitenkin osoitetaan, että käytännössä avaruuksien voi aina olettaa olevan positiivisesti suunnistettuja.

Kun pujoskaaviot on nyt esitelty, tutkitaan joitakin esimerkkejä.

**Esimerkki 6.4** (Erillinen summa). Kahden epäsolmun (tai yleisemmin linkin) erillistä summaa kuvataan erillisillä pujoskaavioilla


$$\circ \longrightarrow \quad \circ \longrightarrow$$

**Esimerkki 6.5.** Esimerkiksi jos kaksi epäsolmua  $(\mathbb{S}^3, S_1), (\mathbb{S}^3, S_2)$  pujotaan yhteen, on tuloksena tyhjä  $\mathbb{S}^3$  ilman yhtäkään solmua, kuten lemma 4.22 osoittaa.

$$\begin{aligned} \circ \longrightarrow + \longleftarrow \circ &= \circ \longrightarrow \circ \\ &= \circ \end{aligned}$$

Lauseen 4.30 topologisessa todistuksessa tehtiin liimausoperaatio, jossa liimattiin vääntyneitä toruksia.

**Esimerkki 6.6.** (Torussolmut) Torussolmu  $S(p, q) \subset \mathbb{S}^3$  voidaan esittää kuidutuksen  $\pi_{p,q} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$  säännöllisenä kuituna. Siispä  $(p, q)$ -torussolmun pujoskaavio on




**Esimerkki 6.7.** Lemma 5.9 saa pujoskaavioiden avulla muodon


$$\begin{aligned} \begin{array}{c} \circ \\ | \\ k_1 \\ | \\ \circ \end{array} \longrightarrow &= \begin{array}{c} \circ \\ | \\ k_2 \\ | \\ \circ \end{array} \longrightarrow \end{aligned}$$

**Esimerkki 6.8** (Iteroitu torussolmu). Kaapeloidaan  $(p_1, q_1)$ -torussolmu  $S$   $(p_2, q_2)$ -kaapelilla. Olkoon  $\mathbb{S}_1^3$  avaruus, jossa  $S$  elää ja  $\mathbb{T} \subset \mathbb{S}^3$  torus, jonka pinnalle  $S$  voidaan piirtää. Tällöin  $S$  kulkee  $p_1$  kertaa pituuspiirin ympäri ja  $q_1$  kertaa ympäryspiirin ympäri.

Kaapelin pujoskaavio on



Kaapeli on kahden solmun linkki. Avaruudella  $\mathbb{S}_2^3$ , jossa kaapeli elää on, kuidutus  $\pi_{p_2, q_2} : \mathbb{S}_2^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ . Solmut avaruudessa ovat säännöllinen kuitu kertaluvulla 1 (torussolmu  $S' = S'(p_2, q_2)$ ) ja erityiskuitu kertaluvulla  $q_2$  (epäsolmu). Jos erityiskuitu eli epäsolmu pujotaan torussolmuun  $S(p_1, q_1)$ , liimatessa  $\mathbb{S}_2^3 \setminus S'$  avaruuteen  $\mathbb{S}_1^3 \setminus S$  täytyy ensimmäistä vääntää niin rajusti, että  $S'(p_2, q_2)$  muuttuu iteroiduksi.



Työn tavoitteena on määritellä yhteys algebrallisten käyrien ja solmujen välille. Polynomin nollakohdalla voi olla jokin moninkerta, ja on myöhempien tulosten kannalta määritellä solmun silmuille moninkerta.

**Määritelmä 6.9.** Määritelmä: solmun moninkerta

**Asetus.** Jatkossa *moninkerralla* tai *kertaluvulla* viitataan solmun tai silmun moninkertaan. Erityiskuidun moninkerta tai kertaluku täsmennetään erikseen erityiskuidun ominaisuudeksi.

## 6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia

Tässä kappaleessa käsitellään muodollisesti pujoskaavioiden ominaisuuksia ja todistetaan joitakin hyödyllisiä tuloksia. Pujoskaavioita määritellessä huomattiin esimerkiksi, että  $\circ \text{---} \circ = \circ$ , mikä osoittaa, että yhdellä solmulla voi olla erilaisia pujoskaavioita. Tämä herättää kysymyksen mahdollisesta minimaalisesta pujoskaaviosta, tai vähintään siitä, millä tavoin pujoskaaviota voi muokata ilman, että sen esittämä solmu muuttuu.

Edelliskappaleessa ei pujoskaaviota määriteltäessä otettu kantaa avaruuden tai solmujen suunnistukseen. Seuraava lause osoittaa, että pujoskaavioille mahdollisten manipulointioperaatioiden ansiosta avaruuden suunnistuksen voi aina olettaa positiiviseksi. Merkitään avaruuden suunnistusta  $\delta, \varepsilon = \pm 1$  kirjoittamalla  $\varepsilon$  tai  $\delta$  avaruutta vastaavan pallon  $\circ$  sisään.

**Lause 6.10** ([Eisenbud ja Neumann, 1985], lause 8.1). *Olkoot  $\Gamma(\underline{m})$  ja  $\Gamma_i(\underline{m}_i)$ ,  $i \in \mathbb{N}_0$  pujoskaavioita.*

1.  $\Gamma(\underline{m}) = \Gamma(-\underline{m})$ .

2. 
$$\begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ \varepsilon \end{array} \xrightarrow{\alpha_0} \Gamma_0(\underline{m}_0) = \begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ -\varepsilon \end{array} \xrightarrow{-\alpha_0} \Gamma_0(-\underline{m}_0)$$

3.

$$\begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ \varepsilon \end{array} \xrightarrow{1} \circ = \begin{cases} \begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ \varepsilon \end{array} & r > 2 \\ \Gamma_1(\underline{m}_1) \text{ --- } \Gamma_2(\varepsilon \underline{m}_2) & r = 2 \end{cases}$$

4.

$$\begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ \varepsilon \end{array} \xrightarrow{0} \circ = \begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \text{ --- } \circ \\ + \\ \vdots \\ + \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \text{ --- } \circ \end{array} \quad (\text{erillinen yhdiste})$$

5.

$$\boxed{\Gamma(\underline{m})} + \circ \text{ --- } \circ = \boxed{\Gamma(\underline{m})} \quad (\text{erillinen yhdiste})$$

6. Jos  $\alpha_0 \alpha'_0 = \varepsilon \varepsilon' \alpha_1 \cdots \alpha_r \cdots \alpha'_1 \cdots \alpha'_s$  niin

$$\begin{array}{c} \Gamma_0(\underline{m}_0) \\ \alpha_1 \quad \vdots \quad \alpha_r \\ \circ \\ \varepsilon \\ \alpha_0 \\ \alpha'_0 \\ \circ \\ \varepsilon' \\ \alpha'_1 \quad \vdots \quad \alpha'_s \\ \Gamma'_1(\underline{m}_1) \end{array} = \begin{array}{c} \Gamma_0(\underline{m}_0) \\ \alpha_1 \quad \vdots \quad \alpha_r \\ \circ \\ \delta \\ \alpha'_1 \quad \vdots \quad \alpha'_s \\ \Gamma'_1(\delta \varepsilon \varepsilon' \underline{m}_1) \end{array}$$

missä  $\delta = \pm 1$  siten, että

$$\alpha_0 = \delta \varepsilon \alpha'_1 \cdots \alpha'_s,$$

$$\alpha'_0 = \delta \varepsilon' \alpha_1 \cdots \alpha_r.$$

Huomio:  $\delta$  on olemassa, sillä  $\text{syt}(\alpha_0, \alpha_1 \cdots \alpha_r) = \text{syt}(\alpha'_0, \alpha'_1 \cdots \alpha'_s) = 1$ .

Todistuksen hahmotelma. Todistuksen ovat täydessä täsmällisessä muodossaan muotoilleet Eisenbud ja Neumann kirjassaan [Eisenbud ja Neumann, 1985] lauseeseen

8.1. Käydään tässä läpi vain todistuksen ideat.

1. Olkoon  $\Gamma(\underline{m})$  linkin  $\mathbf{L}(\underline{m})$  pujoskaavio. Linkillä  $\mathbf{L}$  on “sisä-” ja “ulkopuoli”, jotka ovat identtiset. Ajatus on sama, kuin lemmassa 5.9, jossa torussolmulla on “sisäpuolinen” ja “ulkopuolinen” torus. Linkin tapauksessa ei ole torusta, vaan jokin Seifert-pinta  $F \subset \mathbb{S}^3$ , joka määritellään sellaiseksi, että linkki sattuu olemaan sen reuna:  $\partial F = \mathbf{L}$ .

Analogia toimii siten, että Seifert-pinnan voi piirtää kulkemaan linkin “sisäpuolella” lyhyintä reittiä linkin komponenttien välillä tai linkin “ulkopuolella” kaukaisinta reittiä komponenttien välillä. Nämä ovat “vastakkaiset” Seifert-pinnat ja niitä voidaan merkitä  $F$  ja  $-F$ . Koska vastakkaisten Seifert-pintojen reuna on sama linkki, on  $\mathbf{L}(\underline{m}) = \mathbf{L}(-\underline{m})$ , mistä seuraa  $\Gamma(\underline{m}) = \Gamma(-\underline{m})$ .

Kaikilla linkeillä ei ole Seifert-pintaa, mutta Seifert-linkit ovat määritelmän mukaan linkkejä, joilla on. Tässä työssä käsitellyt linkit ovat kaikki Seifert-linkkejä (ks. propositio 7.3 osa 1 kirjassa [Eisenbud ja Neumann, 1985]).

2. Avaruuden  $\mathbb{S}^3$  suunnistus voidaan vaihtaa kääntämällä yhden erityiskuidun  $(\alpha_0)$  suunnistus toisin päin.
3. Pujoskaaviossa lehdillä merkitään kuitua, jolla ei ole komponenttia solmussa. Tässä mielessä lehti on “virtuaalikuitu”. Linkkiin kuulumattoman säännöllisen kuidun olemassaolon merkitseminen ei tuo lisäarvoa, vain erityiskuidun merkitseminen tuo.
4. [Eisenbud ja Neumann, 1985] lause 6.3 + lause 1.1 osa 3. En tajua lausetta 6.3.
5. Selkeä.
6. Kohtaa 2 käyttämällä voidaan olettaa, että  $\varepsilon = \varepsilon' = 1$ .

□

**Propositio 6.11.** *Linkki  $\mathbf{L} = (\Sigma, K)$  on kompleksitason käyrän singulariteetin linkki jos ja vain jos sillä on yhtenäinen pujoskaavio, jonka kaikki painot ja kaa-rideterminantit ovat positiivisia. Tällöin sillä on minimaalinen pujoskaavio näillä ominaisuuksilla.*

*Todistus.* En tiedä.

□

**Lemma 6.12.** *Kahden linkin osasen (virtuaalisen tai todellisen) linkkiluku  $\Sigma$ :ssa saadaan laskemalla pujoskaaviossa osasten välillä olevan polun viereisten painojen tulo.*

*Todistus.* En tiedä.

□

### 6.3 Monimutkainen esimerkki

Tässä kappaleessa tutustutaan monimutkaiseen solmuun ja sen pujoskaavion rakentamiseen sekä mielellään myös toisin päin.

## 7 Algebralliset käyrät ovat solmuja

Tässä kappaleessa osoitetaan, että algebralliset käyrät käyttäytyvät tietyissä tapauksissa iteroitujen torussolmujen tavoin.

### 7.1 Käyrän Puiseux-sarja

Keskeinen osa algebrallista geometriaa on aina ollut polynomiyhtälöiden ratkaiseminen. 1800-luvun alussa nuori matemaatikko Évariste Galois kuitenkin tunnetusti todisti, että polynomilla  $f \in \mathbb{K}[x]$ , jolla  $\deg f \geq 5$  ei ole yleistä ratkaisukaavaa. Polynomien nollakohtia ei voi siis esittää rationaalilukujen ja juurifunktioiden avulla, mikä houkuttelee tarkan esitysmuodon asemesta approksimoimaan oikeaa ratkaisua.

Kahden muuttujan tapauksessa tilanne on monimutkaisempi: ratkaisujoukko muodostaa tyypillisesti tasokäyrän eli on kooltaan ääretön. Olkoon  $f \in \mathbb{K}[x, y]$  jokin polynomi. Voidaan aina olettaa, että  $f(0, 0) = 0$ .

**Propositio 7.1.** *Jos  $f \in \mathbb{K}[x, y]$  on polynomi, voidaan analyyttisellä koordinaattimuunnoksella tuottaa polynomi  $g \in \mathbb{K}[x, y]$  siten, että  $g(0, 0) = 0$ .*

*Todistus.* Olkoot  $x_0, y_0 \in \mathbb{C}$  jokin  $f$ :n nollakohta. Tällöin  $g(x, y) := f(x + x_0, y + y_0)$  on haluttu polynomi.  $\square$

Polynomin  $f$  nollakohtajoukko on kokonainen käyrä, joka kulkee origon kautta. Samaan tapaan kuin Taylor- ja Laurent-sarjoilla voi approksimoida funktioiden käyttäytymistä tietyn pisteen läheisyydessä tai koko avaruudessa, onko olemassa sarjakehitelmä, joka kuvaisi  $f$ :n nollakohtajoukkoa origon ympäristössä tai koko avaruudessa?

Ensimmäisenä polynomien approksimoimista tutki Newton, jonka kehittämä menetelmä, jota nykyisin kutsutaan Puiseux-sarjaksi, on yhä käytössä. Puiseux-sarja on mahdollisesti ääretön summa, jonka voi laskea mille tahansa polynomille  $f \in \mathbb{K}[x, y]$ . Se esittää polynomin juuret ratkaistuna muuttujan  $y$  suhteen. Jos  $\phi$  on polynomin Puiseux-sarja,  $y = \phi(x)$ , niin  $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \phi(x)$ . Yleisesti Puiseux-sarjat ovat muotoa

$$y = \phi(x) = \sum_{k=k_0}^{\infty} c_k x^{k/n},$$

jossa  $k_0 \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  ja  $c_k \in \mathbb{C}$ .

Muotoillaan ja todistetaan nyt täsmällinen versio edellä hahmotellusta sarjasta.

**Lause 7.2** ([Brieskorn ja Knörrer, 1986], kappale 8.3). *Olkoon  $f \in \mathbb{C}[x, y]$  tai  $f \in \mathbb{C}[[x, y]]$ . Oletetaan, että  $f(0, 0) = 0$  ja, että  $y^n$  esiintyy  $f$ :ssä jollekin  $n \in \mathbb{N}$ . Tällöin yhtälöllä  $f(x, y) = 0$  on Puiseux-sarja*


$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{k/N}, \quad N \in \mathbb{N},$$

*jolle  $f(x, y(x)) = 0$  kaikilla  $x \in \mathbb{C}$ .*

Todistus seuraa läheisesti Brieskornin ja Knörrerin todistusta.

*Todistus.* Mielekästä olisi, että sarja suppenisi mahdollisimman nopeasti. Koska  $f$ :ää approksimoidaan origon  $(0,0)$  ympäristössä  $f(0,0) = 0$ , ja sarja on muotoa  $y = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{k/N}$ , niin sarja suppenee nopeiten, kun eksponentit  $k/N$  ovat mahdollisimman pieniä. Todistuksen strategia on laskea approksimaatio  $y \approx \alpha x^q + p$ , missä  $\alpha$  on jokin vakio,  $q$  on mahdollisimman pieni ja  $p$  sisältää termejä, joiden eksponentit ovat suurempia kuin  $q$ . Tämän jälkeen lasketaan uusi approksimaatio  $p$ :lle, iteroiden samaa prosessia, jolla alunperin approksimoitiin  $y$ :tä. Koko Puiseux-sarja voidaan johtaa induktiivisesti tästä prosessista.

Olkon  $f(x, y) = \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$  approksimoitava polynomi. Eristetään ensimmäiseksi  $f$ :n “matalimmat” termit, joista voidaan laskea Puiseux-sarjan ensimmäinen approksimaatio. Merkitään pisteet  $(i, j)$ , joilla  $a_{ij} \neq 0$ ,  $(i, j)$ -koordinaatistoon. Asetetaan  $j$ -akselin suuntainen suora  $L$  kulkemaan pisteen  $(0, n)$  kautta, jolla  $a_{0n} \neq 0$  on pienin mahdollinen ja pyöritetään suoraa  $L$  vastapäivään, kunnes se koskettaa jotakin pistettä  $(i, j)$ , jolla  $a_{ij} \neq 0$ .



Jos  $L$  on horisontaalinen tai kasvava, niin suoran  $j = n$  alapuolella ei ole merkittäviä pisteitä, joten  $y^n$  jakaa  $f$ :n ja  $y = 0$  on ratkaisu.

Muussa tapauksessa suora  $L$  leikkaa  $x$ -akselin pisteessä  $(np_1/q_1, 0)$ , missä  $p_1/q_1 \in \mathbb{Q}_+$  on supistettu murtoluku. Suoran yhtälö on

$$j = -\frac{q_1}{p_1}i + n \quad \text{eli} \quad \frac{q_1}{p_1}i + j = n.$$

Yllä olevan kaavion tapauksessa suora leikkaa  $i$ -akselin pisteessä  $(7/2, 0)$ , jolloin  $p_1 = 1$  ja  $q_1 = 2$ .  $L$  on jyrkin mahdollinen suora, joka kulkee joidenkin polynomin pisteiden kautta; se sivuaa polynomin  $f$  pistejoukon  $(i, j)$  alareunaa. Suoralla olevat termit ovat  $f$ :n “matala-asteisimpia”. Eristetään ne polynomiin

$$\hat{f}(x, y) := \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij} x^i y^j.$$

Jos  $a_{ij}x^i y^j$  on mielivaltainen  $f$ :n termi, niin  $(q_1/p_1)i + j \geq n$ , joten  $\hat{f}$ :n termit tosiaan ovat täsmälleen “matalimmat”. Tehdään käsitteestä täsmällinen määrittelemällä uudelleen  $\deg x := q_1/p_1$  ( $\deg y = 1$  pysyy ennallaan). Tällöin  $\hat{f}$  on asteen  $n$  homogeeninen polynomi.

*Huomautus 7.3.* Suoran  $L$  olisi voinut piirtää myös vaakasuoraksi, ja sitten kääntämällä myötäpäivään, kunnes se koskee polynomin pistejoukon alareunaa. Tämä konstruktio ei kuitenkaan minimoi muuttujan  $x$  eksponentteja, vaan muuttujan  $y$ . Muodostettava sarja on muotoa  $y(x) = \dots$ , joten on olennaista minimoida  $x$ :n eksponentit suppenemisen nopeuttamiseksi.

Kirjoitetaan nyt

$$f(x, y) = \hat{f}(x, y) + \overbrace{\sum_{(q_1/p_1)i+j>n} a_{ij}x^i y^j}^{=:h(x,y)}.$$

Ratkaistaan ensimmäisen asteen approksimaatio  $f$ :lle yhtälöstä  $\hat{f} = 0$ . Sijoitetaan yrite  $y = \alpha x^{p_1/q_1}$ , jolloin saadaan

$$\begin{aligned} \hat{f}(x, \alpha x^{p_1/q_1}) &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}x^i (\alpha x^{p_1/q_1})^j \\ &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}\alpha^j x^{i+(p_1/q_1)j} \quad \parallel (q_1/p_1)i + j = n \\ &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}\alpha^j x^{np_1/q_1} \\ &= x^{np_1/q_1} \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}\alpha^j \\ &= x^{np_1/q_1} g(\alpha). \end{aligned}$$

Ainakin termi  $a_{0n}\alpha^n$  on polynomissa  $g(\alpha)$  nollasta poikkeava. Tämä on ainoa nollasta poikkeava termi vain jos  $L$  on horisontaalinen, mikä tapaus käsiteltiin edellä. Siispä  $g$ :llä on ainakin kaksi nollasta poikkeavaa termiä, joten  $g$ :llä on nollakohta  $\alpha_1 \neq 0$ .

*Huomautus 7.4.* Itse asiassa  $g$ :llä on algebran peruslauseen nojalla  $\deg g$  nollakohtaa, joten prosessi haarautuu tässä. Onko sillä väliä?

Sijoitus  $y = \alpha_1 x^{p_1/q_1}$  ratkaisee melkein yhtälön  $f = 0$ :

$$\begin{aligned} f(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) &= \hat{f}(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) + h(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) \\ &= x^{np_1/q_1} g(\alpha_1) + h(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) \\ &= 0 + h(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) \approx 0. \end{aligned}$$

Tehdään muuttujanvaihto  $x_1 := x^{1/q_1}$ , jolloin ensimmäisen asteen approksimatiivinen ratkaisu on  $y_1 = \alpha_1 x^{p_1/q_1} = \alpha_1 x_1^{p_1}$ . Lisätään tuntematon termi  $y_1$  parantamaan approksimaatiota muotoon

$$y \approx x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)$$

ja sijoitetaan tämä yhtälöön  $f = 0$ :

$$f(x, y) = f(x_1^{q_1}, x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)) = 0.$$

Erityisesti on huomattava, että aiemmin  $\hat{f} = x^{np_1/q_1}g$ , joten yllä olevan sijoituksen pitäisi olla jaollinen termillä  $x^{np_1/q_1} = (x^{1/q_1})^{np_1} = x_1^{np_1}$ . Tämän voi varmistaa lausekkeen  $f = \sum_{i,j} a_{ij}x^i y^j$  algebrallisella manipulaatiolla:

$$\begin{aligned} f(x_1^{q_1}, x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)) &= \sum_{i,j} a_{ij}(x_1^{q_1})^i (x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1))^j \\ &= \sum_{i,j} a_{ij}x_1^{q_1 i + p_1 j}(\alpha_1 + y_1)^j \\ &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}x_1^{np_1}(\alpha_1 + y_1)^j + \sum_{(q_1/p_1)i+j>n} a_{ij}x_1^{q_1 i + p_1 j}(\alpha_1 + y_1)^j \\ &= x_1^{np_1} \left[ \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}(\alpha_1 + y_1)^j + \sum_{(q_1/p_1)i+j>n} a_{ij}x_1^{q_1 i + p_1 j - np_1}(\alpha_1 + y_1)^j \right] \\ &= x_1^{np_1} f_1(x_1, y_1). \end{aligned}$$

Polynomin  $f$  aste oli  $n$ , joten polynomin  $f_1$  aste on  $n_1 \leq n$ . Näin ollen on saatu ensimmäisen asteen approksimaatio  $y(x) = x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + y_1)$  siten, että

$$f(0, y(0)) = 0^{np_1/q_1} f_1(0^{1/q_1}, y_1) = 0.$$

Toistetaan koko prosessi seuraavaksi iteratiivisesti polynomille  $f_1$ . Olkoon  $-q_2/p_2$  sille piirretyn viivoitinsuoran kulmakerroin, jolloin  $y_1 = \alpha_2 x_1^{p_2/q_2}$  on approksimatiivinen ratkaisu. Tehdään muuttujanvaihto  $x_2 := x_1^{1/q_2}$  ja parempi alkuarvaus  $y_1 = x_2^{p_2}(\alpha_2 + y_2)$ . Sijoittamalla  $y_1$  polynomiin  $f_1$  ja eristämällä suurin  $x_2$ :n potenssi saadaan

$$f_1(x_2^{q_2}, x_2^{p_2}(\alpha_2 + y_2)) = x_2^{n_1 p_2} f_2(x_2, y_2).$$

Polynomin  $f_2$  aste on  $n_2 \leq n_1$ . Kaiken kaikkiaan prosessia iteroimalla saavutaan polynomisarjaan  $(f_i(x_i, y_i))_{i=0}^\infty$ , jossa  $x_{i+1} = x_i^{1/q_{i+1}}$  ja  $n_{i+1} \leq n_i$ . Tapaus  $i = 0$  vastaa muuttujia  $x, y$  ja polynomia  $f$ . Tällöin saadaan siis ratkaisu

$$\begin{aligned} y &= x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + y_1), \quad y_1 = x_1^{p_2/q_2}(\alpha_2 + y_2), \quad y_2 = x_2^{p_3/q_3}(\alpha_3 + y_3), \dots \\ y &= x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + x_1^{p_2/q_2}(\alpha_2 + x_2^{p_3/q_3}(\alpha_3 + \dots))) \\ &= x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + x^{p_2/q_1 q_2}(\alpha_2 + x^{p_3/q_1 q_2 q_3}(\alpha_3 + \dots))) \\ &= \alpha_1 x^{p_1/q_1} + \alpha_2 x^{p_1/q_1 + p_2/q_1 q_2} + \alpha_3 x^{p_1/q_1 + p_2/q_1 q_2 + p_3/q_1 q_2 q_3} + \dots \end{aligned}$$

Todistetaan vielä, että eksponenttien jono  $p_i/q_1 \cdots q_i$  ei lähesty nollaa. Tähän tarvitaan tietoa siitä, että  $p_i/q_i \in \mathbb{Q}_+$  vain jos  $n_i > n_{i+1}$ ; muussa tapauksessa  $p_i/q_i \in \mathbb{N}$ .

*Väite 7.5.* Jos  $n_i = n_{i+1}$ , niin  $p_i/q_i \in \mathbb{N}$ .

*Syy.* Koska Puiseux-sarja määriteltiin induktiivisesti, voidaan yleisyydestä tinkimättä olettaa, että  $i = 0$  ( $n_0 = n$ ,  $x_0 = x, y_0 = y$  ja  $f_0 = f$ ). Tällöin, kuten aiemmin pääteltiin,

$$\begin{aligned} x_1^{np_1} f_1(x_1, y_1) &= f(x_1^{q_1}, x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)) \\ &= x_1^{np_1} \left[ \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}(\alpha_1 + y_1)^j + x_1(\dots) \right]. \end{aligned}$$

Sijoitetaan  $x_1 = 0$   $f_1$ :een.

$$\begin{aligned} f_1(0, y_1) &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}(\alpha_1 + y_1)^j \\ &= g(\alpha_1 + y_1). \end{aligned}$$

Tässä  $\alpha_1 \neq 0$  oli  $g$ :n nollakohta ja  $\deg g = n$ . Luku  $n_1$  on vain termin  $x^0 y^{n_1}$  aste eli nollakohdan  $y_1 = 0$  aste polynomissa  $f_1(0, y_1)$ . Tällöin se on myös  $\alpha_1$ :n aste  $g$ :ssä.

Jos oletetaan  $n_1 = n$ , niin  $g(\alpha) = c(\alpha - \alpha_1)^n$ ,  $c \in \mathbb{C}^\times$ . Tällöin termin  $t^{n-1}$  kertoimelle polynomissa

$$g(\alpha) = \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij} \alpha^j$$

pätee  $a_{i,(m-1)} \neq 0$  (jollekin  $i \in \mathbb{N}$  joka toteuttaa yhtälön  $(q_1/p_1)i + n - 1 = n$ ). Pyörittelemällä yhtälöä saadaan

$$\begin{aligned} \frac{q_1}{p_1}i + n - 1 &= n \\ \Leftrightarrow \frac{q_1}{p_1}i - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow \mathbb{N} \ni i &= \frac{p_1}{q_1}. \end{aligned}$$

□

Olko  $k$  ensimmäinen indeksi, jolla  $p_k/q_k \in \mathbb{N}$ . Voidaan olettaa, että  $q_k = 1$ , jolloin  $x_{i+1} = x_i$  kaikille  $i \geq k$ . Koska eksponenttien jakajat ovat muotoa  $q_1 \cdots q_i$ , niin kaikille termeille  $i \geq k$  jakaja on vain

$$\begin{aligned} n &:= q_1 \cdots q_k \cdots q_i \\ &= q_1 \cdots q_k \cdot 1^{i-k} \\ &= q_1 \cdots q_k. \end{aligned}$$

Siispä  $n$  (uudelleenmääritelty) on eksponenttien yhteinen jakaja; toisin sanoen eksponentit eivät pienene mielivaltaisesti.

Täten induktiivisesti määritelty jonolle  $y(x) = \dots$  pätee, että  $f(x, y(x))$  lähestyy nollaa mielivaltaisella tarkkuudella. Siis

$$y(x) = \sum_i a_i x^{i/n}$$

on haluttu sarja.

□

Todistuksessa huomattiin, että Puiseux-sarjan lopullinen muoto riippuu siitä, miten nollakohdat  $\alpha_i$  valitaan jokaisen iteraatioaskeleen kohdalla. Jos käyrä  $V(f)$  on singulaarinen origossa ja kulkee origon kautta  $k$  kertaa, Puiseux-sarjallakin on  $k$  haaraa, jotka vastaavat yksi yhteen käyrän haaroja.

Toistaiseksi Puiseux-sarja on vain muodollinen, eikä todistus tarjoa varmuutta sen suppenemisesta koko avaruudessa tai edes pienessä joukossa. Todistetaan suppeneminen ja määritellään ensin sopiva pieni joukko.

**Määritelmä 7.6.** Olkoon  $f(x, y)$  polynomi tai potenssisarja, joka täyttää lauseen 7.2 ehdot. Tällöin  $f$ :n *elliptinen naapurusto* on

$$U_{\varepsilon, \delta} := \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : |y| < \varepsilon, |x| < \delta\}$$

ja *elliptinen nollajoukko* on

$$V = V(U_{\varepsilon, \delta}) := \{(x, y) \in U_{\varepsilon, \delta} : f(x, y) = 0\}.$$

**Lause 7.7** ([Brieskorn ja Knörrer, 1986], kappale 8, lause 1). *Olkoon  $f(x, y)$  polynomi tai potenssisarja, joka täyttää lauseen 7.2 ehdot ja  $m$  pienin kokonaisluku, jolla  $a_0 m y^m \neq 0$ . On olemassa  $\varepsilon_0 > 0$  siten, että kaikille  $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$  on olemassa  $\delta > 0$ , jolle seuraava pätee.*

*Jos  $V = V(U_{\varepsilon, \delta})$  on  $f$ :n elliptinen nollajoukko, on olemassa suppeneva potenssisarja  $y(z) \in \mathbb{C}[[z]]$ , jolle kuvaus*

$$\begin{aligned} \pi : B &\rightarrow \mathbb{C}^2, & B &:= \{z \in \mathbb{C} : |z| < \delta^{1/m}\} \\ z &\mapsto (z^m, y(z)) \end{aligned}$$

*on holomorfinen ja surjektiivinen  $V$ :ssä. Lisäksi rajoitus  $\pi^\times : B \setminus \{0\} \rightarrow V \setminus \{0\}$  on biholomorfinen<sup>5</sup> ja  $(\pi^\times)^{-1}(0) = \{0\}$ .*

Muuttujanvaihtoa  $t = z^m$  lauseeseen 7.7 soveltaen voidaan nähdä, että yhtälön  $f(t, y(t^{1/m})) = 0$  toteuttava sarja  $y(t^{1/m})$  suppenee. Määritelmän mukaan tällaiset sarjat ovat tismalleen Puiseux-sarjoja, joten Puiseux-sarjat suppenevat jossakin ympäristössä.

## 7.2 Solmujen ja polynomien yhteys

Tässä osiossa kehitetään yhteys algebrallisten käyrien ja solmujen välille. Algebrallisia käyriä on mahdollista tutkia paikallisesti pisteessä  $p \in C$  tutkimalla käyrää  $\mathbb{S}^3(p) \cap C$ , joka osoittautuu linkiksi. Näitä linkkejä kutsutaan algebrallisiksi. Lisäksi tutkitaan kysymystä siitä, milloin mielivaltainen pujoskaavio esittää algebrallista linkkiä ja annetaan välttämättömät sekä tarpeelliset kriteerit tähän. Näitä havaintoja voidaan käyttää singulariteetin  $p \in C$  epäsuoraan tutkimiseen sitä vastaavan pujoskaavion avulla. Olkoon  $f \in \mathbb{C}[x, y]$  siten, että  $f(0, 0) = 0$ .

<sup>5</sup>Holomorfinen siten, että käänteiskuvauskin on holomorfinen.

**Lemma 7.8.** *Tarpeeksi pienelle  $\varepsilon > 0$  3-pallo*

$$\mathbb{S}_\varepsilon^3 = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : |(x, y)| = \varepsilon\}$$

*leikkaa  $V(f)$ :n transversaalisesti.*<sup>6</sup>

*Todistus.* Bézout’n lauseen mukaan leikkauspisteitä on vain äärellinen määrä, jos polynomeilla ei ole yhteisiä tekijöitä.

Valitaan  $\varepsilon > 0$ . Olkoon  $s_\varepsilon$  pallon  $\mathbb{S}_\varepsilon^3$  määrittävä polynomi

$$\mathbb{S}_\varepsilon^3 = V(s_\varepsilon) = V(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - \varepsilon^2).$$

Lemman 3.5 nojalla  $s_\varepsilon$  on pelkistymätön, joten  $s_\varepsilon$ :lla ja  $V(f)$ :llä on yhteisiä tekijöitä jos ja vain jos  $V(f)$  on jaollinen  $s_\varepsilon$ :lla. Jos näin on, voidaan  $\varepsilon$ :ia perturboida hieman. Koska  $V(f)$ :llä on äärellisesti tekijöitä, on olemassa  $0 < \delta \ll \varepsilon$  ja  $\varepsilon_1 \in [\varepsilon - \delta, \varepsilon + \delta]$  siten, että jaollisuus ei toteudu.

Koska leikkauksia on äärellinen määrä, on mahdollista tarkistaa transversaalius jokaisessa leikkauksessa erikseen. Jos jokin leikkauksista on transversaalinen, voidaan toteuttaa uusi perturbaatio  $0 < \delta_1 \ll \delta$ .

Määritellään uudelleen  $\varepsilon := \varepsilon_1 \pm \delta_1$ . Seuraa, että leikkaus  $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$  on transversaalinen.  $\square$

**Seurauslause 7.9.** *Leikkaus  $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$  on linkki*

$$\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n),$$

*joka perii suunnistuksensa käyrältä  $V(f)$ .*

*Todistus.* Jos  $p = (z_1, z_2) = (x_1, y_1, x_2, y_2) \in \mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$ , niin  $X$  toteuttaa yhtälöryhmän

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = \varepsilon^2, & p \in \mathbb{S}_\varepsilon^3 \\ \Re[f(x_1, y_1, x_2, y_2)] = 0, & p \in V(f) \\ \Im[f(x_1, y_1, x_2, y_2)] = 0, & p \in V(f) \end{cases}.$$

Yleisesti pisteellä  $p$  on vähintään  $1 = 4 - 1 - 1 - 1$  vapausaste ja enintään kolme, jos kaikki kolme yhtälöä virittävät pisteessä  $p$  saman tangenttiavaruuden. Näin ei kuitenkaan koskaan käy, sillä  $\mathbb{S}_\varepsilon^3$  ja  $V(f)$  leikkaavat transversaalisesti, joten  $X$ :llä on toisaalta korkeintaan yksi vapausaste. Tällöin  $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$  on 1-ulotteisten käyrien, joita on  $n > 0$  kappaletta, erillinen yhdiste.

Lopuksi  $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$  perii suunnistuksen  $V(f)$ :ltä ollen  $V(f)$ :n alimonisto. Tämä tekee kyseisestä käyrästä linkin.  $\square$

**Määritelmä 7.10.** Olkoon  $C$  on algebrallinen käyrä.  $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$  on *algebrallinen linkki*, jos tarpeeksi pienelle  $\varepsilon > 0$  pätee  $\mathbf{L} = \mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap C$ .

<sup>6</sup>Leikkauspisteessä  $\mathbb{S}_\varepsilon^2$ :n ja  $V(f)$ :n tangentit eivät ole yhdensuuntaiset, vaan ne virittävät koko avaruuden  $\mathbb{C}^2$  kannan.

Käyrän  $V(f)$  origon kautta kulkevat pätkät vastaavat yksi yhteen Puiseux-sarjan haaroja. Toisaalta nämä pätkät vastaavat yksi yhteen myös algebrallisen linkin  $\mathbf{L}$  komponentteja, koska tarpeeksi pienellä  $\varepsilon > 0$  komponentit eivät leikkaa toisiaan. Tämän johdosta Puiseux-sarjasta voidaan päätellä, millainen komponentti on kyseessä; epäsolmu, torussolmu vai iteroitu torussolmu. Esitellään seuraavaksi menetelmä, jolla komponenttia  $(\mathbb{S}^3, S)$  voidaan halutaan tutkia Puiseux-sarjan avulla.

$\mathbb{S}_\varepsilon^3$  voidaan kirjoittaa muodossa

$$\mathbb{S}_\varepsilon^3 = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : |x|^2 + |y|^2 = \varepsilon^2\}.$$

Kun  $|x| = \varepsilon$ , on  $|y| = 0$ . Siispä joukot  $\{|x| = \varepsilon\}$  ja  $\{|y| = \varepsilon\}$  ovat  $\mathbb{S}_\varepsilon^3$ :n erityiskuidut, jotka antavat hajotuksen kahdeksi torukseksi  $\mathbb{S}_\varepsilon^3 = \mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2$ . Täytetyt torukset ovat muotoa

$$\mathbf{T}_1 = \{0 \leq |y| \ll |x| \leq \varepsilon\}$$

$$\mathbf{T}_2 = \{0 \leq |x| \ll |y| \leq \varepsilon\}.$$

**Lemma 7.11.** *Olkoon  $\mathbf{T}_1$  kuten yllä ja merkitään  $\mathbb{T} = \partial\mathbf{T}_1$ . Linkki  $\mathbb{T} \cap V(f)$  on isotooppinen linkkiin  $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$ .*

*Todistus.* Hmm... apuja? En ole määritellyt isotopiaakaan =(


Ilman muuta ymmärrän miksi tämä on totta. Olen tarkoituksella vältellyt isotopian määrittelyä, koska sen voi määritellä 1) käsiä heilutellen helposti 2) täsmällisesti suurella työllä. En oikein osaa arvioida, miten tasapainoilla näiden välillä esimerkiksi tässä.  $\square$

Koska linkkiä voidaan  $\mathbb{S}_\varepsilon^3$ :n sijasta tutkia toruksen pinnalla, on mahdollista osoittaa, että  $V(f)$  on (iteroitu) torussolmu.

**Esimerkki 7.12** (Ensimmäisen asteen approksimaatio). Käyrän  $V(f)$  solmun  $S$  ensimmäisen asteen Puiseux-approksimaatio  $\mathbb{T}$ :ssä  $y = \alpha_1 x^{q_1/p_1}$  on  $(p_1, q_1)$ -torussolmu. Kirjoitetaan  $\mathbb{T} = \{|x| \gg |y| : |x| = \varepsilon, |y| \leq \varepsilon\}$ . Muuttuja  $x$  vastaa toruksen pituuspiiriä ja  $y$  ympäryspiiriä. Parametrisoidaan  $t = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$  ja asetetaan  $x(t) = \varepsilon t^{p_1}$ , mistä seuraa

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha_1 (\varepsilon t^{p_1})^{q_1/p_1} \\ &= \alpha_1 \varepsilon^{q_1/p_1} t^{q_1} \end{aligned}$$


eli  $y$  on vakio kertaa  $t^{q_1}$ . Kun  $t$  kulkee kerran yksikköympyrän  $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$  ympäri, kulkee piste  $(x, y)$  parametrin  $x$  suuntaan  $p_1$  ympyränmatkaa ja  $y$  suuntaan  $q_1$  ympyränmatkaa. Lemman 5.9 nojalla  $S(p_1, q_1) = S(q_1, p_1)$ , joten piste  $(x(t), y(t))$  parametrizoi  $(p_1, q_1)$ -torussolmun. Merkitään tätä approksimaatiota  $S_1$  ja piirretään sille pujoskaavio




**Esimerkki 7.13** (Toisen asteen approksimaatio). Toisen asteen approksimaatio  $S_2$  on muotoa  $y = x^{q_1/p_1}(\alpha_1 + \alpha_2 x^{q_2/p_1 p_2})$ . Parametrisoidaan tällä kertaa  $x = \varepsilon t^{p_1 p_2}$ ,  $t \in \mathbb{S}^1$  ja lasketaan  $y$ :

$$\begin{aligned} y &= (\varepsilon t^{p_1 p_2})^{q_1/p_1} (\alpha_1 + \alpha_2 (\varepsilon t^{p_1 p_2})^{q_2/p_1 p_2}) \\ &= \varepsilon^{q_1/p_1} t^{q_1/p_2} (\alpha_1 + \alpha_2 \varepsilon^{q_2/p_1 p_2} t^{q_2}) \\ &= \alpha_1 \varepsilon^{q_1/p_1} t^{q_1/p_2} + \alpha_2 \varepsilon^{q_1/p_1 + q_2/p_1 p_2} t^{q_1/p_2 + q_2}. \end{aligned}$$

Koska  $\varepsilon$  on pieni,  $0 < \varepsilon < 1$ , on jälkimmäisen termin kerroin huomattavasti ensimmäistä pienempi  $\varepsilon^{q_1/p_1} \gg \varepsilon^{q_1/p_1 + q_2/p_1 p_2}$ . Tällöin  $S_2$  muistuttaa pientä perturbaatiota lukuun ottamatta solmua  $S_1$ . Kulkekoon  $t$  yksikköympyrän ympäri, jonka aikana  $S_1$  kiertää pituuspiirinsä  $p_1$  kertaa ja  $S_2$  kiertää  $p_1 p_2$  kertaa. Siis kun  $S_1$  kiertää pituuspiirinsä kerran, kiertää  $S_2$  tämän  $p_2$  kertaa. On olemassa jokin kokonaisluku  $a_2$ , jolla  $S_2$  on  $(p_2, a_2)$ -torussolmu ja sillä on pujoskaavio



**Lause 7.14.** Olkoon  $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$  algebrallinen linkki ja  $y_k(x)$  polynomin  $f$   $k$ -Puisseux-approksimaatio ( $k$  ensimmäistä termiä). Tällöin  $k$ -Puisseux-approksimaatio on algebrallinen linkki  $(\mathbb{S}^3, S_k)$ , joka koostuu yhdestä  $k$  kertaa iteroidusta torussolmusta. Torussolmu saadaan kaapelijonolla  $(p_1, a_1), \dots, (p_k, a_k)$ , jossa  $(p_i, a_i)$  on kaapeli yli  $(p_{i-1}, a_{i-1})$ :n ja  $(p_1, a_1)$  on torussolmu.  $S_k$ :lla on pujoskaavio



*Todistus.* Todistetaan lause induktiolla. Tapaus  $n = 1$  on jo osoitettu esimerkissä 7.12. Tehdään induktio-oletus, että väitteet pätevät, kun  $n = k$ . Olkoon tapauksessa  $n = k + 1$  käyrän parametrisointi  $x = \varepsilon t^{p_1 \cdots p_{k+1}}$ , jolloin

$$y_{k+1} = (\varepsilon t^{p_1 \cdots p_k})^{q_1/p_1} (\alpha_1 + \dots (\alpha_k + \alpha_{k+1} (\varepsilon t^{p_1 \cdots p_{k+1}})^{q_{k+1}/p_1 \cdots p_{k+1}}) \dots).$$

Jos tulon avaa auki, on kerrointa  $\alpha_{k+1}$  vastaavan  $\varepsilon$ -termin eksponentti suurempi kuin kertoimen  $\alpha_k$   $\varepsilon$ -eksponentti. Esimerkki 7.13 on vain yksinkertaisempi versio tästä. Koska  $\varepsilon < 1$ , niin termi  $k + 1$  lisää vain hieman perturbaatiota termien  $1, \dots, k$  iteroituun torussolmuun.

Kun parametri  $t \in \mathbb{S}^1$  kulkee kerran yksikköympyrän ympäri, kulkee  $k$ :s kaapeli  $(p_k, a_k)$  induktio-oletuksen nojalla pituuspiirinsä ympäri  $p_1 \cdots p_k$  kertaa. Toisaalta tällöin parametrisaatio  $x = \varepsilon t^{p_1 \cdots p_{k+1}}$  kulkee saman pituuspiirin yli  $p_1 \cdots p_k p_{k+1}$  kertaa, joten se kulkee kaapelin  $(p_k, a_k)$  ympäri  $p_{k+1}$  kertaa. Tällöin on olemassa kokonaisluku  $a_{k+1}$ , jolla  $(p_{k+1}, a_{k+1})$  on kaapeli yli kaapelin  $(p_k, a_k)$ .

Siis induktion nojalla  $k$ -Puisseux-approksimaatio on  $k$ -iteroitu torussolmu. Tällöin myös pujoskaavio on luonnollinen, sillä se on täsmälleen painoilla  $(p_i, a_i)$ ,  $i = 1, \dots, k$  iteroidun torussolmun pujoskaavio.  $\square$

**Lemma 7.15.** *Lauseen 7.14 kertoimet  $a_i$  saadaan polynomin  $f$  Puiseux-pareista  $(p_i, q_i)$  rekursiivisilla kaavoilla*

$$\begin{aligned} a_1 &= q_1 \\ a_{i+1} &= q_{i+1} + p_i p_{i+1} a_i, \quad i \geq 1. \end{aligned}$$

*Todistus.* [Eisenbud ja Neumann, 1985], propositio 1A.1. □

Lemman 7.15 jälkeen tunnetaan varsin hyvin algebrallisen käyrän pisteessä  $p \in V(f)$  kutakin haaraa vastaavat solmukomponentit. Tarkastellaan vielä koko linkin kasaamista yksittäisistä komponenteista, minkä jälkeen ymmärrys pistettä vastaavasta algebrallisesta linkistä on kattavaa. Olkoon  $(\mathbb{S}^3, S_1 \cup S_2)$  algebrallinen linkki, joka vastaa Puiseux-kehitelmiä

$$\begin{aligned} S_1 : y &= x^{q_{1,1}/p_{1,1}} (\alpha_{1,1} + \cdots ((\alpha_{1,k-1} + \alpha_{1,k} x^{q_{1,k}/p_{1,1} \cdots p_{1,k}})) \cdots) \\ S_2 : y &= x^{q_{2,1}/p_{2,1}} (\alpha_{2,1} + \cdots ((\alpha_{2,s-1} + \alpha_{2,s} x^{q_{2,k}/p_{2,1} \cdots p_{2,s}})) \cdots) \end{aligned}$$

Oletetaan, että korkeintaan  $n < \min\{k, s\}$  termiä ovat samoja, eli  $(p_{1,i}, q_{1,i}) = (p_{2,i}, q_{2,i})$  ja  $\alpha_{1,i} = \alpha_{2,i}$  kaikille  $1 \leq i \leq n$ , mutta kaikille  $i > n$  vähintään toinen näistä yhtälöistä ei päde.

Tapaukset

- i.  $k = n$
- ii.  $s = n$
- iii. 1. yhtälö ei päde
- iv. 2. yhtälö ei päde

## 8 RPI-kaaviot äärettömyydessä

Tässä osiossa rakennetaan edellisten avulla ensin RPI-kaaviot ja sitten päätulos.

### 8.1 Algebrallisen käyrän pujoskaavio

Määritellään ensin juurretut kaaviot. Usein hyödyttää käsitellä juurrettuja pujoskaavioita, joilla on jokin juurisilmu. Tässä työssä käsitellyn teorian kontekstissa ei ole matemaattisesti oikeaa tapaa määrittää, minkä silmuista pitäisi olla kaavion juuri. Juuren valinta on siis epämatemaattinen ja perustuu johonkin intuitivistiseen syyhyn (joka yleensä on kontekstista selvä). Juurretun kaavion etu on se, että juuri antaa kaaviolle “relativistisen koordinaatiston”.

**Määritelmä 8.1.** Olkoon  $\Omega$  pujoskaavio.  $\Omega$  on *juurrettu*, jos jokin sen silmuista, joka ei ole lehti, valitaan kaavion juureksi.

Millä tavalla juurretty kaavio sitten antaa relativistisen koordinaatiston? Määritellään jokaiselle pujoskaavion kaarelle lähi- ja kaukopää.

**Määritelmä 8.2.** Olkoon  $\Omega$  juurrettu pujoskaavio. Olkoon  $v$  jokin kaari ja  $l, k$  kaaren silmut. Kuljettakoon kummastakin silmusta lyhyin reitti (matkalla olevien silmujen määrässä mitattuna) kaavion juuren luo, ja olkoon  $\gamma(\cdot) \in \mathbb{N}$  matkalla olevien silmujen määrä alkupiste  $l$  tai  $k$  poislukien. Jos

$$\gamma(l) < \gamma(k),$$

niin  $l$  on  $v$ :n *lähipää* ja  $k$  sen *kaukopää*. Päitä vastaavia painoja kutsutaan samaten *lähi-* ja *kaukopainoiksi*.

*Huomautus 8.3.* Lukijan on syytä huomata, että  $\gamma(l) \neq \gamma(k)$  aina, sillä muutoin kaaviossa olisi silmukka.

Rajoittamalla tutkimus sopivan hyvin käyttäytyviin kaavioihin löytyy yksinkertainen vastaavuus algebrallisten painojen ja pujoskaavioiden välillä. Tällainen kaavio on RPI-pujoskaavio.

**Määritelmä 8.4.** Olkoon  $\Omega$  juurrettu pujoskaavio.  $\Omega$  on *RPI-pujoskaavio* (englannista *Reverse Puiseux Inequalities*, käänteiset Puiseux-epäyhtälöt), jos

1. jokaisella silmulla on korkeintaan yksi lähipaino, joka ei ole 1,
2. kaikki lähipainot ovat positiivisia ja
3. kaikki kaarideterminantit ovat negatiivisia, mukaanlukien juurisilmun kaaret tapauksessa  $n = 1$  ja muutoin.

Algebrallisten käyrien kannalta kiinnostavaa on ymmärtää, miten käyrä käyttäytyy äärettömyydessä. On mahdollista määritellä mielekkäällä tavalla käyrän linkki äärettömyydessä, käyttäen samoja ideoita kuin määrittellessä käyrän linkkiä sen singulariteetissa. Toistetaan vielä työssä todistettava päätulos.

**Lause 1.2.** (i) Pelkistetty algebrallinen käyrä  $V \subset \mathbb{C}^2$  jollakin upotuksella  $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$  määrittää RPI-pujoskaavion  $\Omega$   $V$ :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee  $n_\infty(V) = n$ , missä  $n$  on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi  $\deg(V) = \ell_{\text{root}}$ , jossa  $\ell_{\text{root}}$  on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos  $V$  on säännöllinen käyrä,  $\Omega$  on säännöllinen (määritelmä???) pujoskaavio.

(ii) Linkki on jonkin äärettömyyslinkin (joka voidaan valita säännölliseksi (määritelmä???), jopa hyväksi (määritelmä???) osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.

**Ajatus.** Lause on sangen tiukasti muotoiltu, mutta sen ydinajatus on seuraava.

- i Minkälainen solmu tai pujoskaavio algebrallisella käyrällä on?
- ii Millä ehdoilla algebralliset käyrät vastaavat linkkejä ja pujoskaavioita yksi yhteen?


*Lausen 1.2(i) todistus.* Tarkastelun kohteena ovat käyrät  $V$ , joilla on upotus  $V \hookrightarrow \mathbb{C}^2$ , missä kompleksiavaruudella on jokin sopiva upotus projektiiviseen tasoon  $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2$ .  $V$ :llä on olemassa jokin projektiivinen laajennus  $C$ , joka myös saattaa saada erisuuria arvoja äärettömyydessä riippuen  $V$ :n haarojen asymptotiikasta.

Tarkemmin sanottuna  $V = C - (C \cap \mathbb{P}^1) \subset \mathbb{P}^2 - \mathbb{P}^1 = \mathbb{C}^2$ , missä  $C$  on jokin pelkistetty<sup>7</sup> projektiivinen käyrä. Jos oletetaan, että  $\mathbb{P}^1$  ei ole käyrän  $C$  komponentti, niin

$$C \cap \mathbb{P}^1 = \{P_1, \dots, P_n\}, \quad n < \infty,$$

sillä myös  $\mathbb{P}^1$  voidaan nähdä algebrallisena käyränä  $\mathbb{P}^2$ :ssa. Olkoon  $D' \hookrightarrow \mathbb{P}^1$  siten, että  $C \cap \mathbb{P}^1 \subset D'$  leikkauspisteet sisältävä levy. Olkoon  $D$   $\mathbb{P}^2$ :ssa säännöllinen (määritelmä???) 4-levy-ympäristö  $D'$ :lle, siten että reuna  $R = \partial D$  leikkaa  $C$ :n ja  $\mathbb{P}^1$ :n transversaalisesti (määritelmä???)

Tällöin  $L_0 = (R, (\mathbb{P}^1 \cup C) \cap R)$  on linkki, jota voidaan esittää pujoskaaviolla 1.



Pujoskaavio 1

□

## 9 Yhteenveto

Tosiaan.

## Viitteet

Egbert Brieskorn ja Horst Knörrer. *Plane Algebraic Curves*. Springer, 1986. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5097-1>.

David Eisenbud ja Walter D. Neumann. *Three-Dimensional Link Theory and Invariants of Plane Curve Singularities*, volume 110 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1985. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bgzb9w>.

Andreas Gathmann. Algebraic geometry. Lecture notes, 2026. URL <https://agag-gathmann.math.rptu.de/en/alggeom.php>.

Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. URL <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.

<sup>7</sup>Ei toistuvia pelkistymättömiä komponentteja

Aleksis Koski. General topology, Maaliskuu 2024. URL <https://atkoski.fi/topology.pdf>. Lecture notes.

John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-1.

James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-13-181629-9.

Dale Rolfsen. *Knots and Links*. AMS Chelsea Publishing, 1976.

## A Esimerkki liitteestä

Liitteet eivät ole opinnäytteen kannalta välttämättömiä ja opinnäytteen tekijän on kirjoittamaan ryhtyessään hyvä ajatella pärjäävänsä ilman liitteitä. Kokemattomat kirjoittajat, jotka ovat huolissaan tekstiosan pituudesta, paisuttavat turhan helposti liitteitä pitääkseen tekstiosan pituuden annetuissa rajoissa. Tällä tavalla ei synny hyvää opinnäytettä.

Liite on itsenäinen kokonaisuus, vaikka se täydentääkin tekstiosaa. Liite ei siten ole pelkkä listaus, kuva tai taulukko, vaan liitteessä selitetään aina sisällön laatu ja tarkoitus.

Liitteeseen voi laittaa esimerkiksi listauksia. Alla on listausesimerkki tämän liitteen luomisesta.

```
\clearpage
\appendix
\addcontentsline{toc}{section}{Liite A}
\section*{Liite A}
...
\thispagestyle{empty}
...
tekstiä
...
\clearpage
```

Kaavojen numerointi muodostaa liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$d \wedge A = F, \tag{A1}$$

$$d \wedge F = 0. \tag{A2}$$

## B Toinen esimerkki liitteestä

Liitteissä voi myös olla kuvia, jotka eivät sovi leipätekstin joukkoon: Liitteiden taulukoiden numerointi on kuvien ja kaavojen kaltainen: Kaavojen numerointi muodostaa

Taulukko B1: Taulukon kuvateksti.

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.00–9.55  | Käytettävyystestauksen tiedotustilaisuus<br>(osanottajat ovat saaneet sähköpostitse valmistautumistehtävät, joten tiedotustilaisuus voidaan pitää lyhyenä). |
| 9.55–10.00 | Testausalueelle siirtyminen                                                                                                                                 |

liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$T_{ik} = -pg_{ik} + wu_i u_k + \tau_{ik}, \quad (\text{B1})$$

$$n_i = nu_i + v_i. \quad (\text{B2})$$

## C Matemaattisten lauseiden todistukset

Systeemianalyysin töissä matemaattisten lauseiden todistukset laitetaan yleensä liitteiksi. Leipätekstissä lauseen yhteydessä todistuksen todetaan löytyvän liitteestä XX. Tämä ei koske matematiikan töitä, joissa lauseiden todistukset voivat olla merkittävä osa varsinaista työtä!

**Määritelmä C.1.** Tässä määritellään  $1 = 1$ .

**Lause C.2** (Roposen lause). *Lukiomatematiikassa kolmannen asteen yhtälöillä on aina vähintään yksi kokonaislukuratkaisu välillä  $[-3, 3]$ .*

*Todistus.* Jätetään harjoitustehtäväksi. □

*Huomautus C.3.* Lause [C.2](#) saattaa olla väärin.

Tiedoston opinnaytepohja.tex alusta löytyy myös muita teoreema- ym. tyylejä sekä suomeksi että englanniksi, joten katso löytyykö sieltä käyttöösi sopiva. Voit myös määritellä itse lisää.