

Opinnäytteen otsikko

Oscar Escartín

Perustieteiden korkeakoulu

Kandidaatintyö

Espoo 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Vastuuopettaja

Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja

Prof. Oscar Kivinen

Copyright © 2026 Oscar Escartín

The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University.
All other rights are reserved.



Tekijä Oscar Escartín

Työn nimi Opinnäytteen otsikko

Koulutusohjelma Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Pääaine Matematiikka ja systeemitieteet

Pääaineen koodi SCI3029

Vastuupettaja Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja Prof. Oscar Kivinen

Päivämäärä 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Sivumäärä 22+3

Kieli Suomi

Tiivistelmä

Tiivistelmässä on lyhyt selvitys kirjoituksen tärkeimmästä sisällöstä: mitä ja miten on tutkittu, sekä mitä tuloksia on saatu.

Tämän opinnäytteen tiivistelmäteksti kirjoitetaan opinnäytteen luettavan osan lomakkeen lisäksi myös pdf-tiedoston metadataan \thesisabstract-makron avulla (katso yllä). Kirjoita tähän luettavaan tiivistelmälomakkeeseen menevä teksti. Tässä saa olla erikoismerkkejä kuten kreikkalaiset kirjaimet ja rivinvaihto- ja kappaleenjako-merkit. Tämän tekstin on muuten oltava sama kuin metedatatiivistelmän teksti.

Jos tiivistelmäsi ei sisällä erikoismerkkejä eikä kaipaa kappaleenjakoja, voit hyödyntää makroa \abstracttext joka käyttää ylläantamaasi metedata-kelpoista tiivistelmää (katso kommentti alla).

Avainsanat Avainsanoiksi valitaan kirjoituksen, sisältöä keskeisesti, kuvaavia, käsitteitä

Author Oscar Escartín

Title Thesis template

Degree programme Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Major Matematiikka ja systeemitieteet

Code of major SCI3029

Teacher in charge Prof. Oscar Kivinen

Advisor Prof. Oscar Kivinen

Date 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI** **Number of pages** 22+3 **Language** Finnish

Abstract

Your abstract in English. Keep the abstract short. The abstract explains your research topic, the methods you have used, and the results you obtained.

Keywords Resistor, resistance, temperature

Sisällys

Tiivistelmä	3
Tiivistelmä (englanniksi)	4
Sisällys	5
1 Johdanto	7
2 Differentiaaligeometriaa	7
2.1 Sileät monistot	8
2.2 Tangenttiavaruus	9
2.3 Vektoriavaruuden suunnistus	9
2.4 Suunnistus monistossa	10
3 Algebrotopologiset määritelmät	10
3.1 Kimput	11
3.2 Kuidut	11
3.3 Putket	12
3.4 Homologiaa pintapuolisesti	12
3.5 Homologia (aksiomaattinen yritys)	14
4 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet	15
4.1 Affiinit algebralliset käyrät kompleksitasossa	15
4.2 Singulariteetit ja säännöllisyys	15
4.3 Projektiivinen taso ja suora	16
4.4 Upotus $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2$	16
4.5 Projektiiviset käyrät	17
5 Solmut ja linkit	17
5.1 Perusmääritelmät	18
5.2 Torussolmut	18
5.3 Pujonta	18
6 Pujoskaavio	19
6.1 Pujoskaavion synty	19
6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia	20
6.3 Monimutkainen esimerkki	21
7 Dehnin kirurgia	21
8 RPI-kaaviot äärettömyydessä	21
9 Yhteenveto	21
A Esimerkki liitteestä	23

B	Toinen esimerkki liitteestä	24
C	Matemaattisten lauseiden todistukset	25

1 Johdanto

Merkintätapoja.

- $\approx$ homeomorfismi
- $\mathbf{L}, \mathbf{K}$ linkki ja solmu
- $N(\mathbf{L}), N(\mathbf{K})$ linkin ja solmun putkiympäristö
- M_i, L_i linkin osasen pituus- ja leveyspiiri
- $\#$ topologisten monistojen yhtenäinen summa
-

Tämän tekstin lähteenä oleva tiedosto on opinnäytteen pohja, jota voi käyttää kandidaatintyössä, diplomityössä ja lisensiaatintyössä. Tekstin lähteenä oleva tiedosto on kirjoitettu L^AT_EX-tiedoston rakenteen opiskelemista ajatellen. Tiedoston kommentit sisältävät tietoa, joka on hyödyllistä opinnäytettä kirjoitettaessa.

Johdanto selvittää samat asiat kuin tiivistelmä, mutta laveammin. Johdannossa kerrotaan yleensä seuraavat asiat

- Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaiheen yleisluonteinen esittely
- Tutkimuksen tavoitteet
- Pääkysymys ja osaongelmat
- Tutkimuksen rajausta ja keskeiset käsitteet.

Lyhyiden opinnäytteiden johdannot ovat yleensä liian pitkiä, joten johdannon paisuttamista on vältettävä. Diplomityöhön sopii johdanto, joka on 2–4 sivua. Kandidaatintyön johdannon on oltava diplomityön johdantoa lyhyempi. Sopivasti tiivistetty johdanto ei kaipaa alaotsikoita.

2 Differentiaaligeometriaa

Käyrien muodostamien linkkien tutkimiseen tarvitaan (sileiden) monistojen teoriaa. Monistot ovat geometrisia rakenteita, jotka muistuttavat paikallisesti euklidista avaruutta. Ne mahdollistavat *avaruuden rakenteen* käsitteen. Algebrallisten solmujen kannalta tämä on olennaista, sillä solmujen tutkimista helpottaa niiden upottaminen monistoon. Tässä työssä noudatetaan lähteen [Lee, 2012] merkintätapoja.

Huomautus 2.1. Tässä osiossa, kuten kirjallisuudessa yleisesti, käsitellään $\mathbb{R}$ -monistoja, vaikka työ muuten käsittelee $\mathbb{C}$ -käyriä. Monistojen teoria sellaisenaan ei kuitenkaan välitä skalaareiden reaalisuudesta, ja isomorfia $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ sallii teorian siirtämisen kompleksiluvuille.

2.1 Sileät monistot

Sileiden monistojen määrittely on jotakuinkin teknistä niiden ymmärrettävyyteen verrattuna. Kärsimätön lukija voi ohittaa osion, ja ajatella monistoja n -ulotteisina pintoina, jotka $n + 1$ -ulotteiseen avaruuteen upotettuna näyttävät paikallisesti n -ulotteisilta tasoilta, mutta saattavat globaalisti olla vääntyneitä.

Sileä monisto on sellainen monisto, joka ei ole ”rutussa”, jolloin sen pinnalla voi integroida ja derivoida käyriä. Esimerkiksi maapallo on sileä 2-ulotteinen monisto.

Määritelmä 2.2. Olkoon M topologinen avaruus. M on n -ulotteinen topologinen monisto, jos

- M on Hausdorff-avaruus
- M on N_2 -avaruus
- M on paikallisesti euklidisesti n -ulotteinen: kaikilla $p \in M$ on avoin ympäristö $U \subset M$, joka on homeomorfinen johonkin $\mathbb{R}^n$:n avoimeen osajoukkoon $V \subset \mathbb{R}^n$.

Huomautus 2.3. Yleisesti kirjoitetaan ”olkoon M^n monisto”, jolla tarkoitetaan, että M on n -ulotteinen monisto.

Esimerkki 2.4. Esimerkiksi Maapallo on 2-ulotteinen monisto, koska paikallisesti Maapallon pinta muistuttaa tasoa. Maapallo on erityistapaus algebrallisesta pinnasta, koska sen polynomiyhtälö $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Määritelmä 2.5. Olkoon M^n monisto. M :n koordinaattikartta on pari (U, φ) , jossa $U \subset M$ on avoin ja $\varphi : U \rightarrow \hat{U}$ on homeomorfismi avoimeen joukkoon $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$. Koordinaattikartan koordinaattikuvaus on φ .

Esimerkki 2.6. Yleisesti algebrallinen hyperpinta $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0$ määrittää n -ulotteisen moniston $\mathbb{R}^{n+1}$:ssä.

Määritelmä 2.7. Jos $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$, funktio $f : U \rightarrow V$ on sileä, jos sen jokaisella komponenttifunktiolla on jatkuvat asteen n osittaisderivaatat kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

Määritelmä 2.8. Kuvaus $f : A \rightarrow B$ on diffeomorfismi, jos f on bijektio ja f ja f^{-1} ovat sileitä.

Määritelmä 2.9. Moniston M atlas $\mathcal{A}$ on kokoelma karttoja $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ siten, että karttojen lähtöjoukot peittävät moniston M : kaikille $p \in M$ on olemassa $i \in I$, jolle $p \in U_i$. Jos koordinaattikartat ovat pareittain sileästi yhteensopivia, eli

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j) \quad (1)$$

tai $U_i \cap U_j = \emptyset$, niin $\mathcal{A}$ on sileä atlas.

Määritelmä 2.10. Monisto M on sileä monisto, jos sillä on sileä atlas.

2.2 Tangenttiavaruus

Keskeinen osa sileiden monistojen motivaatiota on derivoimisen mahdollistaminen avaruuksissa, jotka ovat globaalisti kaarevia. Alunperin derivointi määriteltiin käyrille $\mathbb{R}^2$:ssa tangenttien avulla. Tässä tilanteessa käyrää voidaan ajatella sileänä 1-monistona. Mitä jos käyrä ei olekaan upotettu $\mathbb{R}^2$:een? Käyrälle ajatus voi tuntua naurettavalta, mutta moniulotteisemmissa monistoissa tilanne ei ole enää selvä. Esimerkiksi maailmankaikkeus on jonkinlainen monisto, mutta mihin avaruuteen se on upotettu?

On selvää, että tangentti ei sellaisenaan yleisty monistoille ja tarvitaan tarkempi määritelmä. Hyvän määritelmän ymmärtäisi myös moniston “sisällä” elävä olio. Tangenttiavaruuden määrittely alkaa derivaatan yleistyksestä derivaatiosta.

Määritelmä 2.11. Olkoon M sileä n -monisto ja $p \in M$. Olkoon $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ lineaarinen kuvaus. Jos se tyydyttää Leibniz-säännön

$$v(fg) = f(p)vg + g(p)vf, \quad \text{kaikille } f, g \in C^\infty(M), \quad (2)$$

niin v on *derivaatio* p :ssä.

Määritelmä 2.12. Kaikkien derivaatioiden joukko p :ssä, merkitään T_pM , on M :n *tangenttiavaruus* p :ssä. Jos $v \in T_pM$, niin v on *tangenttivektori* p :ssä.

Joissakin tapauksissa hyödyllinen on myös konsepti, joka niputtaa kaikki tangenttiavaruudet yhteen.

Määritelmä 2.13. Moniston M *tangenttikimppu* on erillinen yhdiste

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM. \quad (3)$$

2.3 Vektoriavaruuden suunnistus

Toisin kuin tutuissa vektoriavaruuksissa $\mathbb{R}^3 \cong \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$, yleisessä vektoriavaruudessa V ei ole päivänselvää tapaa määrittää “positiivista” tai “negatiivista” suuntaa.

Esimerkki 2.14. Olkoon V 2-ulotteinen vektoriavaruus, jonka kanta on $\{\sin \theta, \cos \theta\}$. Kumpi suunnistetuista kannoista $(\sin \theta, \cos \theta)$ ja $(\cos \theta, \sin \theta)$ on positiivinen?

Vektoriavaruuden tai moniston oikeaoppinen suunnistus voidaan kuitenkin kääntää muodollisiksi matemaattisiksi ilmaisuiksi *differentiaalimuotojen* avulla. Aloitetaan kuitenkin hyvin määritellyistä suunnistuksista.

Määritelmä 2.15. Olkoon V reaalin n -vektoriavaruus. Kaksi suunnistettua kantaa $(e_1, \dots, e_n)$ ja $(f_1, \dots, f_n)$ ovat *yhtäpitävästi suunnistettuja*, jos niiden muuntomatriisille, jonka määrittää yhtälö

$$e_i = B_i^j f_j, \quad (4)$$

pätee $\det(B_i^j) > 0$.

Tämä muuntomatriisi määrittää ekvivalenssirelaation, joka jakaa kannat kahteen joukkoon.

Lemma 2.16. *Vektoriavaruuden yhtäpitävä suunnistus on sen kantojen ekvivalenssirelaatio, jolla on tasan kaksi ekvivalenssiluokkaa.*

Todistus. ???

□

Matemaatikon tehtäväksi jää määritellä toinen näistä luokista “positiiviseksi” ja toinen “negatiiviseksi”. Tämän jälkeen voidaan määritellä suunnistus vektoriavaruudessa.

2.4 Suunnistus monistossa

Moniston M suunnistus määritellään sen tangenttiavaruuden suunnistuksen kautta.

Määritelmä 2.17. Olkoon M sileä n -monisto. M :n *pisteittäinen suunnistus* on suunnistuksen valinta jokaiselle tangenttiavaruudelle $T_p M$, $p \in M$.

Sellaisenaan tämä ei ole järkevä hyödyllinen määritelmä, sillä suunnistus voi vaihdella pisteestä toiseen. Toivottavaa olisi etenkin, että moniston sileillä alimonistoilla (käyrillä), suunnistus muuttuisi sileästi alimoniston (käyrän) kaartuessa.

Määritelmä 2.18 (Local frame, paikallinen kehys). ???

Määritelmä 2.19. Olkoon (e_i) tangentialikimpun TM paikallinen kehys. Tällöin (e_i) on *(positiivisesti) suunnistettu*, jos $(e_1|_p, \dots, e_n|_p)$ on (positiivisesti) suunnattu $T_p M$:n kanta kaikilla $p \in U$.

Pisteittäinen suunnistus on *jatkuva*, jos jokainen $p \in M$ on jossakin suunnistetussa kehyksessä.

Moniston M *suunnistus* on jatkuva pisteittäinen suunnistus.

3 Algebrotopologiset määritelmät

Tässä työssä solmujen ominaisuuksien tutkimiseen tarvitaan topologiaa työkaluja. Tämän osion päätarkoituksena on määritellä harvinaisia, solmuteorialle tyypillisiä konstruktioita ja peruskäsitteistö oletetaan lukijan hallitsemaksi.¹ Algebrallisen topologian käsitteistöä seuraillaan Hatcherin [Hatcher, 2002] kirjaa.

Tämä osio palvelee kahta tarkoitusta: putkiympäristön käsitteen kehittämistä sekä teknisempää todistusta siitä, että kahden homologisen n -pallon yhteen pujominen² tuottaa homologisen n -pallon. Käyrän putkiympäristöä voi ajatella pienenä käyrää seurailevana täytettynä putkena. Homologisia palloja koskeva lause varmistaa, että kun kaksi eri avaruuksissa elävää solmua pujotaan yhteen, elää tulossolmu myös “hyvänlaatuisessa” avaruudessa.

¹Topologian peruskäsitteistöä tuntematonta lukijaa suositetaan perehtymään esimerkiksi tiiviiseen luentomuistiinpanoon [Koski, 2024] tai syvällisempään johdantoon [Munkres, 2000].

²Pujominen määritellään solmuja koskevassa kappaleessa ???

Formaaleista muotoiluista kiinnostunut lukija voi tutustua osakappaleisiin tarkemmin, mutta niiden sivuuttaminen ei estä lainkaan myöhempiin kappaleisiin perehtymistä.

3.1 Kimput

Kuitukimppua voidaan pitää topologisten avaruuksien tulon $X \times Y$ yleistyksenä sikäli, että se sallii “vääntyneen” tulon. Vektorikimppu on kuitukimppun erityistapaus.

Määritelmä 3.1 (Kuitukimppu). *Kuitukimppu* on nelikko (E, B, π, F) , missä E, B ja F ovat topologisia avaruuksia ja $\pi : E \rightarrow B$ jatkuva surjektio, joka tyydyttää paikallisen triviaaliuden ehdon (alla). Sivun 386 alg. top. kirjasta.

Määritelmä 3.2 (Vektorikimppu). Olkoon M topologinen avaruus. Asteen k $\mathbb{K}$ -vektorikimppu M :n yli on jatkuvalla surjektiolla $\pi : E \rightarrow M$ varustettu topologinen avaruus E siten, että

1. kaikille $p \in M$ kuitu $E_p = \pi^{-1}(p)$ yli p :n voidaan varustaa k -ulotteisen $\mathbb{K}$ -vektoriavaruuden rakenteella ja
2. kaikille $p \in M$ on olemassa p :n ympäristö $U \subset M$ ja homeomorfismi $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{K}^k$ siten, että
 - $\pi_U \circ \Phi = \pi$ (jossa $\pi_U : U \times \mathbb{K}^k \rightarrow U$ on projektio) ja
 - kaikille $q \in U$ $\Phi|_{E_q}$ on vektoriavaruusisomorfia $E_q \cong \{q\} \times \mathbb{K}^k \cong \mathbb{K}^k$.

3.2 Kuidut

Määritelmä 3.3 (Homotopinen nosto-ominaisuus). Kuvaus $\pi : E \rightarrow B$ tyydyttää *homotopisen nosto-ominaisuuden* avaruudelle X , jos

- kaikille homotopioille $g : X \times [0, 1] \rightarrow B$ ja
- kaikille kuvauksille $\tilde{g}_0 : X \rightarrow E$ nostaen $g_0 = g(\cdot, 0)$:n, eli $p \circ \tilde{g}_0 = g_0$,

on olemassa homotopia $\tilde{g} : X \times [0, 1] \rightarrow E$ nostaen g :n (eli $g = p \circ \tilde{g}$) niin, että $\tilde{g}_0 = \tilde{g}|_{X \times \{0\}}$. Kommutoiava kaavio havainnollistaa tilanteen:

$$\begin{array}{ccc}
 X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{g}_0} & E \\
 \downarrow & \nearrow \tilde{g} & \downarrow \pi \\
 X \times [0, 1] & \xrightarrow{g} & B
 \end{array} \tag{5}$$

Määritelmä 3.4. *Kuidutus* on kuvaus $\pi : E \rightarrow B$, jolla on homotopinen nosto-ominaisuus kaikkien avaruuksien X suhteen.

Määritelmä 3.5. Olkoon $\pi : E \rightarrow B$ kuidutus. Kuidutus on *paikallisesti triviaali*, jos kaikille $x \in B$ on olemassa avoin ympäristö $U \subset B$ siten, että

$$\pi^{-1}(U) \approx U \times F.$$

Määritelmä 3.6. Jos E on pohja-avaruuden B kuitukimppu $\pi : E \rightarrow B$, niin *kuitukimppun sektio* on jatkuva kuvaus $\sigma : B \rightarrow E$ siten, että $\pi \circ \sigma = \text{id}_B$.

3.3 Putket

Määritelmä 3.7. Olkoot S, M : $S \subset M$ sileitä monistoja. S :n putkiympäristö M :ssä on pari (π, J) , jossa $\pi : E \rightarrow S$ on vektorikimppu ja $J : E \rightarrow M$ on sileä kuvaus, siten että

- $J \circ 0_E = i$, i on upotus $S \hookrightarrow M$ ja 0_E nollasektio
- on olemassa avoimet joukot $U \subset E$, $V \subset M$ siten, että $0_E[S] \subset U$ ja $S \subset V$ niin, että rajoitus $J|_U$ on diffeomorfismi.

Lause 3.8 (Putkiympäristölause). *Jokaisella sileän moniston upotetulla sileällä alimonistolla on putkiympäristö.*

Todistus. Todistus on vaikea ja löytyy lähteestä ???.

□

Ajatus. Ajattele esimerkiksi algebrallista käyrää $\mathbb{R}^3$:ssa. Sen putkiympäristö on käyrää seuraileva kolmiulotteinen mato, jonka poikkileikkaukset ovat levyjä, joiden lävistäjä voi vaihdella.

Määritelmä 3.9. Olkoon $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ polynomikuvaus. Sen kuitua $f^{-1}(c)$, $c \in \mathbb{C}$ kutsutaan *säännölliseksi*, mikäli jollekin c :n ympärisölle D kuvaus $f|_{f^{-1}(D)} : f^{-1}(D) \rightarrow D$ on paikallisesti triviaali C^∞ -kuidutus.

Kuitu $f^{-1}(c)$ on *säännöllinen äärettömyydessä*, jos jollekin c :n ympäristölle E ja kompaktille osajoukolle $K \subset \mathbb{C}^2$ kuvaus $f|_{f^{-1}(D)-K}$ on paikallisesti triviaali kuidutus.

Jos kaikki f :n kuidut ovat säännöllisiä äärettömyydessä niin f on *hyvä*.

Huomautus 3.10. “Säännöllinen” ja “säännöllinen äärettömyydessä ja epäsingulaarinen” ovat yhtäpitäviä.

Ajatus. Säännöllisyys on matemaattinen muotoilu idealle, että läheiset kuidut “näyttävät samalta” kuin $f^{-1}(c)$. Säännöllisyys äärettömyydessä muotoilee tämän samalta näyttämisen äärettömyyden “lähellä”.

3.4 Homologiaa pintapuolisesti

Homologia on sisällöltään rikas ja tekninen matematiikan osa-alue, jonka tarkoituksena on tutkia topologisten avaruuksien rakennetta ja reikiä. Homologian ehtisi tässä työssä esitellä vain lyhyesti, mikä ei tee aihepiirille oikeutta syvyytensä vuoksi; siispä aiheen esittely ohitetaan tässä työssä, mutta kiinnostunutta lukijaa ohjataan tutustumaan erinomaiseen Hatcherin materiaaliin [Hatcher, 2002].

Tässä aliosiossa esitetään kuitenkin lyhyt motivaatio homologialle sekä määritelmään pari työssä keskeistä käsitettä. Määritelmät tarjoillaan intuitiivisen selityksen kera, homologiaa tuntematonta lukijaa silmälläpitäen.

Ajatus. Homologia tutkii topologisten avaruuksien *erilaisuutta* avaruuksien *reikäisyyden* kautta. Reikäisyys on yllättävän vaikeaa määritellä, mutta se auttaa myös yllättävän hyvin erottelemaan avaruuksia toisistaan, esimerkiksi pallon ja toruksen.

Esimerkki 3.11. Ympyrä $\mathbb{S}^1$ ja kahdeksikko eivät ole homologisia. Ympyrällä sulkee sisäänsä yhden reiän, kahdeksikko kaksi reikää.

Ympyrän sisäänsä sulkema reikä on tietyssä mielessä kaksiulotteinen. Sitä rajaa yksiulotteinen ympyrä, ja sen paikalle voisi piirtää 2-pinnan. Samaan tapaan on olemassa kolmiulotteisia reikiä. Tällaisen sulkee sisäänsä $\mathbb{S}^2$. Tähän reikään ei voi päästä kolmiulotteisessa avaruudessa käsiksi kulkematta $\mathbb{S}^2$:n pinnan läpi, mutta neljättä ulottuvuutta pitkin reiän läpi voi kulkea koskematta $\mathbb{S}^2$:een.

Käytännössä homologiassa lasketaan homologiaryhmiä $H_n(X)$, missä X on topologinen avaruus. Alaindeksi n kertoo, että kyseessä on n :s homologiaryhmä, joka tavallaan mittaa avaruuden n -ulotteisia reikiä.

Esimerkki 3.12. Ympyrälle $\mathbb{S}^1$ homologiaryhmät ovat

$$H_i(\mathbb{S}^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 1 \\ 0, & i > 1 \end{cases}.$$

Nollas homologiaryhmä H_0 mittaa avaruuden yhtenäisten komponenttien määrää. $H_0(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$ tarkoittaa, että ympyröitä voisi olla k kappaletta liimattuna päällekkäin, $k \in \mathbb{Z}$ tai nolla, jos $k = 0$.

H_1 mittaa 1-ulotteisten reikien määrää, sitä, montako silmukkaa avaruus tekee yksiulotteisesti.

H_n mittaa n -ulotteisten reikien määrää, mutta $\mathbb{S}^1$:llä ei ole n -ulotteisia reikiä.

Esimerkki 3.13. Pallon $\mathbb{S}^2$ tapauksessa $H_2(\mathbb{S}^2) = \mathbb{Z}$, mutta $H_1(\mathbb{S}^2) = 0$, koska pallon pinnalle piirretyn ympyrän voi aina kiristää pisteeksi, mutta pinnalle asetettua huppua ei voi.

Esimerkki 3.14. Toruksella $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ on mielenkiintoisempia ryhmiä:

$$H_i(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & i = 1 \\ 0, & i > 2 \end{cases}$$

Ryhmä H_1 selittyy sillä, että toruksen pinnalle voi piirtää kaksi silmukkaa, joita ei voida muuntaa toisikseen: toruksen ison akselin ympäri, sekä toruksen paksuutta pitkin.

Mitä ympyröiden homologiaryhmiin tulee, lukija saattoi huomata jo kaavaan, joka todistetaan lemmassa 3.15.

Lemma 3.15. *Kaikille n -palloille $\mathbb{S}^n$ pätee*

$$\begin{aligned} H_0(\mathbb{S}^n) &= H_n(\mathbb{S}^n) = \mathbb{Z}, \\ H_k(\mathbb{S}^n) &= 0, \quad k \neq n. \end{aligned}$$

Todistus. Mayer-Vietoris-jono. □

Homologia ei ole kuitenkaan täydellinen keino topologisten avaruuksien erottelemiseksi. On olemassa avaruuksia, jotka eivät ole homeomorfisia, vaikka niiden homologiaryhmät ovat samat kaikilla $n \in \mathbb{N}_0$. Työn kannalta tärkeä yleinen avaruus, jossa työskennellään paljon, on avaruus, joka ainakin homologisesti muistuttaa palloa.

Määritelmä 3.16. Topologinen n -monisto X on *homologinen n -pallo*, jos se tyydyttää lemmän 3.15 yhtälöt, ts.

$$\begin{aligned} H_0(X) &= H_n(X) = \mathbb{Z} \\ H_k(X) &= 0, \quad k \neq n \end{aligned}$$

3.5 Homologia (aksiomaattinen yritys)

Tämä on vähän epätoivoinen yritys sisällyttää homologia työhön. Taidan poistaa koko osion.

Tämän aliosion tarkoitus on kiinnittää työssä käytettävä homologian sanasto. Työn tiivis esitys ei tee oikeutta homologialle ja homologiaa tuntematonta lukijaa suositellaankin sivuuttamaan osio, tai tutustumaan homologiaan Hatcherin kirjan avulla [Hatcher, 2002]. Aliosio on pikemminkin suunnattu homologiaa tuntevalle lukijalle, joka haluaa varmistaa termistön, tai palata työn myöhemmistä osioista tarkistamaan määritelmiä. Sanastossa noudatetaan kuitenkin yleisiä tapoja, joten myös homologiaa tunteva lukija voi sivuuttaa aliosion.

Määritelmä 3.17. *CW-kompleksi* on topologinen avaruus X , joka muodostetaan algoritmisesti:

1. Valitaan diskreetti joukko X^0 , jonka alkioita kutsutaan X :n *0-soluiksi*.
2. Muodostetaan induktiivisesti n -luuranko X^n X^{n-1} :stä liittämällä n -soluja e_α^n kuvauksilla $\varphi_\alpha : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. X^n on tekijä-avaruus

$$X^n = \frac{X^{n-1} \sqcup_\alpha D_\alpha^n}{\sim}, \quad (6)$$

missä $\sim$ on relaatio $x \sim \varphi_\alpha(x)$, kun $x \in \partial D_\alpha^n$. Joukon $D_\alpha^n - \partial D_\alpha^n$ kuva tekijäkuvauksen suhteen ja solu e_α^n ja ovat homeomorfisia.

3. Jatkamalla prosessia saadaan $X = \bigcup_n X^n$ ja se voidaan varustaa heikolla topologialla: $A \subset X$ on avoin (suljettu) jos ja vain jos $A \cap X^n$ on avoin (suljettu) X^n :ssä kaikille $n \in \mathbb{N}$.

Aksiooma 3.18 (Homologia-aksioomat). 1. Jos $f \cong g : X \rightarrow Y$ niin $f_\bullet = g_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$.

2. On olemassa reunahomomorfismit $\partial : \tilde{h}_n(X/A) \rightarrow \tilde{h}_{n-1}(A)$ määritelty kaikille CW-pareille (X, A) , siten että jono

$$\cdots \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_n(A) \xrightarrow{i_\bullet} \tilde{h}_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_{n-1}(A) \xrightarrow{i_\bullet} \cdots \quad (7)$$

on tarkka. Jonossa i on inklusio ja q tekijäkuvaus.

Määritelmä 3.19. Pelkistetty homologioteoria antaa epätyhjille CW-komplekseille X jonon

- abelisia ryhmiä $\tilde{h}_n(X)$ ja
- homomorfismeja $f_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$ jokaista CW-kompleksien välistä kuvausta $f : X \rightarrow Y$ kohden, siten että
 - $(fg)_\bullet = f_\bullet g_\bullet$.
 - $\mathbb{1}_\bullet = \mathbb{1}$,

siten, että homologia-aksiomat pitävät.

4 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet

Tämän osion tarkoituksena on esitellä tiiviisti algebrallisten käyrien, projektiivisten avaruuksien ja projektiivisten käyrien määritelmän sanaston kiinnittämiseksi. Kiinnostunut lukija löytää huolellisemman tarkastelun esimerkiksi Gathmannin algebrallisen geometrian luentomuistiinpanoista [Gathmann, 2026].

4.1 Affinit algebralliset käyrät kompleksitasossa

Affini algebrallinen käyrä kompleksitasossa on määritelty polynomin nollakohtien joukkona. Tarkemmin sanottuna, jos $f \in \mathbb{C}[x, y]$ on ei-vakio polynomi, niin affini algebrallinen käyrä C joka liittyy polynomiin f on joukko

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \mid f(x, y) = 0\}. \quad (8)$$

Koska $\mathbb{C}$ on algebrallisesti suljettu, niin jokainen polynomi $f \in \mathbb{C}[x, y]$ voidaan tekijöidä lineaarisiin tekijöihin. Tämän vuoksi jokainen affini algebrallinen käyrä kompleksitasossa voidaan esittää lineaaristen käyrien yhdistelmänä.

4.2 Singulariteetit ja säännöllisyys

Käyrän C paikallisen muodon pisteessä $p = (a, b) \in C$ määrittyy f :n osittaisderivaattojen avulla. Piste p on *singulaarinen* (tai kriittinen), jos f :n osittaisderivaatat häviävät pisteessä p :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \quad \text{ja} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0 \quad (9)$$

Jos vähintään yksi osittaisderivaatoista ei ole nolla p :ssä, niin piste on *säännöllinen*. Säännöllisessä pisteessä implisiittisten funktioiden lause takaa, että käyrä näyttää paikallisesti kompleksisen 1-ulotteiselta varistolta, ja on mahdollista määritellä yksikäsitteinen tangenttisuora.

4.3 Projektiivinen taso ja suora

Affinilla avaruudella $\mathbb{C}$ on geometrinen rajoitus: kaksi erillistä suoraa leikkaavat yleensä yhdessä pisteessä, paitsi jos ne ovat yhdensuuntaisia. Yhtenäistääksemme näitä geometrisia käsitteitä, otamme käyttöön projektiivisen avaruuden.

Kompleksinen n -ulotteinen projektiivinen avaruus $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ määritelläänjoukoksi, joka koostuu avaruuden $\mathbb{C}^{n+1}$ vektorisäteistä (tai niiden ekvivalenssiluokista), jotka kulkevat origon kautta. Toisin sanoen, $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ on määritelty seuraavasti:

Määritelmä 4.1. Olkoon $(Z_0, \dots, Z_n) \in \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$. Määritellään ekvivalenssirelaatio $\sim$ seuraavasti:

$$(Z_0, \dots, Z_n) \sim (\lambda Z_0, \dots, \lambda Z_n) \quad \text{kaikille } \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

Tällöin

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{C}) := \frac{\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}}{\sim}.$$

Ekvivalenssiluokan edustaja merkitään homogeenisilla koordinaateilla $[Z_0 : \dots : Z_n]$.

Asetus. Jatkossa merkitään $\mathbb{P}^n$ pidemmän $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ sijasta, koska tässä työssä keskitytään yksinomaan kompleksisten käyrien tarkasteluun.

Esimerkki 4.2. Tapauksissa $n = 1$ ja $n = 2$

- $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (Riemann-pallo)
- $\mathbb{P}^2 \cong \mathbb{C}^2 \cup \mathbb{P}^1$. $\mathbb{P}^2$:n koordinaatit ovat $[X : Y : Z]$, ja $\mathbb{P}^1$ on joukko pisteitä, joilla $Z = 0$.

Jos tarkastellaan projektiivisten avaruuksien ulottuvuuksia reaali mielessä ($\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$), niin $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^1) = 2$ ja $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^2) = 6$ (vai 4?).

4.4 Upotus $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2$

Lemma 4.3. Projektiivinen avaruus on erillinen yhdiste $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$.

Todistus. Tarkastellaan $\mathbb{P}^n$:n pistettä $[Z_0 : \dots : Z_n]$, jolla on n koordinaattia. Jos $Z_{n+1} \neq 0$, niin piste voidaan esittää muodossa

$$[Z_0 : \dots : Z_n] \sim [Z_0 : \dots : Z_{n-1} : 1] \in \mathbb{C}^n,$$

koska on olemassa $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, jolla $\lambda Z_n = 1$. Jos taas $Z_n = 0$, niin piste kuuluu $\mathbb{P}^{n-1}$ -joukkoon. Tällöin saadaan jako $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$. $\square$

Lemma yleistää esimerkin 4.2: yleisen projektiivisen avaruuden $\mathbb{P}^n$ “sisus” on $\mathbb{C}^n$ ja “kuori äärettömyydessä” $\mathbb{P}^{n-1}$, joka induktiivisesti kuortaan lukuunottamatta muistuttaa $\mathbb{C}^{n-1}$:tä. Tämä antaa mielekkään upotuksen $\mathbb{C}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n$.

Työlle relevantissa 2-ulotteisessa tapauksessa avaruus $\mathbb{C}^2$ voidaan nähdä paikallisena karttana (tai tiheänä avoimena joukkona) projektiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$. Tyypillinen upotus määritellään seuraavasti:

$$\begin{aligned}\iota : \mathbb{C}^2 &\hookrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{C}) \\ (x, y) &\mapsto [x : y : 1]\end{aligned}\tag{10}$$

Pisteet $\mathbb{P}^2$:ssa, jotka eivät kuulu tämän upotuksen kuvaan, ovat muotoa $[X : Y : 0]$. Näiden pisteiden joukko muodostaa projektiivisen suoran $\mathbb{P}^1$, jota kutsutaan *suoraksi äärettömyydessä* tai *äärettömyyssuoraksi*. Lemman 4.3 hengessä $\mathbb{P}^2 = \mathbb{C}^2 \sqcup \mathbb{P}^1$.

4.5 Projektiiviset käyrät

Projektiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2$ klassinen polynomi $f(x, y)$ ei ole hyvin määritelty, koska homogeeniset koordinaatit ovat ekvivalentteja skalaarikertoimen suhteen. Tämän vuoksi on käytettävä *homogeenistä* polynomia $F(X, Y, Z)$, eli polynomia, jossa kaikilla monomeilla on sama aste d . Yhtälö $F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^d F(X, Y, Z) = 0$ on tällöin riippumaton valitusta edustajasta.

Määritelmä 4.4 (Homogenisointi). Polynomi $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ voidaan *homogenisoida* määrittelemällä

$$F(X, Y, Z) = Z^d f\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right),\tag{11}$$

missä d on polynomin f aste.

Määritelmä 4.5. Projektiivinen algebrallinen käyrä $\mathcal{C}$ määritellään homogeenisen polynomin $F(X, Y, Z)$ nollakohtien joukkona:

$$\mathcal{C} = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2 \mid F(X, Y, Z) = 0\}.\tag{12}$$

Huomautus 4.6. Polynomin homogenisointi sallii luonnollisesti käyrän tarkastelun myös äärettömyyssuoralla. Projektiivinen käyrä $\mathcal{C}$ on aina suljettu ja kompakti, koska se on suljettu alijoukko projektivisessä avaruudessa $\mathbb{P}^2$, joka on itsessään kompakti.

5 Solmut ja linkit

Matematiikassa solmuja tarkastellaan ympyrännäköisinä topologisina olioina, jotka saavat sotkeutua itseensä. Epämuodollisesti määriteltynä matemaattinen solmu on kuin tavallinen solmu, jonka päät on liimattu yhteen. Linkillä tarkoitetaan kappaletta, joka koostuu erillisistä solmuista, jotka voivat olla kietoutuneina toisiinsa. Työssä noudatetaan D. Eisenbudin ja W. D. Neumannin [Eisenbud ja Neumann, 1985] merkintätapoja ja joitakin peruskäsitteitä lainataan Rolfsenin kirjasta [Rolfsen, 1976].

5.1 Perusmääritelmät

Määritelmä 5.1. Topologisen avaruuden X osajoukko $K \subset X$ on *solmu*, jos K on homeomorfinen palloon $\mathbb{S}^p$, jollekin $p \in \mathbb{N}$.

Määritelmä 5.2. *Linkki* $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ on pari, jossa Σ on suunnattu homologinen n -pallo ja S_i on kokoelma sileitä, erillisiä, suunnattuja ja yksinkertaisia³ käyriä Σ :ssa.

Määritelmä 5.3. Linkkien $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', S'_1 \cup \dots \cup S'_m)$ *erillinen summa* on

$$\mathbf{L} + \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S'_1 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa $\Sigma \# \Sigma'$ on Σ ja Σ' :n yhtenäinen summa S_i :tä leikkaamattomien levyjen kautta.

Linkkien *yhtenäinen summa* on

$$\mathbf{L} \# \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', (S_1 \# S'_1) \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \cup S'_2 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa Σ :n ja Σ' :n yhtenäinen summa otetaan kautta levyjen, jotka leikkaavat linkkejä väleissä $I \subset S_1$ ja $I' \subset S'_1$.

Määritelmä 5.4. Solmun K putkiympäristöä merkitään $N(K)$ ja linkin $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ putkiympäristö määritellään $N(\mathbf{L}) := N(S_1) \cup \dots \cup N(S_n)$.

Määritelmä 5.5. Linkin osasen S_i pituuspiiri M_i ja leveyspiiri L_i ???

5.2 Torussolmut

Nyt kun solmujen ja linkkien perussanasto on saatu määriteltyä, voidaan esitellä torussolmut. Työn tarkoituksena on avata algebrallisten käyrien tutkimuksessa luontaisesti esiintyviä solmuja, jotka ovat aina luonteeltaan iteroituja torussolmuja. Siispä työssä huomio voidaan keskittää kokonaan (iteroituihin) torussolmuihin.

Määritelmä 5.6. *Torussolmu* on solmu K , jolla on upotus $K \hookrightarrow \mathbb{T}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$.

Torussolmu on siis solmu, joka voidaan piirtää toruksen pinnalle. Kuvassa ??? torussolmuja. Torussolmu voidaan määrittää kokonaan kahdella kokonaisluvulla p, q , jotka kertovat monestiko silmukka kiertyy toruksen kahden eri homologia-akselin ympäri ennen palaamistaan lähtöpisteeseen.

Määritelmä 5.7. (p, q) -torussolmu

5.3 Pujonta

Määritelmä 5.8 (Linkkien pujos). Olkoot $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', S'_1 \cup \dots \cup S'_m)$ linkkejä. Määritellään

$$\Sigma'' = (\Sigma - \text{int } N(S)) \cup (\Sigma' - \text{int } N(S'))$$

³Yksinkertainen käyrä ei leikkaa itseään.

liimaamalla avaruuksien reunat toisiinsa siten, että samansuuntaisesti päällekkäin liitetään M ja L' sekä L ja M' . Σ'' on suunnattu homologinen 3-pallo [???]. Linkki

$$\mathbf{L}'' = (\Sigma'', (K - S) \cup (K' - S'))$$

on $\mathbf{L}$:n ja $\mathbf{L}'$:n *pujos* ja sitä merkitään

$$???kaavio??? : L -_S -_{S'} - L'$$

Määritelmä 5.9. *Seifert-linkki* on linkki $\mathbf{L} = (\Sigma, K) = (\Sigma', \cup_{i=1}^n K_i)$, jonka ulkoreunalla $\Sigma_0 = \Sigma' - \text{int } N(K)$ on Seifert-kuidutus.

6 Pujoskaavio

Solmuja voi pujoa peräkkäin useita ja monimutkaisilla tavoilla, jolloin solmujen piirtäminen käy nopeasti hyvin vaikeaksi. Monimutkaisten linkkien kuvaamiseen hyödyllinen työkalu ovat pujoskaaviot, jotka ovat tietynlaisia verkkoja. Verkko on matemaattinen olio, joka koostuu silmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. Pujoskaavioissa kaariin liitetään kokonaislukukertoimet, jotka kertovat tietoa solmusta.

Pujoskaavioihin liittyy monta hankalaa ideaa, koska monimutkaisten linkkien esittäminen yksinkertaisesti, mutta yksiselitteisesti, on hyvin vaikeaa. Sen takia tässä kappaleessa pujoskaavioiden rakentamisessa joustetaan matemaattisesta formalismista ja lukijaa kuljetetaan eteenpäin intuitivistisesti.

Tämän kappaleen perimmäinen tarkoitus on palvella lukijaa vakuutuksena siitä, että monimutkaisten linkkien kohdalla on parempi unohtaa linkki, ja tyytyä pujoskaavioon, ja luottaa siihen, että olennaista tietoa ei menetetä.

6.1 Pujoskaavion synty

Kuten edellisessä solmuja ja linkkejä käsittelevässä kappaleessa esiteltiin, linkkien yhteen pujominen ei operaationa manipuloi linkkejä, vaan itse asiassa ympäröivää avaruutta. Solmut, joiden kautta kaksi linkkiä pujotaan yhteen, poistetaan avaruuksistaan, ja jäljelle jää kaksi tyhjää silmukkaa. Lopuksi avaruudet liimataan intuitionvastaisella tavalla yhteen tyhjiä silmukoita pitkin. Monesti pujomisen visuaalinen hahmottaminen on äärimmäisen hankalaa. Tärkeää on huomata, että operaatiota pitää ajatella abstraktina *pujomisena*, eikä missään nimessä konkreettisena *pujottamisena*.

Oivallus 6.1. Ensimmäinen ja kenties keskeisin pujoskaavioihin liittyvä oivallus onkin, että kaavion ei pitäisi esittää ainoastaan solmua, vaan myös sitä ympäröivää avaruutta: miten avaruutta on edellisissä pujoksissa venytetty ja runnottu.

Tätä varten kaavioon tarvitaan kahdenlaisia kaaviokomponentteja: avaruutta kuvaavia ja linkin osasia kuvaavia. **KUVA:** $\circ \rightarrow$, $\bullet \rightarrow$ ja $\rightarrow$ nuolet.

Oivallus 6.2. Toinen oivallus ammentaa avaruuden rakenteesta. Käyrä, joka hajaantuisi $\mathbb{R}^3$:ssa positiiviseen ja negatiiviseen äärettömyyteen, ei voi käyttäytyä samoin

$\mathbb{S}^3$:ssa, koska $\mathbb{S}^3$ on kompakti; käyrä tulee ennen pitkää takaisin lähtöpisteeseen, muodostaen $\mathbb{S}^3$:n globaalissa geometriassa “silmukan”. Toisaalta “silmukan” voi muodostaa helpomminkin menemällä lokaalisti ympäri. Globaali ja lokaali silmukka ovat perustavalla tavalla erilaisia, samoin kuin lineaarisesti riippumattomat vektorit; sanotaan että $\mathbb{S}^3$:lla on kaksi *torusakselia*.

On olemassa myös avaruuksia, joilla on useampi torusakseli. Työn kannalta tärkein tällainen luokka ovat *homologiset n -pallot*:

Määritelmä. *Homologinen n -pallo* on topologinen avaruus, jonka homologiaryhmät ovat samat kuin $\mathbb{S}^n$:llä.

Ajatus. Ympyrä $\mathbb{S}^1$ ja kahdeksikko eivät ole homologisia keskenään. Ensimmäisellä on yksi reikä, kun jälkimmäisellä taas kaksi. Homologisella n -pallolla on samantyyppisiä reikiä kuin $\mathbb{S}^n$:llä, ja samankaltainen globaali rakenne.

Huomautus 6.1. Homologia on sisällöltään rikas ja tekninen matematiikan osa-alue, jonka tarkoituksena on tutkia topologisten avaruuksien rakennetta ja reikiä. Homologian ehtisi tässä työssä esitellä vain lyhyesti, mikä ei tee aihepiirille oikeutta syvyytensä vuoksi; siispä aiheen esittely ohitetaan tässä työssä, mutta kiinnostunutta lukijaa ohjataan tutustumaan erinomaiseen Hatcherin materiaaliin [Hatcher, 2002].

Huomautus 6.2. Toista oivallusta tukee se, että kahta solmua pujotessa syntyvä avaruus on homologinen n -pallo, mikäli alkuperäiset avaruudet olivat. Toisin sanoen kaikki toivomamme hyvät ominaisuudet säilyvät pujonnassa.

Oivallus 6.3. Kolmas oivallus on, että voidaan käyttää avaruuden sisäisiä torusakseli-rakenteita hyväksi torussolmujen esittämisessä. Esimerkiksi tyyppin (p, q) torussolmun voi ajatella käyränä, joka kiertää $\mathbb{S}^3$:n yhden torusakselin p kertaa ja toisen torusakselin q kertaa ennen palaamistaan lähtöpisteeseen.

Kun nämä oivallukset kootaan yhteen, voidaan yksinkertaisin epätriviaali torus-solmu $(2, 3)$ esittää kuten kuvassa ??.

6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia

Tässä kappaleessa käsitellään muodollisesti pujoskaavioiden ominaisuuksia ja todistetaan joitakin hyödyllisiä tuloksia.

Propositio 6.3. *Linkki $L = (\mathbb{S}^3, L)$ on kompleksitason käyrän singulariteetin linkki jos ja vain jos sillä on yhtenäinen pujoskaavio, jonka kaikki painot ja kaari-determinantit ovat positiivisia. Tällöin sillä on minimaalinen pujoskaavio näillä ominaisuuksilla.*

Todistus. En tiedä. □

Lemma 6.4. *Kahden linkin osasen (virtuaalisen tai todellisen) linkkiluku Σ :ssa saadaan laskemalla pujoskaaviossa osasten välillä olevan polun viereisten painojen tulo.*

Todistus. En tiedä. □

Propositio 6.5. *Polynomisolmun pujoskaavion siduskertoimet saadaan kaavoista $\alpha_1 = q_1$ ja $\alpha_{i+1} = q_{i+1} + q_i p_i p_{i+1}$, missä p_i, q_i ovat polynomin Puiseux-dataa.*

Todistus. [Eisenbud ja Neumann, 1985][Prop 1A.1] □

6.3 Monimutkainen esimerkki

Tässä kappaleessa tutustutaan monimutkaiseen solmuun ja sen pujoskaavion rakentamiseen sekä mielellään myös toisin päin.

7 Dehnin kirurgia

Työssä on tähän asti nojattu runsaasti yksinkertaisiin 3-monistoihin, pääosin $\mathbb{S}^3$:een. Monimutkaisempia 3-monistoja ja edistyneempää monistojen teoriaa on pyritty tarkoituksella häivyttämään, jotta vastaavasti fokus työn kannalta keskeisiin rakenteisiin pysyisi kirkkaana.

Itse asiassa solmut ja pujominen löytyvät modernissa matemaattisessa kirjallisuudessa paljon laajemmasta 3-monistojen hajotelmien kontekstista.

8 RPI-kaaviot äärettömyydessä

Moi

9 Yhteenveto

Tosiaan.

Viitteet

David Eisenbud ja Walter D. Neumann. *Three-Dimensional Link Theory and Invariants of Plane Curve Singularities*, volume 110 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1985. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bgzb9w>.

Andreas Gathmann. Algebraic geometry. Lecture notes, 2026. URL <https://agag-gathmann.math.rptu.de/en/alggeom.php>.

Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. URL <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.

Aleksis Koski. General topology, Maaliskuu 2024. URL <https://atkoski.fi/topology.pdf>. Lecture notes.

John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-1.

James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-13-181629-9.

Dale Rolfsen. *Knots and Links*. AMS Chelsea Publishing, 1976.

A Esimerkki liitteestä

Liitteet eivät ole opinnäytteen kannalta välttämättömiä ja opinnäytteen tekijän on kirjoittamaan ryhtyessään hyvä ajatella pärjäävänsä ilman liitteitä. Kokemattomat kirjoittajat, jotka ovat huolissaan tekstiosan pituudesta, paisuttavat turhan helposti liitteitä pitääkseen tekstiosan pituuden annetuissa rajoissa. Tällä tavalla ei synny hyvää opinnäytettä.

Liite on itsenäinen kokonaisuus, vaikka se täydentääkin tekstiosaa. Liite ei siten ole pelkkä listaus, kuva tai taulukko, vaan liitteessä selitetään aina sisällön laatu ja tarkoitus.

Liitteeseen voi laittaa esimerkiksi listauksia. Alla on listausesimerkki tämän liitteen luomisesta.

```
\clearpage
\appendix
\addcontentsline{toc}{section}{Liite A}
\section*{Liite A}
...
\thispagestyle{empty}
...
tekstiä
...
\clearpage
```

Kaavojen numerointi muodostaa liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$d \wedge A = F, \tag{A1}$$

$$d \wedge F = 0. \tag{A2}$$

B Toinen esimerkki liitteestä

Liitteissä voi myös olla kuvia, jotka eivät sovi leipätekstin joukkoon: Liitteiden taulu-



Kuva B1: Kuvateksti, jossa on liitteen numerointi

koiden numerointi on kuvien ja kaavojen kaltainen: Kaavojen numerointi muodostaa

Taulukko B1: Taulukon kuvateksti.

9.00–9.55	Käytettävyystestauksen tiedotustilaisuus (osanottajat ovat saaneet sähköpostitse valmistautumistehtävät, joten tiedotustilaisuus voidaan pitää lyhyenä).
9.55–10.00	Testausalueelle siirtyminen

liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$T_{ik} = -pg_{ik} + wu_i u_k + \tau_{ik}, \quad (\text{B1})$$

$$n_i = nu_i + v_i. \quad (\text{B2})$$

C Matemaattisten lauseiden todistukset

Systeemianalyysin töissä matemaattisten lauseiden todistukset laitetaan yleensä liitteiksi. Leipätekstissä lauseen yhteydessä todistuksen todetaan löytyvän liitteestä XX. Tämä ei koske matematiikan töitä, joissa lauseiden todistukset voivat olla merkittävä osa varsinaista työtä!

Määritelmä C.1. Tässä määritellään $1 = 1$.

Lause C.2 (Roposen lause). *Lukiomatematiikassa kolmannen asteen yhtälöillä on aina vähintään yksi kokonaislukuratkaisu välillä $[-3, 3]$.*

Todistus. Jätetään harjoitustehtäväksi. □

Huomautus C.3. Lause [C.2](#) saattaa olla väärin.

Tiedoston opinnaytepohja.tex alusta löytyy myös muita teoreema- ym. tyylejä sekä suomeksi että englanniksi, joten katso löytyykö sieltä käyttöösi sopiva. Voit myös määritellä itse lisää.