

单元1.6 欧拉图

第15章 欧拉图与哈密顿图

15.1 欧拉图

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

1

内容提要

- 欧拉回路、欧拉通路
- 欧拉图、半欧拉图
- 有向欧拉图、有向半欧拉图
- 欧拉图、半欧拉图的充要条件
- 求欧拉回路的算法

2

七桥问题


- Königsberg, River Pregel (Kaliningrad, Russia)



3

七桥问题

- Königsberg, River Pregel (Kaliningrad, Russia)



4

Leonhard Euler(1707~1783)


- 瑞士数学家, 最多产的数学家

– ≥1100书籍论文

– 全集≥75卷

– 13个孩子

– 最后17年失明



$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{0!} + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$



$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n) \right).$$



5

Euler的解法

- 1736年, 图论和拓扑学诞生



6

欧拉通(回)路、(半)欧拉图

- 欧拉通路: 经过图中所有边的简单通路
- 半欧拉图: 有欧拉通路的图

- 欧拉回路: 经过图中所有边的简单回路
- 欧拉图: 有欧拉回路的图
(定义平凡图为欧拉图)

- 如果仅用边来描述, 欧拉通路和欧拉回路就是图中所有边的一种全排列。

7


无向欧拉图的充分必要条件

定理15.1, 15.5: 设G是无向连通图, 则

G是欧拉图 (1)

⇔ G中所有顶点都是偶数度 (2)

⇔ G是若干个边不交的圈的并 (3)



证明 (1)⇒(2) 若欧拉回路总共k次经过顶点v, 则 $d(v)=2k$. (2)⇒(3) 若删除任意1个圈上的边, 则所有顶点的度还是偶数, 但是不一定连通了. 对每个连通分支重复进行. (3)⇒(1) 有公共点但边不交的简单回路, 总可以拼接成欧拉回路: 在交点处, 走完第1个回路后再走第2个回路. #

8

无向半欧拉图的充分必要条件

• 定理15.2: 设 G 是无向连通图, 则

(1) G 是半欧拉图

\Leftrightarrow (2) G 中恰有2个奇度顶点 #



9


有向欧拉图的充分必要条件

• 定理15.3: 设 G 是有向强连通图, 则

G 是欧拉图

$\Leftrightarrow \forall v \in V(G), d^+(v) = d^-(v)$

$\Leftrightarrow G$ 是若干个边不交有向圈的并 #




10

有向半欧拉图的充分必要条件

• 定理15.4: 设 G 是有向单向连通图, 则


G 是半欧拉图

$\Leftrightarrow G$ 中恰有2个奇度顶点, 其中1个入度比出度大1, 另1个出度比入度大1, 其余顶点入度等于出度. #



11

例



12

Fleury算法(避桥法)

- 从任意一点开始, 沿着没有走过的边向前走
- 在每个顶点, 优先选择剩下的非桥边, 除非只有唯一一条边
- 直到得到欧拉回路或宣布失败
- **定理:** 设 G 是无向欧拉图, 则Fleury算法终止时得到的简单通路是欧拉回路. #




Fleury算法(迭代形式)

- (1) $P_0 := v$;
- (2) 设 $P_i = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_i v_i$ 已经行遍,
 设 $G_i = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$,
 $e_{i+1} := G_i$ 中满足如下2条件的边:
 - (a) e_{i+1} 与 v_i 关联
 - (b) 除非别无选择, 否则 e_{i+1} 不是 G_i 中的桥
- (3) 若 $G_i \neq N_i$, 则回到(2); 否则算法停止



Fleury算法举例




逐步插入回路算法

- 每次求出一个简单回路
- 然后回溯到上一个有边没有被遍历到的顶点
- 把新求出的回路插入老回路, 合并成一个更大的回路
- 直到得到欧拉回路或宣布失败






逐步插入回路算法举例



18


应用：一笔画



21

应用：蚂蚁比赛

- 甲、乙两只蚂蚁分别位于图的结点A、B处，并设图中的边长度相等。甲、乙进行比赛：从它们所在的结点出发，走过图中所有边最后到达结点C处。如果它们的速度相同，问谁先到目的地C点？



22

小结

- 欧拉图 **Easy**
- 充要条件

23