

单元2.8 一阶逻辑命题符号化

第4章 一阶逻辑基本概念

4.1 一阶逻辑命题符号化



命题逻辑局限性

- 命题逻辑能够解决的问题是有局限性的。只能进行命题间关系的推理，无法解决与命题的结构和成分有关的推理问题。

- 例如(著名的苏格拉底三段论):

1) P: 所有的人都是要死的;

2) Q: 苏格拉底是人。


3) R: 苏格拉底是要死的。

- $P \wedge Q \rightarrow R$ 为非有效推理形式: P、Q、R 为不同的命题，无法体现三者相互之间的联系。



命题逻辑局限性

- 问题: 命题之间的逻辑关系不是体现在原子命题之间，而体现在构成原子命题的内部成分之间。
- 需要进一步分解简单命题



内容提要

- 个体词、谓词、量词
- 命题符号化



个体

将可以独立存在的客体（具体事物或抽象概念）称为**个体**或**个体词**，并用 a, b, c, \dots 表示**个体常元**（表示具体事物的个体词），用 x, y, z, \dots 表示**个体变元**（表示抽象事物的个体词）。（个体的函数还是个体，例如，设 a, b 是数， $f(a, b)$ 可以表示 a 和 b 的运算结果，如 $a+b$ 、 $a \cdot b$ 等。）

将个体变元的取值范围称为**个体域**，个体域可以是有穷或无穷集合。人们称由宇宙间一切事物组成的个体域为**全总个体域**。

5

谓词

将表示个体性质或彼此之间关系的词称为**谓词**，常用 F, G, H, \dots 表示**谓词常元**（表示具体性质或关系）或**谓词变元**（表示抽象的或泛指的性质或关系）。

n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ：含 n 个个体变项的谓词，是定义在个体域上，值域为 $\{0, 1\}$ 的 n 元函数。

- **一元谓词**：表示事物的性质
- **多元谓词** ($n \geq 2$)：表示事物之间的关系
- **0元谓词**：不含个体变项的谓词，即命题常项或命题变项

6

谓词

用 $F(x)$ 表示“ x 具有性质 F ”，用 $F(x, y)$ 表示“ x 和 y 具有关系 F ”。

例如，若 $F(x)$ 表示“ x 是黑色的”， a 表示黑板，则 $F(a)$ 表示“黑板是黑色的”；

若 $F(x, y)$ 表示“ x 大于 y ”，则 $F(5, 2)$ 表示“5大于2”。

- 将 n 元谓词中的个体变元都用个体域中具体的个体取代后，就**成为一个命题**
- 谓词中个体词的顺序是十分重要的，不能随意变更。如命题 $F(5, 2)$ 为“真”，但命题 $F(2, 5)$ 为“假”

7

举例

(1) 4是偶数

4是个体常项，“是偶数”是谓词常元，符号化为： $F(4)$

(2) 小王和小李同岁

小王, 小李是个体常元，同岁是谓词常元。记 a :小王, b : 小李, $G(x, y)$: x 与 y 同岁，符号化为： $G(a, b)$

(3) $x < y$

x, y 是个体变元， $<$ 是谓词常元，符号化为： $L(x, y)$

(4) x 具有某种性质 P

x 是个体变元， P 是谓词变元，符号化为： $P(x)$

8

0元谓词符号化

例 将下述命题用0元谓词符号化, 并讨论它们的真值

(1) $\sqrt{2}$ 是无理数, 而 $\sqrt{3}$ 是有理数

(2) 如果 $2>3$, 则 $3<4$

解 (1) 设 $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数

符号化为 $F(\sqrt{2}) \wedge G(\sqrt{3})$

真值为0

(2) 设 $F(x,y)$: $x>y$, $G(x,y)$: $x<y$,

符号化为 $F(2,3) \rightarrow G(3,4)$

真值为1

9

量词、全称量词

称表示数量的词为量词。

全称量词是自然语言中的“所有的”、“一切的”、“任意的”、“每一个”、“都”等的统称,

用符号“ \forall ”表示。

用 $\forall x$ 表示个体域里的所有 x ;

用 $\forall x F(x)$ 表示个体域里所有 x 都有性质 F 。

10

存在量词

存在量词是自然语言中的“有一个”、“至少有一个”、“存在着”、“有的”等的统称,

用符号“ \exists ”表示。

用 $\exists x$ 表示存在个体域里的 x ;

用 $\exists x F(x)$ 表示在个体域里存在 x 具有性质 F 。

11

有限域下的公式表示法

考虑有限个体域 $D = \{1, 2, \dots, k\}$

• $\forall x P(x) = P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k)$:

对任意 x , $P(x)$ 均成立, 合取联结词的推广

• $\exists x P(x) = P(1) \vee P(2) \vee \dots \vee P(k)$:

有一个 x 使得 $P(x)$ 成立, 析取联结词的推广

注意: 在无穷集 $\{1, 2, \dots, k, \dots\}$ 上, $P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \wedge \dots$, $P(1) \vee P(2) \vee \dots \vee P(k) \vee \dots$ 没有定义, 不是合式公式。

12

一阶逻辑命题符号化

例3 在一阶逻辑中将下面命题符号化:

(1) 人都爱美; (2) 有人用左手写字

个体域分别取(a) 人类集合, (b) 全总个体域.

解: (a) (1) 设 $F(x)$: x 爱美, 符号化为 $\forall x F(x)$

(2) 设 $G(x)$: x 用左手写字, 符号化为 $\exists x G(x)$

(b) 设 $M(x)$: x 为人, $F(x)$, $G(x)$ 同(a)中

(1) $\forall x (M(x) \rightarrow F(x))$

(2) $\exists x (M(x) \wedge G(x))$

$M(x)$ 称作**特性谓词**, 用于将个体变元局限在满足该谓词代表的性质或关系的范围之内

同一命题在不同个体域中符号化形式可能不同。 13

一阶逻辑命题符号化

• 下列符号代表什么意思?

1. $\forall x (M(x) \rightarrow F(x))$

2. $\forall x (M(x) \wedge F(x))$

3. $\forall x (M(x) \vee F(x))$

4. $\exists x (M(x) \wedge G(x))$

5. $\exists x (M(x) \rightarrow G(x))$

6. $\exists x (M(x) \vee G(x))$

• 其中: $M(x)$: x 为人, $F(x)$: x 爱美, $G(x)$: x 用左手写字

14

一阶逻辑命题符号化

一阶逻辑中**命题符号化**的两个基本公式:

个体域中所有有性质 M 的个体都有性质 G , 应符号化为 $\forall x (M(x) \rightarrow G(x))$, 其中

$M(x)$: x 具有性质 M , $G(x)$: x 具有性质 G 。

个体域中存在有性质 M 同时有性质 G 的个体, 应符号化为 $\exists x (M(x) \wedge G(x))$, 其中

$M(x)$: x 具有性质 M , $G(x)$: x 具有性质 G 。

15

举例

将下面命题符号化

① 人都吃饭;

② 有人喜欢吃糖;

③ 男人都比女人跑得快 (这是假命题)。

使用全总个体域。

16

举例

① 人都吃饭;

令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 吃饭。

命题符号化为 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 。

② 有人喜欢吃糖;

令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 喜欢吃糖。

命题符号化为 $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 。

17

举例

③ 男人都比女人跑得快 (这是假命题)。

令 $F(x)$: x 是男人, $G(y)$: y 是女人,

$H(x,y)$: x 比 y 跑得快。

命题符号化为

$$\forall x (F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x,y)))$$

等值形式为

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$$

18

举例

例 将下列命题符号化, 并讨论其真值:

(1) 对任意的 x , 均有 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$

(2) 存在 x , 使得 $x+5=3$

分别取 (a) 个体域 $D_1 = \mathbf{N}$, (b) 个体域 $D_2 = \mathbf{R}$

解 记 $F(x): x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, $G(x): x+5=3$

(a) (1) $\forall x F(x)$ 真值为1

(2) $\exists x G(x)$ 真值为0

(b) (1) $\forall x F(x)$ 真值为1

(2) $\exists x G(x)$ 真值为1

同一命题在不同个体域中真值可能不同。

19

Open Question Points: 10

Setting

求下列各式真值。

1) $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)). D = \{1,2\}, P(x): x = 1, Q(x): x = 2.$

2) $(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)). D = \{0,1,2\}, P(x): x > 2, Q(x): x = 0.$

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer

20

例

例 将下列命题符号化。

(1) 每个实数都存在比它大的另外的实数。

(2) 函数极限定义：对于任意给定的 $\epsilon > 0$ ，必存在着 $\delta > 0$ ，使得对任意的 x ，只要 $|x - a| < \delta$ ，就有 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$ 。

(3) 兔子比乌龟跑得快。

(4) 有的兔子比所有的乌龟跑得快。

(5) 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快。

(6) 不存在跑得一样快的兔子和乌龟。

21

例

(1) 每个实数都存在比它大的另外的实数。

设个体域为实数集。 $L(x, y)$: x 小于 y

$\forall x(\exists y(L(x, y)))$ $\exists y \forall x L(x, y)$?

设个体域为全总个体域。

$R(x)$: x 是实数, $L(x, y)$: x 小于 y

$\forall x(R(x) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge L(x, y)))$

多个量词出现时，不能随意交换顺序。

22

对量词顺序的分析

- 设 $P(x, y)$ 为二元谓词，
 - $(\forall x)(\forall y)P(x, y) \Leftrightarrow (\forall x)((\forall y)P(x, y)) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)P(x, y)$
对一切 x 和对一切 y 都有关系 P
 - $(\forall x)(\exists y)P(x, y), (\forall x)(\exists y)$ 不可交换
对一切 x ，都存在一个 y 具有关系 P
 - $(\exists x)(\forall y)P(x, y)$
存在一个 x ，对于任意 y 都有关系 P
 - $(\exists x)(\exists y)P(x, y) \Leftrightarrow (\exists x)((\exists y)P(x, y)) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x)P(x, y)$
有一个 x ，有一个 y 有 关系 P

23

对量词顺序的分析

- 在 $\{1, 2\}$ 个体域上讨论多次量化公式：

$$\begin{aligned}
 (\forall x)(\forall y)P(x, y) &\Leftrightarrow (\forall y)P(1, y) \wedge (\forall y)P(2, y) \\
 &\Leftrightarrow P(1, 1) \wedge P(1, 2) \wedge P(2, 1) \wedge P(2, 2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\exists x)(\forall y)P(x, y) &\Leftrightarrow (\forall y)P(1, y) \vee (\forall y)P(2, y) \\
 &\Leftrightarrow (P(1, 1) \wedge P(1, 2)) \vee (P(2, 1) \wedge P(2, 2))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\forall y)(\exists x)P(x, y) &\Leftrightarrow (\exists x)P(x, 1) \wedge (\exists x)P(x, 2) \\
 &\Leftrightarrow (P(1, 1) \vee P(2, 1)) \wedge (P(1, 2) \vee P(2, 2))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\exists x)(\exists y)P(x, y) &\Leftrightarrow (\exists y)P(1, y) \vee (\exists y)P(2, y) \\
 &\Leftrightarrow P(1, 1) \vee P(1, 2) \vee P(2, 1) \vee P(2, 2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\forall y)(\exists x)P(x, y) &\Leftrightarrow [P(1, 1) \wedge P(1, 2)] \vee [P(2, 1) \wedge P(2, 2)] \\
 &\quad \vee [P(1, 1) \wedge P(2, 2)] \vee [P(2, 1) \wedge P(1, 2)] \\
 &\Leftrightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y) \vee [P(1, 1) \wedge P(2, 2)] \vee [P(2, 1) \wedge P(1, 2)]
 \end{aligned}$$

$$\therefore (\exists x)(\forall y)P(x, y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y)$$

24

设个体域为{a,b,c}。试将下列公式写成命题逻辑公式。

1) $(\forall x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$

2) $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer

25

例

(2) 对于任意给定的 $\epsilon > 0$ ，必存在着 $\delta > 0$ ，使得对任意的 x ，只要 $|x - a| < \delta$ ，就有 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$ 。

设个体域为实数集。

$$\forall \epsilon (\epsilon > 0)$$

$$\rightarrow \exists \delta (\delta > 0)$$

$$\wedge \forall x ((|x - a| < \delta) \rightarrow (|f(x) - f(a)| < \epsilon))$$

26

例

(3) 兔子比乌龟跑得快。

(4) 有的兔子比所有的乌龟跑得快。

(5) 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快。

(6) 不存在跑得一样快的兔子和乌龟。

用全总个体域，令 $F(x)$: x 是兔子， $G(y)$: y 是乌龟，

$H(x, y)$: x 比 y 跑得快， $L(x, y)$: x 和 y 跑得一样快

(1) $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$ $\forall x (F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)))$

(2) $\exists x (F(x) \wedge (\forall y (G(y) \rightarrow H(x, y))))$

(3) $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$ $\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$

(4) $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y))$

27

二阶谓词逻辑

例：Leibniz Law: “对于任意个体 x 和 y ，只要 x 和 y 相等，那么 x, y 具有相同的性质”

$P(z)$: z 具有性质 P 。

$E(u, v)$: u 和 v 相等。

那么翻译为: $\forall x \forall y [E(x, y) \rightarrow \forall P (P(x) \leftrightarrow P(y))]$

此时，量词符号作用在谓词符号上 $\forall P$ 。之前我们在一阶谓词中只允许量词作用在个体上，例如 $\forall x P(x)$ 。这就是一阶逻辑和二阶逻辑的区别。

本课程只关注一阶谓词逻辑。

注意“一阶”与“一元”的区别。

28

小结

- 个体词、谓词、量词
- 命题符号化

