


Gráfica de $y = \csc x$

Tabulación

	1o. cuadrante			2o. cuadrante		3o. cuadrante		4o. cuadrante	
X	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
Y	1	1.4	No existe	-1.4	-1	-1.4	No existe	1.4	1

Gráfica



Características de la función cosecante

1. La función no interseca al eje X.
2. La función es positiva en el primero y segundo cuadrantes.
3. La función es negativa en el tercero y cuarto cuadrantes.
4. La función tiene periodo igual a $2\pi \text{ rad}$.
5. El valor de x es un número real tal que $x \neq n\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$ (asíntotas verticales).
6. $y \geq 1$ o $y \leq -1$.

Resumen

La siguiente tabla muestra el periodo, la amplitud, las asíntotas verticales, el dominio y el rango de cada una de las funciones trigonométricas.

	Periodo	Amplitud	Asíntotas verticales	Valores de x	Valores de y
$y = \sin x$	2π	1	No tiene	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} / -1 \leq y \leq 1\}$
$y = \cos x$	2π	1	No tiene	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} / -1 \leq y \leq 1\}$
$y = \tan x$	π		$\frac{\pi}{2}(2n+1), n \in \mathbb{Z}$	$\left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2}(2n+1)\right\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
$y = \cot x$	π		$n\pi, n \in \mathbb{Z}$	$\{x \in \mathbb{R} / x \neq n\pi\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
$y = \sec x$	2π		$\frac{\pi}{2}(2n+1), n \in \mathbb{Z}$	$\left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2}(2n+1)\right\}$	$\{y \in \mathbb{R} / y \leq -1 \text{ o } y \geq 1\}$
$y = \csc x$	2π		$n\pi, n \in \mathbb{Z}$	$\{x \in \mathbb{R} / x \neq n\pi\}$	$\{y \in \mathbb{R} / y \leq -1 \text{ o } y \geq 1\}$

Amplitud, periodo y desplazamiento de fase

Si $y = a \operatorname{sen} bx$, o bien $y = a \cos bx$, para $a, b \in \mathbb{R}$, distintos de cero, entonces la gráfica tiene amplitud $|a|$, y

periodo $\frac{2\pi}{|b|}$

EJEMPLOS

- 1 ●● Calcula la amplitud, el periodo y traza la gráfica de $y = 4 \operatorname{sen} 2x$.

Solución

De $y = 4 \operatorname{sen} 2x$ se obtiene $a = 4$ y $b = 2$, los cuales al sustituir en las fórmulas se determinan la amplitud y el periodo:


$$\text{Amplitud: } |a| = |4| = 4$$

$$\text{Periodo: } \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

Luego, la gráfica tiene amplitud 4 y periodo π .

Tabulación

X	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3}{4}\pi$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7}{4}\pi$	2π
Y	0	4	0	-4	0	4	0	-4	0

Gráfica

- 2 ●●● Calcula la amplitud, el periodo y traza la gráfica de $y = 2 \operatorname{sen} \frac{1}{2} x$.


Solución

De $y = 2 \operatorname{sen} \frac{1}{2} x$ se obtiene $a = 2$ y $b = \frac{1}{2}$, los cuales al sustituirlos en las fórmulas se determinan la amplitud y el periodo:

$$\text{Amplitud: } |a| = |2| = 2 \qquad \text{Periodo: } \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$$

Entonces, la gráfica tiene amplitud 2 y periodo 4π .

X	Y
0	0
$\frac{\pi}{2}$	1.41
π	2
$\frac{3\pi}{2}$	1.41
2π	0
$\frac{5\pi}{2}$	-1.41
3π	-2
$\frac{7\pi}{2}$	-1.41
4π	0



- 3 ●●● Determina la amplitud y el periodo de $y = \frac{2}{3} \cos \frac{1}{3} x$.

Solución

En este caso $a = \frac{2}{3}$ y $b = \frac{1}{3}$, por tanto,

$$\text{Amplitud} = \left| \frac{2}{3} \right| = \frac{2}{3} \qquad \text{Periodo} = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$$

Entonces, la gráfica tiene amplitud $\frac{2}{3}$ y periodo 6π .

Desplazamiento de fase (desfasamiento)

● **Caso 1.** Si $y = a \operatorname{sen}(bx + c)$, o bien $y = a \cos(bx + c)$ con $a \neq 0$ y $b \neq 0$

El desplazamiento de fase se calcula resolviendo las siguientes ecuaciones:

$$bx + c = 0 \qquad \text{y} \qquad bx + c = 2\pi$$

Ejemplo

Calcula la amplitud, periodo y desplazamiento de fase y traza la gráfica de:

$$y = 3 \operatorname{sen} \left(2x + \frac{\pi}{2} \right)$$

Solución

$y = 3 \operatorname{sen} \left(2x + \frac{\pi}{2} \right)$, tiene la forma de $y = a \operatorname{sen} (bx + c)$ donde $a = 3$, $b = 2$ y $c = \frac{\pi}{2}$, por consiguiente:


$$\text{Amplitud} = |a| = |3| = 3 \quad \text{Periodo} = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

Para determinar el desplazamiento de fase y el intervalo, se resuelven las siguientes ecuaciones:

$$2x + \frac{\pi}{2} = 0 \quad \text{y} \quad 2x + \frac{\pi}{2} = 2\pi$$

Donde $x = -\frac{\pi}{4}$ y $x = \frac{3}{4}\pi$, respectivamente.

X	$-\frac{5}{4}\pi$	$-\pi$	$-\frac{3}{4}\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3}{4}\pi$	π	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{3}{2}\pi$	$\frac{7}{4}\pi$
Y	0	3	0	-3	0	3	0	-3	0	3	0	-3	0



● **Caso 2.** Si $y = a \tan (bx + c)$ con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces:

a) El periodo es $\frac{\pi}{|b|}$

Se pueden determinar las asíntotas verticales sucesivas en la gráfica resolviendo las ecuaciones:

$$bx + c = -\frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad bx + c = \frac{\pi}{2}$$

b) El desplazamiento de fase es $-\frac{c}{b}$

Ejemplo

Calcula el periodo y traza la gráfica de $y = \frac{1}{2} \tan(x + \frac{\pi}{4})$

Solución

$a = \frac{1}{2}$, $b = 1$ y $c = \frac{\pi}{4}$; entonces,

a) El periodo es $\frac{\pi}{|b|} = \frac{\pi}{1} = \pi$

b) Para determinar las asíntotas verticales sucesivas se resuelven las ecuaciones:


$$x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Donde $x = -\frac{3}{4}\pi$ y $x = \frac{\pi}{4}$, respectivamente, esto significa que cada π rad se traza una asíntota.

c) En la función $a = \frac{1}{2}$, la gráfica de la ecuación en el intervalo $[-\frac{3}{4}\pi, \frac{\pi}{4}]$ tiene la forma de $y = \frac{1}{2} \tan x$, debido a que $c = \frac{\pi}{4}$ y $b = 1$, el desplazamiento de fase se define como $-\frac{c}{b} = -\frac{\pi}{4}$, por consiguiente, la gráfica se obtiene desplazando $y = \frac{1}{2} \tan x$ hacia la izquierda una distancia de $\frac{\pi}{4}$

Gráfica

Finalmente se traza la gráfica de la función $y = \frac{1}{2} \tan(x + \frac{\pi}{4})$ con los datos ya obtenidos.



Gráficas de $y = \sin^{-1} x$, $y = \cos^{-1} x$, $y = \tan^{-1} x$

Seno inverso ($y = \sin^{-1} x$)

Se representa como $\sin^{-1} y$ y se define como sigue:

$$y = \sin^{-1} x \quad \text{si y sólo si} \quad x = \sin y$$

donde $-1 \leq x \leq 1$, $-\infty < y < \infty$

La expresión se puede escribir de las siguientes formas:


$$y = \sin^{-1} x = \text{arc sen } x \quad \text{o} \quad y = \text{ang sen } x$$

Las cuales se leen, respectivamente, *arco seno de x* o *ángulo seno de x*.

Tabulación

X	Y
0	$-\pi$
-1	$-\frac{1}{2}\pi$
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{4}\pi$
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}\pi$
0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}\pi$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{4}\pi$
1	$\frac{1}{2}\pi$
0	π

Gráfica



Coseno inverso ($y = \cos^{-1}x$)

La expresión coseno inverso se define como:

$$y = \cos^{-1}x \quad \text{si y sólo si} \quad x = \cos y$$

donde $-1 \leq x < 1$, $-\infty < y < \infty$.

La expresión se puede escribir de la siguiente forma:


$$y = \cos^{-1}x = \text{arc} \cos x = \text{ang} \cos x$$

Las cuales se leen, respectivamente, *arco coseno de x* o *ángulo coseno de x*.

Tabulación

X	Y
-1	π
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3}{4}\pi$
$-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$
0	$\frac{1}{2}\pi$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}\pi$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{4}\pi$
1	0

Gráfica



Tangente inversa ($y = \tan^{-1}x$)


La expresión tangente inversa se define como:

$$y = \tan^{-1}x \quad \text{si y sólo si} \quad x = \tan y$$

donde $-\infty < x < \infty$, “y” es un real tal que $y \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}$ con $n \in \mathbb{Z}$.

La tangente inversa se puede escribir de la siguiente forma:

$$y = \tan^{-1}x = \arctan x = \operatorname{ang} \tan x$$



EJERCICIO 41

Obtén la amplitud, el periodo y el desplazamiento de fase de las siguientes funciones:

1. $y = 2 \cos \left(3x - \frac{\pi}{2} \right)$

4. $y = 5 \sin \left(\frac{1}{4}x + \frac{\pi}{2} \right)$

7. $y = \frac{3}{2} \sin \left(\frac{1}{2}\pi - 5x \right)$

2. $y = 2 \sin 4x$

5. $y = 4 \cos \left(x - \frac{3}{4}\pi \right)$

8. $y = -\frac{1}{3} \cos \left(\frac{1}{4}x + \frac{\pi}{3} \right)$

3. $y = \frac{4}{3} \sin \left(-\frac{2}{3}x + \frac{3}{2}\pi \right)$

6. $y = -3 \cos 2x$

9. $y = \sin \left(\frac{x}{3} \right)$

Calcula el periodo, las asíntotas verticales y el desplazamiento de fase de las siguientes funciones:

10. $y = 3 \tan(2x)$

12. $y = \frac{1}{2} \tan \left(3x - \frac{\pi}{3} \right)$

14. $y = -\frac{3}{2} \tan \left(\frac{1}{4}x - \frac{\pi}{2} \right)$

11. $y = 2 \tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$

13. $y = -4 \tan \left(\frac{1}{2}x - \pi \right)$

15. $y = \tan(x - \pi)$

Traza la gráfica de:

16. $y = \frac{1}{2} \sin \left(x + \frac{3}{4}\pi \right)$

23. $y = \sec^{-1}x$

17. $y = \sin 2x$

24. $y = \operatorname{ang} \csc x$

18. $y = -3 \cos \left(2x + \frac{4}{3}\pi \right)$

25. $y = 2 + \sin 3x$

19. $y = \sin \left(\frac{x}{3} \right)$

26. $y = \cos(2x) - 3$

20. $y = \tan 2x$

27. $y = 1 + 2 \sin 4x$

21. $y = \tan \left(\frac{x}{4} \right)$

28. $y = \sin(3x - \pi)$


22. $y = \operatorname{arc} \operatorname{ctg} x$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

IDENTIDADES Y ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

IDENTIDADES PITAGÓRICAS



Definiciones de
ángulos del libro
Los elementos de Euclides

A sí se denomina a las identidades que resultan del teorema de Pitágoras y se obtienen del círculo unitario mediante un triángulo rectángulo de hipotenusa 1 y catetos con longitudes $\text{sen } \alpha$ y $\text{cos } \alpha$.

Por definición del teorema de Pitágoras:

$$(1)^2 = (\text{sen } \alpha)^2 + (\text{cos } \alpha)^2$$

$$1 = \text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha$$

A la cual se le denomina identidad fundamental.

Identidades trigonométricas

Son igualdades en las que intervienen funciones trigonométricas y es válida para cualquier valor angular.


Obtención de las identidades trigonométricas básicas

Para determinar las identidades se hace uso de las definiciones de las funciones trigonométricas.

En el triángulo las funciones del ángulo α se definen:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{a}{c} \quad \tan \alpha = \frac{a}{b} \quad \operatorname{csc} \alpha = \frac{c}{a}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{b}{a} \quad \sec \alpha = \frac{c}{b}$$



Al multiplicar una función directa por cada una de sus recíprocas se obtiene:

$$(\operatorname{sen} \alpha)(\operatorname{csc} \alpha) = \left(\frac{a}{c}\right) \cdot \left(\frac{c}{a}\right) = \frac{a \cdot c}{c \cdot a} = 1$$

$$(\cos \alpha)(\sec \alpha) = \left(\frac{b}{c}\right) \cdot \left(\frac{c}{b}\right) = \frac{b \cdot c}{c \cdot b} = 1$$

$$(\tan \alpha)(\operatorname{ctg} \alpha) = \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{b}{a}\right) = \frac{a \cdot b}{b \cdot a} = 1$$

Por tanto, se deducen las identidades recíprocas.

Identidades recíprocas

$$(\operatorname{sen} \alpha)(\operatorname{csc} \alpha) = 1 \quad (\cos \alpha)(\sec \alpha) = 1 \quad (\tan \alpha)(\operatorname{ctg} \alpha) = 1$$

Al realizar los respectivos despejes en las identidades anteriores, se obtienen las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \alpha &= \frac{1}{\operatorname{csc} \alpha} & \tan \alpha &= \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha} & \operatorname{csc} \alpha &= \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} \\ \cos \alpha &= \frac{1}{\sec \alpha} & \operatorname{ctg} \alpha &= \frac{1}{\tan \alpha} & \sec \alpha &= \frac{1}{\cos \alpha} \end{aligned}$$

Identidades de cociente

Si se realiza el cociente de la función seno ($\operatorname{sen} \alpha$) por la función coseno ($\cos \alpha$), se obtiene la función $\tan \alpha$:

$$\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b} = \tan \alpha$$

De manera análoga se obtiene la función cotangente ($\operatorname{ctg} \alpha$),

$$\frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{\frac{b}{c}}{\frac{a}{c}} = \frac{b \cdot c}{a \cdot c} = \frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha$$

Por tanto:

$$\tan \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} \quad ; \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha}$$

Identidades pitagóricas

En el triángulo se aplica el teorema de Pitágoras:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Se divide entre c^2 a ambos miembros.

$$\frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = 1$$

Se aplica la ley de los exponentes.

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$$

Los cocientes son equivalentes a las funciones $\operatorname{sen} \alpha$ y $\cos \alpha$

$$(\operatorname{sen} \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1, \quad \text{por consiguiente } \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

En forma semejante se obtienen las demás identidades pitagóricas, entonces:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad ; \quad \tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha \quad \text{y} \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

De las identidades anteriores se realizan despejes, con el fin de obtener otras identidades:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

$$\operatorname{sen} \alpha = \pm \sqrt{(1 - \cos^2 \alpha)}$$

$$\tan \alpha = \pm \sqrt{(\sec^2 \alpha - 1)}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \pm \sqrt{(\csc^2 \alpha - 1)}$$

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{(1 - \operatorname{sen}^2 \alpha)}$$

$$\sec \alpha = \pm \sqrt{(\tan^2 \alpha + 1)}$$

$$\csc \alpha = \pm \sqrt{(\operatorname{ctg}^2 \alpha + 1)}$$

Demostración de identidades trigonométricas

Para realizar la demostración de una identidad trigonométrica se aplican procesos algebraicos como la factorización, las operaciones entre fracciones así como su simplificación, además de las identidades trigonométricas básicas.

La aplicación de estos procesos depende de la identidad en sí; esto significa que no existe un orden o procedimiento específico, debido a esta situación sugerimos iniciar con el lado más complejo o elaborado de la igualdad, con el fin de llegar a demostrar el lado más sencillo, como a continuación se ejemplifica.

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Demuestra la siguiente identidad: $\operatorname{sen} x = \frac{\cos x}{\operatorname{ctg} x}$

Demostración

Se trabaja del segundo hacia el primer miembro, se sustituye $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$ y realiza el cociente correspondiente:

$$\operatorname{sen} x = \frac{\cos x}{\operatorname{ctg} x}$$

→

$$\operatorname{sen} x = \frac{\cos x}{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}$$

→

$$\operatorname{sen} x = \frac{\operatorname{sen} x \cdot \cos x}{\cos x}$$

$$\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x$$

Por tanto queda demostrada la identidad.

- 2 ••• Demuestra la siguiente identidad: $\operatorname{sen} \beta + \cos \beta \operatorname{ctg} \beta = \operatorname{csc} \beta$

Demostración

Para esta identidad se trabaja con el primer miembro para obtener el segundo.

$$\operatorname{sen} \beta + \cos \beta \operatorname{ctg} \beta = \operatorname{csc} \beta \quad \text{se utiliza la identidad del cociente } \operatorname{ctg} \beta = \frac{\cos \beta}{\operatorname{sen} \beta}$$

$$\operatorname{sen} \beta + \cos \beta \cdot \frac{\cos \beta}{\operatorname{sen} \beta} = \operatorname{csc} \beta \quad \text{se efectúa el producto.}$$

$$\operatorname{sen} \beta + \frac{\cos^2 \beta}{\operatorname{sen} \beta} = \operatorname{csc} \beta \quad \text{se realiza la suma fraccionaria.}$$

$$\frac{\operatorname{sen}^2 \beta + \cos^2 \beta}{\operatorname{sen} \beta} = \operatorname{csc} \beta \quad \text{se sustituye la identidad pitagórica } \operatorname{sen}^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$$

$$\frac{1}{\operatorname{sen} \beta} = \operatorname{csc} \beta \quad \text{se aplica } \frac{1}{\operatorname{sen} \beta} = \operatorname{csc} \beta$$

$$\operatorname{csc} \beta \equiv \operatorname{csc} \beta$$

Finalmente, queda demostrada la identidad.

- 3 ••• Demuestra la siguiente identidad:

$$\frac{\operatorname{csc} \alpha}{\tan \alpha + \operatorname{ctg} \alpha} = \cos \alpha$$

Demostración

Se utiliza el primer miembro de la igualdad y se realizan los siguientes cambios:

$$\frac{\operatorname{csc} \alpha}{\tan \alpha + \operatorname{ctg} \alpha} = \cos \alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}}{\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha}} = \cos \alpha$$

Se realiza la suma del denominador,

$$\frac{\frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}}{\frac{\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha}} = \cos \alpha$$

Y posteriormente la división,

$$\frac{\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha \cdot (\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha)} = \cos \alpha$$

Se sustituye $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\frac{\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha (1)} = \cos \alpha$$

Y finalmente se simplifica la fracción:

$$\cos \alpha \equiv \cos \alpha$$

4 ••• Demuestra la siguiente identidad:

$$\frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x} = \frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}$$

Demostración

Se utiliza el segundo miembro como base para la demostración:

$$\frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x} = \frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}$$

$$\frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x} = \frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x} \cdot \frac{1 - \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}$$

Se multiplica por el conjugado del numerador.

$$\frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x} = \frac{1 - \operatorname{sen}^2 x}{(\cos x)(1 - \operatorname{sen} x)}$$

se reemplaza $1 - \operatorname{sen}^2 x = \cos^2 x$.

$$\frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x} = \frac{\cos^2 x}{(\cos x)(1 - \operatorname{sen} x)}$$

se simplifica la fracción.

$$\frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x} = \frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x}$$

se demuestra la identidad.

5 ••• Demuestra la siguiente identidad:

$$2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

Demostración

En este caso se utiliza el primer miembro para obtener el segundo.

$$2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

Se utiliza la identidad $1 = \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x$.

$$2\cos^2 x - (\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x) = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

$$2\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

se simplifican términos semejantes.

$$\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

se emplea $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$.

$$1 - \operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

$$1 - 2\operatorname{sen}^2 x \equiv 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

Por lo que la identidad queda demostrada.

6 ••• Demuestra la siguiente identidad:

$$\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$$

Solución

Se utiliza el lado izquierdo para demostrar la identidad:

$$\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} \quad \text{Se emplea la identidad } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} \quad \text{se factoriza denominador y numerador}$$

$$\frac{(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)}{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} \quad \text{se simplifica la fracción}$$

$$\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} \quad \text{se divide entre } \cos \alpha \text{ numerador y denominador.}$$

$$\frac{\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} \quad \rightarrow \quad \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$$

EJERCICIO 42

Demuestra las siguientes identidades:

1. $\sin x (1 + \cot x) = \sin x + \cos x$
2. $(1 + \tan^2 x) \cos x = \sec x$
3. $\left(\frac{\sin x}{\tan x}\right)^2 + \left(\frac{1}{\csc x}\right)^2 = 1$
4. $(\sec x + \sin^2 x + \cos^2 x)(\sec x - 1) = \tan^2 x$
5. $\csc \theta (1 - \cos^2 \theta) = \sin \theta$
6. $\frac{\operatorname{ctg} \alpha}{\cos \alpha} = \csc \alpha$
7. $\frac{1 - \sin^2 \phi}{\sec^2 \phi} = \cos^4 \phi$
8. $\operatorname{ctg}^2 y - \cos^2 y = \operatorname{ctg}^2 y \cos^2 y$
9. $\sec y = \frac{\operatorname{ctg} y + \tan y}{\csc y}$
10. $\frac{1 + \cos \omega}{\sin \omega} = \frac{\sin \omega}{1 - \cos \omega}$
11. $\sec \beta \cdot \sin \beta \cdot \operatorname{ctg} \beta = 1$

12. $\operatorname{ctg} x - \tan x = \frac{2 \cos^2 x - 1}{\operatorname{sen} x \cdot \cos x}$
13. $2 \csc^2 y = \frac{1}{1 - \cos y} + \frac{1}{1 + \cos y}$
14. $\frac{1}{\csc \alpha + \operatorname{ctg} \alpha} = \csc \alpha - \operatorname{ctg} \alpha$
15. $3 \operatorname{sen}^2 x - 9 \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{ctg} x + 7 \cos^2 x - 4 \cos x = (4 \cos x - 1)(\cos x - 3)$
16. $\cos^2 x + \frac{\tan^2 x}{1 + \sec x} + \operatorname{sen}^2 x = \sec x$
17. $\cos^4 x + \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x = 1$
18. $\sqrt{\frac{1 - \cos \beta}{1 + \cos \beta}} + \sqrt{\frac{1 + \cos \beta}{1 - \cos \beta}} = 2 \csc \beta$
19. $\cos x (2 \sec x + \tan x)(\sec x - 2 \tan x) = 2 \cos x - 3 \tan x$
20. $1 + \frac{\operatorname{sen} x \cdot \operatorname{ctg}^2 x}{1 + \operatorname{sen} x} = \csc x$
21. $2(\operatorname{sen}^6 x + \cos^6 x) - 3(\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x) + 1 = 0$
22. $\operatorname{sen} x (1 + \operatorname{ctg} x) = \cos^3 x (1 + \tan x) + \operatorname{sen}^3 x (1 + \operatorname{ctg} x)$
23. $(\csc x - \operatorname{sen} x)^2 + (\sec x - \cos x)^2 = \tan^2 x + \operatorname{ctg}^2 x - 1$
24. $\frac{2 - \csc^2 x}{\tan x - 1} - \csc^2 x + 1 = \operatorname{ctg} x$
25. $\frac{\tan x + \operatorname{ctg} x}{\csc x - \operatorname{sen} x} = \sec^3 x$
26. $\frac{\cos x - \sec x}{\operatorname{sen} x - \csc x} = \sec x (\sec^2 x - 1) \operatorname{sen} x$
27. $\sec^3 x = \frac{\sec^3 x - \sec x \tan^2 x}{(1 - \operatorname{sen} x)(1 + \operatorname{sen} x)}$
28. $\operatorname{sen}^2 x + \tan^2 x + \cos^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
29. $\sec^2 x + \csc^2 x = (\csc x \sec x)^2$
30. $\sec^2 x \equiv \operatorname{sen} x \csc x + \operatorname{sen} x (\operatorname{sen} x \sec^2 x)$
31. $\frac{1}{\csc x + \operatorname{ctg} x} - \frac{1}{\operatorname{ctg} x - \csc x} = \frac{2}{\operatorname{sen} x}$
32. $1 - \operatorname{ctg} x = \sqrt{(\csc^2 x - 2 \operatorname{ctg} x)}$




Este ejercicio no tiene soluciones al final del libro por ser demostraciones.

Obtención de las identidades trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos

Considerando que $\overline{OB} \perp \overline{BC}$, $\overline{OC} \perp \overline{DC}$, se realiza una proyección de $\overline{OD}$ con el eje X y $\overline{OA} \perp \overline{AD}$, $\overline{DE} \perp \overline{CE}$, donde $\overline{AE} = \overline{BC}$, así como $\overline{AB} = \overline{CE}$

Para obtener $\text{sen}(\alpha + \beta)$



$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \frac{\overline{AD}}{\overline{OD}} \text{ pero } \overline{AD} = \overline{AE} + \overline{ED};$$

entonces,

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \frac{\overline{AE} + \overline{ED}}{\overline{OD}} \quad \text{sen}(\alpha + \beta) = \frac{\overline{AE}}{\overline{OD}} + \frac{\overline{ED}}{\overline{OD}}$$

Para obtener las funciones trigonométricas de los ángulos α y β

$$\text{sen } \alpha = \frac{\overline{BC}}{\overline{OC}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{OC}} = \frac{\overline{CE}}{\overline{CD}} \dots(1)$$

$$\text{sen } \beta = \frac{\overline{CD}}{\overline{OD}} \dots(3)$$

$$\cos \alpha = \frac{\overline{OB}}{\overline{OC}} = \frac{\overline{ED}}{\overline{CD}} \dots(2)$$

$$\cos \beta = \frac{\overline{OC}}{\overline{OD}} \dots(4)$$

Si se realiza el producto de (1) y (4); (2) y (3) se tiene:

$$(\text{sen } \alpha)(\cos \beta) = \frac{\overline{AE}}{\overline{OC}} \cdot \frac{\overline{OC}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{OD}} \dots(5)$$

$$(\text{sen } \beta)(\cos \alpha) = \frac{\overline{CD}}{\overline{OD}} \cdot \frac{\overline{ED}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{ED}}{\overline{OD}} \dots(6)$$

Al sumar (5) y (6):

$$(\text{sen } \alpha)(\cos \beta) + (\text{sen } \beta)(\cos \alpha) = \frac{\overline{AE}}{\overline{OD}} + \frac{\overline{ED}}{\overline{OD}};$$

Se obtiene $\text{sen}(\alpha + \beta)$, entonces:

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = (\text{sen } \alpha)(\cos \beta) + (\text{sen } \beta)(\cos \alpha)$$

Para obtener $\cos(\alpha + \beta)$

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{\overline{OA}}{\overline{OD}}; \quad \text{pero} \quad \overline{OA} = \overline{OB} - \overline{AB};$$

entonces,

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{\overline{OB} - \overline{AB}}{\overline{OD}} \quad \cos(\alpha + \beta) = \frac{\overline{OB}}{\overline{OD}} - \frac{\overline{AB}}{\overline{OD}}$$

Si se realiza el producto de (2) y (4); (1) y (3) se tiene:

$$(\cos \alpha)(\cos \beta) = \frac{\overline{OB}}{\overline{OC}} \cdot \frac{\overline{OC}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{OB}}{\overline{OD}} \dots (7)$$

$$(\sin \alpha)(\sin \beta) = \frac{\overline{CE}}{\overline{CD}} \cdot \frac{\overline{CD}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{CE}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OD}} \dots (8)$$

Al restar (8) de (7):

$$(\cos \alpha)(\cos \beta) - (\sin \alpha)(\sin \beta) = \frac{\overline{OB}}{\overline{OD}} - \frac{\overline{AB}}{\overline{OD}};$$

Se obtiene $\cos(\alpha + \beta)$

$$\cos(\alpha + \beta) = (\cos \alpha)(\cos \beta) - (\sin \alpha)(\sin \beta)$$

Para obtener $\tan(\alpha + \beta)$, se emplean identidades básicas:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}; \quad \tan(\alpha + \beta) = \frac{(\sin \alpha)(\cos \beta) + (\sin \beta)(\cos \alpha)}{(\cos \alpha)(\cos \beta) - (\sin \alpha)(\sin \beta)}$$

Si se divide entre $(\cos \alpha)(\cos \beta) \neq 0$, entonces,

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\frac{(\sin \alpha)(\cos \beta) + (\sin \beta)(\cos \alpha)}{(\cos \alpha)(\cos \beta)}}{\frac{(\cos \alpha)(\cos \beta) - (\sin \alpha)(\sin \beta)}{(\cos \alpha)(\cos \beta)}} = \frac{\frac{(\sin \alpha)(\cos \beta)}{(\cos \alpha)(\cos \beta)} + \frac{(\sin \beta)(\cos \alpha)}{(\cos \alpha)(\cos \beta)}}{\frac{(\cos \alpha)(\cos \beta)}{(\cos \alpha)(\cos \beta)} - \frac{(\sin \alpha)(\sin \beta)}{(\cos \alpha)(\cos \beta)}}; \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\frac{(\sin \alpha)}{(\cos \alpha)} + \frac{(\sin \beta)}{(\cos \beta)}}{1 - \frac{(\sin \alpha)}{(\cos \alpha)} \cdot \frac{(\sin \beta)}{(\cos \beta)}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} \end{aligned}$$

Finalmente se deduce que:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Para obtener las identidades trigonométricas de la diferencia se emplean las identidades de los ángulos negativos en función de ángulos positivos, es decir:

$$\sin(-x) = -\sin(x) \quad \cos(-x) = \cos(x) \quad \tan(-x) = -\tan(x)$$

Por tanto:

$$\sin(\alpha + \beta) = (\sin \alpha)(\cos \beta) + (\sin \beta)(\cos \alpha)$$

Se cambia β por $-\beta$ y se obtiene:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha - \beta) &= (\sin \alpha)(\cos(-\beta)) + (\sin(-\beta))(\cos \alpha) \\ \sin(\alpha - \beta) &= (\sin \alpha)(\cos \beta) - (\sin \beta)(\cos \alpha) \end{aligned}$$

De una manera semejante se realiza la diferencia para las demás funciones trigonométricas y se obtiene:

$$\cos(\alpha - \beta) = (\cos \alpha)(\cos \beta) + (\sin \alpha)(\sin \beta)$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Resumen de fórmulas

Identidades trigonométricas de la suma de ángulos:

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = (\operatorname{sen} \alpha)(\cos \beta) + (\operatorname{sen} \beta)(\cos \alpha)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = (\cos \alpha)(\cos \beta) - (\operatorname{sen} \alpha)(\operatorname{sen} \beta)$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Identidades trigonométricas de la diferencia de ángulos:

$$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = (\operatorname{sen} \alpha)(\cos \beta) - (\operatorname{sen} \beta)(\cos \alpha)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = (\cos \alpha)(\cos \beta) + (\operatorname{sen} \alpha)(\operatorname{sen} \beta)$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Valor de una función trigonométrica para la suma y la diferencia de ángulos

Los valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables se emplean para obtener el valor de una función cuyo ángulo se pueda descomponer en una suma o diferencia.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Obtén el valor de $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right)$.

Solución

Al aplicar la identidad para el seno de la suma de ángulos, se determina que:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) &= \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{4} \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

- 2 •• Calcula el valor exacto de $\tan(90^\circ - 60^\circ)$.

Solución

Se aplica la identidad de la tangente de la diferencia de ángulos y se obtiene:

$$\tan(90^\circ - 60^\circ) = \frac{\tan 90^\circ - \tan 60^\circ}{1 + \tan 90^\circ \tan 60^\circ}$$

La $\tan 90^\circ$ no está definida, por consiguiente, se multiplica la identidad $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ por la unidad expresada como $1 = \frac{\operatorname{ctg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha}$

$$\tan(\alpha - \beta) = \left(\frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}\right) \left(\frac{\operatorname{ctg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha}\right) = \frac{\tan \alpha \operatorname{ctg} \alpha - \tan \beta \operatorname{ctg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha + \tan \alpha \tan \beta \operatorname{ctg} \alpha}$$

Por identidades $\tan \alpha \operatorname{ctg} \alpha = 1$, entonces:

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{1 - \tan \beta \operatorname{ctg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha + 1(\tan \beta)} = \frac{1 - \tan \beta \operatorname{ctg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha + \tan \beta}$$

Sustituyendo $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 60^\circ$ y posteriormente los valores de $\operatorname{ctg} 90^\circ = 0$ y $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, se obtiene como resultado:

$$\tan(90^\circ - 60^\circ) = \frac{1 - \tan 60^\circ \operatorname{ctg} 90^\circ}{\operatorname{ctg} 90^\circ + \tan 60^\circ} = \frac{1 - (\sqrt{3})(0)}{0 + \sqrt{3}} = \frac{1 - 0}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

3 ••• Expresa en función de x la identidad $\cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right)$

Solución

Se aplica la identidad del coseno de la diferencia de ángulos:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Se obtiene:

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) &= \cos\frac{3}{2}\pi \cos x + \sin\frac{3}{2}\pi \sin x = (0) \cos x + (-1) \sin x \\ &= 0 - \sin x \\ &= -\sin x\end{aligned}$$

Resulta que, $\cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = -\sin x$

EJERCICIO 43

Aplica las identidades de suma o diferencias de ángulos y determina el valor de las siguientes funciones trigonométricas:

1. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$

5. $\sec\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right)$

9. $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \pi\right)$

2. $\cos\left(\frac{3}{4}\pi - \frac{\pi}{3}\right)$

6. $\cos(270^\circ - 45^\circ)$

10. $\cotg\left(2\pi - \frac{7}{4}\pi\right)$

3. $\sin(45^\circ + 60^\circ)$

7. $\cotg\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$

4. $\tan(45^\circ + 90^\circ)$

8. $\csc\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{2}\right)$

Expresa en función del ángulo indicado las siguientes expresiones:

11. $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$

15. $\csc\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$

19. $\tan(3\pi - \alpha)$

12. $\cos\left(\frac{3}{4}\pi - x\right)$

16. $\cotg\left(\frac{\pi}{4} + \beta\right)$

20. $\sin\left(\frac{3}{4}\pi - \theta\right)$

13. $\sin(2\pi + \beta)$

17. $\cos\left(x - \frac{8}{3}\pi\right)$

14. $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

18. $\sec(\pi + 2\omega)$

➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

Aplicación de las funciones trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos

Para determinar el valor de una función trigonométrica de determinados ángulos, éstos se descomponen como la suma o la diferencia de dos ángulos notables.

EJEMPLOS

- 1 •• Determina el $\cos 75^\circ$ y expresa 75° como una suma de ángulos notables.

Solución

El ángulo de 75° , como la suma de ángulos notables, es $75^\circ = 30^\circ + 45^\circ$

Entonces,

$$\cos 75^\circ = \cos (30^\circ + 45^\circ)$$

Se emplea la identidad $\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

$$\cos (75^\circ) = \cos (30^\circ + 45^\circ) = (\cos 30^\circ)(\cos 45^\circ) - (\sin 30^\circ)(\sin 45^\circ)$$

Al sustituir el valor de cada función trigonométrica, se determina que:

$$\cos 75^\circ = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Por tanto, $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

- 2 •• Determina $\tan 15^\circ$ y expresa 15° como una diferencia de ángulos notables.

Solución

El ángulo de 15° se expresa como $60^\circ - 45^\circ$, entonces:

$$\tan (15^\circ) = \tan (60^\circ - 45^\circ)$$

Se emplea la identidad $\tan (\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$ en la que se sustituyen los valores de los ángulos $\alpha = 60^\circ$ y $\beta = 45^\circ$,

$$\tan (15^\circ) = \tan (60^\circ - 45^\circ) = \frac{\tan 60^\circ - \tan 45^\circ}{1 + \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ}$$

Se sustituyen los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables:

$$\tan (15^\circ) = \tan (60^\circ - 45^\circ) = \frac{\sqrt{3} - 1}{1 + (\sqrt{3})(1)} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$$

Al racionalizar el denominador, se obtiene:


$$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

- 3 •• Calcula las funciones trigonométricas básicas de $(\alpha + \beta)$ si sabes que $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ para $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$ y $\tan \beta = \frac{5}{12}$ para $\pi \leq \beta \leq \frac{3\pi}{2}$.

Solución


Se obtienen las funciones de los ángulos α y β , con el teorema de Pitágoras y se respetan los signos de las funciones en los cuadrantes indicados.

Para $\sin \alpha$, el segundo cuadrante



Funciones del ángulo α : $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ y $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$

Para $\tan \beta$, el tercer cuadrante



Funciones del ángulo β : $\sin \beta = -\frac{5}{13}$, $\cos \beta = -\frac{12}{13}$ y $\tan \beta = \frac{5}{12}$

Por consiguiente, estos valores se sustituyen en las identidades de sumas de ángulos.

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(\alpha + \beta) &= (\operatorname{sen} \alpha)(\cos \beta) + (\operatorname{sen} \beta)(\cos \alpha) = \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{12}{13}\right) + \left(-\frac{5}{13}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= -\frac{36}{65} + \frac{20}{65} = -\frac{16}{65} \\ \cos(\alpha + \beta) &= (\cos \alpha)(\cos \beta) - (\operatorname{sen} \alpha)(\operatorname{sen} \beta) = \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{12}{13}\right) - \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{13}\right) \\ &= \frac{48}{65} + \frac{15}{65} = \frac{63}{65} \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} = \frac{\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(\frac{5}{12}\right)}{1 - \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{5}{12}\right)} = \frac{-\frac{4}{12}}{\frac{63}{48}} = -\frac{16}{63}\end{aligned}$$

Por tanto, los resultados son:

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = -\frac{16}{65}, \cos(\alpha + \beta) = \frac{63}{65} \text{ y } \tan(\alpha + \beta) = -\frac{16}{63}$$

4 ••• Demuestra la siguiente identidad:

$$\operatorname{arc} \tan \frac{2\sqrt{t}}{t-1} - \operatorname{arc} \operatorname{ctg} \sqrt{t} = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{1}{\sqrt{t+1}}$$


Solución

Sean $\theta = \operatorname{arc} \tan \frac{2\sqrt{t}}{t-1}$ y $\alpha = \operatorname{arc} \operatorname{ctg} \sqrt{t}$, entonces $\theta - \alpha = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{1}{\sqrt{t+1}}$ que es la identidad a demostrar donde

$$\tan \theta = \frac{2\sqrt{t}}{t-1} \text{ y } \operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{t}$$

Se construyen los triángulos respectivamente,


Para el ángulo θ



Por el teorema de Pitágoras

$$\begin{aligned}h^2 &= (2\sqrt{t})^2 + (t-1)^2 \\ h &= \sqrt{4t + t^2 - 2t + 1} \\ h &= \sqrt{t^2 + 2t + 1} \\ h &= \sqrt{(t+1)^2} = t+1\end{aligned}$$

Para el ángulo α



Por el teorema de Pitágoras

$$\begin{aligned}h^2 &= (\sqrt{t})^2 + (1)^2 \\ h &= \sqrt{t+1}\end{aligned}$$

Se realiza la demostración aplicando seno a $(\theta - \alpha)$

$$\operatorname{sen}(\theta - \alpha) = \operatorname{sen} \theta \cos \alpha - \operatorname{sen} \alpha \cos \theta$$

Pero $\operatorname{sen} \theta = \frac{2\sqrt{t}}{t+1}$, $\cos \theta = \frac{t-1}{t+1}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t+1}}$ y $\operatorname{sen} \alpha = \frac{1}{\sqrt{t+1}}$, entonces

$$\operatorname{sen}(\theta - \alpha) = \frac{2\sqrt{t}}{t+1} \cdot \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t+1}} - \frac{1}{\sqrt{t+1}} \cdot \frac{t-1}{t+1} = \frac{2t - t + 1}{(t+1)\sqrt{t+1}} = \frac{(t+1)}{(t+1)\sqrt{t+1}} = \frac{1}{\sqrt{t+1}}$$

Donde,

$$\operatorname{sen}(\theta - \alpha) = \frac{1}{\sqrt{t+1}} \quad \rightarrow \quad \theta - \alpha = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{1}{\sqrt{t+1}}$$

Así queda demostrada la identidad.

EJERCICIO 44

Determina los valores de las siguientes funciones trigonométricas y expresa los ángulos como suma o diferencia:

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. $\tan 105^\circ$ | 3. $\csc 15^\circ$ | 5. $\tan 255^\circ$ | 7. $\tan 345^\circ$ | 9. $\csc 255^\circ$ |
| 2. $\cot 75^\circ$ | 4. $\sec 105^\circ$ | 6. $\cos 285^\circ$ | 8. $\sec 165^\circ$ | 10. $\sen 165^\circ$ |

11. Si $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ con $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$ y $\tan \beta = \frac{2}{3}$ con $0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, halla $\sen(\alpha + \beta)$, $\cos(\alpha + \beta)$ y $\tan(\alpha + \beta)$.
12. Si $\tan \alpha = 1$ con $\pi \leq \alpha \leq \frac{3}{2}\pi$ y $\sec \beta = 2$ con $\frac{3}{2}\pi \leq \beta \leq 2\pi$, halla $\sen(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha - \beta)$ y $\tan(\alpha - \beta)$.
13. Si $\sec \alpha = -\frac{3}{2}$ con $\pi \leq \alpha \leq \frac{3}{2}\pi$ y $\ctg \beta = \sqrt{2}$ con $0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, halla las seis funciones trigonométricas de $(\alpha + \beta)$ y $(\alpha - \beta)$.

Demuestra las siguientes identidades:

14. $\left[\sen(\pi - x) + \sen\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right] [\sen x - \cos x] \equiv 1 - 2\cos^2 x$
15. $\left[\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) - \cos(\pi - x) \right] - \left[\sen\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \right] \equiv 2\sen x$
16. $\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sen(\pi + x) \right] - \left[\cos(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \right] \equiv 3\sen x + \cos x$
17. $\frac{\sen\left(\beta - \frac{3\pi}{2}\right)}{\sec \beta} + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)}{\csc \beta} \equiv 1$
18. $\tan(\pi - \alpha) \cdot \sen\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right) \cdot \sen(\pi - \alpha) \equiv 1 - \cos^2 \alpha$
19. $[\sen \alpha - \sen \beta]^2 - 2\cos(\alpha + \beta) + [\cos \alpha + \cos \beta]^2 \equiv 2$
20. $\frac{\sec(\pi - \omega)}{\csc\left(\frac{\pi}{2} + \omega\right)} + \frac{\sen(\pi + \omega)}{\cos(\pi + \omega)} \equiv \tan \omega - 1$
21. $\csc(\pi - y) + \frac{\cos(\pi + y)}{\tan(\pi + y)} \equiv \sen y$
22. $\frac{\csc\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} - \frac{\tan(\pi - x)}{\sen x} \equiv \sec x \cdot (\csc x + 1)$
23. $\left[\sen(x + 2\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right]^2 + \frac{4\cos(x - 2\pi)}{\csc\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} \equiv 4$
24. $\frac{\sen(\alpha + \beta + \gamma) + \sen(\alpha - \beta - \gamma)}{\cos(\alpha + \beta + \gamma) + \cos(\alpha - \beta - \gamma)} \equiv \tan \alpha$

$$25. \operatorname{sen}(\theta + \omega) \cdot \operatorname{sen}(\theta - \omega) \equiv (\operatorname{sen} \theta + \operatorname{sen} \omega)(\operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen} \omega)$$

$$26. \tan\left(\frac{\pi}{4} + \delta\right) + \tan\left(\frac{\pi}{4} - \delta\right) \equiv -\frac{2}{\operatorname{sen}^2 \delta - \cos^2 \delta}$$

$$27. 4 \operatorname{arc} \tan\left(-\frac{3}{2}\right) + \pi \equiv 4 \operatorname{arc} \tan\left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$28. \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{\pi}{2} \equiv -\operatorname{sen}^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$29. \cos^{-1} \frac{12}{13} - \cos^{-1} \frac{33}{65} \equiv -\operatorname{sen}^{-1} \frac{3}{5}$$

$$30. \operatorname{sec}^{-1} \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{t} - \operatorname{arctg}^{-1} t \equiv 0, t > 0$$

$$31. \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} - \operatorname{arc} \cos \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \equiv -\operatorname{arc} \tan \frac{1}{t}, t > 0$$

$$32. \operatorname{sen}^{-1} \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} \equiv \operatorname{sen}^{-1}(1), t > 0$$

$$33. \operatorname{sen}^{-1} \sqrt{\frac{t}{t+1}} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{\sqrt{t+1}} \equiv \operatorname{sen}^{-1} \frac{t-1}{t+1}, t \geq 1$$

$$34. \operatorname{arc} \tan s - \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} \equiv \operatorname{arc} \tan \frac{s - t}{1 + st}, s > 0 \text{ y } t > 0$$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

Funciones trigonométricas del ángulo doble

Estas funciones se obtienen a partir de las identidades de la suma de ángulos, como se muestra a continuación:

Seno del ángulo doble $\operatorname{sen}(2\alpha)$

Para obtener el $\operatorname{sen}(2\alpha)$ se emplea la identidad $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$ donde $\beta = \alpha$

Entonces:

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = (\operatorname{sen} \alpha)(\cos \beta) + (\operatorname{sen} \beta)(\cos \alpha)$$

$$\operatorname{sen}(2\alpha) = (\operatorname{sen} \alpha)(\cos \alpha) + (\operatorname{sen} \alpha)(\cos \alpha)$$

$$\operatorname{sen}(2\alpha) = 2(\operatorname{sen} \alpha)(\cos \alpha)$$

Coseno del ángulo doble $\cos(2\alpha)$

Para obtener $\cos(2\alpha)$ se emplea la identidad $\cos(\alpha + \beta)$ donde $\beta = \alpha$

Entonces:

$$\cos(\alpha + \beta) = (\cos \alpha)(\cos \beta) - (\operatorname{sen} \alpha)(\operatorname{sen} \beta)$$

$$\cos(2\alpha) = (\cos \alpha)(\cos \alpha) - (\operatorname{sen} \alpha)(\operatorname{sen} \alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha \text{ (con el empleo de identidades trigonométricas básicas)}$$

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2\operatorname{sen}^2 \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = 2\cos^2 \alpha - 1$$

Tangente del ángulo doble $\tan(2\alpha)$

Para obtener $\tan(2\alpha)$ se emplea la identidad $\tan(\alpha + \beta)$ donde $\beta = \alpha$

Entonces:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \alpha}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$


EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Obtén las funciones trigonométricas de (2ω) , si se sabe que $\tan \omega = 3$, para $\pi \leq \omega \leq \frac{3\pi}{2}$

Solución

En este caso el ángulo ω se encuentra en el tercer cuadrante, entonces: $\tan \omega = \frac{-3}{-1}$



Por el teorema de Pitágoras

$$r^2 = (-1)^2 + (-3)^2$$

$$r^2 = 1 + 9$$

$$r = \sqrt{10}$$

Se obtienen las funciones trigonométricas de ω :

$$\sin \omega = -\frac{3}{\sqrt{10}} = -\frac{3\sqrt{10}}{10}, \quad \cos \omega = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10} \quad \text{y} \quad \tan \omega = \frac{-3}{-1} = 3$$

Por tanto,

$$\sin 2\omega = 2(\sin \omega)(\cos \omega) = 2\left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}\right)\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right) = \frac{(6)(10)}{100} = \frac{3}{5}$$

$$\cos 2\omega = \cos^2 \omega - \sin^2 \omega = \left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right)^2 - \left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}\right)^2 = \frac{10 - 90}{100} = -\frac{4}{5}$$

$$\tan 2\omega = \frac{2\tan \omega}{1 - \tan^2 \omega} = \frac{2 \cdot (3)}{1 - (3)^2} = \frac{6}{-8} = -\frac{3}{4}$$

- 2 •• Demuestra la siguiente identidad:

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

Demostración

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cdot \cos^2 x + \cos^4 x) = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

$$(1)(\sin^4 x - \sin^2 x \cdot \cos^2 x + \cos^4 x) = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

$$\sin^4 x - \sin^2 x \cdot \cos^2 x + \cos^4 x + 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x - 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

$$(\sin^4 x + 2\sin^2 x \cdot \cos^2 x + \cos^4 x) - 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

$$1 - 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x \quad (\text{pero } \sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x)$$

$$1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x \equiv 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

3 ••• Demuestra la siguiente identidad:

$$\frac{1 + \cos 2x}{\operatorname{ctg} x} = \operatorname{sen} 2x$$

Demostración

Se inicia con la sustitución de las siguientes identidades:

$$1 = \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x \quad \text{y} \quad \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$$

Se realizan las operaciones correspondientes y se simplifica:

$$\frac{1 + \cos 2x}{\operatorname{ctg} x} = \frac{(\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x) + (\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x)}{\operatorname{ctg} x} = \frac{2\cos^2 x}{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}} = \frac{2\cos^2 x \operatorname{sen} x}{\cos x} = 2\operatorname{sen} x \cos x$$

Pero $2 \operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x$, por consiguiente se comprueba la igualdad:

$$\frac{1 + \cos 2x}{\operatorname{ctg} x} = \operatorname{sen} 2x$$

Funciones trigonométricas de la mitad de un ángulo

Seno de la mitad de un ángulo: $\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)$

Para obtener el $\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)$, se emplea la identidad $\cos(2\alpha) = 1 - 2\operatorname{sen}^2 \alpha$, entonces se realiza el cambio $\alpha = \frac{\omega}{2}$

$$\cos\left(2 \cdot \frac{\omega}{2}\right) = 1 - 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad \rightarrow \quad \cos \omega = 1 - 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Se despeja $\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)$, resultando $\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos \omega}{2}}$

Coseno de la mitad de un ángulo: $\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)$

Para obtener $\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)$, se emplea la identidad $\cos(2\alpha) = 2\cos^2 \alpha - 1$

Entonces se realiza el cambio $\alpha = \frac{\omega}{2}$

$$\cos\left(2 \cdot \frac{\omega}{2}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1 \quad \rightarrow \quad \cos \omega = 2\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - 1$$

Se despeja $\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)$, resultando $\cos\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos \omega}{2}}$

Tangente de la mitad de un ángulo: $\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$

Para obtener $\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$, se emplean identidades trigonométricas básicas:

$$\tan\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\frac{1 - \cos \omega}{2}}}{\sqrt{\frac{1 + \cos \omega}{2}}} = \sqrt{\frac{1 - \cos \omega}{1 + \cos \omega}}$$

Al racionalizar el denominador:

$$\tan\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{(1-\cos\omega) \cdot (1-\cos\omega)}{(1+\cos\omega) \cdot (1-\cos\omega)}} = \sqrt{\frac{(1-\cos\omega)^2}{1-\cos^2\omega}} = \sqrt{\frac{(1-\cos\omega)^2}{\sin^2\omega}} = \frac{1-\cos\omega}{\sin\omega}$$

Por tanto:


$$\tan\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{1-\cos\omega}{1+\cos\omega}} = \frac{1-\cos\omega}{\sin\omega}$$

EJEMPLOS

- 1 •• Obtén las funciones trigonométricas básicas de $\left(\frac{\omega}{2}\right)$ si se sabe que: $\sin\omega = -\frac{\sqrt{55}}{8}$ para $270^\circ \leq \omega \leq 360^\circ$.

Solución

Se ubica el ángulo ω en el cuarto cuadrante:



Por el teorema de Pitágoras

$$(8)^2 = (x)^2 + (-\sqrt{55})^2$$

$$64 = x^2 + 55$$

$$64 - 55 = x^2$$

$$x = \sqrt{9}$$

$$x = 3$$

Se obtienen las funciones trigonométricas del ángulo ω :

$$\sin\omega = -\frac{\sqrt{55}}{8} \quad \cos\omega = \frac{3}{8} \quad \tan\omega = -\frac{\sqrt{55}}{3}$$

De acuerdo con el resultado anterior, las funciones trigonométricas del ángulo $\left(\frac{\omega}{2}\right)$ son:

$$\sin\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{1-\cos\omega}{2}} = \sqrt{\frac{1-\left(\frac{3}{8}\right)}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{5}{8}}{2}} = \sqrt{\frac{5}{16}} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

$$\cos\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+\cos\omega}{2}} = \sqrt{\frac{1+\left(\frac{3}{8}\right)}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{11}{8}}{2}} = \sqrt{\frac{11}{16}} = \frac{\sqrt{11}}{4}$$

$$\tan\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1-\cos\omega}{\sin\omega} = \frac{1-\left(\frac{3}{8}\right)}{\left(-\frac{\sqrt{55}}{8}\right)} = \frac{\frac{5}{8}}{-\frac{\sqrt{55}}{8}} = -\frac{5}{\sqrt{55}} = -\frac{\sqrt{55}}{11}$$

- 2 ●●● Obtén el valor de las funciones trigonométricas básicas del ángulo de 15° , haciendo $15^\circ = \frac{30^\circ}{2}$

Solución

a) Para hallar el valor de $\operatorname{sen} 15^\circ$ se utiliza la siguiente fórmula:

$$\operatorname{sen} \left(\frac{\omega}{2} \right) = \sqrt{\frac{1 - \cos \omega}{2}}$$

Entonces,

$$\operatorname{sen} 15^\circ = \operatorname{sen} \left(\frac{30^\circ}{2} \right) = \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

Por tanto:

$$\operatorname{sen} 15^\circ = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

b) Para hallar el valor de $\cos 15^\circ$ se utiliza la siguiente fórmula:

$$\cos \left(\frac{\omega}{2} \right) = \sqrt{\frac{1 + \cos \omega}{2}}$$

Entonces,

$$\cos 15^\circ = \cos \left(\frac{30^\circ}{2} \right) = \sqrt{\frac{1 + \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$$

Por tanto,

$$\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$$

c) Para hallar el valor de $\tan 15^\circ$ se utiliza la siguiente fórmula:

$$\tan \left(\frac{\omega}{2} \right) = \frac{1 - \cos \omega}{\operatorname{sen} \omega}$$

Entonces,

$$\tan 15^\circ = \tan \left(\frac{30^\circ}{2} \right) = \frac{1 - \cos 30^\circ}{\operatorname{sen} 30^\circ} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{2 - \sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2 - \sqrt{3}}{1}$$

Por consiguiente,

$$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

3 ••• Demuestra la siguiente identidad:

$$\frac{\cos \alpha - \cos 2\alpha}{\sin \alpha + \sin 2\alpha} \equiv \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

Demostración

Se aplican las identidades del doble del ángulo

$$\frac{\cos \alpha - \cos 2\alpha}{\sin \alpha + \sin 2\alpha} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \quad \rightarrow \quad \frac{\cos \alpha - (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

$$\frac{\cos \alpha - \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\sin \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

$$\frac{\cos \alpha - \cos^2 \alpha + 1 - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

$$\frac{1 + \cos \alpha - 2\cos^2 \alpha}{\sin \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

Se realiza una factorización tanto en el numerador como en el denominador,

$$\frac{1 + \cos \alpha - 2\cos^2 \alpha}{\sin \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{(1 - \cos \alpha)(1 + 2\cos \alpha)}{\sin \alpha(1 + 2\cos \alpha)} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Se aplican identidades básicas con el nuevo resultado,

$$\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sqrt{(1 + \cos \alpha)(1 - \cos \alpha)}} = \frac{\sqrt{1 - \cos \alpha}}{\sqrt{1 + \cos \alpha}} = \frac{\frac{\sqrt{1 - \cos \alpha}}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{1 + \cos \alpha}}{\sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

Pero $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ y $\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$, entonces se demuestra la igualdad

$$\frac{\cos \alpha - \cos 2\alpha}{\sin \alpha + \sin 2\alpha} \equiv \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

EJERCICIO 45

- Utiliza las identidades del ángulo mitad para obtener las funciones trigonométricas de los ángulos $\frac{\pi}{8}$, $\frac{3}{8}\pi$, $\frac{5}{8}\pi$ y $\frac{7}{8}\pi$.
- Obtén las funciones trigonométricas de (2α) y $\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, si se sabe que $\csc \alpha = 4$ para $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$.
- Si se sabe que $\tan \beta = \frac{12}{5}$, para $\pi \leq \beta \leq \frac{3}{2}\pi$, halla las funciones trigonométricas de (2β) y $\left(\frac{\beta}{2}\right)$.
- Dada la función trigonométrica $\cos \omega = \frac{5}{8}$ donde $\frac{3}{2}\pi \leq \omega \leq 2\pi$, encuentra las funciones trigonométricas de (2ω) y $\left(\frac{\omega}{2}\right)$.
- Obtén las funciones trigonométricas de (2α) y $\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ si se sabe que: $\sec \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{2}$ para $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$.
- Si $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{6}}$ y $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$, determina $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$.
- Si $\cos 2\beta = \frac{15}{17}$ y $\pi \leq \beta \leq \frac{3}{2}\pi$, encuentra las funciones trigonométricas de β y $\frac{\beta}{2}$.
- Si $\sin \frac{1}{4}\alpha = \sqrt{\frac{10-\sqrt{50+10\sqrt{5}}}{20}}$, determina las funciones trigonométricas de α si $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$.
- Si $\csc \frac{1}{4}\beta = \sqrt{\frac{6}{3-\sqrt{6}}}$ y $0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, halla las funciones trigonométricas de β y $\frac{\beta}{2}$.
- Si $\operatorname{ctg} \frac{\omega}{2} = -3$ y $\frac{3}{2}\pi \leq \omega \leq 2\pi$, halla las funciones trigonométricas de ω , 2ω y 4ω .

Demuestra las siguientes identidades:

- $\frac{2}{1 + \cos \alpha} = \sec^2 \frac{\alpha}{2}$
- $[\cos 2x - \sin 2x]^2 - 1 = \sin(-4x)$
- $\cos 8x + \cos 4x = 2\cos 2x - 4\sin^2 3x \cdot \cos 2x$
- $\sin 4x + \sin 6x = 2(\sin 5x \cdot \cos x)$
- $\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - \omega \right) = \frac{1 + \sin 2\omega}{\cos 2\omega}$
- $\cos^8 \beta - \sin^8 \beta = \frac{1}{4} \cos 2\beta \cdot (3 + \cos 4\beta)$
- $\sqrt{2} \sec \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{2(\sin \alpha + \cos \alpha)}{1 + \sin 2\alpha}$
- $\cos 12^\circ \cos 24^\circ \cos 48^\circ \cos 96^\circ = -\frac{1}{16}$
- $\frac{\cos^3 x - \sin^3 x}{\cos 2x} = \cos x - \frac{\sin 2x}{2(\sin x + \cos x)} + \sin x$

$$20. \frac{1}{1 + \operatorname{sen} \varphi} = \frac{1 + \tan^2 \frac{\varphi}{2}}{\left(\tan^2 \frac{\varphi}{2}\right) \cdot \left(1 + \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}\right)^2}$$

$$21. 2 \left[\cos \frac{y}{2} - \operatorname{sen} \frac{y}{2} \right] \cdot \left[\operatorname{sen} \frac{y}{2} + \cos \frac{y}{2} \right] \cos x = \cos(x+y) + \cos(x-y)$$

$$22. \operatorname{sen}(x+2y) - \operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} y \cdot \cos(x+y)$$

$$23. 4 \csc^2 \beta \cdot \cos \beta = \operatorname{ctg}^2 \frac{\beta}{2} - \tan^2 \frac{\beta}{2}$$

$$24. \left[3 \cos \frac{\theta}{2} - \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \right] \cdot \left[\cos \frac{\theta}{2} + \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \right] = 2 \cos \theta + \operatorname{sen} \theta + 1$$

$$25. \operatorname{sen}^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{4} \operatorname{sen}^2 2x$$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Identidades trigonométricas para transformar un producto en suma o resta

De las identidades:

$$\operatorname{sen}(x+y) = (\operatorname{sen} x)(\cos y) + (\operatorname{sen} y)(\cos x) \text{ se realiza la suma con}$$

$$+ \operatorname{sen}(x-y) = (\operatorname{sen} x)(\cos y) - (\operatorname{sen} y)(\cos x)$$

$$\operatorname{sen}(x+y) + \operatorname{sen}(x-y) = 2(\operatorname{sen} x)(\cos y)$$

Al despejar,

$$(\operatorname{sen} x)(\cos y) = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x+y) + \operatorname{sen}(x-y)]$$

De forma semejante se obtiene:

$$(\cos x)(\operatorname{sen} y) = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x-y)]$$

De las identidades:

$$\cos(x+y) = (\cos x)(\cos y) - (\operatorname{sen} x)(\operatorname{sen} y) \text{ se realiza la suma con}$$

$$+ \cos(x-y) = (\cos x)(\cos y) + (\operatorname{sen} x)(\operatorname{sen} y)$$

$$\cos(x+y) + \cos(x-y) = 2(\cos x)(\cos y)$$

Al despejar,

$$(\cos x)(\cos y) = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

De la misma manera se obtiene:

$$(\operatorname{sen} x)(\operatorname{sen} y) = -\frac{1}{2} [\cos(x+y) - \cos(x-y)]$$

EJEMPLOS

- 1 ••• Expresa el siguiente producto en forma de suma o resta:

$$\cos(8x) \cos(2x)$$

Solución

Se emplea la identidad $(\cos x)(\cos y) = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$ y se obtiene:

$$\cos(8x) \cos(2x) = \frac{1}{2}[\cos(8x+2x) + \cos(8x-2x)]$$

$$\cos(8x) \cos(2x) = \frac{1}{2}[\cos(10x) + \cos(6x)]$$

- 2 ••• Encuentra el valor del siguiente producto:

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

Solución

Se emplea la identidad $(\sin x)(\cos y) = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{12}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{12}\right)\right]$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{9\pi+ \pi}{12}\right) + \sin\left(\frac{9\pi- \pi}{12}\right)\right]$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right]$$

Al sustituir el valor de las funciones trigonométricas de ángulos notables:

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right] = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$$

EJERCICIO 46

Convierte los siguientes productos en sumas o diferencias de funciones trigonométricas:

- | | |
|--|--|
| 1. $\sin(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$ | 11. $4 \sin(3\alpha) \sin(\alpha)$ |
| 2. $\cos(45^\circ) \sin(60^\circ)$ | 12. $5 \cos(2\alpha) \sin(6\alpha)$ |
| 3. $\sin(y + \beta) \sin(y - \beta)$ | 13. $\cos(47^\circ) \sin(43^\circ)$ |
| 4. $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | 14. $\cos\left(\frac{2}{3}\alpha\right) \cos\left(\frac{5}{3}\beta\right)$ |
| 5. $\sin(82^\circ 30') \cos(37^\circ 30')$ | 15. $3 \sin(9\alpha) \cos\left(\frac{1}{2}\alpha\right)$ |
| 6. $\sin(37^\circ 30') \sin(7^\circ 30')$ | 16. $\sec\left(\frac{\pi}{3}\right) \sec\left(\frac{\pi}{6}\right)$ |
| 7. $\cos(x + \alpha) \sin(x - \alpha)$ | 17. $\tan 2\alpha \cot \alpha$ |
| 8. $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ | 18. $\sec\left(\frac{3}{4}\pi\right) \csc\left(\frac{\pi}{4}\right)$ |
| 9. $\sin(187^\circ 30') \cos(217^\circ 30')$ | 19. $\tan(x + a) \tan(x - a)$ |
| 10. $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ | 20. $\frac{\sin(2\alpha + \beta)}{\sec(2\alpha - \beta)}$ |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Demostración de identidades

EJEMPLOS

1 •• Demuestra la siguiente igualdad: $\operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{1}{4}$

Demostración

Se aplica la identidad $(\operatorname{sen} x)(\cos y) = \frac{1}{2}[\operatorname{sen}(x+y) + \operatorname{sen}(x-y)]$

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{12} \right) + \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{12} \right) \right] = \frac{1}{2} \left[\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} + \operatorname{sen} 0 \right]$$

Pero $\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ y $\operatorname{sen} 0 = 0$, entonces:

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + 0 \right] = \frac{1}{4}$$

Por tanto queda demostrada la igualdad.

2 •• Demuestra la siguiente expresión:

$$\operatorname{sen} x \cos y + \operatorname{sen} y \cos x = \operatorname{sen}(x+y)$$

Demostración

Se aplica la transformación de productos a sumas y se obtiene:

$$\operatorname{sen} x \cos y = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x+y) + \operatorname{sen}(x-y)]$$

$$\operatorname{sen} y \cos x = \cos x \operatorname{sen} y = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x-y)]$$

Al sumar ambas expresiones:

$$\operatorname{sen} x \cos y + \operatorname{sen} y \cos x = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x+y) + \operatorname{sen}(x-y)] + \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x-y)]$$

$$\operatorname{sen} x \cos y + \operatorname{sen} y \cos x = \frac{1}{2} \operatorname{sen}(x+y) + \frac{1}{2} \operatorname{sen}(x-y) + \frac{1}{2} \operatorname{sen}(x+y) - \frac{1}{2} \operatorname{sen}(x-y)$$

Se simplifican términos semejantes, entonces:

$$\operatorname{sen} x \cos y + \operatorname{sen} y \cos x = \operatorname{sen}(x+y)$$

Por tanto, queda demostrada la igualdad.

EJERCICIO 47

Demuestra las siguientes igualdades:

1. $\frac{1}{\sec 30^\circ \csc 120^\circ} = \frac{3}{4}$
2. $\frac{\sen 75^\circ \cos 45^\circ}{\sen 225^\circ \cos 75^\circ} = -2 - \sqrt{3}$
3. $\frac{\cos 35^\circ \sen 10^\circ + \cos 10^\circ \sen 35^\circ}{\cos 20^\circ \cos 10^\circ - \sen 20^\circ \sen 10^\circ} = \frac{\sqrt{6}}{3}$
4. $\frac{\tan \frac{\pi}{6} \tan \frac{5\pi}{12} + \tan \frac{\pi}{12} \tan \frac{5\pi}{12}}{1 - \tan \frac{\pi}{6} \tan \frac{\pi}{12}} = 2 + \sqrt{3}$
5. $\sen x \cos x + \cos 3x \sen x = \frac{1}{2} \sen 4x$
6. $\cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \sen \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \left[\sen 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$
7. $\frac{\sen^2 \left(\frac{3}{2}\pi - x \right) \cos^2 \left(x - \frac{\pi}{2} \right)}{\cos(2\pi - x) \cos^2 \left(\frac{3}{2}\pi - x \right) \sen^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} = \sec x$
8. $\cos x [\cos 2x - 2\sen^2 x] = \cos 3x$
9. $\tan \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \tan \left(\frac{\pi}{3} - x \right) = \frac{2 \cos 2x + 1}{2 \cos 2x - 1}$
10. $\sen(10^\circ + x) \cos(20^\circ - x) + \cos(80^\circ - x) \sen(70^\circ + x) = \sen(2x - 10^\circ)$
11. $\sen \left(\frac{2}{9}\pi + x \right) \cos \left(\frac{1}{18}\pi + x \right) - \sen \left(\frac{5}{18}\pi - x \right) \cos \left(\frac{4}{9}\pi - x \right) = \frac{1}{2}$
12. $\frac{\sen \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}{\csc 2x} - \frac{\sen x}{\csc \left(\frac{3\pi}{2} + 2x \right)} = \sen 3x$
13. $\cos 2x + 2[\sen x \cos y + \cos x \sen y] \sen(x - y) = \cos 2y$
14. $\sen \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \cdot \sen \left(\frac{3}{2}\pi - x \right) \cdot \cos(\pi - x) = \cos^3 x$



Este ejercicio no tiene soluciones al final del libro por ser demostraciones ■

Identidades para transformar sumas o restas de funciones trigonométricas en un producto

Dados los ángulos x y y , tales que

$$x + y = \alpha \quad ; \quad x - y = \beta$$

Al resolver el sistema de ecuaciones para x y y se obtienen los siguientes resultados:

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2} \quad ; \quad y = \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Estos valores angulares se sustituyen en la identidad:

$$(\operatorname{sen} x) (\cos y) = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x+y) + \operatorname{sen}(x-y)]$$

Y el resultado es:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \frac{1}{2} [\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta]$$

Ahora, al despejar la suma de los senos, se determina que:

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

De la misma manera se obtiene:

$$\operatorname{sen} \alpha - \operatorname{sen} \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Efectúa lo siguiente: $\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} \frac{\pi}{6}$

Solución

Al aplicar la transformación de diferencia de senos a productos, se obtiene:

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = 2 \cos\left(\frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}}{2}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}}{2}\right); \text{ simplificando}$$

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = 2 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

2 ●●● Calcula, sin hacer uso de las tablas trigonométricas:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{12}\right)$$

Solución

Se emplea la identidad, $\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 2 \left[\operatorname{sen}\left(\frac{\frac{7\pi}{12} + \frac{5\pi}{12}}{2}\right) \cos\left(\frac{\frac{7\pi}{12} - \frac{5\pi}{12}}{2}\right) \right]$$

Se simplifica,

$$\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

Dado que $\frac{\pi}{12}$ no es un ángulo notable, se puede emplear la identidad:

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$$

Donde $\frac{\pi}{12} = \frac{\frac{\pi}{6}}{2}$, entonces,

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\frac{\pi}{6}}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{12}\right) &= 2 \left[(1) \cdot \left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}\right) \right] \\ \operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{12}\right) &= \sqrt{2+\sqrt{3}} \end{aligned}$$

3 ●●● Simplifica la siguiente expresión: $\cos\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right)$

Solución

Se emplea la identidad, $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \left[\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \right]$

$$\begin{aligned} \cos\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) &= -2 \operatorname{sen}\left(\frac{\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) + \left(\omega - \frac{\pi}{3}\right)}{2}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) - \left(\omega - \frac{\pi}{3}\right)}{2}\right) \\ \cos\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) &= -2 \operatorname{sen}(\omega) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) &= -2 \operatorname{sen}(\omega) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ \cos\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) &= -\sqrt{3} \cdot \operatorname{sen} \omega \end{aligned}$$

4 ••• Simplifica la siguiente expresión: $\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$

Solución

Al utilizar la identidad, $\operatorname{sen} \alpha - \operatorname{sen} \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$, se obtiene:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos\left(\frac{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) + \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)}{2}\right)$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{x}{2} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{x}{2} \quad (1)$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{x}{2}$$

EJERCICIO 48

Convierte en producto las siguientes sumas y restas de funciones trigonométricas:

1. $\operatorname{sen} 165^\circ + \operatorname{sen} 75^\circ$

9. $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$

2. $\cos(7\beta) + \cos(-2\beta)$

10. $\cos\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right)$

3. $\operatorname{sen}(240^\circ) + \operatorname{sen}(120^\circ)$

11. $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)$

4. $\cos(5\theta) - \cos(3\theta)$

12. $\operatorname{sen}\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2} + \beta\right)$

5. $\cos(37^\circ 29') + \cos(52^\circ 31')$

13. $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$

6. $\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{12}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{12}\right)$

14. $\operatorname{sen}\left(\beta + \frac{\pi}{8}\right) + \operatorname{sen}\left(\beta - \frac{\pi}{8}\right)$

7. $\cos\left(\frac{5\pi}{18}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{9}\right)$

15. $\operatorname{sen}\left(\frac{5}{8}\pi + \alpha\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{7}{8}\pi - \alpha\right)$

8. $\operatorname{sen} 35^\circ - \operatorname{sen} 25^\circ$

16. $\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Demostración de identidades

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Demuestra la siguiente igualdad: $\frac{\operatorname{sen} 50^\circ + \operatorname{sen} 10^\circ}{\cos 50^\circ + \cos 10^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Solución

Se aplica la suma de senos y cosenos

$$\frac{\operatorname{sen} 50^\circ + \operatorname{sen} 10^\circ}{\cos 50^\circ + \cos 10^\circ} = \frac{2 \left[\operatorname{sen} \frac{1}{2}(50^\circ + 10^\circ) \cos \frac{1}{2}(50^\circ - 10^\circ) \right]}{2 \left[\cos \frac{1}{2}(50^\circ + 10^\circ) \cos \frac{1}{2}(50^\circ - 10^\circ) \right]} = \frac{\operatorname{sen} 30^\circ \cos 20^\circ}{\cos 30^\circ \cos 20^\circ} = \tan 30^\circ$$

Pero $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, por lo que la igualdad queda demostrada.

- 2 ••• Demuestra la siguiente igualdad:

$$\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x = 4 \operatorname{sen} 4x \cos 2x \cos x$$

Solución

Se agrupan dos a dos los sumandos

$$\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x = (\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x) + (\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x)$$

Se aplica la transformación de suma de senos a productos

$$\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x = 2 \left[\operatorname{sen} \frac{1}{2}(x + 3x) \cos \frac{1}{2}(x - 3x) \right] = 2 [\operatorname{sen} 2x \cos(-x)] = 2 \operatorname{sen} 2x \cos x$$

$$\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x = 2 \left[\operatorname{sen} \frac{1}{2}(5x + 7x) \cos \frac{1}{2}(5x - 7x) \right] = 2 [\operatorname{sen} 6x \cos(-x)] = 2 \operatorname{sen} 6x \cos x$$

Entonces,

$$\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x = 2 \operatorname{sen} 2x \cos x + 2 \operatorname{sen} 6x \cos x = 2 \cos x (\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 6x)$$

En esta nueva expresión se aplica la transformación de sumas a productos,

$$\begin{aligned} 2 \cos x (\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 6x) &= 2 \cos x \cdot 2 \left[\operatorname{sen} \frac{1}{2}(2x + 6x) \cos \frac{1}{2}(2x - 6x) \right] \\ &= 4 \cos x [\operatorname{sen} 4x \cos(-2x)] \\ &= 4 \cos x \operatorname{sen} 4x \cos 2x \end{aligned}$$

Por tanto, queda demostrada la igualdad.

EJERCICIO 49

Demuestra las siguientes igualdades:

1. $\cos \frac{5}{12}\pi + \cos \frac{11}{12}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

2. $\frac{\operatorname{sen} 40^\circ + \operatorname{sen} 20^\circ}{\operatorname{sen} 40^\circ - \operatorname{sen} 20^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{ctg} 10^\circ$

3. $\frac{\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} + \operatorname{sen} \frac{5\pi}{18}}{\operatorname{sen} \frac{5\pi}{18} - \operatorname{sen} \frac{\pi}{6}} = \frac{\tan \frac{2\pi}{9}}{\tan \frac{\pi}{18}}$

4. $\cos(x - \pi) + \cos(x + \pi) = -2 \cos x$

5. $\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 4x - \operatorname{sen} 6x = 4 \operatorname{sen} x \operatorname{sen} 2x \operatorname{sen} 3x$

6. $\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 3x - \operatorname{sen} 4x = -4 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cos \frac{5x}{2} \cos x$

7. $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x = 4 \cos \frac{5x}{2} \cos x \cos \frac{x}{2}$

8. $\tan x = \frac{\operatorname{sen} 5x - \operatorname{sen} 3x}{\cos 5x + \cos 3x}$

9. $\frac{1 - 2 \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} 3x - \operatorname{sen} x} = \frac{1}{2} \csc x$

10. $\frac{\cos(x+y) - \cos(x-y)}{\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x-y)} = -\tan x$

11. $\frac{1}{\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 3x} = \frac{1}{4} \csc \frac{3x}{2} \sec x \sec \frac{x}{2}$

12. $\frac{1}{4} [\cos(a+b+c) + \cos(a+b-c) + \cos(a-b+c) + \cos(a-b-c)] = \cos a \cos b \cos c$



Este ejercicio no tiene soluciones al final del libro por ser demostraciones

Ecuaciones trigonométricas

Una ecuación trigonométrica es una expresión que tiene como incógnita valores angulares bajo los signos de funciones trigonométricas.

Al resolver una ecuación trigonométrica se debe encontrar el o los valores que satisfacen dicha ecuación, esto es, que en una ecuación trigonométrica no siempre existe una solución única, en ocasiones existen varias, las cuales se expresan como conjunto solución.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Resuelve la siguiente ecuación para
- $0 \leq x \leq 2\pi$
- .

$$\operatorname{sen} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 1$$

Solución

Se despeja la incógnita x y la función seno se representa como *arc sen* en el segundo miembro, luego el intervalo indica que se tomarán como solución aquellas entre 0° y 360°

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 1 & \quad \rightarrow \quad \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \operatorname{arc} \operatorname{sen} (1) \\ x + \frac{\pi}{4} &= \frac{\pi}{2} \\ x &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ \end{aligned}$$

El resultado puede expresarse en grados o en radianes.

- 2 ••• Resuelve la siguiente ecuación para
- θ
- si
- $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$
- .

$$3 \tan \theta - 4 = \tan \theta - 2$$

Solución

Se agrupan los términos que tienen a las incógnitas y se reducen:

$$\begin{aligned} 3 \tan \theta - 4 &= \tan \theta - 2 & \rightarrow & \quad 3 \tan \theta - \tan \theta = -2 + 4 \\ & & & \quad 2 \tan \theta = 2 \\ & & & \quad \tan \theta = 1 \end{aligned}$$

De esta expresión se despeja el ángulo θ

$$\begin{aligned} \tan \theta = 1 & \quad \rightarrow \quad \theta = \operatorname{arc} \tan (1) \\ & \quad \theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ \end{aligned}$$

Luego, la tangente es positiva en el primero y tercer cuadrantes, por consiguiente, el conjunto solución es $\frac{\pi}{4}$ y $\frac{5\pi}{4}$.

- 3 ••• Resuelve la siguiente ecuación para
- x
- si
- $0 \leq x \leq 2\pi$
- .

$$2 \operatorname{sen}^2 x - 1 = -\operatorname{sen} x$$

Solución

Se agrupan los términos en el primer miembro:

$$2 \operatorname{sen}^2 x - 1 = -\operatorname{sen} x \quad \rightarrow \quad 2 \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1 = 0$$

La expresión resultante se factoriza,

$$(2 \operatorname{sen} x - 1)(\operatorname{sen} x + 1) = 0$$

Por tanto, $2 \operatorname{sen} x - 1 = 0$ y $\operatorname{sen} x + 1 = 0$, de las cuales se despeja la incógnita x , entonces,

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{sen} x - 1 &= 0 & \operatorname{sen} x + 1 &= 0 \\ \operatorname{sen} x &= \frac{1}{2} & \operatorname{sen} x &= -1 \\ x &= \operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \right) & x &= \operatorname{arc} \operatorname{sen} (-1) \\ x &= \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} & x &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

Luego, el conjunto solución es $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$ y $\frac{3\pi}{2}$.

- 4 ••• Resuelve la siguiente ecuación para θ , si $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$.

$$4 \cos^2 \theta - 3 = 0$$

Solución

Se despeja $\cos \theta$ de la ecuación:

$$4 \cos^2 \theta - 3 = 0 \quad \rightarrow \quad 4 \cos^2 \theta = 3 \quad \rightarrow \quad \cos^2 \theta = \frac{3}{4}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Se obtienen dos ecuaciones

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{y} \quad \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Se despeja el ángulo θ

$$\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30^\circ, 330^\circ \quad ; \quad \theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 150^\circ, 210^\circ$$

Al final, el conjunto solución es $30^\circ, 150^\circ, 210^\circ$ y 330° .

- 5 ••• Resuelve la siguiente ecuación para θ si $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$.

$$2 \sen^2 \theta = -\sen \theta$$

Solución

Se resuelve la ecuación:

$$2 \sen^2 \theta + \sen \theta = 0 \quad \rightarrow \quad \sen \theta (2 \sen \theta + 1) = 0$$

Se obtienen dos ecuaciones:

$$\sen \theta = 0 \quad 2 \sen \theta + 1 = 0$$

Se despeja el ángulo θ ,

$$\begin{aligned} \sen \theta &= 0 & 2 \sen \theta + 1 &= 0 \\ \theta &= \arcsen(0) & \theta &= \arcsen\left(-\frac{1}{2}\right) \\ \theta &= 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ & \theta &= 210^\circ, 330^\circ \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto solución es $0^\circ, 180^\circ, 210^\circ, 330^\circ$ y 360° .

- 6 ••• Resuelve la siguiente ecuación para x si $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$.

$$2 \cos^2 x = \sen x - 1$$

Solución

$$2 \cos^2 x = \sen x - 1 \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} 2(1 - \sen^2 x) &= \sen x - 1 \\ 2 - 2\sen^2 x &= \sen x - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 - 2\sen^2 x - \sen x + 1 &= 0 \\ -2\sen^2 x - \sen x + 3 &= 0 \quad (\div -1) \\ 2\sen^2 x + \sen x - 3 &= 0 \\ (2\sen x + 3)(\sen x - 1) &= 0 \end{aligned}$$

Se despeja el ángulo x de ambas ecuaciones:

$$\begin{aligned} \sen x - 1 &= 0 & 2 \sen x + 3 &= 0 \\ x &= \arcsen(1) & \sen x &= -\frac{3}{2} \text{ (no existe solución)} \\ x &= 90^\circ & & \end{aligned}$$

Cabe mencionar que $2 \sen x + 3 = 0$ no tiene solución porque $-1 \leq \sen x \leq 1$, entonces el conjunto solución es 90° .

EJERCICIO 50

Resuelve las siguientes ecuaciones, tales que $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$.

1. $\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$
2. $\cos x + 2 \operatorname{sen} x = 2$
3. $2 \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = 1$
4. $\csc x = \sec x$
5. $2 \cos x \cdot \tan x - 1 = 0$
6. $4 \cos^2 x = 3 - 4 \cos x$
7. $3 \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 3$
8. $2 \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x = 0$
9. $\cos x + 9 \operatorname{sen}^2 x = 1$
10. $\csc^2 x = 2 \cot^2 x$
11. $\operatorname{sen} x \cdot \tan x + 1 = \operatorname{sen} x + \tan x$
12. $2 \cos^2 x + 3 \operatorname{sen} x = 0$
13. $\operatorname{sen} x - \cos x = 0$
14. $3 \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 0$
15. $\cos x - \sqrt{3} \operatorname{sen} x = 0$
16. $2 \operatorname{sen} x + \csc x = 3$
17. $\operatorname{sen} x \cdot \operatorname{ctg} x - \operatorname{sen} x = 0$
18. $2 \cos^3 x + \cos^2 x - 2 \cos x - 1 = 0$
19. $4 \cos x - 2 = 2 \tan x \cdot \operatorname{ctg} x - \sec x$
20. $\tan^5 x - 9 \tan x = 0$
21. $\frac{1}{\operatorname{ctg}^2 x} + \sqrt{3} \tan x = 0$
22. $\operatorname{sen} x \cdot \sec x + \sqrt{2} \operatorname{sen} x - \sqrt{2} = \sec x$
23. $(2 - \sqrt{3}) \operatorname{sen} x + (2 - \sqrt{3}) = 2 \cos^2 x$
24. $(2 + \sqrt{5}) - (1 + 2\sqrt{5}) \cos x = 2 \operatorname{sen}^2 x$
25. $\sec x(2 \operatorname{sen} x + 1) - 2(2 \operatorname{sen} x + 1) = 0$
26. $\frac{\sqrt{3} \tan x}{\sec x} - \cos x = 0$
27. $\sqrt{2} \cos x - \sqrt{2} \operatorname{sen} x = -\sqrt{3}$
28. $5 \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 2$
29. $\frac{5}{\csc x} - 5\sqrt{3} \cos x = 0$
30. $\cos^2 x + \cos x = \operatorname{sen}^2 x$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 15

TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

RECTÁNGULO

El triángulo



Medición de tierras
en el antiguo
Egipto mediante
los azudadores

Su origen se encuentra en la cultura egipcia, específicamente en la geometría egipcia.

Los egipcios dominaban a la perfección los triángulos, ya que fueron la base para la construcción de sus pirámides así como la medición de tierras. Se auxiliaban de los anudadores, hacían nudos igualmente espaciados para medir y se dieron cuenta que al ubicar cuerdas de diversas longitu-

des en forma de triángulo obtenían ángulos rectos y, por tanto, triángulos rectángulos, lo cual significa que tenían conocimiento de la relación que existe entre la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo.

Sin embargo, Pitágoras fue el primero en demostrar el teorema que lleva su nombre, el cual establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, aunque los egipcios y babilónicos lo utilizaban en sus cálculos y construcciones pero sin haberlo demostrado.

Solución de triángulos rectángulos

Dados tres datos de un triángulo, si uno de ellos es un lado, encontrar el valor de los datos restantes.


Para los triángulos rectángulos basta conocer el valor de uno de los lados y algún otro dato, el cual puede ser un ángulo u otro lado, debido a que el tercer dato siempre está dado ya que, al ser triángulo rectángulo, uno de los ángulos siempre será de 90° .

Cabe destacar que el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas son de suma importancia para la resolución de triángulos rectángulos.

EJEMPLOS

- 1 •• En el triángulo ABC , $a = 12 \text{ cm}$, $b = 9 \text{ cm}$. Resuelve el triángulo.

Solución



Se proporcionan catetos; entonces, para encontrar la hipotenusa se utiliza el teorema de Pitágoras:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$c = \sqrt{(12)^2 + (9)^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$$

Por lo tanto $c = 15 \text{ cm}$.

Para encontrar los ángulos se utilizan funciones trigonométricas; en este caso, al tener los tres lados se puede aplicar cualquier función. Por ejemplo, en el caso del ángulo A se aplica la función tangente, entonces:

$$\tan A = \frac{12}{9}$$

Se despeja el ángulo A :

$$\angle A = \arctan\left(\frac{12}{9}\right) = 53^\circ 7' 48''$$

Para encontrar el tercer ángulo, se tiene que $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$, en particular $\angle A + \angle B = 90^\circ$ ya que $\angle C = 90^\circ$, por tanto:

$$53^\circ 7' 48'' + \angle B = 90^\circ$$

$$\angle B = 90^\circ - 53^\circ 7' 48''$$

$$\angle B = 36^\circ 52' 12''$$

- 2 ••• En el triángulo MNP , $m = 13,4 \text{ cm}$, $\angle P = 40^\circ$. Resuelve el triángulo.

Solución

Para hallar el $\angle N$, se aplica:


$$\angle N + \angle P + \angle M = 180^\circ$$

Ya que $\angle M = 90^\circ$, entonces,

$$\angle N + \angle P = 90^\circ \text{ donde } \angle N = 90^\circ - \angle P$$

$$\angle N = 90^\circ - 40^\circ$$

$$\angle N = 50^\circ$$



Lado n

Se elige uno de los ángulos agudos, en este caso $\angle P$ y se establece la función trigonométrica de acuerdo al lado que se va a encontrar (n) y el lado conocido ($m = 13,4$), por lo que la función que se busca es el coseno de P , entonces:

$$\cos P = \frac{n}{m} \quad \text{donde} \quad \cos 40^\circ = \frac{n}{13,4}$$

Al despejar n :

$$n = (13,4) (\cos 40^\circ) = (13,4) (0,76604) = 10,265 \text{ cm}$$

Para hallar el lado restante (p) se utiliza el teorema de Pitágoras:

$$p = \sqrt{m^2 - n^2} = \sqrt{(13,4)^2 - (10,26)^2} = \sqrt{179,56 - 105,27} = \sqrt{74,29} = 8,62 \text{ cm}$$

- 3 ••• En el triángulo ABC , $a = 54 \text{ cm}$, $A = 36^\circ 20'$. Resuelve el triángulo.


Solución

En el triángulo ABC :

$$\angle B = 90^\circ - \angle A$$

$$\angle B = 90^\circ - 36^\circ 20'$$

$$\angle B = 53^\circ 40'$$



Para hallar el lado b , se utiliza la función tangente de $\angle A$:

$$\tan A = \frac{a}{b} \quad \text{donde} \quad \tan 36^\circ 20' = \frac{54}{b}$$


$$\text{Al despejar } b: b = \frac{54}{\tan 36^\circ 20'} = \frac{54}{0,7354} = 73,42 \text{ cm}$$

El valor de la hipotenusa se encuentra mediante el teorema de Pitágoras:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(54)^2 + (73,42)^2} = 91,14 \text{ cm}$$

EJERCICIO 51

Resuelve el siguiente triángulo rectángulo según los datos proporcionados:



1. $a = 12, b = 17$
2. $\angle A = 32^\circ, b = 4$
3. $\angle C = 46^\circ 20', a = 5$
4. $a = 32,5, c = 41,3$
5. $\angle A = 45^\circ, a = 13$
6. $\angle C = 54^\circ, b = 22,6$
7. $b = 22,5, c = 18,7$
8. $\angle A = 48^\circ 12', b = 34,5$
9. $\angle C = 34^\circ 32', c = 56,9$
10. $a = 18,23, b = 19,86$
11. $\angle A = 32^\circ 27', a = 12$
12. $b = \sqrt{17}, a = 2$
13. $\angle C = 48^\circ 23', b = 23$
14. $a = 7,5, c = 2,5$
15. $c = 13, \angle A = 25^\circ 49'$
16. Calcula el valor de los ángulos agudos si $a = \frac{c}{2}$.
17. Determina el valor de los ángulos agudos y el valor de los lados si $a = x, b = x + 8$ y $c = x + 7$.
18. Calcula el valor de los ángulos agudos y el valor de los lados si $a = x + 1, b = x + 2$ y $c = x$.
19. Determina el valor de los ángulos agudos si $a = c$.
20. Calcula el valor de los ángulos agudos si $b = 3a$.




Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 Se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Si el ángulo de elevación al punto más alto del edificio es de $46^\circ 23'$, encuentra la altura del edificio.

Solución

Se representa el problema con un dibujo:



Para hallar la altura del edificio se utiliza la función tangente, ya que se tienen como datos un ángulo y el cateto adyacente a éste, y la altura representa el cateto opuesto al ángulo dado:


$$\tan 46^\circ 23' = \frac{h}{20}$$

Al despejar h :

$$h = (20) (\tan 46^\circ 23') = (20) (1.04949) = 21\text{ m}$$

De acuerdo con el dato anterior, la altura del edificio es de 21 m .

- 2 En la construcción de una carretera se encuentra una montaña de 250 metros de altura, a través de ella se construirá un túnel. La punta de la montaña se observa bajo un ángulo de $48^\circ 30'$ desde un punto P en un extremo de la montaña, y bajo un ángulo de 38° desde el otro extremo. ¿Cuál será la longitud del túnel?

Solución

La longitud del túnel está determinada por $a + b$.

Para obtener a , se utiliza el triángulo PRT y se aplica la función tangente de $\angle P$:

$$\tan 48^\circ 30' = \frac{250}{a}$$

Al despejar a

$$a = \frac{250}{\tan 48^\circ 30'} = \frac{250}{1.1302} = 221.19\text{ m}$$

Para obtener b , se utiliza el triángulo QRT y se aplica la función tangente de $\angle Q$:

$$\tan 38^\circ = \frac{250}{b}$$

Al despejar b


$$b = \frac{250}{\tan 38^\circ} = \frac{250}{0.7812} = 320.02\text{ m}$$

Por tanto, la longitud del túnel es: $221.19 + 320.02 = 541.21\text{ m}$.


EJERCICIO 52

Resuelve los siguientes problemas:

1. En una torre de 40 m que está sobre un peñasco de 65 m de alto junto a una laguna, se encuentra un observador que mide el ángulo de depresión de 20° de un barco situado en la laguna. ¿A qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco?





2. A una distancia de 10 m de la base de un árbol, la punta de éste se observa bajo un ángulo de 23° . Calcula la altura del árbol.




3. Una persona cuyos ojos están a $1,20$ metros del suelo, observa una pintura que se encuentra a un metro del suelo y mide $1,50$ metros. Dicha persona se encuentra a dos metros de distancia de la pintura.

a) ¿Cuál es el ángulo de visión?


b) ¿A qué distancia se debe parar la persona para que el ángulo de visión sea de 45° ?




4. Un niño tiene un papalote, el cual hace volar sosteniendo una cuerda a un metro del suelo. La cuerda se tensa formando un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. Obtén la altura del papalote con respecto al suelo si el niño suelta 20 metros de cuerda.




5. Determina el ángulo de elevación del Sol si un poste de 2.56 metros proyecta una sombra de 1.85 metros.




6. Un globo de aire caliente sube con un ángulo de elevación con respecto a un punto A de $46^\circ 10'$. Calcula la altura a la que se encuentra el globo, con respecto a un punto P del suelo, si la distancia de éste al punto A es de 50 metros.



7. Desde lo alto de una torre cuya altura es de 25 m , se observa un automóvil alejándose de la torre, con un ángulo de depresión de 32° ; si un instante después el ángulo es de 26° , ¿qué distancia se ha desplazado el automóvil?



8. Un maleante es perseguido por un patrullero, quien es apoyado desde el aire por un helicóptero, como se muestra en la figura. Si el ángulo de depresión desde el helicóptero hasta donde se encuentra el delincuente es de 25° y el ángulo de depresión hasta donde se encuentra el patrullero es de 65° , y su distancia a éste es de 25 metros,



calcula:

- La distancia entre el helicóptero y el delincuente.
- La distancia entre el patrullero y el delincuente.
- La altura del helicóptero.

9. Un ingeniero civil desea conocer el ángulo de elevación del topógrafo, así como la distancia a la que se encuentra del asta bandera, si se sabe que el asta bandera mide la cuarta parte de la altura del edificio que es de 16 metros, y la distancia entre ambas es de 9 metros.

