

Al comparar este mecanismo aeróbico de aporte de energía con el sistema del glucógeno-ácido láctico y el sistema de los fosfágenos, las *velocidades máximas relativas de generación de potencia* expresadas en generación de moles de ATP por minuto son las siguientes:

	Moles de ATP/min
Sistema de los fosfágenos	4
Sistema del glucógeno-ácido láctico	2,5
Sistema aeróbico	1

Cuando se comparan los mismos sistemas para la resistencia, los valores relativos son los siguientes:

	Tiempo
Sistema de los fosfágenos	De 8 a 10 s
Sistema del glucógeno-ácido láctico	De 1,3 a 1,6 min
Sistema aeróbico	Tiempo ilimitado (tanto como duren los nutrientes)

De manera que podemos observar que el sistema de los fosfágenos es el que utiliza el músculo para producir potencia durante unos pocos segundos y que el sistema aeróbico se necesita para las actividades prolongadas. En el medio se encuentra el sistema del glucógeno-ácido láctico, el cual es especialmente importante para proporcionar una potencia extra durante las actividades intermedias como las carreras de 200 a 800 m.

¿Qué tipo de actividad deportiva utiliza cada uno de los sistemas energéticos?

Considerando la intensidad y la duración de una actividad deportiva, se puede estimar aproximadamente cuál de los sistemas energéticos se utiliza para cada actividad. En la tabla 85-1 se presentan diversas aproximaciones.

Tabla 85-1

Sistemas energéticos utilizados en diversas actividades deportivas

Sistema de los fosfágenos casi exclusivamente
100 m lisos
Saltos
Levantamiento de peso
Buceo
Carreras en el fútbol americano
Carreras en béisbol
Sistemas de los fosfágenos y del glucógeno-ácido láctico
200 m lisos
Baloncesto
Carreras en hockey sobre hielo
Sistema del glucógeno-ácido láctico principalmente
400 m lisos
100 m natación
Tenis
Fútbol
Sistemas del glucógeno-ácido láctico y aeróbico
800 m lisos
200 m natación
1.500 m patinaje
Boxeo
2.000 m remo
Carrera de 1.500 m
Carrera de 2 km
400 m natación
Sistema aeróbico
10.000 m patinaje
Esquí de fondo
Maratón (42,2 km)
Jogging

Recuperación de los sistemas metabólicos del músculo después del ejercicio

De la misma forma que la energía procedente de la fosfocreatina se puede utilizar para reconstituir el ATP, la energía del sistema glucógeno-ácido láctico puede utilizarse para reconstituir tanto la fosfocreatina como el ATP. La energía del metabolismo oxidativo del sistema aeróbico también puede utilizarse para reconstituir los demás sistemas: el ATP, la fosfocreatina y el sistema del glucógeno-ácido láctico.

La reconstitución del sistema del ácido láctico consiste principalmente en la eliminación del exceso de ácido láctico que se ha acumulado en todos los líquidos corporales. Esta eliminación es especialmente importante porque el *ácido láctico provoca fatiga extrema*. Cuando se dispone de cantidades adecuadas de energía procedentes del metabolismo oxidativo, la eliminación del ácido láctico se produce de dos maneras: 1) una pequeña porción del ácido se convierte en ácido pirúvico que a continuación se metaboliza por la vía oxidativa en todos los tejidos del cuerpo, y 2) el resto del ácido láctico se reconvierte en glucosa fundamentalmente en el hígado, y la glucosa a su vez se utiliza para reponer los almacenes de glucógeno de los músculos.

Recuperación del sistema aeróbico después del ejercicio

Incluso durante las fases iniciales del ejercicio intenso, se agota una porción de la capacidad de proporcionar energía aeróbica. Esto es el resultado de dos efectos: 1) la denominada *deuda de*

oxígeno, y 2) el vaciamiento de los depósitos musculares de glucógeno.

Deuda de oxígeno

El cuerpo contiene normalmente unos 2 l de oxígeno almacenado que puede ser utilizado para el metabolismo aeróbico incluso sin respirar nuevas cantidades de oxígeno. Este oxígeno almacenado es el siguiente: 1) 0,5 l de aire en los pulmones; 2), 0,25 l disuelto en los líquidos corporales; 3) 1 l combinado con la hemoglobina de la sangre, y 4) 0,3 l almacenado en las fibras musculares, combinado fundamentalmente con la mioglobina, un compuesto químico fijador de oxígeno similar a la hemoglobina.

En el ejercicio intenso, casi todo este oxígeno almacenado se utiliza en 1 min más o menos para el metabolismo aeróbico. Luego, cuando el ejercicio se acaba, este oxígeno almacenado tiene que ser repuesto respirando cantidades extra de oxígeno por encima de las necesidades normales. Además, se pueden consumir unos 9 l más para reconstituir el sistema de los fosfágenos y el del ácido láctico. A todo este oxígeno extra que tiene que ser «repagado», unos 11,5 l, se le denomina la *deuda de oxígeno*.

La figura 85-2 demuestra este principio de la deuda de oxígeno. Durante los primeros 4 min de la figura, la persona realiza ejercicio intenso, y la velocidad de consumo de oxígeno aumenta más de 15 veces. Luego, incluso cuando el ejercicio ha finalizado, el consumo de oxígeno continúa todavía por encima de lo normal, al principio muy elevado mientras el organismo está reponiendo el sistema de los fosfágenos y pagando la porción de oxígeno almacenado de la deuda de oxígeno, y luego todavía por encima de lo normal, aunque a un nivel inferior, durante otros 40 min, mientras se elimina el ácido láctico. La primera porción de la deuda de oxígeno se conoce como *deuda de oxígeno alactácida* y es de unos 3,5 l. La última porción se llama *deuda de oxígeno por ácido láctico* y supone unos 8 l.




FIGURA 85-2 Velocidad de consumo de oxígeno por los pulmones durante un ejercicio máximo de 4 min de duración seguido de 40 min después de haber finalizado el ejercicio. Esta figura muestra el principio de la *deuda de oxígeno*.

Recuperación del glucógeno muscular

La recuperación del vaciamiento completo de los depósitos musculares de glucógeno no es un asunto sencillo. Normalmente, este proceso precisa días, más que los segundos, minutos u horas que se necesitan para la recuperación de los sistemas metabólicos de los fosfágenos y del ácido láctico. La figura 85-3 muestra este proceso de recuperación en tres situaciones: primero, en personas que consumen una dieta rica en hidratos de carbono; segundo, en personas con una dieta rica en grasas y proteínas, y tercero, en personas en ayunas. Obsérvese que con la dieta rica en hidratos de carbono se produce una recuperación completa en 2 días. Por el contrario, la gente con una dieta rica en grasas y proteínas o en ayunas muestra una recuperación muy escasa incluso después de 5 días. Los mensajes de estas comparaciones son: 1) que es importante para los deportistas seguir una dieta rica en hidratos de carbono antes de un acontecimiento deportivo importante, y 2) no participar en ejercicios intensos durante las 48 h previas al acontecimiento.




FIGURA 85-3 Efecto de la dieta sobre la velocidad de reposición de glucógeno muscular después de un ejercicio prolongado. (Modificado de Fox EL: Sports Physiology. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1979.)

Nutrientes utilizados durante la actividad muscular

Además de la amplia utilización de hidratos de carbono por parte de los músculos durante el ejercicio, especialmente durante las fases iniciales, los músculos utilizan grandes cantidades de grasa para obtener energía en forma de *ácidos grasos* y *ácido acetoacético* (v. capítulo 69), y también utilizan en mucho menor grado proteínas en forma de *aminoácidos*. De hecho, incluso en las mejores condiciones, en los acontecimientos deportivos de resistencia que duran más de 4 o 5 h, los almacenes de glucógeno muscular quedan prácticamente vacíos y prácticamente no se pueden utilizar para aportar energía a la contracción muscular. Ahora el músculo depende de la energía procedente de otras fuentes, fundamentalmente de las grasas.

La figura 85-4 muestra la utilización relativa aproximada de los hidratos de carbono y las grasas como fuente de energía durante un ejercicio exhaustivo prolongado en tres situaciones dietéticas: dieta rica en hidratos de carbono, dieta mixta y dieta rica en grasa. Obsérvese que la mayor parte de la energía se deriva de los hidratos de carbono durante los primeros segundos o minutos del ejercicio, pero en el momento del agotamiento, hasta del 60 al 85% de la energía procede de las grasas en vez de hacerlo de los hidratos de carbono.




FIGURA85-4 Efecto de la duración del ejercicio, así como del tipo de dieta en los porcentajes relativos de hidratos de carbono o grasas utilizados para la obtención de energía por parte de los músculos. (Datos de Fox EL: Sports Physiology. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1979.)

No toda la energía derivada de los hidratos de carbono procede del glucógeno *muscular* almacenado. De hecho, en el *hígado* se almacena casi la misma cantidad de glucógeno que en el músculo, el cual puede liberarse a sangre en forma de glucosa y a continuación ser captado por los músculos como una fuente de energía. Además, las soluciones de glucosa administradas a un deportista para que beba durante un acontecimiento deportivo pueden proporcionar hasta un 30 o un 40% de la energía que se precisa durante ejercicios prolongados, como una carrera de maratón.

Por tanto, si se dispone de glucógeno muscular y de glucosa sanguínea, estos constituyen los nutrientes energéticos de elección para la actividad muscular intensa. Incluso así, para un ejercicio de resistencia de larga duración podemos esperar que la grasa proporcione más del 50% de la energía necesaria pasadas las primeras 3 a 4 h aproximadamente.

Efecto del entrenamiento deportivo sobre los músculos y el rendimiento muscular

Importancia del entrenamiento de fuerza máxima

Uno de los principios cardinales del desarrollo muscular durante el entrenamiento deportivo es el siguiente: los músculos que trabajan en descarga, incluso aun cuando se ejerciten durante horas, aumentan muy poco su fuerza. En el otro extremo, los músculos que se contraen a más del 50% de la máxima fuerza de contracción ganarán fuerza rápidamente, incluso si las contracciones se realizan

únicamente unas pocas veces al día. Utilizando este principio, los experimentos sobre el crecimiento muscular han demostrado que *seis contracciones casi máximas realizadas en tres series 3 días a la semana proporcionan aproximadamente el aumento óptimo de fuerza muscular, sin producir fatiga muscular crónica*.

La parte superior de la curva en la figura 85-5 muestra el aumento en porcentaje aproximado en fuerza que se puede conseguir en una persona joven no entrenada previamente mediante este programa de entrenamiento de fuerza, demostrando que la fuerza muscular aumenta un 30% aproximadamente alrededor de las 6 a 8 primeras semanas, pero alcanza casi una meseta al cabo de ese tiempo. Junto con este aumento de fuerza se produce también un aumento aproximadamente igual en porcentaje de la masa muscular, a lo que se denomina *hipertrofia muscular*.




FIGURA 85-5 Efecto aproximado de un entrenamiento de resistencia óptimo sobre el aumento en fuerza muscular en un período de 10 semanas.

En edades avanzadas, muchas personas se hacen tan sedentarias que sus músculos se atrofian tremendamente. Sin embargo, en estos casos, el entrenamiento muscular con frecuencia puede aumentar la fuerza muscular más de un 100%.

Hipertrofia muscular

El tamaño medio de los músculos de una persona está determinado en gran parte por la herencia más el nivel de secreción de testosterona, lo que en los hombres da lugar a músculos considerablemente más grandes que los de las mujeres. No obstante, con el entrenamiento los músculos pueden llegar a hipertrofiarse desde un 30 a un 60% adicional. La mayor parte de esta hipertrofia se debe a un aumento en el diámetro de las fibras musculares más que a un aumento en el número de fibras. Sin

embargo, algunas de las fibras musculares que han aumentado de tamaño se dividen por la mitad longitudinalmente para formar nuevas fibras, de tal manera que el número de fibras musculares se incrementa ligeramente.

Los cambios que tienen lugar en el interior de las fibras musculares hipertrofiadas son: 1) un mayor número de miofibrillas, proporcional al grado de hipertrofia; 2) un aumento de hasta el 120% en las enzimas mitocondriales; 3) un aumento de hasta un 60-80% en los componentes del sistema metabólico de los fosfágenos, incluyendo tanto el ATP como la fosfocreatina; 4) un aumento de hasta el 50% en el glucógeno almacenado, y 5) un aumento hasta del 75 al 100% de la cantidad de triglicéridos almacenados (grasa). Debido a todos estos cambios, la capacidad de los sistemas metabólicos anaeróbico y aeróbico aumenta, mejorando especialmente la velocidad máxima de oxidación y la eficiencia del sistema metabólico oxidativo hasta un 45%.

Fibras musculares de contracción rápida y de contracción lenta

En el ser humano, todos los músculos tienen porcentajes variables de *fibras musculares de contracción rápida y de contracción lenta*. Por ejemplo, el músculo gastrocnemio presenta una alta preponderancia de fibras de contracción rápida, lo cual le proporciona la capacidad para realizar contracciones rápidas y potentes como las que se emplean en los saltos. Por el contrario, el músculo sóleo presenta un alto predominio de fibras de contracción lenta y por tanto se utiliza fundamentalmente en actividades prolongadas con el miembro inferior.

Las diferencias básicas entre las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción rápida son las siguientes:

1. Las fibras de contracción rápida tienen un diámetro aproximadamente doble que las de contracción lenta.
2. Las enzimas que favorecen la liberación rápida de energía desde los sistemas energéticos de los fosfágenos y del glucógeno-ácido láctico son de dos a tres veces más activas en las fibras de contracción rápida que en las de contracción lenta, permitiendo que la máxima potencia que se puede alcanzar durante períodos breves de tiempo en las fibras de contracción rápida sea el doble que en las de contracción lenta.
3. Las fibras de contracción lenta están diseñadas fundamentalmente para la resistencia, especialmente para la generación de energía aeróbica. Tienen muchas más mitocondrias que las fibras de contracción rápida. Además contienen considerablemente más mioglobina, una proteína similar a la hemoglobina que se combina con el oxígeno dentro de la fibra muscular; la mioglobina extra aumenta la velocidad de difusión del oxígeno a través de la fibra, lanzando oxígeno de una molécula de mioglobina a la siguiente. Además, las enzimas del sistema metabólico aeróbico son considerablemente más activas en las fibras de contracción lenta que en las rápidas.
4. El número de capilares es mayor en las proximidades de las fibras de contracción lenta que alrededor de las fibras de contracción rápida.

En resumen, las fibras de contracción rápida pueden desarrollar cantidades extremas de potencia durante unos pocos segundos hasta 1 min aproximadamente. Por el contrario, las fibras de contracción lenta proporcionan resistencia, desarrollando una fuerza muscular prolongada durante varios minutos hasta horas.

Diferencias hereditarias entre deportistas en las fibras musculares de contracción rápida frente a fibras de contracción lenta

Algunos individuos tienen un número considerablemente más elevado de fibras de contracción rápida y otros presentan más fibras de contracción lenta; este factor podría determinar hasta cierto

grado las capacidades deportivas de los diferentes individuos. El entrenamiento no ha demostrado ser capaz de cambiar las proporciones relativas de fibras rápidas y de fibras lentas por mucho que un deportista quiera desarrollar un tipo de capacidad deportiva sobre otra. Más bien, las proporciones relativas de las fibras de contracción rápida y de contracción lenta parece estar determinado casi absolutamente por la herencia genética, y a su vez ayuda a determinar qué tipo de actividad deportiva es más adecuada para cada persona; determinados individuos parecen haber nacido para ser maratonianos, mientras que otros han nacido para ser velocistas y saltadores. Por ejemplo, los siguientes datos que se presentan son porcentajes de fibras rápidas frente a fibras lentas en el músculo cuádriceps de diferentes tipos de deportistas.

	Contracción rápida	Contracción lenta
Maratonianos	18	82
Nadadores	26	74
Varón promedio	55	45
Levantadores de peso	55	45
Velocistas	63	37
Saltadores	63	37

Respiración durante el ejercicio

Aunque la capacidad respiratoria de una persona tiene relativamente poca importancia para la realización de deportes tipo *sprint*, resulta fundamental para el máximo rendimiento en los deportes de resistencia.

Consumo de oxígeno y ventilación pulmonar durante el ejercicio

El consumo de oxígeno normal para un varón joven en reposo es de unos 250 ml/min. Sin embargo, en condiciones máximas, este consumo puede aumentar aproximadamente hasta las siguientes cifras:

	ml/min
Varón no entrenado promedio	3.600
Varón entrenado promedio	4.000
Corredor de maratón varón	5.100

La figura 85-6 muestra la relación entre el *consumo de oxígeno* y la *ventilación pulmonar total* a diferentes intensidades de ejercicio. Como cabría esperar, existe una relación lineal. Tanto el consumo de oxígeno como la ventilación pulmonar aumentan unas 20 veces entre la situación de reposo y la máxima intensidad de ejercicio en un *deportista bien entrenado*.




FIGURA 85-6 Efecto del ejercicio sobre el consumo de oxígeno y la tasa ventilatoria. (Modificado de Gray JS: Pulmonary Ventilation and Its Physiological Regulation. Springfield, Ill: Charles C Thomas, 1950.)

Límites de la ventilación pulmonar

¿Hasta dónde podemos estresar a nuestro aparato respiratorio durante el ejercicio? Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta en la siguiente comparación para un hombre joven normal:

	l/min
Ventilación pulmonar en el ejercicio máximo	100-110
Máxima capacidad respiratoria	150-170

De manera que la máxima capacidad respiratoria es aproximadamente un 50% superior que la ventilación pulmonar real durante el ejercicio máximo. Esta diferencia proporciona un elemento de seguridad para los deportistas, concediéndoles una ventilación extra a la que pueden recurrir en condiciones tales como: 1) ejercicio a grandes alturas; 2) ejercicio en condiciones de mucho calor, y 3) alteraciones en el aparato respiratorio.

El aspecto importante es que *el aparato respiratorio no es normalmente el factor más limitante en el aporte de oxígeno a los músculos durante el máximo metabolismo aeróbico muscular. Podemos afirmar en pocas palabras que la capacidad del corazón para bombear sangre a los músculos es normalmente un factor limitante mayor.*

Efecto del entrenamiento sobre el $\dot{V}O_{2\text{máx}}$

La abreviatura para la tasa de consumo máximo de oxígeno que se utiliza durante el metabolismo aeróbico máximo es $\dot{V}O_{2\text{máx}}$. La figura 85-7 muestra el efecto progresivo del entrenamiento deportivo sobre el $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ registrado en un grupo de sujetos que comienzan desde el nivel de no entrenados y se someten a un programa de entrenamiento durante 7 a 13 semanas. En este estudio, resulta sorprendente que el $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ aumentó solo un 10%. Además, la frecuencia de

entrenamiento, que fue de dos o de cinco veces por semana, tuvo poca influencia sobre el aumento del $\dot{V}O_{2\text{máx}}$. Como hemos señalado anteriormente, el $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ de un maratoniano es alrededor de un 45% mayor que el de una persona no entrenada. Parte de este mayor $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ del maratoniano está probablemente determinado genéticamente; es decir, aquellos sujetos que presentan un mayor tamaño del tórax en relación con el tamaño corporal y unos músculos respiratorios más fuertes están preseleccionados para llegar a ser maratonianos. No obstante, también es posible que muchos años de entrenamiento aumenten el $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ de los maratonianos a valores considerablemente mayores que el 10% que se ha obtenido en los experimentos a corto plazo como el de la figura 85-7.




FIGURA 85-7 Aumento del $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ en un período de 7 a 13 semanas de entrenamiento deportivo. (Modificado de Fox EL: Sports Physiology. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1979.)

Capacidad de difusión de oxígeno en los deportistas

La *capacidad de difusión de oxígeno* es una medida de la velocidad a la cual el oxígeno puede difundir desde los alvéolos pulmonares hasta la sangre. Esta capacidad se expresa como *los mililitros de oxígeno que difundirán cada minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia entre la presión parcial alveolar de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en la sangre pulmonar*. Es decir, si la presión parcial de oxígeno en el alvéolo es de 91 mmHg y la presión de oxígeno en la sangre es de 90 mmHg, la cantidad de oxígeno que difunde a través de la membrana respiratoria cada minuto es igual a la capacidad de difusión. A continuación se presentan valores medidos para diferentes capacidades de difusión:

	ml/min
No deportista en reposo	23
No deportista durante ejercicio máximo	48
Patinadores de velocidad durante ejercicio máximo	64
Nadadores durante ejercicio máximo	71
Remeros durante ejercicio máximo	80

El hecho más destacable de estos resultados es el aumento que se produce en la capacidad de difusión durante el estado de máximo ejercicio con respecto a la situación de reposo. Este hallazgo se debe principalmente a que el flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares está parcialmente inactivo en la situación de reposo, mientras que en el ejercicio máximo, el aumento del flujo sanguíneo a través de los pulmones hace que todos los capilares pulmonares estén perfundidos a su máxima velocidad, proporcionando así una superficie de intercambio mucho mayor a través de la cual el oxígeno puede difundir hacia los capilares pulmonares.

También parece quedar claro a partir de estos valores que los deportistas que precisan mayores cantidades de oxígeno por minuto presentan capacidades de difusión más elevadas. ¿Se debe a que las personas que disponen por su naturaleza de una mayor capacidad de difusión eligen este tipo de actividades deportivas, o a que el entrenamiento aumenta de alguna manera la capacidad de difusión? No conocemos la respuesta, pero es muy probable que el entrenamiento, en concreto el entrenamiento de resistencia, desempeñe un papel importante.

Gases sanguíneos durante el ejercicio

Debido a la elevada utilización de oxígeno por los músculos durante el ejercicio, cabría esperar que la presión arterial de oxígeno descendiera de forma significativa durante la práctica de deportes intensos y que la presión venosa de dióxido de carbono aumentara muy por encima de los valores normales. Sin embargo, normalmente esto no ocurre. Estos dos valores se mantienen muy próximos a la normalidad, demostrando así la extrema capacidad del aparato respiratorio para proporcionar una ventilación adecuada de la sangre incluso durante los ejercicios intensos.

Esto demuestra, además, otro punto importante: *no es necesario que los gases sanguíneos se encuentren en valores anormales para que durante el ejercicio se produzca un estímulo de la ventilación*. De hecho, la ventilación durante el ejercicio es estimulada por mecanismos neurogénicos como se explica en el capítulo 42. Parte de esta estimulación se produce por la estimulación directa del centro respiratorio por las mismas señales nerviosas que se transmiten desde el cerebro a los músculos para producir el ejercicio. Se piensa que se produce un estímulo adicional procedente de señales sensitivas transmitidas al centro respiratorio desde los músculos activos y las articulaciones que están en movimiento. Toda esta estimulación nerviosa extra de la respiración normalmente es suficiente para proporcionar casi exactamente el aumento necesario de la ventilación pulmonar para mantener los gases sanguíneos (oxígeno y dióxido de carbono) en valores muy próximos a la normalidad.

Efecto del tabaco sobre la ventilación pulmonar durante el ejercicio

Está extendida la creencia de que el tabaco puede reducir el «aliento» de un deportista. Esto es cierto por diversas razones. Primero, uno de los efectos de la nicotina es la constricción de los bronquiólos terminales de los pulmones. Segundo, los efectos irritantes del tabaco provocan por sí mismos un aumento de la secreción en el árbol bronquial, así como algo de edema en los epitelios de revestimiento. Tercero, la nicotina paraliza los cilios en la superficie de las células epiteliales respiratorias que normalmente se baten continuamente para retirar los líquidos que hay en exceso y las partículas extrañas de las vías de conducción respiratorias. Como resultado de estos efectos, se acumula mucha materia en las vías aéreas que aumenta aún más la dificultad de respirar. Si se juntan

todos estos factores, incluso un deportista que fume poco puede presentar con frecuencia dificultad respiratoria durante el ejercicio máximo, y puede quedar reducido el nivel de rendimiento. Mucho más graves son los efectos del tabaquismo crónico. Existen pocos fumadores crónicos que no desarrollen algún grado de enfisema. En esta enfermedad ocurre el siguiente mecanismo: 1) bronquitis crónica; 2) obstrucción de muchos de los bronquiólos terminales, y 3) destrucción de muchos de las paredes alveolares. En personas con enfisema grave se pueden llegar a destruir hasta cuatro quintas partes de la membrana respiratoria; en esta situación incluso el ejercicio más ligero puede provocar dificultad respiratoria. De hecho, la mayoría de estos pacientes no pueden ni siquiera caminar por una habitación sin jadear para respirar.

Aparato cardiovascular durante el ejercicio

Flujo sanguíneo muscular

Uno de los cometidos fundamentales de la función cardiovascular durante el ejercicio es proporcionar a los músculos ejercitantes el oxígeno que necesitan, así como otros nutrientes. Para cumplir esta misión, el flujo sanguíneo muscular aumenta drásticamente durante el ejercicio. La figura 85-8 muestra un registro del flujo sanguíneo en la pierna de una persona durante un período de 6 min de contracciones intermitentes moderadamente intensas. Obsérvese no solo el gran aumento de flujo sanguíneo (unas 13 veces), sino además el descenso de flujo en cada contracción muscular. De este estudio se pueden extraer dos conclusiones:

1. El proceso contráctil por sí mismo reduce temporalmente el flujo sanguíneo muscular debido a que el músculo esquelético contraído comprime los vasos sanguíneos intramusculares; por tanto, las contracciones musculares *tónicas* potentes pueden provocar fatiga muscular inmediata por la falta de aporte del oxígeno suficiente y de otros nutrientes durante la contracción continuada.
2. El flujo sanguíneo a los músculos durante el ejercicio aumenta de forma importante. La siguiente comparación muestra el máximo aumento que se puede producir en el flujo sanguíneo en un deportista bien entrenado.




FIGURA 85-8 Efecto del ejercicio muscular sobre el flujo sanguíneo en la pantorrilla de la pierna durante contracciones rítmicas intensas. El flujo sanguíneo fue mucho menor durante las contracciones que entre ellas. (Modificado de Barcroft J, Dornhorst AC: Blood flow through the human calf during rhythmic exercise. J Physiol 109:402, 1949.)

	ml/100 g de músculo/min
Flujo sanguíneo en reposo	3,6
Flujo sanguíneo durante el ejercicio máximo	90

Por tanto, el flujo sanguíneo muscular puede aumentar un máximo de aproximadamente 25 veces durante el ejercicio más intenso. Casi la mitad de este aumento en el flujo es el resultado de la vasodilatación intramuscular provocada por los efectos directos de un metabolismo muscular aumentado, como se explica en el capítulo 21. El resto del incremento se debe a múltiples factores, siendo probablemente el más importante el aumento moderado en la presión arterial que se produce durante el ejercicio, siendo este aumento de un 30% aproximadamente. El aumento en la presión no solo provoca el paso de más sangre a través de los vasos sanguíneos, sino que además distiende las paredes de las arteriolas y reduce, por tanto, la resistencia vascular. De manera que un aumento del 30% en la presión arterial puede aumentar más del doble el flujo sanguíneo; esto multiplica el gran aumento de flujo ya provocado por la vasodilatación metabólica al menos por dos.

Potencia producida, consumo de oxígeno y gasto cardíaco durante el ejercicio

La figura 85-9 muestra las interrelaciones entre la potencia producida, el consumo de oxígeno y el gasto cardíaco durante el ejercicio. No resulta sorprendente que cada uno de estos factores se relacione directamente con los otros dos, como queda demostrado por las funciones lineales, dado que la potencia producida por el músculo aumenta el consumo de oxígeno, y el aumento del consumo de oxígeno a su vez dilata los vasos sanguíneos musculares, aumentando así el retorno venoso y el gasto cardíaco. A continuación se muestran valores típicos de gasto cardíaco a diferentes

intensidades de ejercicio:




FIGURA 85-9 Relación entre el gasto cardíaco y el trabajo producido (*línea continua*) y entre el consumo de oxígeno y el trabajo producido (*línea discontinua*) durante diferentes intensidades de ejercicio. Los distintos puntos y cuadrados de colores muestran datos obtenidos de diferentes estudios en seres humanos. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders Co, 1973.)

	l/min
Gasto cardíaco en un varón joven en reposo	5,5
Gasto cardíaco máximo durante el ejercicio en un varón joven no entrenado	23
Gasto cardíaco máximo durante el ejercicio en un varón maratoniano	30

Por tanto, una persona normal no entrenada puede aumentar el gasto cardíaco un poco más de cuatro veces, y el deportista bien entrenado, unas seis veces. (Se han descrito gastos cardíacos de hasta 35 a 40 l/min en maratonianos, es decir, de siete a ocho veces el gasto cardíaco normal en reposo.)

Efecto del entrenamiento sobre la hipertrofia cardíaca y el gasto cardíaco

De los datos anteriores se deduce que los maratonianos pueden alcanzar gastos cardíacos máximos aproximadamente un 40% superiores de los que pueden alcanzar las personas no entrenadas. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que las cámaras cardíacas de los maratonianos son un 40% mayores; junto con este agrandamiento de las cavidades, la masa miocárdica aumenta también un 40% o más. Por tanto, no solo se hipertrofian los músculos esqueléticos durante el entrenamiento deportivo, sino que también lo hace el corazón. No obstante, el aumento de tamaño del corazón y la mayor capacidad de bombeo se producen casi exclusivamente en los entrenamientos deportivos de las actividades de resistencia, no en las de velocidad.

Incluso siendo el corazón del maratoniano considerablemente mayor que el de una persona normal, el gasto cardíaco de reposo es casi exactamente el mismo que en un sujeto normal. Sin embargo, este gasto cardíaco se consigue con un volumen sistólico mayor a una frecuencia cardíaca reducida. En la tabla 85-2 se compara el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca en personas no entrenadas y maratonianos.

Tabla 85-2

Comparación de la función cardíaca entre un maratoniano y un sedentario

	Volumen sistólico (ml)	Frecuencia cardíaca (latidos/min)
Reposo		
Sedentario	75	75
Maratoniano	105	50
Máximo		
Sedentario	110	195
Maratoniano	162	185

De manera que la eficacia de la bomba cardíaca en cada latido es un 40 a un 50% mayor en el atleta muy entrenado que en los sujetos no entrenados, pero hay un descenso correspondiente de la frecuencia cardíaca en reposo.

Función del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco

La figura 85-10 muestra los cambios aproximados en el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca cuando el gasto cardíaco aumenta desde sus valores de reposo de unos 5,5 l/min a 30 l/min en un corredor de maratón. El *volumen sistólico* aumenta de 105 a 162 ml, un aumento de aproximadamente un 50%, mientras que la frecuencia cardíaca aumenta de 50 a 185 latidos/min, un aumento del 270%. Por tanto, el aumento de la frecuencia cardíaca contribuye en una proporción mucho mayor al aumento del gasto cardíaco de lo que lo hace el aumento del volumen sistólico en el ejercicio intenso sostenido. El volumen sistólico alcanza su máximo normalmente cuando el gasto cardíaco ha aumentado solo hasta la mitad de su valor máximo. Los posteriores aumentos en el gasto cardíaco se deben al aumento de la frecuencia cardíaca.




FIGURA 85-10 Volumen sistólico y frecuencia cardíaca aproximados para diferentes niveles de gasto cardíaco en un maratoniano.

Relación entre el rendimiento cardiovascular y el $\dot{V}O_{2\text{máx}}$

Durante el máximo ejercicio, tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca han aumentado hasta el 95% de sus valores máximos. Como el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca *por* el volumen sistólico, obtenemos que el gasto cardíaco alcanza valores del 90% del máximo que una persona puede conseguir, lo que contrasta con el 65% del máximo valor que alcanza la ventilación pulmonar en el ejercicio máximo. De manera que podemos realmente comprobar que el aparato

cardiovascular normalmente es mucho más limitante para el $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ que el aparato respiratorio, ya que la utilización de oxígeno por el organismo nunca puede superar a la velocidad a la cual el aparato cardiovascular es capaz de transportar oxígeno a los tejidos.

Por este motivo, normalmente se afirma que el nivel de rendimiento deportivo que puede alcanzar un maratoniano depende de la capacidad de su corazón, ya que es el paso más limitante en el aporte de las cantidades adecuadas de oxígeno al músculo ejercitante. Por tanto, el gasto cardíaco 40% superior que puede alcanzar el maratoniano sobre la media de sujetos no entrenados es probablemente el beneficio fisiológico más importante del programa de entrenamiento en maratón.

Efecto de las cardiopatías y el envejecimiento en el rendimiento deportivo

Debido a la limitación crítica que supone el aparato cardiovascular para el rendimiento máximo en los deportes de resistencia, es fácil comprender que cualquier tipo de enfermedad cardíaca que reduzca el gasto cardíaco máximo provocará un descenso casi equivalente en la potencia muscular total que un individuo puede alcanzar. Por tanto, una persona con insuficiencia cardíaca congestiva presenta con frecuencia dificultad para conseguir incluso la fuerza muscular necesaria para

levantarse de la cama y mucho menos para caminar.

El gasto cardíaco máximo de las personas mayores también se reduce de forma considerable y desciende más de un 50% entre los 18 y los 80 años. Además, también existe un descenso en la máxima capacidad respiratoria. Por estos motivos, así como por la presencia de una masa muscular esquelética reducida, la máxima fuerza muscular que se puede alcanzar en las personas de edad avanzada está enormemente reducida.

Calor corporal durante el ejercicio

Casi toda la energía liberada por el metabolismo de los nutrientes en el organismo se convierte finalmente en calor corporal. Esto podemos aplicarlo incluso a la energía que provoca la contracción muscular por diversas razones: primero, la eficiencia máxima para la conversión de la energía de los nutrientes en trabajo muscular, incluso en las mejores condiciones, es solo del 20 al 25%; el resto de la energía de los nutrientes se convierte en calor durante el curso de las reacciones químicas intracelulares. Segundo, casi toda la energía que se destina a generar trabajo muscular se convierte en calor corporal, ya que toda, salvo una pequeña porción de esta energía, se utiliza para: 1) superar la resistencia viscosa al movimiento de los músculos y articulaciones; 2) vencer la fricción de la sangre que fluye a través de los vasos sanguíneos, y 3) otros efectos similares, de los cuales todos ellos convierten la energía contráctil del músculo en calor.

Ahora, asumiendo que el consumo de oxígeno por el organismo puede aumentar hasta 20 veces en los deportistas bien entrenados y que la cantidad de calor liberado en el cuerpo es exactamente proporcional al consumo de oxígeno (como se explicó en el capítulo 73), podemos darnos cuenta rápidamente de que cuando se realizan deportes de resistencia se están inyectando grandes cantidades de calor en los tejidos corporales internos. Además, con esta elevada velocidad de flujo de calor en el cuerpo, en un día muy caluroso y húmedo en el que el mecanismo de la sudoración no puede eliminar el calor, los deportistas pueden desarrollar fácilmente una situación intolerable, en ocasiones incluso letal, denominada *golpe de calor*.

Golpe de calor

Durante las actividades deportivas de resistencia, incluso bajo condiciones ambientales normales, la temperatura corporal se eleva desde sus valores normales de 37 a 40 °C. En condiciones de mucho calor y mucha humedad, o si se lleva ropa en exceso, la temperatura corporal puede elevarse fácilmente hasta 41 o 42 °C. A estos niveles, la temperatura elevada por sí misma puede llegar a destruir las células, especialmente las células del cerebro. Cuando sucede este fenómeno, comienzan a aparecer múltiples síntomas, incluyendo debilidad extrema, agotamiento, dolor de cabeza, mareo, náuseas, sudoración profusa, confusión, marcha tambaleante, colapso y pérdida de conciencia. Este complejo sintomático se denomina *golpe de calor*, y si no se trata inmediatamente puede conducir a la muerte. De hecho, incluso aunque la persona haya interrumpido el ejercicio, la temperatura no desciende fácilmente por sí misma, en parte debido a que, a estas temperaturas tan elevadas, el mecanismo termorregulador propiamente dicho con frecuencia fracasa (v. capítulo 74). Una segunda razón es que, en el golpe de calor, la temperatura corporal tan elevada duplica aproximadamente la velocidad de todas las reacciones químicas intracelulares, liberándose así aún más calor.

El tratamiento del golpe de calor es reducir la temperatura corporal tan rápido como sea posible. La forma más práctica de reducir esta temperatura es quitar toda la ropa, rociar con agua fría todas las superficies corporales, o pasar una esponja de forma continuada por el cuerpo, y soplar aire con un

ventilador. Los experimentos han demostrado que este tratamiento puede reducir la temperatura tan rápido o casi tan rápido como cualquier otro, aunque algunos médicos prefieren la inmersión total del cuerpo en agua con hielo picado, si está disponible.

Líquidos corporales y sal durante el ejercicio

Se han registrado pérdidas de peso de hasta 2 a 5 kg en deportistas en un período de 1 h durante actividades de resistencia en condiciones de calor y humedad. Toda esta pérdida de peso se produce fundamentalmente por la pérdida de sudor. La pérdida del sudor suficiente para reducir el peso corporal un 3% puede reducir de forma significativa el rendimiento de una persona y un descenso rápido del 5 al 10% del peso puede, a menudo, ser grave, produciendo calambres musculares, náuseas y otros efectos. Por tanto, es fundamental reponer el líquido según se va perdiendo.

Reposición de cloruro sódico y de potasio

El sudor contiene una gran cantidad de cloruro sódico, razón por la cual se ha generalizado que todos los deportistas deberían tomar tabletas de sal (cloruro sódico) cuando realizan ejercicio en días húmedos y calurosos. Sin embargo, el abuso de tabletas de sal a menudo ha supuesto tantos peligros como beneficios. Además, si un deportista se llega a aclimatar al calor mediante un aumento progresivo en la exposición durante la actividad deportiva en un período de 1 a 2 semanas en lugar de realizar una actividad deportiva máxima el primer día, las glándulas sudoríparas también se aclimatan, de manera que la cantidad de sal que se pierde por el sudor es solo una pequeña fracción de la sal que se pierde antes de la aclimatación. Esta aclimatación de las glándulas sudoríparas se produce fundamentalmente por un aumento de la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. La aldosterona a su vez tiene un efecto directo sobre las glándulas sudoríparas, aumentando la reabsorción de cloruro sódico del sudor antes de que este abandone los túbulos de las glándulas sudoríparas para salir a la superficie de la piel. Una vez que el deportista se ha aclimatado, solo es necesario considerar los suplementos de sal como necesarios en raras ocasiones durante los acontecimientos deportivos.

En ocasiones, después de un ejercicio físico sostenido puede producirse *hiponatremia (baja concentración de sodio en el plasma)* asociada al mismo. De hecho, la hiponatremia grave puede ser una causa importante de mortalidad en deportistas de resistencia. Tal como se observó en el capítulo 25, la hiponatremia grave puede provocar edema tisular, en especial en el encéfalo, un problema que puede ser mortal. En personas que sufren una hiponatremia potencialmente mortal después de un ejercicio intenso, la causa principal no es solamente la pérdida de sodio debida al sudor; de hecho, la hiponatremia se debe a menudo a la ingestión de líquido hipotónico (agua o bebidas deportivas que suelen tener una concentración de sodio inferior a 18 mmol/l) en condiciones de exceso de sudor, orina y pérdidas insensibles de fluido (sobre todo, respiratorio). Este exceso de consumo de líquidos puede estar impulsado por la sed, pero también podría deberse a una conducta condicionada que se basa en las recomendaciones de beber líquido durante el ejercicio para evitar la deshidratación. En los maratones, triatlones y otras pruebas deportivas de resistencia existen también suministros abundantes de agua.

La experiencia de las unidades militares expuestas a ejercicio intenso en el desierto ha demostrado además otro problema relacionado con electrolitos: la pérdida de potasio. Esta pérdida se debe en parte al aumento de la secreción de aldosterona durante la aclimatación al calor, lo que aumenta la pérdida de potasio por la orina, así como por el sudor. Como consecuencia de estos hallazgos, algunas de las bebidas de suplemento para los deportistas contienen cantidades adecuadamente

proporcionadas de potasio y sodio, normalmente en forma de zumos de frutas.

Fármacos y deportistas

Sin extendernos en este tema, enumeraremos algunos de los efectos de los fármacos en los deportistas.

En primer lugar, algunos autores piensan que la *cafeína* aumenta el rendimiento deportivo. En un experimento con un corredor de maratón, el tiempo de la carrera de maratón mejoró en un 7% gracias al empleo juicioso de cafeína en cantidades similares a las que se encuentran en una a tres tazas de café. Los trabajos de otros autores no han podido confirmar ninguna ventaja, dejando dudoso este tema.

Segundo, la utilización de *hormonas sexuales masculinas (andrógenos)* o de otros esteroides anabolizantes para aumentar la fuerza muscular puede aumentar indudablemente el rendimiento deportivo en determinadas condiciones, especialmente en las mujeres e incluso en los varones. Sin embargo, los esteroides anabolizantes también aumentan enormemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque con frecuencia provocan hipertensión, reducción de las lipoproteínas de alta densidad y aumento de las lipoproteínas de baja densidad, factores que favorecen la incidencia de accidentes cardíacos e ictus.

En los varones, cualquier tipo de preparado de hormonas sexuales conduce también a un descenso de la función testicular, que incluye tanto una disminución de la formación de espermatozoides y un descenso de la secreción de la testosterona endógena del individuo, cuyos efectos residuales en ocasiones pueden durar durante varios meses e incluso indefinidamente. En una mujer se pueden producir efectos todavía más importantes, como vello facial, voz grave, piel más áspera e interrupción de la menstruación, ya que lo normal es que no esté adaptada a las hormonas masculinas.

Se considera que ciertos fármacos, como las *anfetaminas* y la *cocaína* que tienen la capacidad de aumentar el rendimiento deportivo. Sin embargo, es igualmente cierto que el abuso de estos fármacos puede conducir al deterioro del rendimiento. Además, hay estudios que no han podido demostrar el valor de estos fármacos, excepto como estimulante psíquico. Algunos deportistas han fallecido durante acontecimientos deportivos debido a la interacción de estos fármacos con la adrenalina y la noradrenalina liberadas por el sistema nervioso simpático durante el ejercicio. Una de las posibles causas de la muerte en estas condiciones es la sobreexcitabilidad del corazón, conduciendo a una fibrilación ventricular, la cual es mortal en pocos segundos.

La buena forma física prolonga la vida

Múltiples estudios han demostrado que las personas que mantienen una forma física apropiada, utilizando programas de ejercicio sensatos y controlando el peso, presentan el beneficio adicional de prolongar la vida. Los estudios demuestran que, sobre todo en las edades comprendidas entre los 50 y los 70 años, la mortalidad es tres veces menor en la gente que presenta mejor forma física.

Pero ¿por qué la buena forma física prolonga la vida? A continuación presentamos algunas de las razones más evidentes.

La buena forma física y el control de peso reducen enormemente la enfermedad cardiovascular. Esto es el resultado de: 1) mantener una presión arterial moderadamente baja, y 2) concentraciones de colesterol y lipoproteínas de baja densidad en sangre reducidas junto con un aumento de las lipoproteínas de alta densidad. Como se ha destacado anteriormente, todos estos cambios actúan conjuntamente para reducir el número de ataques cardíacos, infartos cerebrales y enfermedades

renales.

La persona deportista tiene más reservas corporales para utilizarlas cuando cae enferma. Por ejemplo, una persona de 80 años que no está en forma puede tener un aparato respiratorio que limita el aporte de oxígeno a los tejidos a no más de 1 l/min: esto significa una *reserva respiratoria de no más de tres o cuatro veces la situación de reposo*. Sin embargo, una persona deportista de esta edad puede tener una reserva respiratoria doble. Esta reserva adicional es especialmente importante a la hora de preservar la vida cuando las personas mayores desarrollan cuadros como una neumonía que puede precisar rápidamente toda la reserva respiratoria disponible. Además, la capacidad para aumentar el gasto cardíaco en momentos de necesidad (la «reserva cardíaca») es un 50% mayor en las personas mayores con una buena forma física que en el resto.

El ejercicio y la buena forma física reducen asimismo el riesgo de sufrir varios trastornos metabólicos crónicos asociados con la obesidad, como la resistencia a la insulina y la diabetes de tipo 2. El ejercicio moderado, incluso en ausencia de una pérdida de peso significativa, ha demostrado tener capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir, o en algunos casos eliminar, la necesidad de tratamiento insulínico en pacientes con diabetes de tipo 2.

Una buena forma física reduce también el riesgo de distintos tipos de cáncer, como los de mama, próstata y colon. Buena parte de los efectos beneficiosos del ejercicio puede guardar relación con la reducción de la obesidad. Sin embargo, los estudios en animales de experimentación y en seres humanos han demostrado también que el ejercicio regular reduce el riesgo de numerosas enfermedades crónicas a través de mecanismos cuya comprensión es incompleta aunque, en alguna medida, son independientes de la pérdida de peso o de la disminución de la adiposidad.

Bibliografía

- Allen DG, Lamb GD, Westerblad H. Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiol Rev.* 2008;88:287.
- Booth FW, Laye MJ, Roberts MD. Lifetime sedentary living accelerates some aspects of secondary aging. *J Appl Physiol.* 2011;111:1497.
- Casey DP, Joyner MJ. Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol.* 2012;590:6321.
- González-Alonso J. Human thermoregulation and the cardiovascular system. *Exp Physiol.* 2012;97:340.
- Joyner MJ, Green DJ. Exercise protects the cardiovascular system: effects beyond traditional risk factors. *J Physiol.* 2009;587:5551.
- Kent-Braun JA, Fitts RH, Christie A. Skeletal muscle fatigue. *Compr Physiol.* 2012;2:997.
- Lavie CJ, McAuley PA, Church TS, et al. Obesity and cardiovascular diseases: implications regarding fitness, fatness, and severity in the obesity paradox. *J Am Coll Cardiol.* 2014;63:1345.
- Powers SK, Jackson MJ. Exercise-induced oxidative stress: cellular mechanisms and impact on muscle force production. *Physiol Rev.* 2008;88:1243.
- Powers SK, Smuder AJ, Kavazis AN, Quindry JC. Mechanisms of exercise-induced cardioprotection. *Physiology (Bethesda).* 2014;29:27.
- Rosner MH. Exercise-associated hyponatremia. *Semin Nephrol.* 2009;29:271.
- Sandri M. Signaling in muscle atrophy and hypertrophy. *Physiology (Bethesda).* 2008;23:160.
- Schiaffino S, Dyar KA, Ciciliot S, et al. Mechanisms regulating skeletal muscle growth and atrophy. *BS J.* 2013;280:4294.
- Seals DR, Edwards F. Adolph Distinguished Lecture: the remarkable anti-aging effects of aerobic exercise on systemic arteries. *J Appl Physiol.* 2014;117:425.
- Thompson D, Karpe F, Lafontan M, Frayn K. Physical activity and exercise in the regulation of human adipose tissue physiology. *Physiol Rev.* 2012;92:157.

Índice alfabético

booksmedicos.org

Los números de página seguidos por «*f*» indican figuras y por «*t*» indican tablas.

A

Aberración cromática, [670](#)

Absorción de líquido, en los capilares, [193-194](#)

Acalasia, [809](#), [843](#)

Aceleración

de la cabeza

angular, [717](#)

lineal, [717](#)

lineal, detección, [717](#)

Acetazolamida, [428-429](#)

Acetil coenzima A (acetil-CoA), [883](#)

ácido

acetoacético, [867](#)

pirúvico, conversión, [857](#), [857f](#)

aminoácidos, [869](#)

ciclo del ácido cítrico, [857](#), [857f](#)

después de β -oxidación de ácidos grasos, [867](#)

β -oxidación de ácidos grasos, [866-867](#), [866f](#)

síntesis

de acetilcolina, [776](#)

de ácidos grasos, [868](#), [868f](#)

de colesterol, [871](#)

Acetil-CoA, [Véase Acetil coenzima A](#)

Acetilcolina

biología molecular, [92](#)

canal, [50](#)

constricción parasimpática de los bronquíolos, [505](#)

efectos cardíacos, [128](#)

enfermedad de Huntington, [734-735](#)

estructura molecular, [776](#), [776f](#)

fibras nerviosas colinérgicas, [775-776](#)

 fármacos bloqueantes, [785](#)

flujo sanguíneo coronario, [263](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

membranas postsinápticas, [89-91](#), [90f](#)

músculo liso gastrointestinal, [799](#)

neuronas reticulares del tronco del encéfalo, [751](#), [765](#)

neurotransmisor, [656](#)

 del músculo liso, [102](#)

receptores

 miastenia grave, [93](#)

 tipos principales, [777](#)

secreción(es)

 gástricas, [822-823](#)

 pancreáticas, [826](#)

 terminaciones nerviosas posganglionares, [776](#)

síntesis, destrucción después de la secreción y duración de la acción, [776](#)

sistema, cerebro, [752-754](#), [753f](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

en la unión neuromuscular

 secreción, [89-92](#), [90f](#)

 síntesis, [89](#)

Acetilcolinesterasa

acetilcolina, [776](#)

en la unión neuromuscular, [89](#), [91](#)

Acetona, [867](#), [867f](#)

aliento, [998](#)

cetosis y, [868](#)

Ácido(s)

acetoacético, [867-868](#), [883](#), [988](#)

en diabetes mellitus, [423](#)

uso, [1089](#)

araquidónico, [934](#)

biliares, *Véase también* Sales biliares

colesterol, [871](#), [874](#)

función, [827](#)

carbónico, [535](#)

absorción intestinal de bicarbonato, [839](#)

disociación, [535](#)

flujo sanguíneo cerebral, [787-788](#)

secreciones pancreáticas, [826](#), [826f](#)

cítrico, vesículas seminales, [1024](#)

clorhídrico gástrico

digestión de proteínas, [834-835](#)

estímulos emocionales, [824](#)

liberación de secretina, [827](#)

pH, [410t](#), [821](#)

actividad de pepsina, [834-835](#)

secreción, [821-822](#), [821f-822f](#)

disminuida, [844](#)

estimulación, [823](#)

de pepsinógeno, [822-823](#)

úlcera péptica, [844-845](#)

tratamiento, [845](#)

cólico, [829](#), [871](#)

débiles y fuertes, [409](#)

definición, [409-410](#)

esteárico, [863](#)

ATP de oxidación, [867](#)

etacrínico, [427](#)

fólico, [899](#)

absorción disminuida, [846](#)

deficiencia, [449](#)

feto, [1072](#)

maduración de eritrocitos, [449](#), [452](#), [899](#)

fosfórico, como constituyente básico del ADN, [27](#), [28f](#)

gammaaminobutírico (GABA)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

enfermedad de Huntington, [734-735](#)

neuronas granulares, [737](#)

neurotransmisor, [656](#)

transmisor de molécula pequeña, [586](#)

gástrico, [Véase Ácido clorhídrico gástrico](#)

glucurónico, esteroides conjugados, [968](#)

glutámico, [879](#)

grasos

absorción

directa, [841](#)

sales biliares, [829-830](#)

combustión, [903](#)

degradación, [866-867](#)

difusión placentaria, [1059](#)

entrada en las mitocondrias, [866](#)

estímulo colecistocinina, [829](#)

fuelle de energía, [866](#)

ausencia de hidratos de carbono, [869](#)

en sangre

forma, [864](#)

- transporte, [864-865](#)
- hidrólisis de triglicéridos, [833](#), [836](#)
- libres
 - sangre, [864-866](#)
 - durante el ejercicio, [870](#)
 - tejido adiposo, [869](#)
- movilización, cortisol, [974](#)
- músculo cardíaco, [264](#)
- no esterificados, [865](#)
- β -oxidación, [866f](#), [867](#)
- plasma
 - hormona del crecimiento, [943-944](#), [945t](#)
 - unión a proteína, [335](#)
- quilomicrón, [863](#), [864f](#)
- síntesis, [869](#)
 - de triglicéridos, [841](#), [863](#)
- típicos, [863](#)
- hialurónico, [21](#)
 - filamentos de proteoglucano, [192](#)
- β -hidroxibutírico, [867](#), [988](#)
 - cetosis, [868](#)
- láctico
 - deuda de oxígeno, [1088](#), [1088f](#)
 - eliminación, [1088](#)
 - energía para el corazón, [860](#)
 - glucógeno muscular, [1087](#)
 - glucólisis anaeróbica, [860](#), [860f](#), [905](#)
 - músculo esquelético, [82](#)
 - vasodilatador, [260](#)
 - reconversión a ácido pirúvico, [860](#)
 - shock, [298](#)
 - sudor, [914](#)

no volátil, [415-418](#), [420](#)

hiato aniónico, [426](#)

oleico, [863](#)

oxaloacético, [857](#), [857f](#)

ácidos grasos, [867](#)

palmítico, [863](#)

pantoténico, [857](#), [899-900](#)

paraaminohipúrico (PAH), [354](#)

flujo plasmático renal, [367-368](#), [367f](#)

pirúvico, [904](#), [1087](#)

alanina, [878](#), [878f](#)

conversión

acetil-CoA, [857](#), [857f](#)

ácido láctico, [860](#)

glucosa, [862](#)

glucólisis, [856-857](#), [856f](#)

quenodesoxicólico, [829](#)

sabor agrio, [685](#), [686t](#)

úrico, difusión placentaria, [1059](#)

Acidófilos, [940](#)

Acidosis

calcio

reabsorción, [397](#)

unido a proteínas, [396](#)

características, [422t](#)

corrección renal, [421-422](#)

crónica, excreción de amoníaco, [420](#), [422](#)

deficiencia de insulina, [988](#)

definición, [409-410](#)

diabetes mellitus, [995](#), [996f](#)

metabólica, [422](#), [422t](#)

causas clínicas, [423](#)

corrección renal, [421](#)

definición, [412](#)

hiato aniónico, [425-426](#), [426t](#)

hiperclorémica, [426](#), [426t](#)

potasio, [390](#)

nefropatía crónica, [437](#)

reabsorción de bicarbonato, [416-417](#), [420](#)

en recién nacidos, [1079](#)

respiratoria, [412](#), [415](#), [422](#), [422t](#)

causas clínicas, [422-423](#)

corrección renal, [421](#)

secreción de iones hidrógeno, [421](#)

secreción

de ion hidrógeno, [420-421](#)

de potasio, [392](#), [395](#)

en shock, [298](#)

transmisión sináptica, [592](#)

tratamiento, [424](#)

tubular renal, [423](#), [439](#)

Acinesia, [734](#)

Ácinos

glándulas salivales, [817](#), [818f](#), [819-820](#)

páncreas, [817](#), [825](#), [983](#)

Aclaramiento(s)

del agua libre, [380](#)

de creatinina, [366-367](#)

osmolares, [380](#)

renal, métodos, [364-368](#), [365t](#), [366f-367f](#), [368t](#)

Aclimatación, [544](#)

a la altitud

cambios en el sistema circulatorio periférico, [563](#)

capacidad

de difusión aumentada, [563](#)

de trabajo y, [564](#), [564t](#)

Po₂ alveolar, [562-563](#)

al calor, [921](#)

sudoración y, [915](#)

al frío, termogenia química y, [917](#)

Acidosis, [822](#), [844](#)

Acometida peristáltica, [813](#)

Acomodación

de mecanorreceptores, [598](#)

del ojo

control autónomo, [669-670](#)

mecanismo, [639-640](#), [639f](#)

nervios parasimpáticos, [639-640](#)

reacción pupilar, [670](#)

Acoplamiento excitación-contracción, músculo

cardíaco, [112](#)

esquelético, [93-95](#), [95f](#)

Acromegalia, [947](#), [948f](#)

diabetes mellitus, [997](#)

Acrosoma, [1023](#)

enzimas, [1025](#)

reacción, [1025](#)

Actina

fagocitosis, [20](#)

hendiduras revestidas, [19](#), [19f](#)

microvellosidades intestinales, [837](#)

mitosis, [39](#)

movimiento amebiano, [25](#)

músculo

esquelético

hipertrofia y, [87](#)

tensión muscular y, [81](#)

teoría de la «cremallera» de la contracción, [80](#), [80f](#)

liso, [97](#)

plaquetas, [483](#)

Activación química (ligando), [50](#)

Actividad(es)

motora, control cognitivo, [732](#)

osmolar de los líquidos corporales, [311](#)

sexuales, amígdala, [760](#)

Acto sexual

femenino, [1051-1052](#)

erección y la lubricación, [1052](#)

estimulación, [1051-1052](#)

masculino, [1026-1027](#)

elemento psíquico, [1026](#)

estímulo neuronal, [1026-1027](#)

etapas, [1027](#)

Acuaporinas, [49](#), [949](#)

acuaporina 2 (AQP-2), hormona antidiurética, [364](#), [364f](#)

Adaptación

del gusto, [688](#)

nerviosa, [653](#)

receptores sensitivos, [598-599](#), [598f](#)

sensaciones olfatorias, [690](#)

Addison, enfermedad, [386](#), [978-979](#)

apetito de sal, [386](#)

hiperpotasemia, [389](#), [393](#)

hiponatremia, [314-315](#)

reducción de volumen, [404](#)

Adenilato ciclasa

cilio olfatorio, [689](#), [689f](#)

funciones hormonales, [933-934](#)

hormona

adrenocorticotropa, [976](#)

antidiurética, [949](#)

de crecimiento, [946](#)

memoria, [747](#)

receptores

adrenérgicos o colinérgicos, [777](#)

hormonales, [932](#)

secreción de hormona tiroidea, [959](#)

Adenina, [27](#), [28f](#), [31t](#)

Adenohipófisis, [939](#)

Adenosina

control del flujo sanguíneo

músculo

cardíaco, [263](#)

esquelético, [259](#)

pared intestinal, [805](#)

isquemia coronaria, [264](#)

regulación del flujo sanguíneo, [204-205](#)

shock irreversible, [298](#)

trifosfatasa (ATPasa), *Véase también* Calcio, ATPasa

actividad en cabeza de miosina, [79](#)

cabeza de miosina, [79](#)

mitocondrial, [858f](#), [858-859](#)

transporte activo, [55](#)

riñones, [348](#), [349f](#)

ADH, *Véase* Hormona antidiurética (ADH)

Adipocinas, [925](#)

Adipocitos, [16](#), [865-866](#), [893](#)

deficiencia, [866](#)

hormonas citocina, [925](#)

obesidad y, [894](#)

ADN (ácido desoxirribonucleico), [27](#), *Véase también* Transcripción

código, en el núcleo celular, [30-35](#)

corrección de lectura, [38](#)

elementos básicos, [27-29](#), [28f](#)

estructura, [27-28](#), [29f](#)

ligasa, [38](#)

metilación, [36](#)

polimerasa, [38](#)

reparación, [38](#)

replicación, [37-38](#)

Adrenalina, [505](#)

activación de fosforilasa, [856](#)

disponibilidad de glucosa, [856](#)

filtración glomerular, [341-342](#)

flujo sanguíneo coronario, [264](#)

glándulas sudoríparas, [914](#)

movilización de ácidos grasos, [870](#)

músculo liso gastrointestinal, [799](#)

producción de calor, [917](#)

receptores adrenérgicos, [777](#)

secreción

de insulina, [992](#)

de la médula suprarrenal, [774](#), [777](#), [780](#), [965](#)

basal, [781](#)

shock hipovolémico, [295](#)

shock, [301](#)

simpaticomimético, [784](#)

síntesis, [776](#), [929](#)

tasa metabólica, [911](#)

como vasoconstrictor, [212](#)

músculo esquelético, [260](#)

vasodilatación en músculos esqueléticos, [260](#)

Adrenocorticotropina, [939](#)

Afasia

auditiva receptiva, [744](#)

global, [744](#)

motora, [744](#)

receptora visual, [744](#)

Aglutinación

anticuerpos, [470](#)

sistema del complemento, [471](#)

Aglutininas, [477t](#), [478](#)

anti-A, [478](#), [478f](#)

anti-B, [478](#), [478f](#)

anti-Rh, [479](#)

origen, plasma, [478](#)

tipificación de la sangre, [479](#)

titulación, [478](#), [478f](#)

Aglutinógenos, [477-478](#), [477t](#)

determinación genética, [477-478](#)

Agnosia, [733](#)

Agua

absorción

colon, [841](#)

intestinal, colon, [841-842](#)

intestino delgado, [838](#)

célula, [11](#)

corporal total

medición, [309](#)

regulación, [371](#)

difusión

membrana

capilar, [191-192](#)

celular, [48-49](#), [310](#)

neta, [53-54](#)

eritrocitos, [535](#)

excreción, [371](#)

renal, hipotálamo, [756](#)

heces, [842](#)

ingesta, diaria, [305](#), [306t](#)

pérdida, diaria, [305-306](#), [306t](#)

presión(es)

de gases disueltos, [517-518](#)

de vapor, [518](#)

altitud elevada, [561](#)

reabsorción por los riñones, [348](#), [352](#), [352f](#)

angiotensina II, [363-364](#), [363f](#)

asa de Henle, [354-355](#), [355f](#)

concentración de inulina, [359](#), [359f](#)

hormona antidiurética, [363-364](#), [364f](#), [756](#)

péptido natriurético auricular, [364](#)

regulación renal, [323-324](#)

secreción(es)

gastrointestinales, [819](#), [826](#)

intestinal, [832](#)

pancreáticas, [826](#), [826f](#)

Agudeza visual, [642-643](#), [643f](#)

método clínico, [643](#)

Agujero oval

cierre, [1075](#)

feto, [1074](#)

permeable, [1075](#)

Aire

alveolar

aire atmosférico, [519-520](#), [520f](#)

composición, [519-521](#), [519t](#)

atmosférico, [519-521](#), [519t](#)

del espacio muerto, aire espirado, [521](#), [521f](#)

espirado, [521](#), [521f](#)

Alanina, [878](#), [878f](#)

glucagón, [993](#)

Alarma, reacción, elevación de la presión arterial, [219](#)

Albúmina, *Véase también* [Proteínas plasmáticas](#)

filtración glomerular, [336](#), [336t](#)

medición del volumen plasmático, [309-310](#)

presión coloidosmótica, [877](#)

plasmática, [196](#)

transporte de ácidos grasos, [864-865](#)

Álcali, definición, [409](#)

Alcalosis

calcio y

reabsorción, [397](#)

unido a proteínas, [396](#)

características, [422t](#)

corrección renal, [422](#)

crisis tónico-clónica generalizada, [769](#)

definición, [409-410](#)

exceso de aldosterona, [421](#)

excreción de bicarbonato, [416](#), [420](#)

metabólica, [422](#), [422t](#)

causas clínicas, [423-424](#)

definición, [412](#)

exceso de aldosterona, [970](#)

excreción de bicarbonato, [417](#)

potasio, [390](#)

secreción de iones hidrógeno, [421](#)

vómitos, [423](#), [848](#)

respiratoria, [422](#), [422t](#)

- causas clínicas, [423](#)
- secreción de iones hidrógeno, [421](#)
- transmisión sináptica, [592](#)
- tratamiento, [424](#)

Alcohol

- absorción gástrica, [837](#)
- gastritis, [843](#)
- pancreatitis, [845](#)
- úlceras pépticas, [845](#)

Aldosterona, [935](#), [965-966](#), [967f](#), [968-972](#)

- absorción intestinal de sodio, [839](#), [842](#)
- acciones no genómicas, [971](#)
- angiotensina II, [235-236](#)
- antagonistas, [356](#), [357f](#), [428t](#)
- control de la presión arterial, [236](#), [242](#), [242f](#)
- cortisol, [968](#)
- efectos
 - circulatorios, [969-970](#)
 - renales, [969-970](#)
- embarazo, [1061](#)
- escape, [969](#)
- exceso, [969-970](#), [970f](#)
 - alcalosis, [421](#), [970](#)
 - metabólica, [423](#)
 - hipernatremia, [316](#)
 - hipertensión, [438](#)
 - de secreción, [404](#)
- excreción renal, [404](#)
- glándulas
 - salivales, [970](#)
 - sudoríparas, [970](#)
- insuficiencia cardíaca, [276](#)

mecanismo de acción, [970-971](#)

obesidad, [239-240](#)

osmolaridad del líquido extracelular, [385-386](#)

potasio, [389](#)

secreción renal, [362-363](#), [392f-394f](#), [393](#), [969](#), [970f](#)

radioinmunoanálisis, [936f](#)

reabsorción

de sodio, [352](#), [362-363](#), [404](#), [969](#)

tubular, [352](#), [362t](#), [362-363](#)

regulación de la secreción, [971-972](#), [972f](#)

sodio en líquido extracelular, [385-386](#), [386f](#)

sudoración, aclimatación, [915](#)

Aldosteronismo primario (síndrome de Conn), [981](#)

causado por hipertensión, [234](#)

hiperpotasemia, [393](#)

Alergia(s), [475-476](#)

atópicas, [475-476](#)

recién nacidos, [1078](#)

retardada, [475](#)

Aleteo auricular, [165](#), [165f](#)

Alimento(s)

contenido de proteína, grasa, e hidratos de carbono, [888t](#)

efecto termógeno, [909](#), [911](#)

energía disponible, [887-888](#)

regulación de la ingesta, [889-894](#)

liberación de energía, [853](#)

utilización metabólica, [888-889](#)

volumen, vaciamiento del estómago, [811](#)

Almidones

en alimentos de origen no animal, [833](#)

digestión, [834](#), [834f](#)

Aloinjertos, [481](#)

Alta temperatura, efectos perniciosos, [921](#)

Alternancia eléctrica, [158](#), [158f](#)

Alucinaciones, [759](#)

Alvéolos, [1073](#)

colapso, [499-500](#), [553-554](#), [553f](#)

inflamación pulmonar y líquido, [552-553](#), [552f-553f](#)

ocluidos, presión, [500](#)

presión parcial, concentración

de CO₂, [520-521](#), [521f](#)

de oxígeno, [520](#), [520f](#)

sangre pulmonar, difusión de gases entre fases gaseosas, [518](#)

Alzheimer, enfermedad, [771-772](#)

Ambiente frío

aclimatación, [917](#)

exposición de cuerpo, [921-922](#)

hormona

estimulante del tiroides, [918](#), [959](#)

liberadora de tiotropina, [959](#)

Ameloblastos, [1016](#)

Amenorrea, [958](#), [1051](#)

Amígdala, [760](#)

alimentación, [892](#)

comisura anterior, [745](#)

Amilasa pancreática, [825](#)

recién nacidos, [1077](#)

α -amilasa pancreática, [834](#)

Amilina, [983](#)

Amiloidosis, síndrome nefrótico asociado, [434-435](#)

Amilorida, [356](#), [357f](#), [429](#)

síndrome de Liddle, [439-440](#)

Aminoácidos

codones de ARN, [31-32](#), [31t](#)

como constituyentes principales de proteínas, [875](#), [876f](#)

cortisol, [973](#)

cotransporte de sodio, [57](#), [839f](#), [841](#)

depósito, [877](#)

desaminación, [878-879](#), [879f](#), [884](#)

difusión facilitada, [52](#)

esencial, [876f](#), [878](#)

glucosa, [861](#)

hormona del crecimiento, [943](#)

insulina, [988-989](#)

secreción, [991](#)

liberación, en la regulación de la concentración plasmática de aminoácidos, [877](#)

metabolismo, [990](#)

no esencial, [878](#)

productos de la digestión de proteínas, [835](#)

reabsorción renal, [332](#), [349](#), [350f](#)

sangre, [875-877](#)

secreción de glucagón, [993](#)

síntesis de proteínas, ARN de transferencia, [32](#)

transporte activo a las células, [877](#)

tubo digestivo, [876](#)

umbral renal, [877](#)

uso, [1089](#)

Aminoaciduria, [439](#)

β -aminoisobutiricaciduria, [439](#)

Aminopolipeptidasa, [835](#)

Aminotransferasas, [878](#)

Amitriptilina, [771](#)

Amnesia

anterógrada, [749](#), [759](#)

retrógrada, [749](#)

Amoníaco

coma hepático, [879](#)

desaminación de aminoácidos, [879](#)

formación de la urea, [884](#)

ion (NH_4^+)

amortiguación, [419](#), [419f](#)

excreción, [420-422](#)

sistema amortiguador, [419-420](#), [419f](#)

urea derivada, [903](#)

Amorfosíntesis, [613-614](#)

Amplitud de potencial de receptor máximo, [597](#)

Ampolla del conducto semicircular, [715f-716f](#), [716](#)

Anafase, [38f](#), [39](#)

Anafilaxia, [475](#)

Análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas, [936-937](#), [936f](#)

Anastomosis arteriovenosas, [912](#), [912f](#)

Andrógenos

química, [1028](#), [1028f](#)

rendimiento deportivo, [1095](#)

secreción, [1028](#)

testicular, [1028](#)

suprarrenales, [978](#)

embarazo, [1060](#)

Androstenodiona

secreción, [966](#)

síntesis ovárica, [1042](#)

Anemia, [249](#), [452-453](#)

aplásica, [452](#)

características de los eritrocitos, [447f](#)

efectos circulatorios, [453](#)

falciforme, [447f](#), [452](#)

hemoglobina, [450](#)

hematocrito, [307](#)

hemolítica, [452-453](#)

hipocrómica, [451](#), [1062](#)

microcítica, [447f](#), [452](#)

hipoxia, [453](#)

en insuficiencia renal crónica, [437](#)

macrocítica, [899](#)

megaloblástica, [447f](#), [452](#)

microcítica hipocrómica, [447f](#), [452](#)

por pérdida de sangre, [452](#)

perniciosa, [449](#), [452](#), [822](#), [844](#), [899](#)

en recién nacidos, [1076f](#), [1078-1079](#)

Anestesia

espinal

gasto cardíaco, [255](#), [255f](#)

shock neurógeno, [299](#)

general, shock neurógeno, [299](#)

parada cardíaca, [165](#)

parálisis de la deglución, [843](#)

respiración, [546](#)

Anestésicos

locales como estabilizadores de membrana, [73](#)

transmisión sináptica, [592](#)

Anfetaminas, [896](#), [1095](#)

Angina de pecho, [268-269](#), *Véase también* [Isquemia miocárdica](#)

cirugía de derivación coronaria, [269](#)

corriente de lesión, [152](#)

tratamiento farmacológico, [269](#)

Angiogenia, [209](#), [209f](#), [563](#)

Angioplastia, arterias coronarias, [269](#)

Angiostatina, [210](#)

Angiotensina I, [234-235](#)

Angiotensina II, [235-236](#), [236f](#), [972f](#)

cambios de presión arterial, [236](#)

efectos renales, [235](#)

excreción renal, [403-404](#)

filtración glomerular, [342](#), [344](#)

hipertensión, [237-238](#), [238f](#)

obesidad, [239-240](#)

osmolaridad del líquido extracelular, [385-386](#)

reabsorción renal, [362-364](#), [362t](#), [363f](#), [405](#)

secreción de aldosterona, [966](#), [972](#)

sed, [384](#)

shock hipovolémico, [295](#)

sodio en líquido extracelular, [385-386](#)

vasoconstrictor, [212](#)

Angiotensinasas, [234](#)

Angiotensinógeno, [234](#)

Anhidrasa carbónica, [535](#)

cinc, [901](#)

efecto, [535](#)

eritrocitos, [445](#)

inhibidores, [428-429](#), [428t](#)

riñón, [411](#)

reabsorción de bicarbonato, [416f](#), [417](#)

secreción

de ácidos gástricos, [822](#)

pancreática, [826](#), [826f](#)

Anorexia, [896-897](#)

ANP, [Véase Péptido natriurético auricular \(ANP\)](#)

Antagonistas del receptor de la angiotensina II, [403](#)

Anticoagulantes, [485](#), [489](#), [492](#)

Anticodones, [32](#)

Anticoncepción

hormonal, [1052-1053](#)

método rítmico, [1052](#)

Anticuerpo(s), [457](#), [469-470](#)

acción directa, [470](#), [470f](#)

anti-D, [480](#)

clases, [470](#)

especificidad, [469-470](#)

formación, células plasmáticas, [469](#)

inmunodepresores, [482](#)

leche, [1069](#)

mecanismos de acción, [470](#)

naturaleza, [469-470](#), [470f](#)

en recién nacidos, [1078](#)

saliva, [820](#)

sensibilizantes, [475](#)

Antidepresivos tricíclicos, [771](#)

Antidiuresis, [949](#)

Antigenicidad, causa de reacciones inmunitarias de la sangre, [477](#)

Antígeno(s)

autoantígenos, [466-467](#)

células sanguíneas, multiplicidad, [477](#)

inmunidad adquirida iniciada, [465-466](#)

inmunización por inyección, [474](#)

Antígeno D, [480](#)

Antígenos Rh, [479](#)

Antiinflamatorios no esteroideos, mucosa gástrica, [845](#)

Antioncogenes, [42](#)

Antiperistaltismo, [847](#)

Antipiréticos, [920](#)

Antipirina, [309](#)

Antitiroideos, [959-960](#)

Antitrombina III, [489](#)

Antro gástrico, [809](#), [810f](#)

Anuria, [430](#), [432](#)

Aparato

respiratorio

feto, [1071-1072](#)

recién nacidos, [1076](#)

vestibular, [714-716](#), [715f](#)

aceleración lineal, [717](#)

conexiones con el sistema nervioso central, [718-719](#), [718f](#)

equilibrio estático, [716-717](#), [719](#)

rotación de la cabeza, [716-718](#), [717f](#)

yuxtaglomerular, [207](#)

Apertura pupilar, control autónomo de la acomodación, [669-670](#)

Apetito, [820](#), [889](#)

centros suprahipotalámicos, [892](#)

hipotálamo, [890](#)

por la sal, [386-387](#)

secreciones gástricas, [823](#)

Aplysia, [747-748](#), [747f](#)

Apnea

obstructiva del sueño, [547-548](#)

del sueño, [547-548](#)

Apoferitina, [884](#)

Apolipoproteína, [874](#)

Apolipoproteína B, mutaciones, [871-872](#)

Apolipoproteína E

eliminación de quilomicrones de la sangre, [864](#), [864f](#)

enfermedad de Alzheimer, [771-772](#)

Apoproteína B, [863](#)

Apoproteínas en surfactante, [500](#)

Apoptosis, [41](#)

Aporte sanguíneo coronario, [262](#), [262f](#)

Apraxia motora, [709](#)

Aprendizaje

- conectividad neuronal, [748](#)
- hipocampo, [759-760](#)
- recompensa o castigo, [758-759](#)
- reflejo, [749](#)

Área(s)

- de asociación, [739-740](#), [739f](#)
 - área de Wernicke, [741](#)
 - límbicas, [739-740](#), [739f](#)
 - neuronas de los granos, [737](#)
 - núcleo caudado, [732-733](#)
 - parietooccipitotemporal, [739-740](#), [739f](#)
 - prefrontal, [739-740](#), [739f](#), [742-743](#)
 - somatosensitivas, [613-614](#)
 - efecto de la eliminación, [613-614](#)
- facilitadora bulborreticular, [751](#)
- motora complementaria, [707f-708f](#), [708-709](#), [738](#), [739f](#)
 - ganglios basales, [731f](#), [732](#)
- olfatoria
 - lateral, [691-692](#)
 - medial, [691](#)
- postrema, barrera hematoencefálica, [793](#)
- premotora, [707f](#), [708](#), [738](#), [739f](#)
 - Broca, área, [708f](#), [709](#), [740](#), [742](#)
 - campo de movimiento de ojos voluntario, [709](#)
 - cerebelo, [722](#), [728](#)
 - destrezas manuales, [709](#)
 - ganglios basales, [731f-732f](#), [732](#)
- quimiosensitiva, [541](#)
- de reconocimiento facial, [740](#), [741f](#)
- sensitivas, [217](#)
 - corteza cerebral, [737](#), [739f](#)

somatosensitiva I, [611-612](#), [611f](#)

funciones, [613](#)

orientación espacial de las señales, [612](#), [612f](#)

somatosensitiva II, [611-612](#), [611f](#)

vasoconstrictora, [216-217](#)

vasodilatadora, [217](#)

visuales secundarias, [662-663](#), [662f](#)

Arginina

glucagón, [993](#)

secreción de insulina, [991](#)

ARN (ácido ribonucleico), [27](#)

codones, [31-32](#)

elementos básicos, [30](#)

de interferencia

corto, [33](#)

pequeño (ARNsi), [33](#)

mensajero, [27f](#), [31-32](#), [32f](#)

precursor (pre-ARNm), [31](#)

no codificante, [32-33](#)

nuclear pequeño (ARNnp), [31](#)

polimerasa, [29f](#), [30](#)

ribosómico, [31-32](#)

de silenciamiento (ARNsi), [33](#)

síntesis, [30](#)

núcleo de la plantilla de ADN, [30](#)

tipos, [31](#)

de transferencia (ARNt), [31](#)

ARNm, traducción, insulina, [989](#)

Aromatasa, [1042](#), [1044](#), [1044f](#)

Arrastre del disolvente, [352](#)

Arrenoblastoma, [1028](#)

Arritmia(s)

cardíacas, [155-166](#)

aleteo auricular, [165](#), [165f](#)

anomalías del ritmo sinusal, [155-156](#), [156f](#)

bloqueo

auriculoventricular, [156](#)

intraventricular parcial, [158](#), [158f](#)

sinoauricular, [156](#), [156f](#)

causas, [155](#)

fibrilación

auricular, [164-165](#), [165f](#)

ventricular, [161-164](#)

hipertrofia cardíaca, [290-291](#)

parada cardíaca, [165](#)

síndromes de QT largo, [159-160](#), [160f](#)

taquicardia(s)

paroxística, [160-161](#)

auricular, [160-161](#), [160f](#)

ventricular, [161](#), [161f](#)

supraventriculares, [161](#)

torsades de pointes, [159](#), [160f](#)

sinusal, [156](#), [156f](#)

Arrugas de la mucosa vesical, [327](#)

Arteria(s)

cerebral

media, bloqueo, [790](#)

posterior, bloqueo, [790](#)

coronarias, [262](#), [262f](#)

circulación colateral, [265](#), [265f](#)

disposición en el músculo cardíaco, [263](#), [263f](#)

oclusión aguda, [265](#), *Véase también* Infarto de miocardio

causas de muerte, [266-267](#)

circulación colateral, [265](#)

distensibilidad, [179](#)

función, [169](#)

hepáticas, [881-882](#)

inervación simpática, [215](#)

piales, [787](#), [787f](#)

pulmonar, [509](#)

retiniana central, [649](#)

umbilicales, [1057](#), [1074-1075](#), [1074f](#)

velocidad, [169](#)

Arterioesclerosis, [1004](#)

ateroesclerosis, [872](#)

definición, [872](#)

diabetes mellitus, [998](#)

perfiles de pulso de presión aórtica, [181](#), [181f](#)

Arteriolas, [169](#), [189](#), [190f](#)

aferentes renales, [325](#), [326f-327f](#), [331f](#)

control fisiológico, [341-342](#)

filtración glomerular, [338](#), [339f](#)

mecanismo miógeno, [345](#)

retroalimentación tubuloglomerular, [343](#), [344f](#)

y arterias penetrantes, [787](#), [787f](#)

eferentes, [326](#), [326f-327f](#), [331f](#)

angiotensina II, [363](#)

control fisiológico, [341](#)

filtración glomerular, [338](#), [339f](#)

retroalimentación tubuloglomerular, [343](#), [344f](#)

encéfalo, [787-788](#), [787f](#), [790](#)

hepáticas, [881](#)

inervación simpática, [215](#), [216f](#)

resistencia, [176](#)

tono simpático, [781](#)

Arteriopatía coronaria, [262](#)

tratamiento basado en catéter, [269](#)

Ascitis, [318](#), [320](#), [882](#)

Asma, [476](#), [551](#)

obstrucción de la vía aérea, [554](#)

Asta intermediolateral, [773](#)

Astenia, [995-996](#)

Astigmatismo, [641-642](#), [641f](#)

Astrocitos, [787-788](#), [787f](#)

Ataxia, [729](#)

Atelectasia

obstrucción de la vía aérea, [553-554](#), [553f](#)

toxicidad por oxígeno, [571](#)

Ateroesclerosis, [872-874](#)

arteria renal, [433](#)

aumento de la presión sistólica, [183](#)

colesterol, [872-873](#)

coronaria, [264-265](#)

circulación colateral, [265](#)

cirugía de derivación coronaria, [269](#)

oclusión aguda, [265](#)

diabetes mellitus, [995](#)

enfermedad de Alzheimer, [772](#)

factores de riesgo, [873-874](#)

hipotiroidismo, [962-963](#)

prevención, [874](#)

Atetosis, [732](#)

Atletas

bradicardia, [155](#)

capacidad de difusión de oxígeno, [1091-1092](#), [1091t](#)

fármacos y, [1095](#)

Átomos de hidrógeno

oxidación, [858](#)