




Figura 23-12. Sección transversal de la muñeca. 1: Primer metacarpo. 2: Trapecio. 3: Trapecoide. 4: Hueso grande. 5: Hueso gancho. 6: Piramidal. 7: Pisiforme. 8: Musculatura tenar. 9: Flexor radial del carpo. 10: Flexor largo del pulgar. 11: Nervio mediano. 12: Flexor profundo de los dedos. 13: Tendones del músculo flexor profundo de los dedos. 14: Canal de Guyon con el nervio y la arteria cubital. 15: Arteria radial. Flecha: retináculo flexor.

Límite superior: un plano horizontal que pasa por encima de la cabeza del cúbito (este relieve queda incluido en la muñeca).

Límite inferior: un plano que siga las superficies distales de los huesos de la segunda fila del carpo.

Con arreglo al complejo articular, la muñeca se divide en dos compartimientos: anterior y posterior (**regiones carpianas anterior y posterior**).

REGIÓN CARPIANA ANTERIOR

La región carpiiana anterior o **región anterior de la muñeca** es el conjunto de estructuras situadas por delante de las articulaciones del complejo articular de unión entre antebrazo y mano.

Esta región comprende **dos zonas diferentes**: una superior, que es continuación de la parte distal de la región antebraquial anterior, y una **zona inferior**, el **túnel carpiano**, que constituye un pasillo de acceso hacia la palma de la mano.

La **zona superior** es una banda estrecha situada por delante de las extremidades distales del radio y del cúbito, y delimitada entre el tendón del flexor cubital del carpo y el tendón del separador largo del pulgar. Está tapizada por la **fascia antebraquial**, que se acaba fusionando con el **retináculo flexor**.

El **túnel carpiano** es un conducto osteofibroso comprendido entre el surco carpiano y el retináculo flexor (véase Cap. 5, Figs. 5-12 y 5-41).

Plano profundo a la fascia y al retináculo flexor

Está ocupado por tendones, vasos y nervios.

Tendones

En la **zona superior** se disponen los mismos tendones que en la porción distal del antebrazo. En un **primer plano**,

haciendo relieve bajo la piel cuando se flexiona la muñeca, encontramos, de lateral a medial, los tendones de los músculos braquiorradial, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. En un **segundo plano**, los tendones del flexor superficial de los dedos. En el **tercer plano**, los tendones de los músculos flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. El **cuarto plano** no es tendinoso y lo forma la porción más distal del músculo pronador cuadrado.

En el **túnel carpiano** se introducen algunos de estos tendones. El **tendón del flexor radial del carpo** ocupa la parte más lateral del túnel, aislado en un compartimiento fibroso propio. Los tendones de los flexores de los dedos se organizan en dos planos. En el **plano anterior** se disponen los **tendones del flexor superficial de los dedos**, y en el **plano posterior**, los **tendones del flexor largo del pulgar y del flexor profundo de los dedos**.

Los tendones del flexor radial del carpo y del flexor largo del pulgar están envueltos en una vaina sinovial independiente; los tendones flexores de los dedos están rodeados por una vaina sinovial común (**vaina tendinosa común de los flexores**).

El **tendón del palmar largo** pasa por delante del retináculo flexor para continuarse con la aponeurosis palmar.

Elementos vasculonerviosos

El **nervio mediano**, en la zona superior de la región continúa el mismo trayecto que en la porción distal del antebrazo, luego penetra en el túnel carpiano donde ocupa una posición muy superficial por delante del tendón del índice del flexor superficial de los dedos.

El **paquete vasculonervioso cubital** (arteria y nervio cubital) se sitúa lateralmente al tendón del flexor cubital del carpo, bajo la fascia, y enseguida pasa por delante del retináculo flexor, en un compartimiento fibroso especial (**canal de Guyon**) que está limitado medialmente por el pisiforme.

La **arteria radial** discurre primero por el canal del pulso, luego da la **arteria palmar superficial** y enseguida abandona la región rodeando el ligamento colateral radial del carpo para pasar al dorso de la mano y perforar el primer espacio interóseo.

Plano superficial

Por delante del retináculo flexor discurre el **ramo cutáneo palmar del nervio mediano**. En la zona superior de la región de la muñeca comienzan a formarse las venas del antebrazo. En la piel se observan tres pliegues de flexión. El más distal es el pliegue que limita con las eminencias tenar e hipotenar.

REGIÓN CARPIANA POSTERIOR

La región carpiiana posterior (**región posterior de la muñeca**), a diferencia de la región anterior, forma una unidad continua con el dorso de la mano. La fascia antebraquial se engrosa formando el retináculo extensor.

Plano profundo a la fascia y al retináculo

Está constituido por los tendones de la región antebraquial posterior, que se dirigen a la mano y discurren envueltos en *vainas sinoviales independientes por las vainas fibrosas* que se forman entre el retináculo extensor y las extremidades distales del radio y del cúbito. Estos tendones, dispuestos en un plano aplicado sobre el esqueleto, son, de lateral a medial, los siguientes: **separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor del índice, extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo.**

Distalmente al retináculo, y en la parte lateral del dorso de la muñeca, se forma la **tabaquera anatómica, un espacio tendinoso triangular** que forma relieve bajo la piel. Está comprendida entre los tendones del separador largo y extensor corto por fuera y el tendón del extensor largo por dentro. El fondo corresponde al trapecio y está surcado por la **arteria radial**, que, a este nivel, emite la **arteria dorsal del carpo.**

Plano superficial

Junto a las venas superficiales caminan ramos nerviosos cutáneos: el **ramo superficial del nervio radial, el nervio cutáneo posterior del antebrazo y el ramo dorsal del cubital.**

MANO

(Figs. 23-13 a 23-15)

REGIÓN PALMAR

La palma de la mano es el conjunto de partes blandas dispuestas por delante de los metacarpianos y los espacios interóseos. La superficie de la palma de la mano está algo deprimida en el centro (huevo de la palma) y ligeramente elevada hacia los lados; lateralmente, la eminencia tenar, que corresponde a los músculos cortos del pulgar, y medialmente, la eminencia hipotenar, que corresponde a los músculos cortos del meñique.

Compartimientos de la región palmar

En la profundidad de la región palmar se dispone el **compartimiento interóseo formado por los metacarpianos, los músculos interóseos, y vasos y nervios.** Por delante de este espacio se encuentran los **compartimientos palmares**, los cuales están delimitados por las fascias de la palma de la mano, constituida por dos hojas, una superficial y otra profunda. La hoja profunda es la **fascia interósea palmar**, que recubre anteriormente el compartimiento interóseo. La hoja superficial, subcutánea, es muy fina a nivel de las eminencias tenar e hipotenar (**fascias palmares laterales**), pero




Figura 23-13. Corte transversal esquemático de la región de la mano, visión distal.




Figura 23-14. Representación esquemática de las fascias palmares tras abrir una amplia ventana en la piel.

es muy gruesa y singular en el hueso de la mano, donde forma la **aponeurosis palmar** (véase Fig. 23-14).

De las zonas de unión entre la aponeurosis palmar y las fascias palmares laterales parten hacia la profundidad dos

tabiques fibrosos. El **tabique palmar lateral** se desprende del borde lateral de la aponeurosis palmar, se dirige hacia el primer metacarpiano y da una fina expansión fibrosa hacia el tercero, recubriendo al músculo aductor corto del pulgar. El tabique contornea medialmente los músculos tenares pasando entre el flexor corto del pulgar y el flexor largo del pulgar envuelto en su vaina sinovial.

El **tabique palmar medial** se desprende del borde medial de la aponeurosis palmar, contornea lateralmente los músculos hipotenares y termina en el quinto metacarpiano.

Los tabiques fibrosos delimitan tres **compartimientos palmares: tenar, palmar medio e hipotenar**.

Compartimiento palmar medio

Límites: *anteriormente*, la aponeurosis palmar; *posteriormente*, la fascia interósea profunda; *lateralmente*, el tabique palmar lateral; *medialmente*, el tabique palmar medial.

Este compartimiento está, a su vez, dividido por un delgado septo fibroso, el **tabique palmar intermedio**, en dos zonas virtuales de naturaleza celulosa. La zona medial es el **espacio mediopalmar** y la zona lateral el **espacio tenar** (que no debe confundirse con el compartimiento tenar). Los espacios medio palmar y tenar (véase Fig. 23-15) se prolongan distalmente en torno a los tendones de los músculos lumbricales (*prolongaciones o conductos lumbricales*). El **tabique palmar intermedio** se desprende de la superficie profunda de la aponeurosis palmar, pasa medialmente a los tendones del dedo índice de los flexores de los dedos y termina en el tercer metacarpiano fusionado con la fascia




Figura 23-15. Proyección de los espacios celulosos o fasciales del compartimiento medio de la mano.

que cubre el músculo aductor corto del pulgar. Este tabique tiene muy poca consistencia anatómica, pero en casos de infecciones de la palma de la mano los espacios virtuales que delimita se hacen reales en la contención y dirección de las secreciones purulentas.

Contenido (véase Cap. 8, Figs. 8-97 y 8-98, y Cap. 16, Figs. 16-16 a 16-18): en un **primer plano superficial**, subyacente a la aponeurosis palmar, se encuentran los vasos y nervios del compartimiento. El **arco palmar superficial** cruza la región emitiendo distalmente las **arterias digitales palmares comunes**. El **nervio mediano** sale del túnel carpiano y emite los **nervios digitales palmares** en posición dorsal con respecto al arco palmar superficial. Nada más entrar en la región, da el **ramo tenar**, que atraviesa el tabique fibroso lateral y pasa a inervar algunos músculos de la eminencia tenar. El **ramo superficial del nervio cubital** penetra en la mano por la eminencia hipotenar, pero su rama, el **nervio digital palmar común del cuarto espacio**, desciende bajo la aponeurosis palmar. Una anastomosis entre el mediano y el cubital puede estar presente.

En un **segundo plano** se disponen los **tendones flexores** y los **músculos lumbricales**, ocupando casi todo el espacio. Los flexores superficiales y profundos de los dedos están envueltos en la **vaina tendinosa común**, la cual se continúa con la vaina digital del quinto dedo (vaina digitocarpiana medial). La vaina tendinosa común de los flexores emite prolongaciones entre los tendones flexores (prolongaciones pretendinosa, intertendinosa y retrotendinosa). Los tendones flexores profundos tienen asociados los cuatro músculos lumbricales, que reciben sus correspondientes ramas nerviosas. Por la parte más externa del espacio, junto al compartimiento tenar discurre el **tendón del flexor largo del pulgar**, recubierto de su vaina sinovial que se continúa en el dedo pulgar (vaina digitocarpiana lateral).

Compartimiento tenar

Este compartimiento contiene los músculos cortos del pulgar con excepción del aductor corto, que, como ya hemos indicado, ocupa un espacio propio.

Los músculos se organizan en dos planos. El **plano superficial** lo forma el **músculo abductor corto del pulgar**. El **plano profundo** lo constituyen los músculos **oponente del pulgar**, por fuera, y **flexor corto del pulgar**, por dentro.

La **arteria palmar superficial**, procedente de la radial, desciende en posición subcutánea o atraviesa el músculo abductor corto. El **ramo tenar del mediano** se distribuye por los músculos de la región.

Compartimiento hipotenar

Contiene los músculos cortos del dedo meñique. Profundamente, el **músculo oponente del meñique**, y en un plano superficial, y de medial a lateral, los músculos **abductor**

corto del meñique y **flexor corto del meñique**. Anteriormente a la delgada fascia hipotenar se encuentra el **músculo palmar corto**.

La **arteria palmar profunda**, rama de la cubital, penetra entre los músculos hipotenares y perforando los tabiques conectivos pasa al compartimiento interóseo para formar el arco palmar profundo. El **ramo profundo del nervio cubital** se distribuye por los músculos de la región y pasa al compartimiento interóseo en compañía del arco palmar profundo.

Compartimiento interóseo

(véase Cap. 8, Fig. 8-98, y Cap. 16, Fig. 16-18)

Contiene, en el primer espacio, el **músculo interóseo dorsal del primer espacio**, que está atravesado por la arteria radial; en el resto de los espacios interóseos se encuentran los **interóseos ventrales y dorsales correspondientes**. Por delante de los interóseos de los dos primeros espacios está el músculo aductor corto del pulgar, el cual, debido a la disposición de los tabiques fibrosos y las fascias, ocupa un compartimiento propio (**compartimiento aductor**).

El **arco palmar profundo** y el **ramo profundo del cubital** se sitúan por delante de los músculos y por detrás de la fascia interósea palmar, y emiten, respectivamente, las arterias metacarpianas palmares y los nervios para los interóseos, el aductor corto del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar.

REGIÓN DORSAL DE LA MANO

Es el espacio situado por detrás de los metacarpianos y los espacios interóseos. La **fascia dorsal de la mano** permite distinguir un plano superficial y un plano profundo.

Plano superficial

Carece de panículo adiposo. En el tejido celular subcutáneo se dispone una **red venosa** y los **ramos cutáneos de los nervios radial y cubital**.

Plano subfascial

(véase Cap. 8, Fig. 8-99, y Cap. 16, Fig. 16-21)

Entre la fascia y el compartimiento interóseo hay una capa de tejido celular muy laxa por donde discurren los **tendones extensores de los dedos** y, lateralmente, los **tendones del dedo pulgar** según la disposición que se observa en la **figura 23-13**. La **arteria radial**, al salir de la tabaquera anatómica, perfora la parte superior del primer espacio interóseo. Las tres **arterias metacarpianas dorsales** (ramas de la red carpiana dorsal) y la **arteria metacarpiana dorsal del primer espacio** (rama de la radial) descienden parcialmente cubiertas por los tendones.

Anatomía topográfica de la extremidad inferior

- CADERA
- MUSLO
- RODILLA

- PIERNA
- PIE

CADERA

La cadera establece la unión entre la pelvis y la extremidad inferior. Topográficamente está formada por la **región glútea** y la denominada **región de la cadera**, la cual incluye la **articulación coxofemoral** y las formaciones laterales a la misma comprendidas entre el trocánter mayor y la cresta ilíaca. Consideraremos la región glútea.

REGIÓN GLÚTEA

(Fig. 24-1)

La región glútea comprende el conjunto de partes blandas que cubren por detrás la pelvis y la articulación de la cadera.

Límites: *superior*, la cresta ilíaca; *inferior*, el surco glúteo; *medial*, el borde lateral del sacro y del cóccix; *lateral*, una línea vertical que pase por el trocánter mayor.

El abombamiento característico de la región viene determinado por el músculo glúteo mayor y el panículo adiposo que lo recubre. La disposición de la grasa glútea es un rasgo sexual; la cantidad de grasa es mayor en la mujer, en la que aumenta con la edad. El pliegue glúteo no coincide con el borde inferior del músculo glúteo mayor, que queda más arriba; corresponde a adherencias fibrosas entre la dermis y la fascia glútea a través del panículo adiposo.

La región descansa anteriormente sobre un **plano osteoarticular con dos zonas diferentes: una superolateral** formada por la fosa ilíaca externa y la articulación de la cadera, y una zona inferomedial comprendida entre el borde posterior del coxal y la columna ósea sacrococcígea. En esta última se encuentran las comunicaciones con los espacios de la pelvis y está tabicada por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso en los **orificios isquiáticos mayor y menor**.

La **fascia glútea** (véase Cap. 6, Figs. 6-15 a 6-19) tapiza dorsalmente los músculos glúteos. Se inserta en la cresta ilíaca y en el sacro, y lateralmente se continúa con la fascia lata.

Plano subfascial

Está constituido por dos planos musculares, uno superficial y otro profundo.

El **plano superficial** lo forma, en gran parte, el **músculo glúteo mayor**; el **músculo glúteo mediano**, que está cubierto por el glúteo mayor, sobresale de éste en la parte superolateral de la región. La porción de fascia glútea que recubre el músculo glúteo mediano es muy tendinosa y resistente. En el borde inferior del glúteo mayor, la fascia glútea se refleja para tapizar la cara profunda del músculo encerrándolo en un compartimiento. Debajo del glúteo mayor se encuentran algunas bolsas sinoviales. Las más relevantes son la **bolsa trocantérea del glúteo mayor**, entre este músculo y el trocánter mayor, y la **bolsa isquiática del glúteo mayor**, entre el músculo y la tuberosidad isquiática.

El **plano profundo** está formado por los **músculos pelvi-trocantéreos**, que se disponen junto a la articulación de la cadera. De superior a inferior son el **músculo glúteo inferior**, el **músculo piriforme**, el **músculo obturador interno** con sus **músculos géminos** asociados, el **músculo cuadrado femoral** y el **músculo obturador externo**. Este último es anterior al cuadrado femoral. En la zona inferior de la región está el origen de los músculos isquiotibiales. El músculo piriforme, al salir por el agujero isquiático mayor, lo divide en **hendidura o agujero suprapiriforme** y **agujero o hendidura infrapiriforme**.

Entre los dos planos musculares se forma el **espacio celuloso subglúteo, ocupado por tejido conectivo laxo** y los paquetes vasculonerviosos de la región.

El espacio subglúteo está cerrado superolateralmente; inferiormente se continúa con el espacio celuloso de la región femoral posterior; medialmente, a través de los agujeros isquiáticos mayor y menor, está en continuidad con el tejido conectivo de la pelvis y del periné.

Paquetes vasculonerviosos

(véase Cap. 8, Fig. 8-78, y Cap. 16, Fig. 16-32)

Se pueden distinguir dos paquetes vasculonerviosos: superior e inferior.

El **paquete vasculonervioso superior** está formado por la **arteria glútea superior**, las venas correspondientes y el **nervio glúteo superior**. Pasan por la hendidura suprapiriforme y caminan entre los glúteos mediano y menor.

El **paquete vasculonervioso inferior** es más complejo. Consta de un pedículo lateral y un pedículo medial que aparecen en la región por la hendidura infrapiriforme.




Figura 24-1. Corte transversal esquemático del muslo por el triángulo femoral, visión distal.

El **pedículo lateral** lo forman el **nervio ciático** (estructura fundamental de la región), los **nervios glúteo inferior y cutáneo femoral posterior**, y la **arteria glútea inferior** en compañía de sus venas satélites. El nervio ciático es el elemento más lateral del pedículo y desciende por detrás del obturador interno y del cuadrado femoral, cubierto por el glúteo mayor.

El **pedículo medial** está constituido por el **nervio pudendo** y los **vasos pudendos internos**, los cuales contornean en seguida la espina ciática y el ligamento sacroespinoso y pasan a la fosa isquioanal por el agujero isquiático menor abandonando la región glútea.

Plano superficial

El panículo adiposo está tabicado en pequeños cúmulos por numerosos tractos conectivos que se extienden desde la dermis a la fascia glútea. Por este panículo caminan numerosas ramas nerviosas cutáneas. Medialmente, los **ramos dorsales de los nervios sacros**; superiormente, los **ramos clúneos superiores de los nervios lumbares**; inferiormente (bajo el pliegue glúteo), los **ramos clúneos inferiores del cutáneo femoral posterior**, los **ramos perineales** y el **nervio cutáneo perforante**; lateralmente, el **ramo cutáneo lateral del nervio iliohipogástrico**.

Sobre la inserción del músculo glúteo mayor en el trocánter mayor se encuentra la **bolsa subcutánea trocantérea**.

MUSLO

El muslo se divide en tres regiones topográficas: triángulo femoral, región femoral anterior y región femoral posterior.

TRIÁNGULO FEMORAL

(Figs. 24-2 y 24-3; véase Fig. 24-1)

El triángulo femoral (**triángulo de Scarpa**) es una zona triangular de la parte superior y medial de la cara anterior del muslo.

Límites: *superior o base* del triángulo, ligamento inguinal; *lateral*, músculo sartorio; *medial*, músculo aductor largo; *inferior o vértice*, contacto de los bordes de los músculos sartorio y aductor largo.

El **suelo del triángulo inguinal** lo forman los **músculos iliopsoas (lateralmente) y pectíneo (medialmente)**. Es acanalado, pues sobre él se apoyan los vasos femorales.

Este suelo muscular separa el triángulo de la **articulación de la cadera**.

La superficie anterior del triángulo está cubierta por la **fascia lata (véase Cap. 6)**, la cual determina la separación entre el plano profundo del triángulo y el plano superficial. En la zona próxima al ligamento inguinal, la fascia lata presenta una dehiscencia ovalada denominada **hiato safeno**, por donde la vena safena mayor atraviesa para unirse a la vena femoral. En el hiato safeno la fascia es más delicada y



Figura 24-2. Sección transversal a nivel del triángulo femoral. 1: Fémur. 2: Isquion. 3: Músculo obturador interno. 4: Músculo glúteo mayor. 5: Músculo tensor de la fascia lata. 6: Músculo recto femoral. 7: Músculo sartorio. 8: Músculo iliopsoas. 9: Músculo pectíneo. 10: Nervio femoral. 11: Arteria femoral. 12: Vena femoral. Flecha: nervio ciático.



Figura 24-3. Resonancia magnética axial de densidad protónica con supresión grasa de la raíz del muslo. 1: Fémur. 2: Músculo vasto lateral. 3: Músculo tensor de la fascia lata. 4: Músculo recto femoral. 5: Músculo sartorio. 6: Músculo iliopsoas. 7: Isquion. 8: Músculo obturador externo. 9: Músculo glúteo mayor. 10: Vasos femorales. 11: Vena safena mayor. 12: Nervio ciático. 13: Músculo cuadrado femoral. 14: Tendones de la musculatura isquiocrural. Flecha: tracto iliotibial.

presenta numerosos orificios pequeños (**fascia cribiforme**) para el paso de vasos linfáticos.

Plano subfascial

Contenido (véase Cap. 8, Figs. 8-104 y 8-105, y Cap. 16, Fig. 16-28): la arteria femoral es el elemento eje del triángulo, al que atraviesa desde la parte externa de la laguna vascular hasta el vértice. Medialmente a la arteria se encuentra la vena femoral y lateralmente se dispone el nervio femoral. En su trayecto emite la arteria femoral profunda y otras colaterales (véase más adelante).

La **vena femoral asciende desde el vértice del triángulo** y pasa a la pelvis por la laguna vascular para continuarse con la vena ilíaca externa.

En la parte superior de la región, la arteria y la vena están rodeadas por la **vaina femoral**, una **envoltura conectiva** en forma de embudo con la base en la laguna vascular. La vaina femoral es continuidad del tejido conectivo de las paredes abdominal y pélvica, y distalmente se continúa con la adventicia de los vasos femorales. En el interior de la vaina, medialmente a la vena femoral, se encuentra un conducto estrecho, el **conducto femoral**, ocupado por vasos linfáticos y, en numerosas ocasiones, por un ganglio linfático inguinal profundo. A nivel de la laguna vascular, lateralmente al ligamento lagunar, el conducto femoral está parcialmente cerrado por un delicado tabique conectivo, el **septo femoral**, el cual es atravesado por vasos linfáticos profundos.

La **arteria femoral profunda** desciende por detrás de la femoral y abandona el triángulo femoral pasando entre el pectíneo y el aductor largo. La **arteria circunfleja medial** sale del triángulo entre el iliopsoas y el pectíneo para adosarse al cuello quirúrgico del fémur. La **arteria circunfleja lateral** se dirige hacia fuera sobre el iliopsoas entre las ramas del nervio femoral.

El **nervio femoral penetra en el triángulo femoral** por la laguna muscular envuelto en la fascia del iliopsoas; desciende en posición inmediatamente lateral con respecto a la vaina femoral y emite sus ramas motoras y cutáneas. Una de sus ramas, el **nervio safeno**, es satélite de la arteria femoral, disponiéndose por fuera de ella.

El **ramo femoral del nervio genitofemoral** se dispone, en la parte superior de la región, por delante de la arteria femoral, en el interior de la vaina vascular; en seguida perfora la vaina y la fascia cribiforme y se hace superficial para la piel de la región.

Plano superficial

Por la tela subcutánea (fascia superficial) discurre la **vena safena mayor en dirección ascendente hacia el hiato safeno**. Recibe las **venas pudendas externas** y la **vena epigástrica superficial**. Los **ganglios linfáticos inguinales superficiales**, en número muy variable, se disponen inferiormente al ligamento inguinal y junto a la vena safena mayor. Las ramas superficiales de la arteria femoral perforan la fascia lata en diversos puntos: **arterias pudendas externas**,

arteria circunfleja iliaca superficial y arteria epigástrica superficial.

REGIÓN FEMORAL

(Figs. 24-4 a 24-6)

Límites: superior, un plano horizontal que pase por el vértice del triángulo femoral y por el surco glúteo; inferior, un plano horizontal que pase a unos 3 cm por encima de la rótula.

En general, ofrece el aspecto de un cono truncado que se adelgaza en sentido distal. En un corte transversal se observa el **eje óseo central formado por la diáfisis del fémur**. Las masas musculares que lo rodean están mantenidas por la fascia lata, la cual la separa de los planos superficiales.

La fascia lata está reforzada lateralmente por el tracto iliotibial. De su cara profunda parten dos tabiques hacia la línea áspera del fémur: el tabique intermuscular lateral, que pasa por detrás del vasto lateral, y el tabique intermuscular medial, que pasa por detrás del vasto medial y por delante de los músculos aductores. Se forman así **dos compartimientos femorales: uno que se dispone por delante de los tabiques y comprende casi toda la diáfisis femoral y los músculos extensores, y otro posterior que integra los músculos isquiotibiales y aductores**. Sin embargo, es preferible considerar los músculos aductores, que forman el grupo muscular medial del muslo, dentro del comparti-

miento femoral anterior por dos razones: en primer lugar, porque el denominado tabique intermuscular medial es una lámina extraordinariamente delgada y de escasa significación, y en segundo lugar, porque la vía quirúrgica para llegar a los aductores y a la arteria femoral profunda es siempre anterior.

Así pues, consideraremos que la región femoral está dividida en una **región femoral anterior y otra posterior** por un plano que pase por el tabique intermuscular lateral, la línea áspera y la superficie posterior del músculo aductor mayor.

Región femoral anterior

Plano subfascial

Bajo la fascia lata hay un grupo muscular anterior y otro medial, separados entre ellos por el fino tabique intermuscular medial. En esta región se forma el conducto de los aductores, por el que discurren los vasos femorales y algunos nervios.

El **grupo muscular anterior** está formado por el **músculo cuádriceps** y el **músculo sartorio**. El cuádriceps cubre como una capa el cuerpo del fémur. El sartorio ocupa una posición más medial y superficial y está envuelto en una vaina fascial independiente por desdoblamiento de la fascia lata. Cruza la región oblicuamente haciéndose progresivamente más medial a medida que desciende; por




Figura 24-4. Corte transversal esquemático del muslo por el tercio medio, visión distal.




Figura 24-5. Sección transversal del muslo. F: Fémur. 1: Músculo vasto lateral. 2: Músculo vasto intermedio. 3: Músculo recto femoral. 4: Músculo vasto medial. 5: Músculo sartorio. 6: Músculo aductor largo. 7: Músculo grácil. 8: Músculo aductor mayor. 9: Músculo semimembranoso. 10: Músculo semitendinoso. 11: Músculo bíceps femoral. 12: Nervio safeno. 13: Arteria femoral. 14: Vena femoral. 15: Nervio ciático. 16: Vasos femorales profundos. Flecha: fascia lata.




Figura 24-6. Resonancia magnética axial de densidad protónica con supresión grasa del tercio medio del muslo. 1: Fémur. 2: Músculo vasto lateral. 3: Músculo vasto intermedio. 4: Músculo recto femoral. 5: Músculo vasto medial. 6: Músculo sartorio. 7: Músculo aductor largo. 8: Músculo aductor mayor. 9: Músculo semimembranoso. 10: Músculo semitendinoso. 11: Músculo bíceps femoral. 12: Nervio ciático. 13: Vasos femorales en el conducto de los aductores. 14: Vena safena mayor.

arriba se continúa formando el límite externo del triángulo femoral.

El **grupo muscular medial** lo forman los **músculos aductores** y el **músculo grácil**. Los aductores se disponen, de adelante a atrás, en tres planos: aductor largo, aductor corto y aductor mayor. En la parte inferior de la región, entre las inserciones femorales del músculo aductor mayor, se forma el **hiato tendinoso del aductor**, puerta de acceso a la región poplítea.

Entre el cuádriceps y los aductores se establece un canal que el músculo sartorio transforma en conducto, es el **conducto de los aductores**. El conducto se abre superiormente al vértice del triángulo femoral y caudalmente al hiato tendinoso del aductor. En un corte transversal se aprecian bien sus paredes: **anteromedialmente**, el músculo sartorio; **anterolateralmente**, el músculo vasto medial; **posteriormente**, los músculos aductores y el tabique intermuscular medial. La porción inferior del conducto de los aductores está reforzada por la **fascia vastoaductora**. Se trata de una lámina tendinosa resistente que se extiende, bajo el músculo sartorio, desde el músculo vasto medial al tendón del aductor mayor. A esta zona del conducto aductor se la denomina **canal de Hunter**.

Contenido: la **arteria femoral** y la **vena femoral** están envueltas en una adventicia común. De superior a inferior, la arteria gira por delante de la vena, de modo que a la entrada del conducto es anterolateral a la vena y a la salida se sitúa medialmente a ella. El **nervio safeno** desciende por delante de la arteria femoral hasta que perfora la fascia vastoaductora. El **ramo para el vasto medial** del nervio del cuádriceps desciende por fuera del paquete vascular.

Plano superficial

En el tejido subcutáneo se encuentran venas tributarias de la **vena safena mayor**, que asciende por la parte medial de la región, y ramos nerviosos cutáneos. Estos últimos son ramos del **nervio cutáneo femoral lateral**, los **ramos cutáneos anteriores del nervio femoral** (algunos perforan el sartorio) y el **ramo cutáneo del nervio obturador**, que aparece entre los músculos aductor largo y grácil. Bajo el sartorio se forman anastomosis nerviosas (**plexo subsartorial**).

Región femoral posterior

Plano subfascial

(véase Cap. 16, Fig. 16-33)

La región está recorrida por las masas alargadas de los **músculos isquiotibiales**. Con excepción de la porción corta del bíceps femoral, ninguno de estos músculos se inserta en el fémur. Se organizan en dos grupos musculares. El **grupo lateral** lo forma el **bíceps femoral**; la porción corta es profunda con respecto a la porción larga. El **grupo medial** está constituido por los **músculos semimembranoso y semitendinoso**; se dispone este último

en posición posterior. Ambos grupos musculares están en contacto en la parte superior del muslo, pero, a medida que descienden, se van separando como las ramas de una horquilla.

Entre los músculos isquiotibiales por detrás y el músculo aductor mayor por delante se forma una *capa celuloadiposa* que sirve de espacio de deslizamiento al *paquete vasculonervioso de la región*. Sin duda, la formación más importante de este paquete es el **nervio ciático**, el cual, como ya sabemos, puede encontrarse desdoblado ya en sus dos ramas (nervios tibial y peroneo) a nivel de esta región, incluso a la salida de la pelvis. El nervio está acompañado por una *cadena arterial* resultado de la anastomosis entre las arterias perforantes, la arteria circunfleja medial y la arteria glútea inferior. Dos cadenas venosas muy finas y plexiformes acompañan a las arterias.

Inmediatamente subyacente a la fascia lata, entre ésta y los músculos más superficiales, desciende el **nervio cutáneo femoral posterior hasta el hueco poplíteo**.

Plano superficial

En el tejido subcutáneo se encuentran venas, como la vena safena accesoria y venas tributarias de la vena safena mayor, y finos ramos nerviosos procedentes del nervio cutáneo femoral posterior que perforan la fascia lata.

RODILLA

(Figs. 24-7 a 24-9)

En relación con la articulación de la rodilla se disponen dos regiones distintas: anterior (región anterior de la rodilla) y posterior (región posterior de la rodilla o fosa poplítea).

La **región anterior de la rodilla** corresponde a las formaciones de la cara anterior de la articulación, al tendón del cuádriceps y al ligamento rotuliano, y ha sido estudiada en el **capítulo 6 (Figs. 6-76 y 6-77)**. Nos ocuparemos aquí de la **región posterior o fosa poplítea**.

FOSA POPLÍTEA

Es el conjunto de partes blandas situadas por detrás de la articulación de la rodilla. Con la rodilla flexionada se aprecia bien su forma romboidal deprimida en el centro (**hueco poplíteo**) y bien delimitada por sus **límites musculares**.

Describiremos unos límites o paredes y un contenido.

Límites o paredes

Suelo o pared anterior. Constituye el plano profundo de la región y está formado por la **cara poplíteo del extremo distal del fémur**, la **cápsula de la rodilla** con los ligamen-




Figura 24-7. Corte transversal esquemático de la rodilla y de la región poplíteo.



Figura 24-8. Sección transversal a nivel de la articulación de la rodilla. 1: Rótula. 2: Extremidad inferior del fémur. 3: Ligamento colateral medial. 4: Músculo sartorio. 5: Músculo grácil. 6: Músculo semimembranoso. 7: Músculo semitendinoso. 8: Músculo gastrocnemio medial. 9: Músculo gastrocnemio lateral. 10: Ligamento colateral lateral. 11: Ligamento cruzado anterior. 12: Nervio peroneo. 13: Arteria poplítea. 14: Nervio tibial. 15: Músculo bíceps femoral.




Figura 24-9. Resonancia magnética axial de densidad protónica con supresión grasa de la interlínea articular de la rodilla. 1: Menisco medial. 2: Menisco lateral. 3: Ligamento cruzado posterior. 4: Tendón rotuliano. 5: Ligamento colateral medial. 6: Tendón grácil. 7: Tendón semimembranoso. 8: Músculo gastrocnemio medial. 9: Ligamento colateral lateral. 10: Retináculo rotuliano lateral. 11: Tendón bíceps femoral. 12: Músculo poplíteo. 13: Arteria poplítea. 14: Nervio tibial. 15: Cuerpo adiposo infrarotuliano. 16: Tendón semitendinoso. 17: Nervio peroneo.

tos posteriores y el **músculo poplíteo**. Entre el tendón del músculo y la articulación hay una bolsa serosa (**receso subpoplíteo**).

Límites laterales. Los músculos que delimitan la fosa se encuentran muy próximos entre sí, pero si se les tracciona hacia los lados se observa que dibujan un rombo de eje mayor vertical cuyos cuatro lados son los siguientes:

- **Superolateral:** **músculo bíceps femoral**.
- **Superomedial:** **músculos semimembranoso** (profundo) y **semitendinoso** (superficial).
- **Inferolateral:** **cabeza lateral del músculo gastrocnemio** y **músculo plantar**.
- **Inferomedial:** **cabeza medial del músculo gastrocnemio**.

Todos estos músculos tienen asociadas bolsas sinoviales que los separan de estructuras vecinas.

Pared posterior o techo. El **techo de la fosa poplítea** está formado por la fascia poplítea profunda y los planos superficiales de la región, constituidos por la piel y la fascia superficial poplítea.

La **fascia poplítea profunda** aísla el contenido de la región del plano superficial; en el centro, es muy fuerte y tendinosa; a los lados se adhiere a los músculos limítrofes, y en profundidad, emite dos tabiques sagitales que se dirigen hacia las líneas de bifurcación de la línea áspera.

La **fascia superficial (tejido subcutáneo)** contiene grasa, la terminación de la **vena safena menor** y ramos del **nervio cutáneo femoral posterior**. A este nivel, la vena safena menor perfora la fascia profunda y se une a la vena poplítea.

La región tiene dos puertas de acceso o comunicación: por arriba, el **hiato tendinoso aductor**, que comunica con el conducto de los aductores, y por abajo, el **arco tendinoso del sóleo**, que da paso a la región posterior de la pierna.

Contenido

(véase Cap. 8, Fig. 8-109, y Cap. 16, Fig. 16-34)

La fosa poplítea contiene abundante grasa entre la que discurren importantes vasos y nervios.

El elemento **eje** es la **arteria poplítea**, que se dirige oblicua hacia abajo y hacia fuera. Da las **arterias articulares (superiores, media e inferiores)** de la rodilla y las **arterias surales** para el músculo gastrocnemio.

Posterolateralmente a la arteria se dispone la **vena poplítea**, que recibe, hacia la parte media del trayecto, la desembocadura de la **vena safena menor**. Arteria y vena están envueltas en una densa vaina vascular.

Los **ganglios linfáticos poplíteos** se disponen a lo largo de los vasos.

El **nervio ciático** se divide en tibial y peroneo. El **nervio tibial**, vertical, va de vértice a vértice del rombo en posición posterolateral a la vena poplítea. Da ramos motores para el tríceps sural y el poplíteo, y el **nervio sural**. El **nervio peroneo** se aleja del paquete vascular y desciende medialmente al tendón del músculo bíceps femoral. Emite el **nervio cutáneo sural lateral** y el **ramo comunicante peroneo**, que descienden sobre la cabeza lateral del gastrocnemio.

PIERNA

(Figs. 24-10 a 24-12)

Límite superior: un plano horizontal por debajo de la articulación de la rodilla (tuberosidad anterior de la tibia).

Límite inferior: un plano horizontal por encima de los maléolos. El esqueleto de la pierna lo constituyen la tibia y el peroné unidos por la membrana interósea. La **fascia profunda de la pierna** contornea los músculos de la pierna y se inserta en los bordes anterior y medial de la tibia, dejando libre la cara anteromedial de la diáfisis tibial. La fascia es muy tendinosa en la porción superior de la pierna, sirviendo de inserción a algunos músculos del compartimiento anterior. Distalmente, la fascia presenta una serie de reforzamientos (retináculos) para sujetar el paso de los tendones al pie. De la superficie profunda de la fascia parten dos tabiques intermusculares hacia el peroné. El **tabique intermuscular anterior** se inserta en el borde anterior del peroné y el **tabique intermuscular lateral** lo hace en el borde posterior. De este modo se organizan tres compartimientos crurales: **anterior, lateral y posterior**. Los **compartimientos anterior y lateral** conforman la **región anterior** de

la pierna, y el **compartimiento posterior**, la **región posterior** de la pierna.

REGIÓN ANTERIOR DE LA PIERNA

Es el conjunto de estructuras situadas por delante del esqueleto de la pierna (tibia y peroné), la membrana interósea y el tabique intermuscular lateral.

Plano subfascial

Como se ha mencionado anteriormente, esta región está dividida por el tabique intermuscular anterior en un compartimiento lateral y un compartimiento anterior.

Compartimiento anterior

Está ocupado por músculos extensores. El **músculo tibial anterior** es el más medial, junto a la tibia; el **extensor largo de los dedos** es el más lateral, junto al tabique intermuscular anterior; el **extensor largo del dedo grueso** queda cubierto parcialmente entre los dos anteriores hasta el extremo distal de la pierna; el **músculo peroneo tercero** ocupa únicamente el tercio distal del compartimiento, lateralmente al extensor largo de los dedos.




Figura 24-10. Corte transversal esquemático de la pierna por el tercio medio, visión distal.




Figura 24-11. Sección transversal de la pierna. 1: Tibia. 2: Peroné. 3: Músculo gastrocnemio medial. 4: Músculo gastrocnemio lateral. 5: Músculo sóleo. 6: Músculo tibial posterior. 7: Músculo tibial anterior. 8: Músculo extensor largo del dedo grueso. 9: Músculo extensor largo de los dedos. 10: Músculo peroneo largo. 11: Nervio tibial. 12: Arteria tibial posterior. 13: Arteria tibial anterior. 14: Nervio peroneo profundo. 15: Nervio peroneo superficial. 16: Vena safena menor. 17: Vena safena mayor. Flecha: membrana interósea.

Paquete vasculonervioso anterior

(véase Cap. 8, Fig. 8-111, y Cap. 16, Fig. 16-35)

El nervio peroneo profundo, la arteria tibial anterior y sus venas satélites descienden por delante de la membrana inter-




Figura 24-12. Resonancia magnética axial de densidad protónica con supresión de grasa del tercio medio de la pierna. 1: Tibia. 2: Peroné. 3: Músculo tibial anterior. 4: Músculo extensor largo de los dedos. 5: Músculo extensor largo del dedo gordo. 6: Músculo peroneo corto. 7: Músculo peroneo largo. 8: Músculo tibial posterior. 9: Músculo gastrocnemio lateral. 10: Músculo flexor largo del dedo gordo. 11: Músculo sóleo. 12: Músculo gastrocnemio medial. 13: Vasos y nervios tibiales anteriores. 14: Vasos y nervios peroneos. 15: Vasos y nervios tibiales posteriores.

ósea cubiertos por los músculos del compartimiento. El **nervio peroneo profundo** se desprende del nervio peroneo cuando éste contornea el cuello del peroné, entra en la región anterior de la pierna atravesando las fibras del músculo extensor largo de los dedos y se sitúa lateralmente a la arteria tibial anterior. Da ramos motores a los músculos del compartimiento.

La **arteria tibial anterior** se desprende de la poplítea a nivel del arco del sóleo y entra en la región inmediatamente por encima de la membrana interósea. En la parte superior emite las **arterias recurrentes tibiales anterior y posterior**, y en la parte inferior, **ramas maleolares**.

Compartimiento lateral

(véase Cap. 16, Fig. 16-35)

Este compartimiento, comprendido entre los tabiques intermusculares, está ocupado por los músculos peroneos. El **músculo peroneo largo** cubre lateralmente al **músculo peroneo corto**.

El **nervio peroneo** entra en la parte superior de la región por fuera del cuello del peroné entre las inserciones del músculo peroneo largo y se divide en peroneo profundo y peroneo superficial. El nervio peroneo profundo abandona inmediatamente el compartimiento lateral para pasar al compartimiento anterior, como ya se ha mencionado. El **nervio peroneo superficial** desciende entre los **músculos peroneos**, a veces en el espesor del tabique intermuscular anterior; en la porción distal de la pierna perfora la fascia profunda y se hace superficial lateralmente al músculo extensor largo de los dedos. En su trayecto en la región da ramos a los músculos peroneos.

Plano superficial

El borde anterior de la tibia hace relieve en la parte medial de la región. Junto a una red venosa superficial discurre el **nervio sural lateral** y, en la porción distal, el **nervio peroneo superficial**.

REGIÓN POSTERIOR DE LA PIERNA

Está formada por el conjunto de estructuras situadas por detrás del esqueleto de la pierna, la membrana interósea y el tabique intermuscular lateral.

Plano subfascial

(véase Cap. 8, Fig. 8-112, y Cap. 16, Fig. 16-34)

Los músculos del compartimiento posterior se disponen en dos planos, superficial y profundo.

El **plano superficial** lo forma el **músculo tríceps sural**, dispuesto en dos capas. El **músculo gastrocnemio** se dispone superficialmente al **músculo sóleo**; el **músculo plantar** desciende entre ambos por la parte medial del espacio intermuscular. En la mitad inferior de la región los músculos convergen en el **tendón calcáneo**.

El **plano profundo** está constituido por tres músculos que, de lateral a medial, son los siguientes: **músculo flexor**

largo del dedo grueso, músculo tibial posterior y músculo flexor largo de los dedos.

Entre ambos planos musculares hay un *espacio celulodiposo* por el que discurren los elementos vasculares y nerviosos de la región.

La **arteria tibial posterior** continúa la poplítea bajo el arco tendinoso del sóleo en dirección al canal calcáneo interno. Cerca de su origen da la **arteria peronea**, que desciende lateralmente al tronco de la arteria tibial, a veces en el espesor del músculo flexor largo del dedo grueso. En la porción proximal da las **arterias circunfleja peronea** y **nutricia de la tibia**; en la porción distal emite **ramas maleolares y calcáneas**. Cada arteria se acompaña de dos venas profundas satélites.

El **nervio tibial**, que penetra en la región bajo el arco tendinoso del sóleo, desciende en compañía de la arteria tibial posterior, situándose lateralmente a ella. En la porción distal de la pierna se sitúa, siempre junto a la arteria, en posición medial al tendón calcáneo y entre los tendones de los flexores. Da ramos motores a los músculos profundos.

Plano superficial

Por el tejido subcutáneo ascienden las venas safenas. La **vena safena menor** por la parte posterior y la **vena safena mayor** por la parte medial, próxima a la tibia. Los ramos cutáneos de la región son los siguientes: el **nervio safeno** (rama del femoral), que desciende por la parte medial de la pierna en compañía de la vena safena mayor; el **nervio sural** (rama del tibial), que camina junto a la vena safena menor y que en la parte superior recibe la anastomosis

del **ramo comunicante peroneo**; el **nervio cutáneo sural lateral** (rama del peroneo), y, en la porción superior de la región, el **nervio cutáneo femoral posterior**. En parte de su trayecto, la vena safena menor y el nervio sural se encuentran en el espesor de la fascia profunda de la pierna.

PIE

(Fig. 24-13)

Las regiones del pie se organizan en torno a sus huesos y articulaciones. La **fascia profunda del pie** rodea los músculos del dorso y de la planta. Proximalmente se continúa con la fascia profunda de la pierna y con los retináculos del pie. La porción que rodea los músculos del dorso es la **fascia dorsal del pie** y la que envuelve los músculos de la planta se denomina **fascia plantar**, la cual, en la parte media, es muy resistente y gruesa (**aponeurosis plantar**).

El espacio comprendido entre el dorso de los huesos del pie y la fascia dorsal es la **región dorsal del pie**. El espacio comprendido entre la fascia plantar y los huesos del pie constituye la **región plantar**.

REGIÓN DORSAL

Plano subfascial

(véase Cap. 8, Fig. 8-113, y Cap. 16, Fig. 16-35)

Está constituido por los tendones de los dedos organizados en dos estratos. El *estrato profundo* lo constituye el **músculo extensor corto de los dedos** (músculo pedio). El *estrato*




Figura 24-13. Corte transversal esquemático del pie a nivel de los metatarsianos, visión distal.

superficial lo forman el **músculo extensor largo del dedo gordo** y los cuatro tendones del **músculo extensor largo de los dedos**. En la zona proximal del dorso se encuentran los **tendones del músculo tibial anterior**, en la parte medial, y del **tercer peroneo**, en la parte lateral.

Los tendones están inmersos en una fina capa de tejido celular muy laxa que facilita su deslizamiento. Los tendones extensores largos de los dedos están rodeados por desdoblamientos de la fascia dorsal.

La **arteria dorsal del pie** camina lateralmente al tendón del extensor largo del dedo gordo hasta el primer espacio interóseo, donde se divide en **arteria plantar profunda**, que pasa a la planta del pie, y **arteria metatarsiana dorsal del primer espacio**. Cerca de su origen da la **arteria arcuata**, de la que parten las **arterias metatarsianas dorsales**.

El **nervio peroneo profundo** aparece junto a la arteria dorsal del pie y da el **ramo lateral**, que discurre bajo el músculo pedio, y el **ramo medial**, que sigue sobre el primer espacio interóseo hacia la raíz de los dedos.

Plano superficial

Un tejido subcutáneo muy poco consistente contiene, bajo una piel muy fina, la **red venosa dorsal del pie** y algunas ramas nerviosas cutáneas: los **nervios cutáneo dorsal medial y cutáneo dorsal intermedio** (ramas terminales del peroneo superficial); el **cutáneo dorsal externo** (rama del sural) se distribuye por el borde externo del pie; existen ramos terminales del **nervio safeno** para el borde interno del pie.

REGIÓN PLANTAR

Al igual que en la palma de la mano, en la profundidad de la región plantar se encuentra el **compartimiento interóseo**, del que forman parte los metatarsianos, los músculos interóseos y vasos y nervios profundos. Este compartimiento está separado de los compartimientos plantares por una condensación de tejido conectivo, la **fascia interósea plantar**, que se extiende entre las superficies plantares de los metatarsianos.

Entre la fascia interósea plantar y la fascia plantar se disponen los **compartimientos plantares**.

De los márgenes de la parte media de la fascia plantar, es decir, de la aponeurosis plantar, parten dos tabiques fibrosos: el **tabique plantar medial** hacia el primer metatarsiano, la cuña medial y el navicular, y el **tabique plantar lateral** hacia el quinto metatarsiano y el ligamento plantar largo. Los tabiques fibrosos delimitan tres compartimientos plantares: **compartimiento plantar medial**, **compartimiento plantar medio** y **compartimiento plantar lateral**.

Compartimiento plantar medio

(véase Cap. 8, Fig. 8-115, y Cap. 16, Figs. 16-36 y 16-37)

Está delimitado superficialmente por la **aponeurosis plantar** (véase Cap. 6, Figs. 6-53, 6-104 y 6-105). Consta de tres planos musculares y un espacio vasculonervioso.

El **primer plano** muscular lo constituye el **músculo flexor corto de los dedos**, inmediatamente subyacente a la aponeurosis plantar.

El **segundo plano** lo forman, hacia atrás, el **músculo cuadrado plantar** y, más anteriormente, los **músculos flexor largo de los dedos y lumbricales**. El tendón del **flexor largo del primer dedo** ocupa primero una posición medial en este compartimiento, pero en seguida perfora el tabique fibroso medial y entra en el compartimiento plantar medial.

El **tercer plano** está formado por el **músculo aductor del dedo gordo** y, en la parte proximal, por el tendón del **peroneo largo** en su vaina fibrosa. El músculo aductor del dedo gordo está contenido en un espacio celoso que le separa de los tendones flexores largos y del compartimiento interóseo.

El **espacio vasculonervioso** se dispone entre el plano del flexor corto de los dedos y el segundo plano muscular. Por él transitan los nervios y arterias plantares.

La **arteria plantar lateral** y el **nervio plantar lateral** cruzan oblicuamente entre el cuadrado plantar y el flexor corto hasta la base del quinto metatarsiano, donde cambian de dirección y dan diversas ramas.

Las porciones distales de la **arteria plantar medial** y del **nervio plantar medial** transitan entre el borde medial de los músculos flexores de los dedos y el tabique fibroso medial que los separa del compartimiento medial.

Compartimiento plantar medial

Este espacio contiene los **músculos abductor del dedo gordo, flexor corto del dedo gordo** y la porción distal del **flexor largo del dedo gordo**. Entre ellos discurren las ramas de la **arteria plantar medial** y del **nervio plantar medial**.

Compartimiento plantar lateral

Contiene los **músculos abductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo** y, cuando existe, el **oponente del quinto dedo**. El abductor se sitúa junto al borde lateral del pie. Por este espacio caminan **ramos digitales de los vasos y nervios plantares laterales**.

Compartimiento interóseo

(véase Cap. 8, Fig. 8-115, y Cap. 16, Fig. 16-37)

Separado de la celda plantar media por la fascia interósea plantar, este compartimiento contiene los **músculos interóseos** de los cuatro espacios e importantes vasos y nervios.

El **arco plantar**, continuación de la arteria plantar lateral, cruza transversalmente entre la fascia y los metatarsianos. Emite cuatro **arterias metatarsianas plantares** que, junto a los músculos interóseos, van hacia la raíz de los dedos.

El **ramo profundo del nervio plantar lateral** acompaña al arco plantar y emite ramos motores para numerosos músculos cortos del pie.

Índice analítico

A

- Abdomen, 122
 - músculo recto, 122
 - pared
 - – anterolateral, 122
 - – posterior, 128

Absceso(s)

- anorrectal, 348
- parafaríngeo, 311
- perirrenales, 537
- retrofaríngeo, 311

Acalasia, 315

Acetábulo, 89, 248

Acoplamiento arteriovenoso, 368

Acromion, 144

Acueducto

- del caracol, 756
- del cerebro, 619
- endolinfático, 756
- de Falopio, 690
- de Hensen, 756
- reuniens, 756
- de Silvio, 619
- del vestíbulo, 755

Adenohipófisis, 605, 606

Adenoides, 311

Adenopatías

- cervicales, 443
- inguinales, 488

Aditus

– *ad antrum*, 749, 754

– laríngeo, 311

– *laryngis*, 503

Agammaglobulinemia, 601

Agenesia renal, 537

Agger nasi, 493

Agujero

- nutricio, 146
- yugular, 61
- ciego de la lengua, 298
- cigomaticofacial, 52
- cigomaticotemporal, 53
- espinoso, 61
- estilomastoideo, 690
- etmoidal anterior, 62
- incisivo, 50
- infraorbitario, 50

- infrapiriforme, 661
 - intervertebral, 629
 - magno, 35
 - mandibular, 54
 - mentoniano, 53
 - obturador, 90
 - oval, 44, 187, 189
 - rasgado, 47, 61
 - redondo, 44
 - sacros pélvicos, 74
 - suprapiriforme, 829
 - timpánico de Jacobson, 48
 - vertebral, 69, 70, 71, 72
 - yugular, 48, 63
- ### Ala(s)
- del sacro, 75
 - del vómer, 52
- ### Alopecia, 767
- ### Alvéolos, 489
- dentarios, 50, 287
- ### Ameloblastos, 286
- ### Amígdala(s), 307, 601
- faríngea, 310
 - lingual, 299
 - palatina, 310
 - tubárica, 310
- ### Amigdalitis, 311
- ### Ampolla
- del conducto
 - – deferente, 557
 - – lagrimal, 742
 - duodenal, 330
 - hepatopancreática, 331, 356
 - membranosa, 756
 - rectal, 345
 - de la trompa uterina, 576
 - de Vater, 331, 356
- ### Anastomosis, 397
- de las arterias
 - – coronarias, 397
 - – intercostales, 446
 - – lumbares, 446
 - arteriovenosas, 368
 - carotídeas, 431
 - extracardiácas, 397
 - portocavas, 463
 - subendocárdicas, 397
 - subepicárdicas, 397

Anatomía, 3

- causal, 3
 - clínica, 3
 - descriptiva, 3
 - evolutiva filogenética, 3
 - funcional, 3
 - humana, 3
 - regional, 3
 - topográfica, 3
 - – de la cabeza, 773
 - – del cuello, 773
 - – de la extremidad
 - – – inferior, 829
 - – – superior, 817
 - – del tronco, 787
- ### Anejos cutáneos, 765
- ### Aneurismas, 369, 410
- ### Anfiartrosis, 20
- ### Angiocardiógrafía, 402
- ### Angiografía, 8
- coronaria, 402
- ### Ángulo duodenoyeyunal, 806
- ### Anillo(s)
- del aductor, 232
 - epifisarios, 84
 - fibrocartilaginoso, 747
 - fibroso, 76, 380
 - inguinal
 - – profundo, 128
 - – superficial, 129
 - linfático de Waldeyer, 312
 - mitral, 381
 - tendinoso común, 672, 675
 - tricuspídeo, 380
 - de Vieussens, 376
- ### Ano contra natura, 348
- ### Antebrazo, 822
- músculos, 164
- ### Antehélix, 745
- ### Antitrigo, 745
- ### Antro
- mastoideo, 754
 - pilórico, 325
- ### Aorta, 403
- abdominal, 408
 - – ramas viscerales, 453
 - ascendente, 407
 - origen anómalo, 409
 - torácica, 408

- Aparato, 4
 - circulatorio, 4, 361
 - - funciones, 361
 - digestivo, 4, 279
 - genital, 4
 - lagrimal, 742
 - locomotor, 4, 11, 35, 67, 143
 - masticador, 284
 - reproductor, 4
 - - femenino, 571
 - - masculino, 551
 - respiratorio, 4, 489
 - urinario, 4, 529
 - yuxtaglomerular, 535
- Apéndice
 - epididimario, 554
 - testicular, 551
 - vermiforme, 340, 806
- Apendicitis, 343
- Apófisis, 69
 - alveolar, 49
 - articulares, 69
 - - inferiores, 69
 - - superiores, 69
 - cigomática, 50, 292
 - clinoides, 42
 - - anterior, 62
 - - posteriores, 42, 62
 - condilar, 54, 291
 - coracoides, 145
 - costiforme, 70
 - **crista galli, 40, 62**
 - esfenoidal, 51
 - espinosa, 69
 - estiloides, 61, 149, 153, 216
 - - del radio, 150
 - etmoidal, 52
 - frontales, 489
 - intrayugulares, 63
 - lagrimal, 52
 - mastoides, 61
 - maxilar, 52
 - muscular, 499
 - odontoides, 73
 - orbitaria
 - - externa, 39
 - - medial, 39
 - palatina, 49
 - piramidal, 51
 - pterigoides, 45
 - temporal, 53
 - transversas, 69
 - unciformes, 40, 70
 - vocal, 499
 - xifoides, 105
- Aponeurosis
 - del bíceps braquial, 163
 - cervical
 - - media, 120
 - - profunda, 121
 - - superficial, 120
 - de envoltura, 27
 - epicraneal, 697
 - de inserción, 27
 - lingual, 299
 - del oblicuo
 - - externo, 124
 - - interno, 125
 - palatina, 312
 - palmar, 181
 - plantar, 245
 - posterior del transverso, 125
 - del transverso, 125
- Arco(s)
 - acromiocracoeideo, 145
 - alveolar, 53
 - cigomático, 46
 - costales, 67, 140
 - cricoideo, 499
 - crural, 124
 - del cuadrado lumbar, 129
 - dentales, 287
 - del diafragma, 113
 - de Douglas, 122
 - femoral, 124
 - iliopectíneo, 124
 - palmares, 474
 - - profundo, 474
 - - superficial, 474
 - del pie, 276
 - plantar, 486
 - del psoas, 128
 - superciliares, 39
 - tendinoso
 - - del elevador del ano, 99
 - - del sóleo, 239
 - venoso
 - - interyugular, 440
 - - plantar, 487
 - vertebral, 69
- Área cribosa, 532
- Arenilla cerebral, 608
- Aréola mamaria, 586
- Arteria(s), 361, 363, 393
 - ácigos de la vagina, 459
 - acromiotorácica, 469
 - de Adamkiewicz, 446, 467
 - alveolar
 - - inferior, 290, 431
 - - superior
 - - - anteriores, 431
 - - - posterior, 431
 - anastomóticas, 364
 - angular, 425
 - apendicular, 452
 - arcuata, 486
 - ascendente, 453
 - auricular
 - - posterior, 427
 - - profunda, 429
 - axilar, 468
 - braquial, 470
 - bronquiales, 511
 - bucal, 431
 - del bulbo
 - - del pene, 457, 562
 - - peneano, 568
 - - del vestíbulo vaginal, 458
 - de calibre grande, 363
 - carótida
 - - común, 420, 421
 - - externa, 423
 - - - anastomosis, 431
 - - interna, 431
 - cecal
 - - anterior, 451
 - - posterior, 451
 - central de la retina, 433, 732, 737
 - cerebral
 - - anterior, 431
 - - posterior, 431
 - cervical
 - - ascendente, 437
 - - profunda, 437
 - cigomaticoorbitaria, 428
 - ciliares, 433
 - circunfleja
 - - de la escápula, 469
 - - femoral
 - - - medial, 480, 831
 - - - lateral, 480, 831
 - - humeral
 - - - anterior, 470
 - - - posterior, 470
 - - ilíaca
 - - - superficial, 482
 - - - profunda, 455
 - - peronea, 485
 - cólica
 - - derecha, 452
 - - izquierda, 453
 - - media, 452
 - del conducto
 - - deferente, 459, 558

- del conjunto
- - pterigoideo, 431
- coronarias, 393
- - anastomosis, 397
- - derecha, 396
- - estomáquica, 449
- - izquierda, 394
- cremastérica, 455, 558
- cubital, 472
- deferencial, 558
- descendente de la rodilla, 480
- diafragmática superior, 446
- diagonal izquierda, 394
- digital
- - dorsal para el flanco lateral del 5º dedo, 486
- - palmares
- - - propia del borde cubital del 5º dedo, 474
- - - propias, 474
- - - propias del pulgar, 475
- dorsal
- - del clítoris, 456
- - de la escápula, 437
- - de la nariz, 433
- - del pene, 456, 568
- - del pie, 485
- - elásticas, 363
- - enfermedades, 369
- - envejecimiento, 369
- - epifisarias, 19
- - epigástrica
- - - inferior, 444, 455, 468
- - - superficial, 482
- - - superior, 436, 444
- - esfenopalatina, 429
- - esplénica, 450
- - estilomastoidea, 428
- - etmoidal
- - - anterior, 434
- - - posterior, 434
- - facial, 425
- - faríngea ascendente, 425
- - femoral, 479
- - profunda, 480
- - fibras
- - - aferentes, 369
- - - eferentes, 369
- - - parasimpáticas
- - - - posganglionares, 369
- - - simpáticas vasodilatadoras, 369
- - frénicas
- - - inferiores, 446
- - - superiores, 446
- - funicular, 558
- - gástrica
- - - corta, 450
- - - derecha, 449
- - - izquierda, 449
- - - posterior, 450
- - gastroduodenal, 449
- - gastroepiploica, 450
- - - izquierda, 450
- - glútea
- - - inferior, 456
- - - superior, 458
- - gonadales, 453
- - hemorroidal
- - - inferior, 456
- - - media, 459
- - - superior, 453
- - hepática
- - - común, 449
- - - derecha, 449
- - - izquierda, 449
- - - propia, 449
- - hipofisaria inferior, 608
- - hipogástrica, 455
- - humeral, 470
- - ileal, 451
- - ileocólica, 451
- - ilíaca
- - - común, 454
- - - externa, 454
- - - interna, 455
- - iliolumbar, 458
- - infraorbitaria, 282, 431
- - infundibular
- - - derecha, 396
- - - izquierda, 394
- - intercostal
- - - anastomosis, 446
- - - posteriores, 444
- - - suprema, 437
- - intermesentérica, 453
- - interósea
- - - anterior, 473
- - - común, 473
- - - posterior, 473
- - interventricular
- - - anterior, 394
- - - posterior, 396
- - izquierda del cono arterial, 394
- - labiales
- - - inferior, 426
- - - superior, 426
- - lagrimal, 434
- - - inferior, 508
- - - superior, 508
- - del ligamento redondo, 455
- - lingual, 425
- - lumbares, 446
- - - anastomosis, 446
- - maleolar
- - - anterolateral, 484
- - - anteromedial, 484
- - - mamaria interna, 436
- - marginal, 452
- - maseterina, 431
- - maxilar, 428, 778
- - de mediano calibre, 363
- - meníngea
- - - anterior, 434
- - - media, 430
- - - - rotura, 443
- - - posterior, 425
- - mentoniana, 431
- - mesentérica
- - - inferior, 452
- - - superior, 450
- - metacarpianas palmares, 475
- - metafisarias, 19
- - metatarsianas dorsales, 486
- - musculares, 363
- - musculofrénica, 446
- - nasales laterales posteriores, 429
- - del nervio isquiático, 456
- - del nódulo sinusal, 396
- - nutricia, 19
- - - del húmero, 470
- - - del peroné, 485
- - - de la tibia, 485
- - obturatriz, 455
- - - accesoria, 455
- - occipital, 427
- - oftálmica, 432
- - ováricas, 454, 574, 581
- - palatina
- - - ascendente, 426
- - - descendente, 431
- - - mayor, 431
- - - menor, 431
- - palmar
- - - profunda, 474, 828
- - - superficial, 825, 828
- - pancreática
- - - dorsal, 450
- - - inferior, 450
- - - magna, 450
- - pancreaticoduodenales
- - - inferiores, 451
- - - superiores, 449
- - perforantes, 480
- - pericardiofrénica, 446
- - perineal, 456, 568
- - perióstica, 19
- - pilórica, 449
- - pineales, 608
- - plantares, 486
- - poplítea, 482
- - principal, 29
- - - del pulgar, 475
- - profunda
- - - del clítoris, 456

Arterial(s) (**cont.**)

- profunda
- del pene, 456, 568
- pudenda interna, 456
- pulmonar, 370, 415
- - derecha, 416
- - izquierda, 416
- radial, 471
- radicales, 444
- - mayor, 446, 467
- rectal
- - inferior, 456
- - media, 459
- - superior, 453
- recurrente cubital, 473
- renales, 453
- - supernumerarias, 453
- reparacion, 369
- retroduodenales, 449
- sacras laterales, 458
- sigmoideas, 453
- subclavia, 434, 783
- subcostal, 444
- subescapular, 469
- sublingual, 425
- submentoniana, 426
- supraduodenales superiores, 449
- supraescapular, 437
- supraorbitaria, 434
- suprarrenales
- - inferior, 453
- - medias, 453
- supratroclear, 434
- sural superficial, 483
- tarsiana
- - lateral, 486
- - mediales, 486
- temporal
- - media, 428
- - profunda, 431
- - superficial, 428
- terminales, 364
- testiculares, 454, 558
- tibial
- - anterior, 483
- - posterior, 484
- timpánica
- - anterior, 430
- - inferior, 425
- - posterior, 428
- - superior, 431
- tiroidea(s), 611
- - ima, 611
- - inferior, 436, 511, 611
- - superior, 424
- torácica
- - interna, 436
- - lateral, 469
- - superior, 469
- toracoacromial, 469
- toracodorsal, 469
- transversa del cuello, 437
- tubérica
- - lateral, 576
- - medial, 576
- umbilical, 458
- uretral, 457
- uterina(s), 459, 574, 581
- - lesiones, 468
- vaginal(es), 459, 581
- vertebral, 435
- vesical
- - inferior, 459
- - superior, 459
- vidiana, 431
- yeyunales, 451
- Arteriografía
- convencional, 8
- digital intravenosa, 8
- sustracción, 8
- Arteriolas, 363
- metarteriolas, 363
- terminales, 363, 365
- Articulación(es), 11, 20, 182
- abducción-aducción, 24
- acromioclavicular, 183
- anfiartrosis, 20, 21
- de las apófisis articulares, 77
- artografía, 25
- artrodis, 23, 24
- artroscopia, 25
- astragalocalcaneonavicular, 268
- atlantoaxial
- - lateral, 80
- - media, 80
- atlantoaxoideas, 80
- - lateral, 80
- - media, 80
- atlantooccipital, 80
- biaxiales, 24
- bisagras, 23
- de las cabezas de las costillas, 108
- carpometacarpiana, 205, 208
- de los cartílagos costales, 109
- de Chopart, 270
- cigapofisarias, 77
- de la cintura escapular, 182
- circunducción, 24
- del codo, 192
- condíleas, 23, 24
- condrocostales, 109
- coracoclavicular, 183
- costotransversaria, 108
- costovertebrales, 108
- coxofemoral, 247
- craneovertebral, 80
- cricoarritenoideas, 500
- cricotiroideas, 500
- de los cuerpos vertebrales, 75
- cuneocuboidea, 274
- del dedo pulgar, 208
- diartrodiales, 20, 23
- dinámica articular, 23
- - posición
- - - abierta, 23
- - - de cierre, 23
- enartrosis, 23, 24
- escapulohumoral, 186
- escapulotorácica, 183
- espaciales, 24
- esternoclavicular, 182
- esternocostales, 109
- exploración, 25
- flexoextensión, 24
- giros, 24
- glenohumeral, 186
- inervación, 24
- - sensitiva, 24
- intercarpianas, 200
- intercondrales, 109
- intercuneiformes, 274
- interfalángicas, 207, 209
- intermetacarpianas, 205
- intervertebrales, 75
- laríngeas, 500
- lineales, 24
- de Lisfranc, 274
- lumbosacra, 79
- de la mano, 199
- mediocarpiana, 201
- membrana sinovial, 22
- metacarpofalángicas, 206
- metatarsfalángicas, 275
- de la pelvis, 92
- planas, 23, 24
- radiocarpiana, 202
- radiocubitales, 198
- - distal, 198
- - proximal, 198
- radiología, 25
- resonancia magnética, 25
- de la rodilla, 255
- rotaciones, 24
- sacrococcígea, 78
- sacroilíaca, 92
- según su movilidad, 24
- separación-aproximación, 24
- en silla de montar, 23, 24
- sinartrosis, 20
- sinoviales, 20
- subastragalina, 270
- talocrural, 268
- tarsometatarsianas, 274

- temporomandibular, 290
- - disfunción, 297
- tibioperonea
- - distal, 266
- - proximal, 265
- tipos, 23
- del tórax, 107
- transversa del tarso, 270
- triaxiales, 24
- tridimensionales, 24
- trocelares, 23
- trochus, 23
- trocleares, 24
- trocoides, 23, 24
- de los últimos cuatro dedos, 205
- uncovertebrales, 77
- Artritis, 25
- Asa
 - de la calavera, 46; véase también **Arco cigomático**
- cervical, 118
- de Henle, 534
- de la subclavia, 719
- de Vieussens, 719
- Astas
 - del cóccix, 75
 - del sacro, 74
- Atelectasia, 524
- Atlas, 72, 85
- Atrio, 370, 493; véase también **Aurícula**
- Atriopeptinas, 371, 385
- Aurícula(s), 361, 370, 375
 - derecha, 375, 404
 - interconexiones, 386
 - izquierda, 377, 404
- Autotolerancia, 591
- Axila, 161, 468, 817
- Axis, 85
- Axón, 620

B

- Balanitis, 567
- Balanopositis, 567
- Banda
 - moderadora, 378; véase también **Trabécula septomarginal**
- del seno, 376
- Barrera hematotímica, 596
- Bartolinitis, 586
- Base del cráneo, 62
- Bazo, 596, 802
 - accesorio, 598
 - ectópico, 598
 - inervación, 600
 - rotura, 602
 - vascularización, 599

- Boca, 279, 281, 283
 - paladar, 283
 - suelo, 283
- Bolsa(s)
 - escrotal, 562
 - omental, 804
 - periarticulares, 189
- Bomba muscular, 368
- Botón(es)
 - gustativos, 759
 - sináptico, 620
- Bóveda
 - craneal, 61
 - plantar, 276
- Brazo, 818
 - fascias, 162
 - músculos, 162
- Broncoscopia, 524
- Bronquiectasias, 524
- Bronquios
 - inervación, 512
 - lobulares, 518
 - principales, 511
 - - derecho, 511
 - - izquierdo, 511
 - vascularización, 511
- Bruxismo, 297
- Bulbo(s)
 - del pene, 566
 - piloso, 768
 - raquídeo, 619
 - del vestíbulo vaginal, 585
- Bulla etmoidal, 40
- Bursitis, 33

C

- Cabeza, 773
 - drenaje
 - - linfático, 440
 - - venoso, 438
 - del húmero, 186
 - vasos, 420
- Cadena del nervio accesorio, 442
- Cadera, 829
- Caja
 - del tímpano, 746
 - - inervación, 752
 - - vascularización, 752
 - torácica, 104
- Calambres, 33
- Calcar femoral, 214
- Cálculos renales, 540
- Calices renales, 537
- Cámaras del globo ocular, 730
- Canal
 - basilar, 63
 - braquial, 819
- calcáneo, 219
- carpiano, 150
- de dentina, 286
- de Guyon, 178
- del hélix, 745
- de Hunter, 479
- del pulso, 167, 471
- retrobulbar, 493
- de torsión, 146
- Cáncer
 - de estómago, 329
 - de labio, 282
 - de mama, 588
 - de ovario, 575
 - de próstata, 561
 - de pulmón, 523
- Capa(s), 387
 - adventicia, 280
 - auriculares, 386
 - - profunda, 386
 - - subendocárdica, 386
 - - subepicárdica, 386
 - - superficial, 386
 - de Bowman, 735
 - epifisaria, alteraciones, 16
- Capilares, 361, 366
 - continuos, 366
 - fenestrados, 366
 - linfáticos, 417
 - sinusoides, 366
- Cápsula(s)
 - adiposa del riñón, 531
 - amigdalina, 311
 - articular, 186, 194, 293
 - de Bowman, 533
 - fibrosa, 186
 - glomerular, 533
 - lesiones, 25
 - suprarrenales, 612
 - de Tenon, 731, 773
 - tiroidea, 609
- Cara, 773
- Caracol
 - membranoso, 757; véase también **Conducto coclear**
 - óseo, 755
- Cardias, 325
- Caries, 290
- Carina, 510
 - uretral, 583
- Carótida
 - bifurcación, 421
 - externa, ligadura quirúrgica, 442
 - común izquierda, 420
- Carpo, 150
 - osificación, 148
 - fracturas, 154

- Cartílago(s), 498
 - alares, 491
 - aritenoides, 499
 - articular, lesiones, 25
 - auricular, 745
 - condilar, 292
 - de conjunción, 14
 - corniculado, 500
 - costales, 107
 - de crecimiento, 14
 - cricoides, 499
 - cuneiforme, 500
 - epiglótico, 499
 - de Santorini, 500
 - sesamoideos, 491, 500
 - del tabique nasal, 490
 - tiroides, 499
 - triticeo, 502
 - vomerianos, 491
 - de Wrisberg, 500
- Carúnculas sublinguales, 284
- Castración, 551
- Cataratas, 743
- Cavidad(es)
 - abdominal, 4, 122
 - abdominopélvica, 4, 317, 794
 - - vascularización, 447
 - bucal; véase **Boca**
 - cardíacas, 375
 - glenoidea, 144
 - infraglótica, 503
 - laríngea, 502
 - orbitaria, 773
 - óseas, alteraciones del crecimiento, 16
 - pélvica, 4, 87
 - pericárdica, 400
 - peritoneal, 801
 - pleural, 524, 527
 - sigmoidea, 147
 - - del radio, 150
 - torácica, 4, 787
 - del trigémino, 678
 - uterina, 579
 - vaginal, 564
 - vesical, 541
- Cavum de Meckel, 678**
- Cayado aórtico, 407
 - malformaciones congénitas, 409
 - variaciones de las ramas, 409
- Celda(s)
 - hipofisaria, 605
 - mastoideas, 754
 - - vascularización, 754
 - parótida, 776
 - tímica, 781
 - tiroidea, 609
- Celdillas
 - etmoidales, 39, 40, 57
 - mastoideas, 754
- Célula(s), 3
 - acidófilas, 606
 - agrupadas, 592
 - aisladas, 592
 - alfa, 606
 - basófilas, 606
 - beta, 606
 - C, 611
 - citolítica, 591
 - claras, 611
 - cromóforas, 607
 - dendríticas, 591
 - - inmaduras, 592
 - - interdigitantes, 592
 - - maduras, 592
 - espermatogénicas, 553
 - de la glía, 620
 - hiliares, 574
 - inmunitarias dispersas, 601
 - intersticiales, 553
 - - neurogliales, 608
 - de Kupffer, 592
 - de Langerhans, 601, 765
 - de Leydig, 553
 - luteínicas, 574
 - M, 601
 - madre, 621
 - - pluripotencial, 592
 - de Merkel, 765
 - NK, 591
 - oxífilas, 612
 - parafooliculares, 611
 - paraluteínicas, 574
 - plasmáticas, 591
 - presentadoras de antígeno, 592
 - progenitoras del hueso, 13
 - pro-T, 593
 - satélites, 26
 - de Schwann, 622, 623
 - sensoriales olfatorias, 757
 - de Sertoli, 553
 - de sostén, 553
- Cemento, 286
- Cementoblastos, 286
- Centros de osificación, 17
 - detección, 16
 - primarios, 17
 - secundarios, 17
- Cerebelo, 619
- Cerebro, 619
- Chancro sifilítico, 567
- Ciclo
 - cardíaco, 382
 - ovárico, 573
- Ciego, 339, 806
- Cifosis, 81
- Cilindroeje, 620
- Cintas pretendinosas, 181
- Cintura
 - escapular, 4, 67
 - - articulaciones, 182
 - pélvica, 4, 67
- Cinturón pélvico, 211
- Circulación
 - colateral, 479
 - extracorpórea, 404
 - intraesplénica, 600
 - intrarrenal, 536
 - linfática, 416
 - pulmonar, 415
 - sistémica, 403
 - tímica, 596
- Círculo arterial del cerebro, 431
- Cirrosis hepática, 354
- Cisterna
 - de Pecquet, 419
 - del quilo, 419
- Cistostomía percutánea, 549
- Cisuras, 516
- Citoscopia, 548
- Clavícula, 143
 - fracturas, 154
 - osificación, 148
- Clítoris, 585
- Cóccix, 68
- Codo, 820
 - articulaciones, 192
 - de estudiante, 181
 - de tenista, 197
- Cola de caballo, 628
- Colelitiasis, 358
- Cólico nefrítico, 540
- Colículo
 - facial, 694
 - seminal, 546
- Colitis isquémica, 343
 - ascendente, 341, 801
 - descendente, 341, 801
 - sigmoide, 342, 806
 - transversa, 341, 805
- Colon, 341
- Columela, 755
- Columna vertebral, 67, 68, 81
 - conducto
 - - raquídeo, 68
 - - vertebral, 68
 - curvaturas, 82
 - funciones, 68, 83
 - - de estabilidad, 83
 - - de movilidad, 68
 - - de protección, 68
 - - de soporte, 68, 83
 - ligamentos, 78

- movilidad, 83
- variaciones, 75
- venas, 414
- Columnas cervicales, 781
- Compartimiento(s)
 - hematopoyéticos, 593
 - prostático, 559
 - retroocular, 774
 - vasculares, 593
- Complejo duodenopancreático, 279
- Conchas
 - nasales, 40
 - - **inferior, 40**
- Cóndilo(s)
 - femorales, 213
 - humeral, 146
 - de la mandíbula, 54
 - occipitales, 42, 61
 - tibiales, 214
- Conductillos eferentes del testículo, 5 3
- Conducto(s)
 - de Alcock, 815
 - alveolar(es), 50, 520
 - anal, 814
 - arterioso, 416
 - auditivo externo, 745
 - - inervación, 746
 - - vascularización, 746
 - auditivo interno, 689
 - carotídeo, 47
 - carpiano, 178
 - cístico, 357
 - coclear, 757
 - colédoco, 356
 - deferente, 554
 - esfenopalatino, 51
 - espiral del modiol, 756
 - excretor, 559
 - - de la glándula bulbouretral, 562
 - eyaculador, 557
 - femorales, 131
 - galactóforos, 587
 - hepático, 356
 - hialoideo, 739
 - del hipogloso, 42, 63
 - incisivo, 50
 - infraorbitario, 50, 55
 - inguinal, 129
 - linfático derecho, 420
 - mandibular, 54
 - nasolagrimal, 55
 - óptico, 44
 - pancreático
 - - accesorio (de Santorini), 332
 - - principal (de Wirsung), 332
 - papilares, 534
 - parauretrales, 547
 - parotídeo (de Stenon), 305
 - peritoneo vaginal, 554
 - petromastoideo, 48
 - pudiendo, 815
 - raquídeo, 63
 - reuniens (de Hensen), 756
 - de Schlemm, 753
 - submandibular, 780, 784
 - temporocigomático, 52
 - torácico, 418
 - venoso (de Arancio), 352
 - vertebral, 68
 - vidiano, 45
- Coniotomía, 504
- Conjuntiva, 741
- Conjuntivitis, 743
- Contracción muscular, 30
 - concéntrica, 30
 - estática, 30
 - excéntrica, 30
 - isométrica, 30
 - unidades motoras, 30
- Corazón, 361, 370
 - aurículas, 361
 - - derecha, 361
 - - izquierda, 361
 - derecho, 370
 - dispositivo valvular, 379
 - estructura, 383
 - evolución, 371
 - forma, 373
 - gammagrafía, 403
 - inervación, 392
 - izquierdo, 370
 - linfáticos, 400
 - proyección, 371
 - radiografía simple de tórax, 402
 - resonancia magnética, 402
 - sistema de conducción, 388
 - - alteraciones, 405
 - situación, 371
 - tomografía de emisión
 - de positrones, 403
 - válvulas, 379
 - vascularización, 393; véase también **Arterias coronarias**
 - venas, 398
 - ventrículos, 361
 - - derecho, 361
 - - izquierdo, 361
- Cordón espermático, 564
- Corion, 764
- Córnea, 734, 743
 - estructura, 735
- Cornete(s), 57
 - nasales, 40
 - - inferior, 40, 52
- Coroides, 735
 - estructura, 735
 - ciliar, 736
 - del diente, 285
 - del glándula, 566
- Corona
 - estructura, 735
 - ciliar, 736
 - del diente, 285
 - del glándula, 566
- Coronariografía, 8
- Corpúsculo(s)
 - gustativos, 759
 - de Malpighi, 533
 - renal, 533
- Corredora bicipital, 146
- Costillas, 105
 - cervical, 114
 - estructura, 107
 - fracturas, 114
 - con rasgos específicos, 106
 - tipo, 106
- Costotomía, 114
- Coxa
 - valga, 222
 - vara, 222
- Coxal, 92
- Cráneo, 35
 - base, 62
 - crecimiento, 64
 - deficiencias mentales secundarias
 - al cierre precoz de las suturas del cráneo, 65
 - fracturas, 66
 - norma
 - - basal, 60
 - - frontal, 54
 - - lateral, 58
 - - occipital, 60
 - - vertical, 60
 - osificación, 64
 - radiografía simple, 65
 - del recién nacido, 63
 - resonancia magnética, 65
 - superficie
 - - externa, 54
 - - interna, 61
 - tomografía computarizada, 65
- Cresta(s)
 - ampollares, 756
 - arqueada, 499
 - buccinatrix, 54
 - de la cabeza de la costilla, 106
 - conchal, 50
 - esfenoidal, 43
 - etmoidal, 50
 - de fricción, 762
 - frontal, 39

Cresta(s) (*cont.*)

- infratemporal, 44
- intertrocantérea, 212
- lagrimal
 - - anterior, 50
 - - posterior, 52
- nasal, 50
- occipital, 42
 - - externa, 42
 - - interna, 42
- papilares, 762
- pectínea, 91
- púbica, 92
- sacra
 - - intermedia, 74
 - - lateral, 74
 - - media, 74
- supramastoidea, 46
- supraventricular, 378
- terminal, 376
- uretral, 546
- Cretinismo, 611
- Criptas amigdalinas, 311
- Criptorquidia, 558
- Cristalino, 739
- Cuarto ventrículo, 619
- Cubiertas escrotales, 562
- Cúbito, 147
 - fracturas, 154
 - osificación, 148
- Cuello, 67, 114, 780
 - drenaje
 - - linfático, 440
 - - venoso, 438
 - de la escápula, 145
 - del glande, 566; véase también *Surco balanoprepucial*
 - de la mandíbula, 291
 - quirúrgico, 146
 - uterino, 578
 - vasos, 420
- Cuerda(s)
 - tendinosas, 380
 - del tímpano, 691
 - uteroovárica, 574
 - vocales, cambios de tensión, 507
- Cuernos uterinos, 577
- Cuerpo(s)
 - adiposo
 - - de la boca, 282
 - - infrarrotuliano, 258
 - - de la órbita, 774
 - - pararenal, 532
 - - preepiglótico, 502
 - albicans, 574
 - aorticopulmonares, 408
 - aórticos, 423
 - calloso, 619

- carotídeo, 422, 423
- cavernosos, 566
- celular, 620
- ciliar, 735
- fibroso central, 380
- humano, 3
 - - división, 4
- lúteo, 574
 - - cíclico, 574
 - - gravídico, 574
- paraaórticos, 616
- perineal, 101
- del útero, 577
- vertebral, 68
- vítreo, 739
- Cúpula vaginal, 583
- Curare*, 624

D

- Dactiloscopia, 763
- Dartos, 564
 - escrotal, 567
 - peneano, 567
- Dedo
 - en martillo, 181
 - pulgar, articulaciones, 208
- Defecación, 347
- Deglución, 279, 317
- Deltoides, 160
- Dendritas, 620
- Denervación, 717
 - vegetativas, 730
- Dentición
 - decidua, 285
 - definitiva, 285
- Dentina, 286
 - canales, 286
 - primaria, 286
 - secundaria, 286
 - terciaria, 286
- Dentinogénesis imperfecta, 290
- Dermatoma, 629
- Dermis, 764
- Derrames
 - pericárdicos, 405
 - pleurales, 527
- Detector de mentiras, 730
- Diáfisis, 12
- Diafragma
 - estiloideo, 776
 - irrigación arterial, 446
 - pélvico, 98, 100, 814
 - - fascias, 100
 - de la silla, 605
 - urogenital, 100
- Diálisis peritoneal, 319
- Diartrosis, 20
- Diástole, 382
- Diencéfalo, 619, 620
- Diente(s), 284
 - ápice, 285
 - del axis, 73
 - cámara pulpar, 285
 - canales pulpares, 285
 - caninos, 289
 - cavidad pulpar, 285
 - cemento, 286
 - corona, 285
 - cuello, 285
 - dentina, 286
 - erupción, 289
 - esmalte, 286
 - incisivos, 289
 - - cúspides, 289
 - marfil, 286
 - orificios apicales, 285
 - premolares, 289
 - - cúspides, 289
 - pulpa dentaria, 285
 - raíz, 285
 - regeneración, 286
 - tipos, 288
 - vascularización, 290
- Digestión, 279
- Dihidrotestosterona, 551
- Direcciones anatómicas, 6
 - anterior (frontal o ventral), 6
 - distal, 6
 - dorso
 - - de la mano, 6
 - - del pie, 6
 - inferior (caudal), 6
 - lateral (externo), 6
 - medial (interno), 6
 - palmar, 6
 - plantar, 6
 - posterior (dorsal), 6
 - profundo, 6
 - proximal, 6
 - superficial, 6
 - superior (craneal), 6
- Disco(s)
 - articulares, 23, 198
 - interpúbico, 95
 - intervertebrales, 76
 - - modificaciones, 77
 - óptico, 737
- Disección, 7
- Disfunción eréctil, 567
- Diverticulitis ileal, 337
- Divertículos esofágicos, 315
- Diverticulosis, 343
- Dolor
 - referido, 730

- cardíaco, 405
- Dorso de la silla, 42
- Drenaje
 - linfático, 20
 - - de la cabeza, 440
 - - de la cavidad
 - - - abdominal, 463
 - - - pélvica, 463
 - - - torácica, 463
 - del cuello, 440
 - de la extremidad
 - - superior, 478
 - - inferior, 487
 - de los músculos, 29
- venoso, 20
- - de la cabeza, 438
- - del cuello, 438
- Duodeno, 329, 799
 - estructura, 330
 - inervación, 333
 - porciones, 803
 - relaciones, 803
 - situación, 329
 - vascularización, 333

E

- Ecocardiografía, 10
- Ecografía, 9
 - Doppler, 10
- Ectopia renal, 537
- Edema pulmonar, 524
- Electroneurografía, 624
- Embolia pulmonar, 524
- Eminencia
 - hipotenar, 173
 - iliopúbica, 92
 - intercondílea, 215
 - media, 605
 - piramidal, 749
 - tenar, 173
- Encéfalo, 619
- Encía, 284
- Endocardio, 383
- Endodoncia, 290
- Endometrio, 580
- Endoneuro, 622
- Endoscopia, 7
- Endosqueleto, 11
 - corneal, 735
- Endotelio(s), 365
- Enfermedad(es)
 - de Addison, 615
 - arteriales, 369
 - de Crohn, 337
 - de Dupuytren, 181
 - hepática, 354
 - de Hirschprung, 343, 730
 - por inmunodeficiencia, 601
 - de megacolon, 730
 - musculares, 33
 - de Peyronie, 567
 - del pulmón, 523
 - por respuesta inmunitaria exagerada, 601
- Enfisema pulmonar, 524
- Epicanto, 740
- Epicardio, 383
- Epicondilitis, 197
- Epidermis, 764
 - zona
 - - de queratinización, 765
 - - germinativa, 765
- Epididimitis, 558
- Epidídimo, 553, 554
- Epífisis, 608
- Epineuro, 621
- Episiotomía, 102
- Epistaxis, 495
- Epitálamo, 620
- Epitelio
 - corneal, 735
 - germinal, 571
- Eponiquio, 769
- Escafoides, 152
 - del tarso, 220
- Escama, 42, 45
 - del frontal, 37
- Escápula, 143
 - alada, 184
 - - estática, 158
 - movimientos, 184
 - osificación, 148
- Esclerótica, 732
- Escoliosis, 82, 89
- Escotadura
 - acetabular, 89
 - cardíaca, 373
 - esfenopalatina, 51
 - etmoidal, 39
 - frontal, 39
 - del ligamento redondo, 352
 - mandibular, 54
 - mastoidea, 47
 - nasal, 50
 - parietal, 46
 - peroneal, 215
 - pterigoidea, 45
 - radial, 149
 - supraorbitaria, 39
 - tiroidea superior, 499
 - troclear, 147
 - yugular, 105
- Escroto, 562
 - inervación, 565
- traumatismos, 565
- vascularización, 565
- Esfínteres, 280
 - del conducto
 - - colédoco, 357
 - - pancreático, 332
 - esofágicos, 316
 - - inervación, 316
 - - inferior, 316
 - - superior, 316
 - - vascularización, 316
- estrias, 286
- gastroesofágico, 316
- de Oddi, 357
- pilórico, 326
- precapilar, 363, 365
- Esmalte, 286
- Esófago, 280, 314, 793
 - abdominal, 803
- Esofagoscopia, 315
- Espacio(s)
 - inframesocólico, 805
 - infraperitoneal, 807
 - interdental, 288
 - laterofaríngeo, 776
 - mediopalmar, 827
 - pelvirrectal superior, 808
 - perifaríngeo, 775
 - pleuropulmonares, 512
 - preestiloideo, 776
 - retroestiloideo, 778
 - retrofaríngeo, 775
 - retromamario, 588
 - retroperitoneal, 794
 - supramesocólico, 801
 - vasculonervioso de la pelvis, 808
- Espátula, 748
- Espermatozoides, 553
- Esplenomegalia, 602
- Espolón
 - calcáneo, 222
 - de Wolff, 378
- Espondilólisis, 89
- Espondilolistesis, 89
- Esqueleto, 11
 - apendicular, 11
 - axial, 11
 - cardíaco, 380
- Estenosis
 - arteriales, 369
 - del conducto vertebral, 89
 - hipertrófica del píloro, 329
 - por placas, 370
- Esternón, 104
 - osificación, 105
- Estómago, 279, 324, 802
 - inervación, 328
 - vascularización, 327

Estornudo, 495
 Estribo, 751
 Estroboscopia, 504
 Estroma cardíaco, 384
 Esosqueleto, 11
 Extremidad
 – inferior, 211, 829
 – superior, 143, 817
 Eyaculación, 569

F

Fagocitos, 591
 – mononucleares, 591
 Falanges, 153
 – distal, 153
 – media, 153
 – osificación, 148
 – proximal, 153
 Faringe, 307
 – inervación, 313
 – músculos, 308
 – vascularización, 313
 Fascia(s), 155
 – antebraquial, 164
 – del antebrazo, 164
 – axilar, 161
 – braquial, 819
 – del brazo, 162
 – de Buck, 567
 – bucofaríngea, 310
 – de Camper, 128
 – cervical, 120
 – clavipectoral, 161
 – clitorídea, 585
 – de coalescencia, 322
 – cremastérica, 564
 – cribiforme, 479
 – del diafragma pélvico, 100
 – endotorácica, 524
 – espermática interna, 564
 – faringobasilar, 307
 – glútea, 224, 829
 – del hombro, 161
 – interósea palmar, 181
 – interpterigoidea, 295
 – lata, 225, 264, 830
 – de la mano, 181
 – obturatriz, 807
 – palmares laterales, 181
 – parótida, 776
 – parotídea, 302
 – pectoral, 161
 – peneana
 – – profunda, 567
 – – superficial, 567
 – perineal superficial, 104

– del plano perineal profundo, 102
 – plantar, 838
 – poplítea profunda, 835
 – profunda del pie, 245
 – renal, 531
 – de Scarpa, 128
 – subescapular, 161
 – superficial de la pared
 anterolateral del abdomen, 128
 – de Toldt, 341
 – toracolumbar, 134
 – transversal, 127
 – de Treitz, 794
 – vastoadductora, 833
 Fasciculaciones, 33
 Fascículo auriculoventricular, 391
 Femoral
 – cateterismos, 488
 – obstrucción, 488
 Fémur, 211
 Feocromocitoma, 616
 Fibras, 622
 – aferentes, 623
 – amielínicas, 620
 – auriculares, 385
 – eferentes
 – – somáticas, 622
 – – viscerales, 623
 – estriomotoras, 622, 670
 – exteroceptivas, 624
 – extrafusales, 26, 30
 – intrafusales, 26
 – lisomotoras, 623
 – mielínicas, 620
 – motoras, 30
 – musculares contráctiles, 26
 – – blancas (tipo IIB), 26
 – – mixtas (tipo IIA), 26
 – – rojas (tipo I), 26
 – musculares de trabajo, 30
 – – arquitectura, 384
 – parasimpáticas, 423
 – propioceptivas, 624
 – de Purkinje, 391
 – secretoras, 623
 – sensitivas, 30
 – simpáticas, 423
 – somáticas aferentes, 624
 – vasomotoras, 623
 – vegetativas, 30, 623
 – ventriculares, 385
 – viscerales aferentes, 624
 Fibrilación(es), 33
 – auricular, 385
 Filtrado glomerular, 536
 Fimosis, 567
 Fisura
 – anal, 348
 – de Glaser, 46
 – del ligamento
 – – redondo, 352
 – – venoso, 352
 – orbitaria
 – – inferior, 774
 – – superior, 44, 672, 774
 – petroescamosa, 46
 – petrotimpánica, 46
 – portal
 – – derecha, 355
 – – izquierda, 355
 – – principal, 354
 – timpanoescamosa, 292
 – umbilical, 355
 Flebogafías, 8
 Flexoextensión, 203
 Flujo sanguíneo, regulación, 367
 Folículo(s)
 – de De Graaf, 574
 – linfoides, 601
 – ováricos, 573
 – piloso, 768
 – primordiales, 573
 Fondo
 – de ojo, 743
 – de saco vesicouterino, 577
 – del útero, 577
 Fontanela(s), 63, 65
 – anterior, 64
 – astéricas, 64
 – bregmática, 64
 – esfenoidales, 64
 – lambdoidea, 64
 – mastoideas, 64
 – posterior, 64
 – ptéricas, 64
 Fórnix vaginal, 583
 Fosa(s)
 – acetabular, 89, 248
 – amigdalina, 310
 – canina, 50
 – cística, 351
 – condílea, 42
 – coronoidea, 147
 – craneal
 – – anterior, 62
 – – media, 62
 – – posterior, 63, 671, 689
 – cubital, 820
 – digástrica, 53
 – epigástrica, 105
 – hialoidea, 739
 – hipofisaria, 42, 62
 – ilíaca, 91
 – inervación, 495
 – infraespinal, 144
 – infratemporal, 59

- inguinal
- - lateral, 324
- - medial, 323
- intercondílea, 213
- isquioanal, 99, 815
- isquiorrectal, 99
- lagrimal, 55
- mandibular, 46, 292
- nasales, 56, 492
- navicular, 585
- olecraneana, 147
- oval, 376
- ovárica, 571
- pararrectales, 345
- paravesical, 807
- patelar, 739
- poplítea, 834
- pterigoidea, 45
- pterigopalatina, 59, 777
- radial, 147
- subescapular, 144
- sublingual, 53
- submandibular, 53
- supraamigdalina, 311
- supraespinosa, 144
- suprarretropleural, 525
- supravesical, 323
- temporal, 58
- triangular, 745
- trocantérica, 213
- vascularización, 495
- del vestíbulo de la vagina, 585
- yugular, 48
- Fosita(s)
- aracnoideas, 36
- de Claudius, 571
- costales, 70
- escafoidea, 45
- granulares, 36
- de Krause, 571
- de Pacchioni, 36
- petrosa, 48
- retrocava de Allison, 402
- troclear, 55
- Fóvea central, 737
- Fracturas
- del carpo, 154
- de la clavícula, 154
- de las costillas, 114
- del cráneo, 66
- del cúbito, 154
- del húmero, 154
- óseas, reparación, 16
- del radio, 154
- Frenillo
- del clitoris, 585
- labial inferior, 281
- de los labios de la vulva, 585

- lingual, 284
- prepucial, 568
- Frenos meniscales, 292

G

- Gálea aponeurótica, 697; véase también *Aponeurosis epicraneal*
- Gammagrafía del corazón, 403
- Ganglio(s)
- apendiculares, 466
- del arco de la vena ácigos, 464
- braquiocefálicos, 463
- broncopulmonares, 464
- bucales, 441
- de la cadena recurrential, 442
- cervicales, 441
- - anteriores, 442
- - profundos, 440, 442
- - superficiales, 442
- ciliar, 725
- cístico, 465
- cólicos, 467
- epicólicos, 467
- epigástricos inferiores, 464
- espláncnicos, 713
- estructura, 625
- faciales, 441
- de Gasser, 677
- geniculado, 688
- glúteos
- - inferiores, 464
- - superiores, 464
- infrahiodeos, 442
- intraneurales, 713
- de Küttner, 442
- lagunares, 464
- linfáticos, 417, 592, 595, 597, 602, 783
- - del abdomen, 464
- - axilares, 478
- - celíacos, 465
- - centrales superiores, 466
- - cervicales profundos, 783
- - deltopectores, 478
- - esplénicos, 465
- - frénicos superiores, 463
- - gástricos, 465
- - gastrooméntales, 465
- - hepáticos, 465
- - ileocólicos, 466
- - ilíacos
- - - comunes, 464
- - - externos, 464, 487
- - - internos, 464
- - infraclaviculares, 478
- - inguinales, 487, 488
- - intercostales, 463
- - intermedios, 466
- - interpectorales, 478
- - lumbares, 464
- - mediastínicos
- - - anteriores, 463
- - - posteriores, 463
- - mesentéricos, 466
- - - inferiores, 467
- - pancreaticoduodenales, 465
- - pancreaticoesplénicos, 465
- - pancreáticos
- - - inferiores, 465
- - - superiores, 465
- - paracorteza, 597
- - paraesternales, 463
- - paramamarios, 478
- - paratraqueales, 464
- - parietales, 463, 464
- - de la pelvis, 464
- - pilóricos, 465
- - poplíteos, 488
- - prepericárdicos, 463
- - prevertebrales, 463
- - sigmoideos, 467
- - subaórticos, 464
- - del tórax, 463
- - traqueobronquiales, 464
- - - inferiores, 464
- - - superiores, 464
- - viscerales, 463, 465
- - yuxtaintestinales, 466
- mandibulares, 441
- occipitales, 441
- oftálmico, 725
- ótico, 682, 726, 778
- paracólicos, 467
- parasimpáticos, 713
- paratraqueales, 442
- parotídeos, 441
- pediculares, 464
- pericervicales, 441
- de los plexos autónomos, 625
- prececales, 466
- prelaríngeos, 442
- pretraqueales, 442
- prevertebrales, 722
- profundos, 441
- del promontorio, 464
- pterigopalatino, 726
- de la raíz pulmonar, 464
- retroauriculares, 441
- retrocecales, 466
- retrofaríngeos, 442
- de Rosenmüller, 488
- sacros, 464
- sensitivos, 623, 625
- simpático, 712
- sublingual, 726

- submandibulares, 441, 726
- submentonianos, 441
- superficiales, 441
- supraclaviculares, 442
- supratrocleares, 478
- vegetativos, 625, 712
- vestibular, 698
- yugulodigástrico, 442
- yuguloomohioideo, 442
- vuxtaviscerales, 441

- uretrales, 547

Gubernaculum testis, 554

– esplénico, 598

- estructura, 14

- etmoides, 39
- falanges, 153, 221
- fémur, 211
- fíbula, 215
- forma, 11
- fracturas, reparación, 16
- frontal, 37
- gancho, 152
- grande, 152
- hamate, 152
- hioides, 283
- ilíacos, 67, 87
- incisivos, 50
- inervación, 20
- lagrimal, 52
- láminas, 15
- largos, 11, 12
 - accidentes, 13
 - agujero nutricio, 13
 - capa celular, 12
 - cavidad medular, 13
 - cuerpo, 12
 - diáfisis, 12
 - endostio, 14
 - epífisis, 12
 - -- superficies articulares, 12
 - -- extremidades, 12
 - -- fibras
 - -- de Sharpey, 12
 - -- perforantes, 12
 - -- periostio, 12
- de la mano, 150
- matriz ósea, 15
- maxilar, 48
- de membrana, 17
- metacarpo, 152
- metatarsianos, 221
- nasal, 52
- navicular, 220
- del neurocráneo, 35
- occipital, 40
- osificación, 13
 - condral, 16, 17
 - endocondral, 17
 - membranosa, 16
 - pericondral, 17
- palatino, 51
- parietal, 37
- pericondrio, 17
- peroné, 215
- pisiforme, 152
- placa epifisaria, 18
- planos, 11, 14
 - díplon, 14
 - láminas, 14
- remodelación, 19
- inicial, 13
- rótula, 214

- semilunar, 152
- sesamoideos, 11, 153, 221
- supernumerarios del pie, 222
- surco pericondral de Ranvier, 18
- sustancia osteoide, 17
- suturales, 11, 36
- tejido óseo, 14
 - compacto, 15
 - -- osteonas, 15
 - -- canal central, 15
 - -- conductos de Havers, 15
 - -- láminas circunferenciales, 15
 - -- esponjoso, 15
 - -- osteoblastos, 14
 - -- osteocitos, 14
 - -- osteoclastos, 14
- temporal, 45
- tibia, 214
- del tórax, 104
- trapecio, 152
- triquetral, 152
- vascularización, 19
 - riego arterial, 19
- wormianos, 11, 36
- Húmero, 145
 - fracturas, 154
 - osificación, 148
- Humor acuoso, circulación, 739
- Husos musculares, 26

I

- Ileítis, 337
- Íleo, 337
- Íleon, 279, 333
- Ilion, 87
- Impresión
 - cardíaca, 350, 514f
 - cólica, 352
 - duodenal, 352
 - gástrica, 352
 - renal, 351f, 352
 - trigeminal, 48
- Incisura
 - angular, 326
 - cardíaca, 325
 - pancreática, 332
- Inclinaciones, 204
- Inervación, 25
 - del disco, 77
- Infarto intestinal, 337
- Infraperitoneo, 323
- Infundíbulo
 - tallo hipofisario, 605
 - del ventrículo derecho, 378
- Inmunidad, 591
 - adaptativa, 591

- celular, 591
- humoral, 591
- innata, 591
- natural, 591
- Inserciones
 - carnosas, 27
 - musculares, 28
- Insuficiencia renal, 537
- Interferones, 591
- Interneuronas, 620, 728
- Intestino
 - delgado, 279
 - grueso, 279, 338
- Intraperitoneo, 323
- Intubación, 511
- Inyecciones
 - intramusculares, 668
 - intravenosas, 479
- Iris, 736
- Islotes celulares, 423
- Isquemia intestinal mesentérica, 467
- Isquion, 87
- Istmo, 609
 - aórtico, 407
 - faringonasal, 310
 - de las fauces, 283
 - de la trompa, 753
 - del útero, 578
 - vertebral, 69
- IX par craneal, 699

L

- Laberinto
 - cortical, 533
 - etmoidal, 39, 40
 - membranoso, 756
 - óseo, 754
- Labios, 281
 - acetabular, 248
 - mayores, 583
 - menores, 585
- Lacertus fibrosus*, 163
- Lago lagrimal, 741
- Lambda, 60
 - propia, 279
- Laringe, 498
 - articulaciones, 500
 - inervación, 508
 - vascularización, 508
- Laringofaringe, 311
- Laringuectomías, 504
- Lecho ungueal, 769
- Lengua, 297
 - dolorosa, 301
 - glositis, 301

Lengua (*cont.*)

- glosodinia, 301
- inervación, 301
- inflamación, 301
- movimiento, 301
- y asfixia, 301
- Lesiones
 - cervicales, 139
 - venosas, 370
- Ligamento(s)
 - acromioclavicular, 183
 - adiposo, 258
 - ancho del útero, 571
 - entre las apófisis,
 - - espinosas, 79
 - - transversas, 79
 - arqueado del pubis, 95
 - arterioso, 416
 - cardinales, 581
 - cigomática, 773
 - de Cloquet, 565
 - de la columna vertebral, 78
 - de Cooper, 588
 - coracoacromial, 145
 - coracoclaviculares, 183
 - coracohumeral, 189
 - coronario, 803
 - costoclavicular, 183
 - costotransverso, 109
 - cricoaritenoides, 500
 - cricotiroides medio, 500
 - cruciforme, 81
 - cruzados, 260
 - cuadrado (ligamento de Dènucé), 196
 - entre los cuerpos vertebrales, 78
 - dorsal del carpo, 178
 - escrotal, 551
 - esfenomandibular, 293
 - esplenorrenal, 599, 803
 - falciforme, 803
 - frenocólico, 803
 - fundiforme del pene, 568
 - gastroesplénico, 598, 803
 - gastrofrénico, 802
 - glenohumerales, 188
 - glosopiglóticos, 502
 - humeral transverso, 189
 - iliofemoral, 250
 - iliolumbar, 94
 - inguinal, 124
 - intercarpianos, 201
 - interclavicular, 183
 - interespinosos, 79
 - interfoveolar (Hesselbach), 128
 - interóseo, 266
 - intertransversarios, 79
 - isquiofemoral, 251

- lagunar, 124
- lesiones, 25
- longitudinales, 78
- meniscofemoral, 257
- metacarpiano transverso, 182
- nugal, 79
- occipitodontoideos, 81
- palmar, 206
- palpebrales, 741
- pectíneo, 124
- perineal transverso, 102
- periodontal, 287
- plantar largo, 272
- poplíteo oblicuo, 234
- propio del ovario, 574
- pterigomandibular, 293
- púbicos, 95
- pubofemoral, 250
- puboprostático, 808
- pubovesicales, 100
- pulmonar, 515
- radiocarpianos, 202
- redondo
 - - del hígado, 803
 - - del útero, 813
- reflejo, 124
- rotuliano, 230
- sacrococcígeos, 78
- sacroespinoso, 94
- sacroiliacos, 94
- sacrotuberoso, 94
- supraespinoso, 79
- suspensorio
 - - de la axila, 161
 - - del clítoris, 585
 - - de la mama, 588
 - - del ovario, 574
 - - del pene, 568
- transverso
 - - del carpo, 178
 - - inferior de la escápula, 145
 - - superior de la escápula, 145
- trapezoide, 183
- tuboovárico, 574
- uterosacros, 581
- uterovesicopúbicos, 581
- vestibular, 501
- vocal, 501
- Limbo
 - de la fosa oval, 376
 - nasal, 493
 - palpebral
 - - anterior, 740
 - - posterior, 740
- Línea(s)
 - alba, 113, 122
 - anorrectal, 346
 - arqueada, 113

- áspera, 211
- blanca, 346
- de Farre-Waldeyer, 573
- de Lange, 763
- mesocólica, 800
- nugal, 42
- oblicua, 499
- pectínea, 212
- pilórica, 800
- semilunar, 122
- del sóleo, 239
- terminal, 96
- Língua, 417
- Linfáticos del corazón, 400
- Linfocitos, 591
 - B, 591
 - T, 591
 - - citolíticos, 591
 - - colaboradores, 591
- Linfografías, 8
- Língua, 515
 - mandibular, 54
- Líquido
 - intersticial, 361
 - peritoneal, 319
 - sinovial, lesiones, 25
 - tisular, 361
 - pleural, 524
- Litiasis parotídea, 306
- Lobulillo(s)
 - pulmonar, 520
 - renal, 533
 - testiculares, 551
- Lóbulos, 516
 - caudado, 350
 - cuadrado, 352
 - de la oreja, 745
 - piramidal, 610
 - de Spiegel, 352
 - tímicos, 594
- Lordosis, 81
- Lúnula(s)
 - de las uñas, 769
 - de las valvas, 382
- Luxación
 - acromioclavicular, 193
 - de la articulación escapulohumeral, 193
 - de codo, 197
 - esternoclavicular, 193
 - del semilunar, 197

M

- Macrófagos, 592
- alveolares, 592
- osteoclastos, 592

- Mácula
 - densa, 535
 - lútea, 737
 - del sáculo, 756
 - utricular, 756
- Maduración de los linfocitos T, 596
- Maléolo
 - lateral, 216
 - medial, 215
- Mama, 586
 - inervación, 589
 - vascularización, 588
- Mancha(s)
 - amarilla, 737
 - cribosas, 755
- Mandíbula, 53, 64
 - luxación, 297
- Manguito de los rotadores, 188
- Mano, 826
 - articulaciones, 199
 - fascias, 181
 - función prensil, 210
 - huesos, 150
 - músculos, 173
 - vascularización arterial, 474
- Marfil, 286
- Martillo, 749
- Masticación, 296
- Matriz extracelular intramiocárdica, alteraciones, 406
- Meato nasal, 493
- Mediastino, 788
 - anterior, 791
 - medio, 371, 791
 - posterior, 793
 - superior, 789
 - testicular, 551
- Mediolo, 755
- Medios de contraste, 8
- Médula
 - espinal, 619
 - oblongada, 619
 - ósea, 11, 13, 593
 - – amarilla, 14, 593
 - – extracciones, 601
 - – inervación, 595
 - – roja, 13, 593
 - – vascularización, 595
 - renal, 532
- Megacolon, 343
- Mejillas, 282
- Melanocitos, 765
- Membrana
 - atlantooccipital, 80
 - basilar, 757
 - cuadrangular, 501
 - de Descement, 735
 - fibroelástica de la laringe, 501
 - interósea, 822
 - obturatriz, 90, 95
 - perineal, 102
 - secundaria del tímpano, 749
 - sinovial, 22, 188, 195
 - suprapleural, 525
 - tectoria, 79
 - timpánica, 747
 - – paracentesis, 752
 - tirohioidea, 502
 - vestibular (Reissner), 757
- Memoria inmunitaria, 591
- Meniscos, 257
- Meralgia parestésica
 - de Bernhardt, 667
 - de Roth, 667
- Mesencéfalo, 619
- Mesenterio, 321, 805
- Mesoapéndice, 321
- Mesocolon
 - sigmoide, 321, 806
 - transverso, 321
- Mesoovario, 574
- Mesosálpinx, 813
- Metacarpo, 152
 - osificación, 148
- Metáfisis, 12
 - mesometrio, 813
- Miastenia grave, 624
- Micción, 545
- Microcirculación, 597
- Microglía, 592
- Mielina, 620, 622
- Mielinización de los nervios, 623
- Miocardio, 383
 - arquitectura, 384
 - capas, 386
 - – auriculares, 386
 - – ventriculares, 387
- Miocardiopatía de tako-tsubo, 405
- Miometrio, 580
- Miotomo, 629
- Miotonía, 33
- Modiolo, 695
- Molares, 289
- Moléculas, 4
- Monoaminas, 715
- Monocitos, 592
- Monte del pubis, 584
- Movilidad gástrica, 328
- Mucosa, 279
 - nasal, 494
 - olfatoria, 494
- Muñeca, 824
 - posición de inmovilización, 197
- Muro, 747
- Muscular, 280
- Muscularis mucosae*, 279, 280
- Músculo(s), 11, 24, 155
 - abductor
 - – corto del pulgar, 176
 - – del dedo meñique, 178
 - – largo del pulgar, 170
 - acintados, 27
 - aductor del pulgar, 177
 - agonistas, 31
 - anchos, 27
 - ancóneo, 173
 - angular de la escápula, 158
 - antagonistas, 31
 - del antebrazo, 164
 - anulares, 27
 - aritenoepiglótico, 505
 - aritenoideo
 - – oblicuo, 505
 - – transverso, 505, 507
 - arquitectura, 27
 - articular de la rodilla, 229
 - auriculares, 697
 - balanceadores, 32
 - bíceps braquial, 163
 - bolsas sinoviales, 835
 - de la borla de la barba, 696
 - braquial, 162
 - braquiorradial, 170
 - del brazo, 162
 - broncoesofágico, 316
 - buccinador, 282, 696
 - bulboesponjoso, 102
 - de la caja del tímpano, 751
 - de la calvaria, 697
 - canino, 696
 - cardíaco de trabajo, 383
 - cigomático
 - – mayor, 696
 - – menor, 696
 - ciliar, 735
 - coccígeo, 100
 - del compartimento
 - – antebraquial
 - – – anterior, 165
 - – – posterior, 170
 - – braquial
 - – – posterior, 164
 - – – anterior, 162
 - complejo, 119
 - compuestos, 27
 - condrogloso, 300
 - contracción muscular, 30
 - coracobraquial, 162
 - corrugador de la ceja, 697
 - cortos, 27
 - crecimiento, 29
 - cremáster, 564
 - cricoaritenoideo
 - – lateral, 505, 507

Músculo(s) (*cont.*)

- cricoaritenoides
- posterior, 505, 507
- cricotiroides, 505, 508
- cuadrado
 - del labio inferior, 696
 - lumbar, 128
- cuádriceps femoral, 229
- cutáneo del cuello, 696
- deltoides, 160f, 817
- depresor
 - del ángulo de la boca, 696
 - de la ceja, 697
 - del labio inferior, 696
 - del tabique, 697
- detrusor de la vejiga, 543
- diafragma, 110
- digástrico, 27, 284, 295
- dilatador del iris, 736
- dorsal ancho, 158
- drenaje linfático, 29
- elementos auxiliares, 28
- elevador
 - del ángulo de la boca, 696
 - del ano, 99
 - de la escápula, 158
 - de la glándula tiroidea, 118
 - del labio superior, 696
 - - y del ala de la nariz, 696
 - del párpado superior, 676
 - de la próstata, 99
- enfermedades, 33
- epicraneales, 697
- epiespinoso, 133
- erector del pelo, 768, 769
- escalenos, 115
- esfínter vesical, 543
- espinoso, 133
- esplenio, 120
- esqueléticos, 24
- estabilizadores, 32
- esternocleidomastoideo, 116
- esternohioideo, 117
- esternotiroideo, 118
- estilofaríngeo, 309
- estilogloso, 300
- estilohioideo, 284
- del estribo, 691, 751
- estructuras fibrosas auxiliares, 28
 - vainas
 - fasciales, 28
 - fibrosas, 28
 - retináculos, 28
 - estructuras serosas auxiliares, 28
 - bolsas
 - serosas, 28
 - sinoviales, 28
- hoja
 - parietal, 28
 - visceral, 28
- mesotendón, 28
- vainas sinoviales, 28
- extensor
 - corto del pulgar, 171
 - cubital del carpo
 - (cubital posterior), 172
 - de los dedos, 171
 - del índice, 171
 - largo del pulgar, 171
 - radial
 - corto del carpo
 - (segundo radial), 169
 - largo del carpo
 - (primer radial), 169
 - del dedo meñique, 172
 - extraoculares, 675
 - faciales, 694
 - de la faringe, 308
 - flexor
 - corto
 - del dedo meñique, 178
 - del pulgar, 177
 - profundo de los dedos, 823
 - cubital del carpo
 - (cubital anterior), 167
 - largo del pulgar, 166
 - profundo de los dedos, 165
 - radial del carpo
 - (palmar mayor), 167
 - frontal, 697
 - función, 30, 33
 - en la movilidad articular, 31
 - geniogloso, 299
 - geniohioideo, 283, 284
 - del globo ocular, 675, 774
 - del grupo
 - medial, 177
 - medio, 174
 - muscular,
 - anterior, 165
 - lateral, 168
 - lateral, 176
 - hiogloso, 300
 - hioideos, 116
 - hipotenares, 177
 - iliaco, 223
 - iliococcígeo, 99
 - iliocostal, 133
 - iliopsoas, 830
 - inervación, 30
 - infraespinoso, 160
 - iniciadores, 31
 - inserciones, 28
 - de origen, 28
 - punto
 - fijo, 28
 - móvil, 28
 - terminación, 28
 - inserciones, 24
 - carnosas, 24
 - tendinosas, 24
 - interespinosos, 118
 - interóseos, 174
 - dorsales, 174, 175
 - palmares, 174, 175
 - isquiococcígeo, 100
 - isquiotibiales, 233, 833
 - largo(s), 27
 - de la cabeza, 115
 - del cuello, 115
 - laterales del cuello, 115
 - de la lengua, 299
 - longísimo, 133
 - lumbricales, 174
 - de la mano, 173
 - masetero, 294
 - masticadores, 293
 - mentoniano, 696
 - milohioideo, 283, 284, 295
 - de la mímica, 694
 - monogástricos, 27
 - morfología, 27
 - motores, 31
 - de emergencia, 31
 - primarios, 31
 - secundarios, 31
 - nasal, 696
 - oblicuos, 676
 - occipital, 697
 - occipitofrontal, 697
 - omohioideo, 117, 421
 - oponente
 - del dedo meñique, 177
 - del pulgar, 176
 - orbicular
 - de la boca, 695
 - de los ojos, 697
 - de los párpados, 697
 - orbitario, 675
 - palancas musculares, 33
 - de primer grado, 32
 - de segundo grado, 32
 - de tercer grado, 32
 - fuerza
 - de balanceo, 32
 - centrífuga, 32
 - centripeta, 32
 - transarticular, 32
 - palatoestafilino, 313
 - palatofaríngeo, 309, 313
 - palatogloso, 300, 313

- palmar
- - corto (palmar cutáneo), 178
- - largo (palmar menor), 167
- palpebrales, 697
- papilares, 380
- de las paredes del tórax, 110
- pectíneos, 375
- pectoral
- - mayor, 156
- - menor, 156
- peniformes, 27
- - del hombro, 159
- periauriculares, 697
- periestafilino
- - externo, 312
- - interno, 313
- periorbiculares, 697
- peroneo
- - corto, 237
- - largo, 237
- piramidal, 122
- - de la nariz, 697
- del plano
- - medial, 156
- - posterolateral, 157
- - profundo, 170
- - superficial, 171
- plantar, 239
- plasticidad, 29
- platisma, 696
- poligástricos, 27
- procero, 697
- pronador
- - cuadrado, 165
- - redondo, 167
- psoas
- - mayor, 128
- - menor, 128
- pterigoideo
- - lateral, 295
- - medial, 295
- pubococcígeo, 99
- puborrectal, 99
- pubovaginal, 99
- radial del carpo, 823
- recto(s), 675
- - del abdomen, 122
- - anterior de la cabeza, 115
- redondo
- - mayor, 160
- - menor, 160
- risorio, 696
- romboides mayor y menor, 157
- salpingofaríngeo, 310
- semiespinoso, 119
- semimembranoso, 234
- semipeniformes, 27
- semitendinoso, 663

- separador corto del pulgar, 645
- serrato anterior, 156
- **shunt, 32**
- sinergistas, 31
- - fijadores, 31
- - neutralizadores, 31
- - - verdaderos, 31
- - - concurrentes, 31
- sóleo, 239, 837
- **spurt, 32**
- subclavio, 155
- subescapular, 159
- del suelo de la boca, 284
- supeciliar, 697
- superficial de los dedos, 823
- supinador, 168
- supraespinoso, 159
- suprahioideos, 283
- tamaño, 27
- temporal, 293
- tenares, 176
- tensor
- - del martillo, 751
- - del tímpano, 751
- tiroaritenoides, 505, 507, 508
- tiroepiglótico, 505
- tirohioideo, 118
- toracobraquiales, 155
- del tórax, 110
- transverso de la lengua, 300
- trapecio, 157
- traqueoesofágico, 509
- triangular, 696
- tríceps braquial, 164
- de trígono vesical, 543
- de la tristeza, 696
- de la úvula, 313
- vascularización, 29
- - pedículos vasculares, 29
- velo del paladar, 753
- vertical de la lengua, 300
- vestibulococlear, 698
- vientre anterior del digástrico, 283
- vocal, 505, 508
- Muslo, 211, 830

N

- Narinas, 492
- Nariz, 489
- alas, 489
- fracturas, 490
- hemorragias, 495
- innervación, 492
- vascularización, 492
- Nasofaringe, 310
- Necrosis tubular, 538

- Nefronas, 533
- corticales, 535
- de transición, 535
- yuxtamedulares, 535
- Nervi nervorum, 622*
- Nervio(s), 621
- **abducens, 672, 674**
- accesorio, 706
- - lesiones, 709
- alveolar inferior, 684
- ampular, 699
- anococcígeos, 667
- de Arnold, 630
- auricular, 632, 690
- auriculotemporal, 684
- axilar, 639
- bucal, 684
- cardíacos, 719
- caroticotimpánico, 720
- ciático, 662
- - mayor, 662
- - poplíteo externo, 663
- cigomático, 680
- ciliares
- - cortos, 725
- - largos, 680
- circunflejo, 639
- clasificación, 624
- clúneos inferiores, 662
- coclear, 699
- del conducto auditivo externo, 684
- craneales, 621, 669
- - cero, 669
- del cuadrado femoral, 662
- cubital, 645
- - lesiones, 652
- - - déficit motor, 652
- - - déficit sensitivo, 652
- cutáneo
- - femoral
- - - lateral, 658
- - - posterior, 662
- - lateral inferior del brazo, 651
- - medial del antebrazo, 640, 818
- - medial del brazo, 640
- - perforante, 830
- - posterior del antebrazo, 651
- - posterior del brazo, 650
- - sural lateral, 835
- dentario inferior, 684
- - dorsales, 650
- - - del pie, 664
- - palmares comunes, 645
- - plantares, 665
- - - comunes, 665
- - - propios, 645, 648, 665
- digitales, 645

Nervio(s) (*cont.*)

- dorsal
- - del clítoris, 456
- - de la escápula, 782
- - del pene, 569
- erectores, 569
- escrotales anteriores, 657
- espinales, 621, 627, 706
- - medio, 627
- espinoso, 684
- esplácnicos, 662, 713, 721
- - lumbares, 721
- - pélvicos, 724, 727
- - sacros, 722
- estructura, 621
- etmoidal
 - - anterior, 680
 - - posterior, 680
- facial, 692
- - herpes, 692
- - lesiones en el parto, 65
- faríngeos, 701
- femoral, 658
- - lesiones, 667
- frénico, 634
- - acceso quirúrgico, 635
- - dolores irradiados
 - por afectación, 635
- - infiltraciones, 635
- - parálisis, 635
- frontal, 680
- genitofemoral, 657
- glossofaríngeo, 699
- glúteo
 - - inferior, 662, 830
 - - superior, 661
 - - - lesiones, 667
- hipogástricos, 721
- hipogloso, 708
- - parálisis, 709
- iliohipogástrico, 657
- ilioinguinal, 657
- infraorbitario, 680
- infratroclear, 680
- intercostales, 653
- - infiltraciones, 655
- intercostobraquial, 640, 818
- intermedio de Wrisberg, 688
- interóseo
 - - anterior, 644, 823
 - - de la pierna, 665
 - - posterior, 824
 - - - del antebrazo, 650
- intraparotídeos, 777
- isquiático, 662
- de Jacobson, 700
- labiales anteriores, 657
- lagrimal, 679
- laríngeo
 - - inferior, 705
 - - recurrente, 705
 - - superior, 705
- lesiones, 624
- lingual, 684
- mandibular, 682, 778
- masetérico, 684
- maxilar, 680, 778
- mediano, lesiones, 652
- de la membrana del tímpano, 684
- mentoniano, 684
- mielinización, 623
- milohioideo, 684
- mixtos, 624
- motores, 624
 - - oculares, 671
 - - - lesiones, 675
- del músculo del estribo, 691
- musculocutáneo, 639
- - lesiones, 652
- nasales
 - - posteriores
 - - - laterales, 495
 - - - superiores laterales, 682
- nasociliar, 680
- nasopalatino, 682
- neumogástrico, 702
- obturador, 658
 - - accesorio, 658
 - - interno, 661
 - - neuralgias, 667
- occipital
 - - mayor, neuralgia, 635
 - - menor, 782
- oculomotor, 672, 673
- oftálmico, 679
- olfatorio, 759
- óptico, 732, 774
- palatino
 - - mayor, 682
 - - menores, 682
- patético, 675; véase también **Nervio troclear**
- pectoral
 - - lateral, 638
 - - medial, 638
- del pericardio, 402
- perineal, 667
- peroneo común, 663
- - lesiones, 668
- petroso
 - - mayor, 690
 - - menor, 700
 - - profundo, 720
- plantar
 - - lateral, 665, 839
 - - medial, 665, 839
- presacro, 721
- pterigoideo, 691, 726
 - - lateral, 684
 - - medial, 295, 684
- pudiendo, 666
- radial, 649
- - lesiones, 652
- - - déficit
- - - - motor, 653
- - - - sensitivo, 653
- raquídeos, 627
- rectales inferiores, 667
- regeneración, 623
- sacular, 699
- safeno, 659
- del seno carotídeo, 701
- sensitivos, 624
- del subclavio, 638
- subcostal, 653, 655
- subescapular, 639
- sublingual, 685
- suboccipital, 630
- supraacromiales, 782
- supraclaviculares, 782
- supraescapular, 638
- supraorbitario, 680
- supratroclear, 680
- sural, 666, 835
- temporales profundos, 684
- tentorial, 679
- terminal, 759
- tibial, 664
 - - lesiones, 668
- timpánico, 700
- torácico largo, lesiones, 640
- toracodorsal, 639, 818
- transverso del cuello, 633
- trigémino, 677
- troclear, 672, 674
- utricular, 699
- utriculoampular, 699
- vago, 702
- vegetativos, 24, 621, 624
- vestibular, 699
- vestibulococlear, 698
- vidiano, 691, 726
- X par craneal, 702
- yugular, 720

Neumonía, 523

Neuralgia(s)

- escrotales, 565
- del nervio occipital mayor, 635
- del obturador, 667

Neurectomía presacra, 730

Neurocráneo, 35

- huesos, 35

Neuroglía, 620

Neurohipófisis, 606

- Neurona(s), 620
 – aferentes intrínsecas, 728
 – asociativas, 620
 – entéricas, 728
 – motoras, 620, 728
 – preganglionar, 711
 – secretomotoras, 728
 – sensitivas, 620
 Neuropéptidos, 715
 Neurotransmisores, 621, 714
 – gases, 715
 – monoaminas, 715
 – neuromoduladores, 715
 – neuropéptidos, 715
 – purinas, 715
 Nódulo(s)
 – atrioventricular, 390
 – auriculoventricular, 390
 – de Keith-Flack, 390
 – linfáticos, 417, 595
 – sinoatrial, 390
 – sinoauricular, 390
 – sinusal, 390
 – de Tawara, 390
 Nomenclatura, 6
 Nómina anatómica, 6
 Nuca, 780
 Núcleo(s)
 – **abducens, 674**
 – accesorio, 708
 – ambiguo, 701, 706
 – coclear, 699
 – dorsal del vago, 712
 – de Edinger-Westphal, 673
 – espinal del trigémino, 686
 – gustativo, 694, 701
 – lagrimal, 694, 712, 726
 – mesencefálico del trigémino, 686
 – motor
 – – del facial, 693
 – – del trigémino, 685
 – mucolagrimonasal, 726
 – nervio hipogloso, 709
 – oculomotor, 673
 – parasimpático sacro, 727
 – pontino del trigémino, 686
 – pulposo, 76
 – salivatorio
 – – inferior, 702, 712, 726
 – – superior, 694, 712, 727
 – solitario, 694
 – troclear, 674
 – vestibulares, 699
 Obstrucción coronaria, 405
 Oclusión dental, 287
 Odontoblastos, 286
 Oftalmoscopio, 743
 Oído, 743
 – externo, 744
 – interno, 754
 – – vascularización, 757
 – medio, 746
 Ojo, 731
 – capas, 732
 Olécranon, 822
 Ombligo de la membrana, 748
 Omento
 – menor, 802
 – mayor, 802
 Omóplato, 143
 Oposición del pulgar, 209
 Ora serrata, 735, 737
 Orbículo ciliar, 736
 Oreja, 744
 Orejuelas, 373
 – derecha, 373
 – izquierda, 373
 Órgano(s), 4
 – de la audición, 743
 – de Corti, 698
 – del equilibrio, 743
 – eréctiles, 566
 – – envolturas, 567
 – del gusto, 759
 – de Jacobson, 493
 – linfoide, 592
 – – primarios, 592, 593
 – – secundarios, 592, 595
 – del olfato, 757
 – de los sentidos, 4, 731
 – de la visión, 731
 – vomeronasal, 493
 Orificio(s)
 – abdominal de la trompa, 576
 – del acueducto del vestíbulo, 48
 – ampollar, 755
 – de la arteria
 – – aorta, 378
 – – pulmonar, 377
 – auditivo interno, 47
 – auriculoventricular, 370
 – – derecho, 377
 – – izquierdo, 377
 – cervical interno, 579
 – ciático, 94
 – del conductillo coclear, 48
 – esfenopalatino, 57
 – esofágico, 311
 – etmoidal anterior, 40
 – externo
 – – del conducto carotídeo, 47
 – – de la uretra, 566
 – – del útero, 578
 – faríngeo de la trompa auditiva, 310
 – ileal, 339
 – interno
 – – del conducto carotídeo, 47
 – – de la trompa, 576
 – isquiáticos, 829
 – de Jacobson, 748
 – mitral, 377
 – olfatorios, 56, 62
 – omental, 324;
 véase también *Hiato de Winslow*
 – papilares, 532
 – prepucial, 568
 – del seno
 – – esfenoidal, 43, 56
 – – maxilar, 50
 – – coronario, 376
 – superior del conducto timpánico, 748
 – timpánico de la trompa auditiva, 749, 753
 – tricuspídeo, 377
 – uretral externo, 585
 – uterino de la trompa, 576
 – de las venas
 – – cava, 113
 – – – superior, 375
 – – – inferior, 375
 – – pulmonares, 377
 Orina, formación, 536
 Orofaringe, 310
 Ortodoncia, 16
 Osificación, 92
 – del carpo, 148
 – centros, 17
 – de la clavícula, 148
 – del cráneo, 64
 – del cúbito, 148
 – de la escápula, 148
 – del esternón, 105
 – de las falanges, 148
 – del húmero, 148
 – del metacarpo, 148
 – patrón temporal, 18
 – del radio, 148
 – de las vértebras, 84
 Osteoma del braquial anterior, 181
 Osteoporosis, 16
 Otitis media, 752
 Otoscopia, 752
 Ovarios, 571
 – inervación, 575
 – vascularización, 574
 Ovulación, 574

O

Obelión, 37, 60

P

- Pabellón auditivo, 744
 - externo, 744
 - inervación, 745
 - vascularización, 745
- Paladar, 283
 - blando, 283, 312; véase también *Velo del paladar*
 - duro, 283
- Palma de la mano, 826
- Páncreas, 331, 799
 - endocrino, 333
 - exocrino, 332
 - inervación, 333
 - vascularización, 333
- Panículo adiposo, 128, 765
- Papila(s)
 - caliciformes, 299
 - cónicas, 299
 - duodenal
 - – mayor, 331
 - – menor, 331
 - filiformes, 299
 - foliadas, 299
 - fungiformes, 299
 - gingival, 288
 - incisiva, 283
 - lagrimal, 740, 742
 - lentiformes, 299
 - renales, 531
 - valladas, 299
- Parafimosis, 567
- Paraganglios, 616
 - abdominales, 616
- Parálisis
 - facial, 692
 - laríngeas, 504
- Parametrio, 581, 812
- Parasimpático
 - sacro, 727
 - craneal, 725
- Paratendón, 181
- Pared
 - de la caja del tímpano, 747
 - esternocostal, 787
 - laberíntica, 748
 - mastoidea, 749
 - membranosa, 747
 - tegmentaria, 749
 - timpánica, 747
 - del tórax, 787
 - tubocarotídea, 749
 - uterina, 579
 - yugular, 479
- Parénquima del ovario, 573
- Paroniquia, 767
- Parótida, 306
 - accesoria, 305
- Parotiditis, 306
- Párpados, 739
 - afecciones, 743
 - inervación, 742
 - vascularización, 742
- Pars affixa*, 804
- Pata de ganso profunda, 234
- Pecten, 91, 346
- Pedículos pulmonares, 512, 794
- Pedúnculos cerebrales, 619
- Pelo, 768
- Pelvimetría, 97
- Pelvis, 87, 318
 - ampollar, 537
 - androide, 98
 - antropoide, 98
 - articulaciones, 92
 - dendrítica, 537
 - diferencias sexuales, 96
 - femenina, 811
 - ginecoide, 98
 - masculina, 807
 - mayor, 96
 - menor, 96
 - en la mujer, 98
 - platipeloide, 98
 - ramificada, 537
 - renal, 537
 - suelo, 98
 - visceral, 807
- Pene, 565
 - cuerpo, 566
 - envolturas, 567
 - erección, 569
 - eyaculación, 569
 - glande, 566
 - induración plástica, 567
 - inervación, 569
 - ligamentos, 568
 - raíz, 566
 - vascularización, 568
- Peñasco, 47
- Perfusión cardíaca por el seno coronario, 405
- Pericardio, 399
 - fibroso, 399
 - nervios, 402
 - seroso, 399
 - vasos, 402
- Perimetrio, 581
- Periné, 100, 814
 - anterior, 566
 - – femenino, 816
 - – masculino, 815
 - músculo transverso profundo, 101
 - posterior, 814
- Perineuro, 622
- Periodonto, 287
- Periostio, 12
- Peritoneo, 319, 598
 - del ciego, 340
 - esplénico, 802
 - hepático, 352
 - rectal, 345
- Peritonitis pélvicas, 577
- Pestañas, 740
- Pezón, 587
- Pico
 - de cuchara, 749
 - del esfenoides, 43
- Pie, 211, 838
 - huesos, 217
 - unidad
 - – anterior, 221
 - – media, 219
 - – posterior, 217
 - vascularización arterial, 485
- Piel, 761
 - anejos cutáneos, 761
 - capacidad de absorción, 767
 - envejecimiento, 766
 - inervación, 770
 - injertos, 767
 - líneas
 - – de flexión, 762
 - – de tensión, 762
 - – – mínima, 763
 - quemaduras, 767
 - vascularización, 769
- Pierna, 211, 836
- Píloro, 325
- Pinealocitos, 608
- Pirámide(s)
 - nasal, 492
 - renales, 532
- Pituicitos, 606
- Pituitaria, 603
- Placa(s)
 - dental, 290
 - epifisaria, 14
 - motora terminal, 30
 - motoras, 623
 - de Peyer, 601
 - ungueal, 769
- Planos anatómicos de orientación, 5
 - coroneales, 5
 - de corte, 5
 - frontales, 5
 - horizontales, 5
 - parasagitales, 5
 - sagital o medio, 5
 - transversales, 5
- Planos de Hodge, 98
- Plasma sanguíneo, filtración, 536

Pleura(s), 489, 523, 787

- costal, 525
- cúpula, 525
- diafragmática, 525
- innervación, 526
- mediastínica, 525
- parietal, 524
- senos, 525
- vascularización, 526
- visceral, 524

Plexo(s)

- braquial, 635
- - lesiones, 640
- cardíaco, 392, 705, 719
- carotídeo interno, 720
- celíaco, 722
- cervical, 631
- - infiltraciones, 635
- coccígeo, 667
- - lesiones, 668
- deferencial, 558
- dentario
- - inferior, 289
- - superior, 289
- entéricos, 281
- esofágico, 705
- espermático, 558
- faríngeo, 313, 705
- hipogástrico
- - inferior, 723
- - superior, 344
- linfático axilar, 478
- lumbar, 655
- nervioso
- - carotídeo externo, 305
- - submucoso, 316
- ovárico, 575, 576
- pampiniforme, 558
- parotídeo facial, 690
- pélvico, 723
- pterigoideo, 440
- prostático, 724
- pudendo, 666
- - lesiones, 668
- pulmonar, 705
- rectal, 460
- - inferior, 348
- - medio, 724
- renal, 537
- rotuliano, 660
- sacro, 660
- solar, 722
- subsartorial, 660
- timpánico, 692, 700
- tiroideo impar, 440
- uterinos, 582
- uterovaginal, 577, 582
- vaginal, 460

- venoso

- - pericarotídeo, 752
- - prostático, 562
- - pterigoideo, 778
- - suboccipital, 440
- - vesical, 544, 558
- vertebrales
- - externos, 414
- - internos, 414
- vesical, 460

Pliegue(s)

- aritenoepiglóticos, 503
- circulares, 331
- espiral, 357
- fimbriados, 298
- gástricos, 326
- gastropancreáticos, 805
- glosopiglóticos, 298
- interureteral, 541
- Kerckring, 331
- lagrimal, 742
- medio del recto, 345
- palatinos transversos, 283
- palmeados, 579
- palpebronasal, 740
- peritoneales, 321
- rectouterinos, 812
- salpingofaríngeo, 310
- semilunar(es), 342, 741
- seniles, 766
- transversales del recto, 345
- triangular, 311
- umbilical
- - lateral, 323
- - medial, 323
- - medio, 323
- vestibular, 502
- vestigial de Marshall, 402
- vocal, 502

Polo

- urinario, 533
- vascular, 533

Porción

- fibrocartilaginosa de la tuba auditiva, 753
- flácida, 747
- intermedia, 606
- ósea de la tuba auditiva, 753
- tensa, 474
- tuberal, 605

Poro gustativo, 760

Posición anatómica, 5

Precursor linfático, 592

Predentina, 286

Prensión, 210

Prepucio

- clítoris, 585

- del pene, 568

Presbicia, 743

Presión arterial, medición, 479

Priapismo, 567

Proceso(s)

- caudado, 352
 - ciliares, 735
 - cocleariforme, 749
 - falciforme, 94
 - papilar, 352
 - unciforme del páncreas, 332
 - vaginal del peritoneo, 564
- Prolongación(es)
- axilar de la glándula mamaria, 587
 - faríngea de la parótida, 305
 - lumbricales, 827
 - profunda de la glándula submandibular, 306

Prominencia del conducto facial, 749

- semicircular lateral, 749

Promontorio, 74, 75, 748

Pronación dolorosa, 197

Próstata, 559, 562, 810

- innervación, 562

Prostatectomía, 561

Proteínas, 4

Prótesis valvulares, 405

Protuberancia

- mentoniana, 53
- occipital
- - externa, 42
- - interna, 42

Pubis, 583

Pulmón(es), 489, 512, 787

- cirugía, 523
- cisuras, 516
- derecho, 518
- divisiones, 517
- infección, 523
- izquierdo, 518
- lóbulos, 516
- vascularización, 521

Pulpa

- blanca, 599
- dental, 286
- roja, 599

Punto

- lagrimal, 740
 - nervioso, 782
- Pupila, 734, 736

Q

Quiasma tendinoso, 167

Quimo, 279

Quistes periapicales, 287

R

- Radio, 149
 - fracturas, 154
 - osificación, 148
- Radiografía simple de tórax del corazón, 402
- Radiología convencional, 7
 - del cráneo, 65
- Rafe
 - escrotal, 562
 - del paladar, 283
 - peneano, 568
- Raíz
 - del diente, 285
 - dorsal, 628
 - espinal del nervio accesorio, 707
 - craneal del nervio accesorio, 703
 - oculomotora, 725
 - pulmonar, 512
 - transversa de la apófisis cigomática, 292
 - ventral, 628
- Rama
 - del isquion, 90
 - mandibular del trigémino, 293
 - viscerales pares de la aorta abdominal, 453
- Ramo(s)
 - dorsal
 - del nervio cubital, 649, 824, 826
 - meníngeo del nervio espinal, 684
- Rampa
 - timpánica, 756
 - vestibular, 755
- Raquitismo, 16
- Reacción pupilar, 743
- Reborde ungueal, 769
- Receptores, 620
 - propioceptivos, 624
- Receso(s)
 - duodenal, 806
 - esenoetmoidal, 57
 - esférico, 754
 - esplénico, 804
 - faríngeo, 310
 - inferior de la bolsa omental, 802
 - intersigmoideo, 806
 - peritoneales, 322
 - pineal del tercer ventrículo, 608
 - retrocecal, 806
 - de Rosenmüller, 310
 - sacciforme, 198
 - subcuadricipital, 258
 - subfrénico,
 - derecho, 803
 - izquierdo, 803
 - subpoplíteo, 240, 835
 - superior
 - de la bolsa omental, 796f
 - de la membrana del tímpano, 747
- Recto, 344
 - conducto anal, 345, 814
 - defecación, 347
 - esfínteres, 280
 - femenino, 814
 - inervación, 348
 - masculino, 811
 - musculatura, 346
 - pélvico, 344, 814
 - peritoneo, 345
 - vascularización, 347
- Red
 - carpiana
 - dorsal, 475
 - palmar, 475
 - de Haller, 553
 - periarticular
 - del codo, 476
 - del hombro, 476
 - perirrotuliana, 484
 - subendocárdica terminal, 391
 - testicular, 553
 - venosa dorsal
 - de la mano, 477
 - del pie, 839
- Reflejo deglutorio, 701
- Región(es)
 - del abdomen, 318
 - antebraquial
 - anterior, 822
 - posterior, 822
 - anterior
 - de la pierna, 836
 - de la rodilla, 834
 - axilar, 817
 - braquial
 - anterior, 819
 - posterior, 645, 819
 - bucal, 773
 - de la cadera, 829
 - carpiana
 - anterior, 825
 - posterior, 825
 - cervical
 - anterior, 781
 - lateral, 782
 - posterior, 780
 - deltoidea, 817
 - dorsal, 838
 - de la mano, 828
 - escapular, 817
 - esfenopetromastoidea, 60
 - de la esplacnopleura paraaórtica, 593
 - esternocleidomastoidea, 421, 783
 - faciales
 - anteriores, 773
 - femoral, 832
 - de las fosas nasales, 494
 - frontal, 773
 - glútea, 829
 - inframamaria, 787
 - infraorbitaria, 773
 - infratemporal, 776
 - labial, 773
 - lingual, 779
 - mamaria, 787
 - mastoidea, 45, 47
 - mentoniana, 773
 - occipital, 61, 773
 - olfatoria, 757
 - palmar, 826
 - paratonsilar, 777
 - parietal, 773
 - parotídea, 776
 - pectoral lateral, 787
 - plantar, 839
 - posterior
 - de la pierna, 837
 - de la rodilla, 834
 - preesternal, 787
 - sublingual, 306, 779
 - suprahiodea, 779
 - temporal, 773
 - del triángulo
 - cervical posterior, 782
 - femoral, 488
 - lateral del cuello, 782
 - submandibular, 305
 - umbilical, 318
- Remodelación ósea, 19
- Resonancia magnética, 9
 - del corazón, 402
 - del cráneo, 65
- Respiración
 - externa, 489
 - interna, 489
- Respuesta inmunitaria, 591
- Restos epiteliales de Malassez, 287
- Retina, 736
 - estructura, 737
 - vascularización, 737
- Retináculo
 - extensor, 178
 - flexor, 178
 - de los peroneos, 246
 - uterino, 581
- Retorno venoso, 368
- Retroperitoneo, 322, 794
 - primario, 794
 - secundario, 799
- Rinitis, 495
- Rinoplastia, 490

Riñón(es), 529, 795
 – cápsula adiposa, 531
 – fascia renal, 531
 – inervación, 537
 – proyección, 529
 – sistema tubular, 533
 – vascularización, 535
 Rodete
 – articulares, 23
 – glenoideo, 186
 – del elevador, 310
 – tubárico, 310
 Rodilla, 834
 – del facial, 690
 Rombo de la traqueostomía, 509, 785
 Romboides
 – mayor, 158
 – menor, 158
 Ronquidos, 311
 Rotaciones, 185
 Ruidos valvulares, 404

S

Saco lagrimal, 742
 Sacro, 68, 85
 Sáculo laríngeo, 503
 Safena mayor, canulación, 488
 Saliva, 304
 Sangre
 – circulación, 361
 – – mayor, 362
 – – menor, 362
 – venosa
 – – de la cabeza, 438
 – – del cuello, 438
 Segmento(s)
 – broncopulmonares, 518
 – esplénicos, 599
 – hepáticos, 355
 – pulmonar, 518
 – renales, 535
 – uterino inferior, 578
 Seno(s)
 – arteriales, 382
 – carotídeo, 422
 – coronario, 399
 – de la duramadre, 36
 – del epidídimo, 564
 – esfenoidales, 497
 – etmoidales, 497
 – frontales, 496
 – galactóforos, 588
 – lácteos, 588
 – maxilar, 49, 57, 497
 – oblicuo
 – – de Haller, 401
 – – del pericardio, 401
 – paranasales, 496
 – – inervación, 497
 – – vascularización, 497
 – pericárdicos, 401
 – petroso inferior, 438
 – piriforme, 309f
 – pleurales, 525
 – prostáticos, 546
 – rectales, 345
 – renal, 531
 – sigmoide, 42
 – del tarso, 218
 – timpánico, 749
 – transverso
 – – del pericardio, 401
 – – de Theile, 401
 – de Valsalva, 382
 – de las venas cavas, 376
 – venoso de la esclerótica, 733
 Septo(s)
 – anal intermuscular, 346
 – atrioventricular, 377
 – femoral, 128, 131, 831
 – orbitarios, 741
 Silla turca, 603;
 véase también **Hipófisis**
 Sinapsis, 621
 Sinartrosis, 20
 Síndrome
 – del agujero yugular, 709
 – de Bernard-Horner, 730
 – del corazón roto, 405
 – de Cushing, 616
 – de De Quervain, 181
 – de dificultad respiratoria
 del recién nacido, 524
 – de DiGeorge, 601
 – del hombro doloroso, 159
 – del intestino irritable, 343
 – de Klinefelter, 551
 – nefrótico, 538
 – del «robo de la subclavia», 443
 – del seno carotídeo, 442
 – uña-rótula, 767
 Sínfisis
 – mandibular, 53
 – del pubis, 92, 94
 Sinovial, lesiones, 25
 Sinovitis, 33, 495, 497
 – etmoidal, 497
 – frontal, 497
 – maxilar, 497
 Sistema(s), 4
 – arterial, 403
 – – carotídeo, 420
 – articular, 4, 20
 – cardiovascular, 4
 – de conducción cardíaco, 388
 – dióptrico ocular, 738
 – endocrino, 4, 603
 – – difuso, 281, 603, 614
 – erector de la columna, 132
 – esquelético, 4
 – inmunitario, 4, 591
 – interespinoso, 132
 – linfático, 4, 416
 – MALT, 281; véase también
 Sistema inmunitario
 – muscular, 24
 – nervioso, 4, 619
 – – autónomo, 621, 711
 – – central, 619
 – – partes, 619
 – – entérico, 711, 727
 – – ganglionar, 711
 – – involuntario, 711
 – – – distribución, 725
 – – periférico, 619, 621
 – – – distribución, 718
 – – somático, 621
 – – vegetativo, 621, 711
 – – – simpático, 711
 – – – parasimpático, 711
 – – de la vida de relación, 621
 – óseo, 11; véase también **Huesos**
 – parasimpático, 712
 – porta, 362
 – – hepático, 362
 – simpático, 712
 – tegumentario, 4, 761
 – transversoespinoso, 132
 – venoso, 403, 410
 – – ácigos, 412
 – – cava, 410
 – – porta, 279
 Sístole, 383
 Sondaje vesical, 549
 Sordera
 – de recepción, 752
 – de transmisión, 752
 Submucosa, 280
 Subtálamo, 620
 Suelo
 – de la boca, 283, 779
 – de la pelvis, 814
 Superficie
 – auricular, 91
 – glútea, 89
 – pectínea, 92
 – semilunar, 89
 – oclusal, 287

Supinación, 199
 Surco
 – astragalino, 218
 – balanoprepucial, 566
 – – lateral, 821
 – – medial, 821
 – bicipital
 – carotídeo, 43
 – condilrotroclear, 146
 – coronario, 373
 – costal, 106
 – deltopectoral, 161
 – gingival, 285
 – de His, 375
 – infraorbitario, 50
 – interauricular anterior, 373
 – interlabial, 584
 – intertuberositario, 146
 – interventricular
 – – anterior, 373
 – – posterior, 374
 – labiogeniano, 281
 – lagrimal, 50
 – mediano de la lengua, 298
 – nasolabial, 281
 – ninfohimeneal, 585
 – óptico, 44
 – palatino mayor, 50
 – prequiasmático, 62
 – del promontorio, 748
 – radial, 146
 – del seno
 – – longitudinal superior, 495
 – – petroso inferior, 42
 – – sagital superior, 42
 – – sigmoide, 42
 – – transverso, 63
 – subnasal, 281
 – terminal, 298, 375
 – V lingual, 298
 Sustancia
 – blanca, 621
 – gris, 621
Sustentaculum tali, 219
 Sutura
 – coronal, 37, 39, 54
 – frontal, 39, 64
 – incisiva, 50
 – metópica, 39, 64
 – palatina
 – – media, 50
 – – transversa, 51
 – sagital, 37, 60

T

Tabaquera anatómica, 171, 472

Tabique(s)
 – escrotal, 562
 – interauricular, 375
 – interventricular, 377
 – nasal
 – – cartílago, 490
 – – desviaciones, 490
 – palmar
 – – lateral, 827
 – – medial, 827
 – del pene, 566
 – rectovaginal, 813
 – rectovesical, 808
 – testiculares, 551
 Tálamo, 620
 Tallo de la epiglotis, 501
 Tapones auditivos, 752
 Tarsos palpebrales, 740
 Techo del tímpano, 48
 Tejido(s), 4
 – de conducción, 383
 – conectivo de las inserciones musculares, 27
 – – aponeurosis de inserción, 27
 – – inserciones carnosas, 27
 – – tendón, 27
 – conectivo del músculo, 25
 – – del vientre muscular, 25
 – – – aponeurosis de envoltura, 27
 – – – endomisio, 25
 – – – epimisio, 27
 – – – fascia, 27
 – – – fascículos, 27
 – – – perimisio, 27
 – conectivo intramiocárdico, arquitectura, 387
 – conectivo paratendinoso, 181
 – linfoide
 – – asociado a la piel, 601
 – – asociado a mucosas, 600
 – muscular esquelético, 25
 – – células satélites, 25
 – – fibras
 – – – contráctiles, 25
 – – – extrafusales, 25
 – – – intrafusales, 25
 – – husos musculares, 25
 – nervioso, 620
 Tela subcutánea, 761, 765
 Telencéfalo, 619
 Tendón(es), 24, 27
 – de Aquiles, 239
 – calcáneo, 239, 837
 – – tendinitis, 224
 – cricoesofágico, 316
 – del cuádriceps, 230, 259
 – de Todaro, 376
 Tenosinovitis, 181

Tercer ventrículo, 620
 Testículos, 551
 – descenso, 554
 – inervación, 558
 – torsión, 565
 – vascularización, 558
 Testosterona, 551
 Timo, 593
 – inervación, 595
 – vascularización, 595
 Tiroidectomía, 615
 Tiroides, 603; véase también
 Glándula(s) tiroides
 – inervación, 611
 – vascularización, 611
 Tirotropina, 610
 Tiroxina, 610
 Tomografía computarizada, 8
 – del cráneo, 65
 Tomografía de emisión de positrones del corazón, 403
 Tono muscular, 30
 Tonsilas, 307
 Tórax, 67, 104, 787
 – articulaciones, 107
 – cavidad torácica, 787
 – en conjunto, 109
 – huesos, 104
 – músculos, 110
 Torniquete, 479
 Torsión del testículo, 565
 Tortícolis, 157
 Trabécula(s)
 – carnosas, 377
 – septomarginal, 378
Trabeculum iridocorneal, 739
 Tracto
 – espinal del trigémino, 686
 – iliopectíneo, 131
 – iliotibial, 225
 – olivococlear, 699
 – solitario, 694
 – supraopticohipofisario, 606
 – uveal, 732, 734
 Trago, 745
 Transcavidad de los epiplones, 804
 Tráquea, 508
 – inervación, 511
 – vascularización, 511
 Traqueostomía, 511
 Trasfondo de la vejiga, 541
 Triángulo
 – anterior del cuello, 783
 – de Calot, 357
 – carotídeo, 421, 786
 – cervical posterior, 782
 – femoral, 830

- hepatocístico, 357
- de Koch, 376
- lateral del cuello, 636, 782
- muscular, 784, 785
- nugal, 119
- occipital, 118
- omoclavicular, 118
- omotraqueal, 784
- de Scarpa, 830
- submandibular, 305, 784
- submentoniano, 783, 784
- suboccipital, 119
- vaginal, 583
- Trígonos fibrosos, 380
- Triyodotironina, 610
- Tróclea, 153, 676
- astragalina, 217, 269
- femoral, 213, 255
- humeral, 146
- de los peroneos, 219
- Tromboflebitis, 370, 675
- oftálmica, 443
- Trombos, 370
- Trombosis del sistema cava inferior, 412
- Trompa(s)
- auditiva, 753
- de Eustaquio, 753
- de Falopio, 575
- - ligadura, 577
- - sección, 577
- uterinas, 575
- - - - - inervación, 576
- - - - - ligadura, 577
- - - - - sección, 577
- - - - - vascularización, 576
- Tronco(s), 67
- arterial braquiocefálico, 420
- basilar, 436
- broncomediastínicos, 464
- celíaco, 447
- ciático, lesiones, 668
- costocervical, 437
- del encéfalo, 619
- intestinales, 465
- linfáticos, 418
- - subclavio, 478
- lumbares, 419, 465
- primarios del plexo braquial, 636
- pulmonar, 415
- subclavio
- - derecho, 420
- - izquierdo, 420
- tirocervical, 436
- vagal
- - anterior, 705
- - posterior, 705

- vasos, 443
- venosos
- - braquiocefálicos, 410
- - porta, 461
- yugular, 440, 442
- Troquín, 146
- Troquíter, 146
- Tuba auditiva, 753
- inervación, 754
- vascularización, 753
- Tubérculo(s)
- accesorio, 71
- articular, 46, 61, 745
- carotídeo, 73
- cigomático
- - anterior, 46
- - posterior, 46
- costal, 108
- cuneiforme, 503
- de Darwin, 745
- del escaleno anterior, 106
- faríngeo, 41
- del labio superior, 281
- de Lisfranc, 106
- mamilar, 71
- de Montgomery, 586
- de Morgagni, 586
- omental, 332, 352
- palatino, 283
- púbico, 92
- Tuberculosis pulmonar, 523
- Tuberosidad
- bicipital, 163
- coracoclavicular, 143
- costal, 143
- deltoidea, 146
- frontal, 37f
- glútea, 212
- ilíaca, 91
- infraglenoidea, 146f
- maxilar, 50
- mayor del húmero, 159
- menor del húmero, 159
- pronadora, 149
- del radio, 150
- sacra, 74
- supraglenoidea, 163
- tibial, 215
- Tubo(s)
- colectores, 533
- digestivo, 279
- de rayos X, 7
- Túbulos seminíferos, 551, 553
- Túnel carpiano, 644
- Túnica
- albugínea, 551, 566
- fibrosa, 732

- vaginal, 564
- vascular, 734

U

- Úlcera(s)
- por decúbito, 767
- gástrica, 329
- Ulna, 147
- Unguis, 52
- Unidades motoras, 30, 623
- Uñas, 769
- Uraco, 131
- Uréter, 538, 798
- inervación, 540
- vascularización, 540
- Uretra, 544, 813
- esponjosa, 547
- femenina, 547
- - inervación, 548
- - vascularización, 548
- masculina, 544
- - inervación, 547
- - vascularización, 547
- membranosa, 546
- músculo
- - compresor, 102
- - esfínter externo, 101
- orificio externo, 566
- prostática, 546
- traumatismos, 549
- Urografía, 540
- Útero, 577, 813
- inervación, 582
- vascularización, 581
- Utrículo prostático, 546
- Úvula
- palatina, 312
- vesical, 541

V

- V par, 677
- Vagina, 582, 814
- inervación, 583
- vascularización, 583
- Vaina(s)
- axilar, 121
- carotídea, 122, 421
- femoral, 831
- fibrosas, 178
- - - - - carpianas, 178
- - - - - de los dedos, 179
- - - - - de los tendones
- - - - - de la mano, 178
- fibrosas

Vaina(s) (**cont.**)

- fibrosas
- - de los tendones
- - - de los dedos, 178
- del globo ocular, 773
- perineural, 622
- peritiroidea, 781
- sinoviales, 179
- - digitales, 180
- - de los tendones,
- - - de la mano, 178
- - - de los dedos, 178
- tendinosas
- - dorsales del carpo, 181
- - palmares del carpo, 180

Valléculas epiglóticas, 298

Valvas, 380

- semilunares, 382

Válvula(s)

- del agujero oval, 377
- anales, 346
- aórtica, 382
- auriculoventriculares, 380, 381
- auscultación, 383
- de Bauhin, 339
- bicúspide, 381
- del corazón, 379
- de Eustaquio, 376
- de la fosa
- - navicular, 547
- - oval, 376
- de Heister, 357
- ileocecal, 339
- mitral, 381
- pulmonar, 382
- semilunares, 381, 382
- del seno coronario, 376
- de Thebesio, 376
- tricúspide, 380
- de la vena cava inferior, 376

- venosas, 367

Varices, 370, 488

Varicocele, 565

Vasa

- **privata, 522**
- publica, 521
- **vasorum, 368**
- **nervorum, 622**

Vascularización

- arterial
- - de la mano, 474
- - del pie, 485

Vasectomía, 558

Vasos

- aferentes, 417
- de la cabeza, 420
- colectores linfáticos, 417
- del cuello, 420

- de la extremidad
- - inferior, 478
- - superior, 468
- intraparotídeos, 777
- linfáticos, 361, 417
- del pericardio, 402
- porta hipofisarios, 607
- quilíferos, 337, 418
- rectos, 451
- sanguíneos, 361, 362
- superficiales, 417
- del tronco, 443
- - inervación, 369

Vegetaciones, 311

Vejiga urinaria, 540

- femenina, 813
- inervación, 544
- masculina, 809
- músculo detrusor, 543
- traumatismos, 549
- vascularización, 544

Vellosidades

- aracnoideas, 37
- intestinales, 335

Velo(s), 380

- del paladar, 283, 312
- - inervación, 313
- - pilar
- - - anterior, 310
- - - posterior, 310
- - vascularización, 313
- valvulares, células intersticiales, 381

Vena(s), 361, 362, 366

- del abdomen, 459
- ácigos, 412
- angular, 438
- anomalías, 412
- axilar, 477
- basílica, 477
- basivertebrales, 415
- braquiales, 477
- cardíaca(s)
- - magna, 399
- - media, 399
- - menor, 399
- - mínima, 399
- cava
- - inferior, 411
- - - compresiones, 412
- - superior, 410
- cefálica, 477
- - accesoria, 478
- cervical(es)
- - profunda, 440
- - transversas, 440
- circunflejas ilíacas profundas, 447
- císticas, 463

- colaterales del tronco porta, 463

- cólica

- - derecha, 462
- - media, 462
- de la columna vertebral, 414
- del corazón, 398
- cubitales, 477
- de los dedos, 477
- del diafragma, 447
- digitales
- - dorsales, 477
- - palmares, 477
- - plantares, 487
- dorsal(es)
- - profunda
- - - del clitoris, 460
- - - del pene, 568
- - superficiales del pene, 568
- emisarias, 36
- epigástricas
- - inferiores, 447
- - superiores, 446
- escrotales, 565
- esplénica, 462
- facial, 438
- - profunda, 438
- faríngeas, 438, 439
- femoral, 487
- frénicas
- - inferiores, 447
- - superiores, 447
- gástricas
- - derecha, 327
- - izquierda, 327
- gastroepiploica
- - derecha, 327
- - izquierda, 327
- glútea inferior, 487
- gonadales, 460
- de gran calibre, 366
- del grupo
- - anterior, 446
- - posterior, 447
- hemiácigos, 413
- - accesoria, 413
- hepáticas, 461
- humerales, 477
- ileales, 337
- ileocólica, 462
- ilíaca
- - común, 412
- - externa, 411
- - interna, 412, 562
- iliolumbar, 412
- intercapitulares, 477
- intercostal(es)
- - anteriores, 446
- - posteriores, 447

- - superior
- - - derecha, 447
- - - izquierda, 447
- - suprema, 447
- interóseas, 477
- interventricular posterior, 399
- intervertebrales, 415
- lesiones, 370
- lingual, 438
- lumbar(es), 447
- - ascendente, 447
- mamarias internas, 446
- de la mano, 477
- de Marshall, 399
- maxilar, 439, 440
- mediana
- - antebraquial, 478
- - basilica, 478
- - cefálica, 478
- - del codo, 478
- de mediano calibre, 366
- mesentérica
- - inferior, 462
- - superior, 462
- metacarpianas dorsales, 477
- metatarsianas plantares, 487
- musculofrénicas, 446, 447
- nasales externas, 438
- oblicua de la aurícula izquierda, 399
- obturatriz accesoria, 447
- occipital, 440
- ováricas, 460
- palatina externa, 438
- palpebrales, 438
- pancreáticas, 463
- pancreaticoduodenales, 462
- paraumbilicales, 463
- de las paredes pélvicas, 460
- parotídeas, 438
- de la pelvis, 459
- de pequeño calibre, 366
- pericardiofrénicas, 447
- del periné, 460
- poplítea, 487
- porta, 461
- posterior del ventrículo izquierdo, 399
- prepilórica, 463
- profundas, 366
- - de la lengua, 439
- del pene, 568
- púlica, 447
- pudenda interna, 562
- pulmonares, 416
- radiales, 477
- ranina, 439
- rectal
- - inferior, 345f
- - media, 345f
- renales, 460
- retromandibular, 439
- sacra media, 412
- safena
- - accesoria, 487
- - externa, 487
- - interna, 487
- - mayor, 487
- - menor, 487
- satélite del nervio hipogloso, 439
- sigmoideas, 806
- subclavia, 437, 783
- - vía, 443
- subcostal, 413, 447
- subcutáneas, 367
- - del abdomen, 446
- sublingual, 439
- supraescapulares, 440
- supraorbitaria, 438
- suprarrenales, 460
- supratroclear, 438
- temporal
- - media, 440
- - superficial, 439
- testiculares, 460, 558
- de Thebesio, 399
- tibiales
- - anteriores, 487
- - posteriores, 487
- tiroidea(s)
- - inferior, 440
- - medias, 439
- - superior, 439
- torácicas internas, 446
- toracoepigástricas, 447
- transversa de la cara, 440
- tributarias, 399
- - del sistema cava, 459
- uterinas, 582
- vaginal, 460
- vertebral, 440
- - accesoria, 440
- - anterior, 440
- vesicales, 460
- viscerales, 460
- - pélvicas, 460
- yeyunales, 462
- yugular
- - anterior, 440
- - externa, 439, 783
- - interna, 438
- Ventana
- coclear, 749
- vestibular, 748
- Ventrículos, 377
- del corazón, 377
- derecho, 377
- izquierdo, 378
- laríngeo, 503
- de Morgagni, 503
- Vénulas, 366
- musculares, 366
- poscapilares, 366
- Vértebras, 67
- apófisis, 69
- arco vertebral, 69
- - agujero vertebral, 69
- cervicales, 68, 70, 85
- cuerpo vertebral, 68
- láminas vertebrales, 69
- lumbares, 68, 71, 85
- osificación, 84
- pedículo vertebral, 69
- prominente, 73
- con rasgos morfológicos individuales, 71
- tipo, 68
- torácicas, 68, 70
- Vértices, 68
- Vértice
- auricular, 745
- del diente, 73
- de la mama, 588
- del olécrano, 147
- del sacro, 78
- Vesícula(s)
- biliar, 357
- - peritoneo, 357
- seminales, 559, 562, 811
- - invasión, 562
- sinápticas, 621
- Vestibulares mayores, 585
- Vestíbulo
- bucal, 281
- de la laringe, 503
- membranoso, 756
- nasal, 492
- óseo, 754
- de la vagina, 585
- Vestigio del proceso vagina, 565
- Vía(s)
- biliar
- - accesoria, 357
- - extrahepáticas, 355
- - principal, 356
- espermáticas, 554
- - invasión, 558
- - vascularización, 558
- Vía(s) (cont.)
- interauriculares, 391
- internodales, 391
- lagrimales, 742
- - afecciones, 743
- respiratorias, 489
- urinarias, 537
- Vibras, 492, 768

Vientre

- anterior, 284
- muscular, 24
- posterior, 284

Vínculos tendinosos, 167

Viscerocráneo, 35

Vómer, 52

Vulva, 583

- inervación, 586
- vascularización, 586

X

XI par craneal, 706

XII par craneal, 708

Y

Yeyuno, 279, 333

- e íleon, 805

Yunque, 750

Z

Zona

- hemorroidal, 346
- de transición, 346

Zónula

- ciliar, 735, 736
- de Zinn, 736

J. A. García-Porrero • J. M. Hurlé

Anatomía Humana

2.^a EDICIÓN

Esta segunda edición de la obra *Anatomía Humana* expone de forma completa, sencilla y renovada la morfología del cuerpo humano. La primera parte del texto, dividida en 20 capítulos, está dedicada a la descripción sistemática y funcional de los aparatos y sistemas constituyentes del cuerpo humano, desde una perspectiva morfológica con criterios funcionales y de aplicación clínica. La segunda parte, formada por 4 capítulos, es una aproximación topográfica de todas las regiones del cuerpo humano, realzando la importancia de las relaciones espaciales de las estructuras anatómicas y su repercusión clínico-quirúrgica.

Atendiendo a los comentarios recibidos sobre la edición anterior, se ha introducido iconografía para simplificar la comprensión anatómica y se han añadido casos clínicos acompañados de imágenes para comparar la anatomía normal con la alterada por lesión o enfermedad.

Anatomía Humana, 2ª edición, incorpora las siguientes novedades:

- Cada capítulo está compuesto de un texto base acompañado de recuadros en los que se detallan los aspectos complementarios de tipo biológico, evolutivo y clínico.
- Recoge casos clínicos ilustrados que refuerzan el aspecto aplicado del texto y que sirven de introducción al lenguaje de la patología.
- Ofrece un amplio número de imágenes obtenidas de preparaciones naturales y de técnicas de imagen empleadas en la medicina actual.
- Contiene nuevas ilustraciones realizadas mediante una tecnología moderna, que incluye el modelo tridimensional del cuerpo humano desarrollado por Editorial Médica Panamericana.

La presente edición está dirigida a estudiantes y profesionales de Medicina, Fisioterapia, Odontología, Enfermería y otras Ciencias de la Salud. Junto a la obra *Neuroanatomía Humana*, constituye un tratado completo de calidad sobre la Anatomía Humana.