

# Logică Matematică și Computațională – SUBIECTE DE EXAMEN

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

FEBRUARIE–SEPTEMBRIE 2023

## 1 REGULILE DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI

**Timp de lucru:** 3 ore (15 minute pentru citirea subiectelor și câte 55 de minute pentru rezolvarea fiecărui exercițiu).

**Materiale permise:** orice material tipărit sau scris de mână.

**Este interzisă folosirea dispozitivelor electronice.**

**Este interzisă părăsirea sălii de examen timp de o oră și jumătate din momentul primirii subiectelor.**

**Punctaj** (maxim **11,5 puncte**; nota:  $\min\{10, \text{punctaj}\}$ ; observați că **nota 10** poate fi obținută, în cazul unui punctaj maxim pentru TEMELE COLECTIVE, cu două *cerințe reduse* de programare în Prolog, pentru **jumătate de punctaj**, dacă rezolvările sunt aproape perfecte):

- **1 punct** din oficiu;
- **3 puncte** pentru TEMELE COLECTIVE;
- fiecare dintre cele două *cerințe numerotate* ale fiecărui exercițiu: **1,25 puncte**.

Pentru cerințele de programare în Prolog se poate folosi orice predicat predefinit, precum și orice predicat scris la LABORATOR sau într-o TEMĂ COLECTIVĂ, utilizând directiva pentru includerea bazelor de cunoștințe *labNrlmcVer.pl* și *temeleNr.pl* în cea curentă, cu condiția respectării **denumirilor predicatelor** din FIȘIERELE .PL de la LABORATOR și din ENUNȚURILE TEMELOR COLECTIVE. Toate celelalte predicate auxiliare necesare pentru a defini predicatele cerute trebuie scrise pe lucrarea de examen.

## 2 EXAM RULES

**Time for completing the exam paper:** 3 hours (15 minutes for reading the subjects and 55 minutes for solving each exercise).

**Allowed materials:** any printed or handwritten material.

**Using electronic devices is strictly forbidden.**

**Leaving the exam hall within an hour and a half from the moment of receiving the subjects list is strictly forbidden.**

**Score** (maximum **11.5 points**; grade:  $\min\{10, \text{score}\}$ ; notice that the maximum grade 10 can be obtained with two *reduced* Prolog programming *requirements*, for **half of the score**, provided the highest score for the COLLECTIVE ASSIGNMENTS has been obtained and the solutions on the exam paper are nearly perfect):

- **1 point** ex officio;
- **3 point** for the COLLECTIVE ASSIGNMENTS;
- each of the two *numbered* requirements of each exercise: **1.25 points**.

For the Prolog programming requirements, any predefined predicate, as well as any predicate written in any LAB LESSON or COLLECTIVE ASSIGNMENT can be used, using the directive for including the knowledge bases *labNrlmcVer.pl* and *temeleNr.pl* into the current one, provided the **names of the auxiliary predicates** are written exactly as in the .PL FILES from the LAB CLASSES and the ENUNCIATIONS OF THE COLLECTIVE ASSIGNMENTS. All the other auxiliary predicates necessary for defining the required predicates must be written in the exam paper.

### 3 Lista 1 de subiecte

**Exercițiul 1.** Să se determine toate funcțiile strict crescătoare  $f : \mathcal{L}_4 \rightarrow \mathcal{L}_2^3$  de la lanțul cu exact 4 elemente la cub și să se arate că toate aceste funcții sunt morfisme de latici mărginite:

- ① matematic;
- ② prin predicate în Prolog (**indicație:** cu primul predicat veți colecta funcțiile strict crescătoare  $f : \mathcal{L}_4 \rightarrow \mathcal{L}_2^3$ ; pentru al doilea predicat cerut, aveți de demonstrat că fiecare element al listei de funcții returnate de primul predicat este morfism de latici mărginite):
  - un predicat unar  $fctL4laL2xL2xL2(-ListaFctStrCresc)$ , care determină în argumentul său  $ListaFctStrCresc$  lista funcțiilor strict crescătoare de la  $\mathcal{L}_4$  la  $\mathcal{L}_2^3$ ;
  - un predicat zeroar  $toatemorflatmarg$  care întoarce  $true$  ddacă toate funcțiile din lista returnată de predicatul  $fctL4laL2xL2xL2$  sunt morfisme de latici mărginite de la  $\mathcal{L}_4$  la  $\mathcal{L}_2^3$ .

Predicatele auxiliare pentru predicatul  $fctL4laL2xL2xL2$  să fie utilizabile pentru oricare două poseturi finite, iar  $fctL4laL2xL2xL2$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru lanțul cu 4 elemente și cub.

Predicatele auxiliare pentru predicatul  $toatemorflatmarg$  să fie utilizabile pentru oricare două latici finite și orice listă de funcții între aceste două latici finite, iar  $toatemorflatmarg$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru  $\mathcal{L}_4$ ,  $\mathcal{L}_2^3$  și lista de funcții returnată de predicatul  $fctL4laL2xL2xL2$ .

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul unar  $fctL4laL2xL2xL2$  definit ca mai sus.

**Exercițiul 2.** Fie  $V$  mulțimea variabilelor propoziționale și  $E$  mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice, iar  $\alpha, \beta, \varphi \in E$ , astfel încât:

$$\varphi = (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \wedge \neg \beta).$$

Să se demonstreze că, în logica propozițională clasică:

- dacă  $\alpha, \beta \in V$ , atunci enunțul  $\varphi$  e satisfiabil;
- dacă  $\vdash \varphi$ , atunci mulțimea  $\{\alpha, \beta\}$  e nesatisfiabilă:

- ① matematic;
- ② prin predicatele zeroare în Prolog:
  - $propr1$ , care întoarce  $true$  ddacă, în cazul în care  $\alpha, \beta \in V$ , rezultă că enunțul  $\varphi$  e satisfiabil, efectuând o demonstrație semantică pentru faptul că există o interpretare  $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$  cu  $h \models \varphi$  în ipoteza că  $\alpha, \beta \in V$ ;
  - $propr2$ , care întoarce  $true$  ddacă mulțimea  $\{\alpha, \beta\}$  e nesatisfiabilă atunci când  $\varphi$  e teoremă formală, efectuând o demonstrație semantică pentru faptul că, dacă  $\vdash \varphi$ , atunci nu există nicio interpretare  $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$  cu  $h \models \{\alpha, \beta\}$ .

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar unul dintre predicatele zeroare  $propr1$  și  $propr2$ , la alegere.

**Exercițiul 3.** Considerăm signatura de ordinul I:  $\tau = (1; 2; 0)$ , simbolul de operație unară  $f$ , simbolul de relație binară  $R$  și simbolul de constantă  $k$ , o mulțime  $A = \{a, b, c, d\}$  având  $|A| = 4$  și o structură de ordinul I de semnătură  $\tau$ :  $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}}, k^{\mathcal{A}})$ , cu mulțimea suport  $A$ , iar  $f^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$ ,  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  și  $k^{\mathcal{A}} \in A$  definite astfel:

- $f^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  este relația funcțională totală a cărei închidere reflexivă coincide cu închiderea reflexivă a relației de succesiune a mulțimii total ordonate  $(A, \leq)$  având  $\min(A, \leq) = a$ ,  $\max(A, \leq) = d$  și  $b < c$  (unde  $<$  este relația de ordine strictă asociată relației de ordine  $\leq$ );

- $R^A$  este relația de ordine strictă a posetului  $(A, \sqsubseteq)$  izomorf cu rombul  $\mathcal{L}_2^2$  având  $\min(A, \sqsubseteq) = a$  și  $\max(A, \sqsubseteq) = d$ ;
- $k^A \in \{b, c, d\}$  și are proprietatea că există  $p \in A$  astfel încât  $(k^A, p) \in f^A \cap R^A$ .

Considerăm două variabile distincte  $x, y \in Var$  și enunțul:

$$\varepsilon = \forall x \forall y [(f(x)=k \wedge f(k)=y \wedge R(k, y)) \rightarrow R(x, y)].$$

Să se determine funcția  $f^A$ , relația binară  $R^A$  și constanta  $k^A$ , apoi să se determine dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$ :

① matematic;

② prin predicate în Prolog:

- un predicat unar  $detf(-Fctf)$ , care întoarce în argumentul său  $Fctf$  funcția de la  $A$  la  $A$  care, ca relație binară pe  $A$ , are aceeași închidere reflexivă ca și relația de succesiune asociată ordinii totale  $\leq$  pe  $A$  cu proprietățile:  $\min(A, \leq) = a$ ,  $\max(A, \leq) = d$  și  $b < c$ ;
- un predicat unar  $detR(-RelR)$ , care întoarce în argumentul său  $RelR$  relația de ordine strictă asociată ordinii  $\sqsubseteq$  pe  $A$  cu proprietățile:  $(A, \sqsubseteq) \cong \mathcal{L}_2^2$ ,  $\min(A, \sqsubseteq) = a$  și  $\max(A, \sqsubseteq) = d$ ;
- un predicat unar  $detk(-Ctk)$ , care întoarce în argumentul său  $Ctk$  elementul lui  $A \setminus \{a\}$  cu proprietatea că relația binară  $RelR$  returnată de predicatul  $detR$  conține perechea formată din elementul  $Ctk$  și imaginea lui  $Ctk$  prin funcția  $Fctf$  returnată de predicatul  $detf$ ;
- un predicat zeroar  $verifAsatepsilon$ , care întoarce *true* dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$  și *false* dacă  $\mathcal{A} \not\models \varepsilon$ , efectuând o demonstrație semantică, prin testarea perechilor de valori din mulțimea  $A$  pentru variabilele  $x, y$  într-o interpretare arbitrară (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară (funcțională totală), deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții; a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar  $verifAsatepsilon$ , introducând direct operația unară  $f^A$ , relația binară  $R^A$  și constanta  $k^A$  în baza de cunoștințe.

Pentru **punctajul complet**, predicatele auxiliare pentru predicatele  $detf$  și  $detR$  să fie utilizabile pentru orice poset finit în locul lui  $(A, \leq)$ , respectiv  $(A, \sqsubseteq)$ , cele pentru predicatul  $detk$  să fie utilizabile pentru orice mulțime finită în locul lui  $A$ , orice element al acelei mulțimi (în locul lui  $a \in A$ ) care va fi scos din  $A$  pentru a obține mulțimea (în locul lui  $\{b, c, d\}$ ) în care va fi căutat elementul  $Ctk$ , orice funcție de la  $A$  la  $A$  și orice relație binară pe  $A$ , iar  $detf$ ,  $detR$  și  $detk$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru poseturile de mai sus, respectiv pentru mulțimea  $A$ , elementul  $a \in A$ , funcția returnată de predicatul  $detf$  și relația binară returnată de predicatul  $detR$ .

## 4 Lista 2 de subiecte

**Exercițiul 4.** Să se determine toate morfismele de latici mărginite  $f : \mathcal{L}_2^3 \rightarrow \mathcal{L}_3$  de la cub la lanțul cu exact 3 și să se arate că niciuna dintre aceste funcții nu este surjectivă:

① matematic;

② prin predicate în Prolog (**indicație:** cu primul predicat veți colecta morfismele de latici mărginite  $f : \mathcal{L}_2^3 \rightarrow \mathcal{L}_3$ ; pentru al doilea predicat cerut, aveți de demonstrat că fiecare element al listei de funcții returnate de primul predicat este nesurjectiv):

- un predicat unar  $fctL2xL2xL2laL3(-ListaMorfLatMarg)$ , care determină în argumentul său  $ListaMorfLatMarg$  lista morfismelor de latici mărginite de la  $\mathcal{L}_2^3$  la  $\mathcal{L}_3$ ;
- un predicat zeroar  $niciunasurj$  care întoarce  $true$  ddacă niciuna dintre funcțiile din lista returnată de predicatul  $fctL2xL2xL2laL3$  nu este surjectivă.

Predicatul auxiliar pentru predicatul  $fctL2xL2xL2laL3$  să fie utilizabile pentru oricare două latici finite, iar  $fctL2xL2xL2laL3$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru cub și lanțul cu 3 elemente.

Predicatul auxiliar pentru predicatul  $niciunasurj$  să fie utilizabile pentru orice listă de funcții cu același codomeniu, iar  $niciunasurj$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru lista de funcții returnată de predicatul  $fctL2xL2xL2laL3$ .

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul unar  $fctL2xL2xL2laL3$  definit ca mai sus.

**Exercițiul 5.** Fie  $V$  mulțimea variabilelor propoziționale și  $E$  mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice, iar  $\alpha, \beta, \varphi \in E$ , astfel încât  $\varphi = [(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta] \rightarrow (\alpha \wedge \beta)$ .

Să se demonstreze că, în logica propozițională clasică:

- dacă  $\alpha, \beta \in V$ , atunci enunțul  $\varphi$  e satisfiabil;
- dacă mulțimea de enunțuri  $\{\alpha, \beta\}$  e nesatisfiabilă, atunci enunțul  $\varphi$  e nesatisfiabil.

① matematic;

② prin predicatele zeroare în Prolog:

- $propr1$ , care întoarce  $true$  ddacă, atunci când  $\alpha, \beta \in V$ , există o interpretare  $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$  care satisface enunțul  $\varphi$ , efectuând o demonstrație semantică pentru această implicație;
- $propr2$ , care întoarce  $true$  ddacă, atunci când nicio interpretare nu satisface mulțimea  $\{\alpha, \beta\}$ , nu există interpretări care să satisfacă enunțul  $\varphi$ , efectuând o demonstrație semantică pentru această implicație.

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar unul dintre predicatele zeroare  $propr1$  și  $propr2$ , la alegere.

**Exercițiul 6.** Considerăm signatura de ordinul I:  $\tau = (1; 2; 0)$ , simbolul de operație unară  $f$ , simbolul de relație binară  $R$  și simbolul de constantă  $k$ , o mulțime  $A = \{a, b, c, d\}$  având  $|A| = 4$  și o structură de ordinul I de signatură  $\tau$ :  $\mathcal{A} = (A, f^A, R^A, k^A)$ , cu mulțimea suport  $A$ , iar  $f^A : A \rightarrow A$ ,  $R^A \subseteq A^2$  și  $k^A \in A$  definite astfel:

- $f^A \subseteq A^2$  este închiderea simetrică a relației de succesiune a posetului  $(A, \leq)$  având elementele minimale  $a$  și  $b$ , elementele maximale  $c$  și  $d$ ,  $a$  incomparabil cu  $d$ , iar  $b$  incomparabil cu  $c$ ;
- $R^A$  este relația de echivalență pe  $A$  generată de relația binară  $f^A$ ;
- $k^A \in \{b, c, d\} \cap a/R^A$ .

Considerăm două variabile distincte  $x, y \in Var$  și enunțul:

$$\varepsilon = \forall x \forall y [(f(x)=k \wedge R(k, y)) \rightarrow R(x, y)].$$

Să se determine funcția  $f^A$ , relația binară  $R^A$  și constanta  $k^A$ , apoi să se determine dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$ :

① matematic;

② prin predicate în Prolog:

- un predicat unar  $detf(-Fctf)$ , care întoarce în argumentul său  $Fctf$  funcția de la  $A$  la  $A$  care, ca relație binară pe  $A$ , este egală cu închiderea simetrică a relației de succesiune a posetului  $(A, \leq)$  având  $Min(A, \leq) = \{a, b\}$ ,  $Max(A, \leq) = \{c, d\}$ ,  $a||d$  și  $b||c$ ;
- un predicat unar  $detR(-RelR)$ , care întoarce în argumentul său  $RelR$  cea mai mică relație de echivalență pe  $A$  care include relația funcțională totală  $Fctf$  returnată de predicatul  $detf$ ;
- un predicat unar  $detk(-Ctk)$ , care întoarce în argumentul său  $Ctk$  elementul diferit de  $a$  din clasa de echivalență a lui  $a$  în relația de echivalență  $RelR$  returnată de predicatul  $detR$ ;
- un predicat zeroar  $verifAsatepsilon$ , care întoarce  $true$  dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$  și  $false$  dacă  $\mathcal{A} \not\models \varepsilon$ , efectuând o demonstrație semantică, prin testarea perechilor de valori din mulțimea  $A$  pentru variabilele  $x, y$  într-o interpretare arbitrară (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară (funcțională totală), deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții; a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar  $verifAsatepsilon$ , introducând direct operația unară  $f^A$ , relația binară  $R^A$  și constanta  $k^A$  în baza de cunoștințe.

Pentru **punctajul complet**, predicatele auxiliare pentru predicatele  $detf$ , respectiv  $detR$ , respectiv  $detk$  să fie utilizabile pentru orice poset finit, respectiv orice relație binară pe o mulțime finită, respectiv orice relație de echivalență pe o mulțime finită și orice element al acelei mulțimi finite, iar  $detf$ ,  $detR$ ,  $detk$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru posetul  $(A, \leq)$  de mai sus, respectiv relația binară funcțională totală pe mulțimea  $A$  returnată de predicatul  $detf$ , respectiv relația de echivalență pe mulțimea  $A$  returnată de predicatul  $detR$  și elementul  $a \in A$ .

## 5 Lista 3 de subiecte

**Exercițiul 7.** Să se determine toate funcțiile strict descrescătoare  $f : \mathcal{L}_2^2 \rightarrow \mathcal{L}_3$  de la romb la lanțul cu 3 elemente și să se arate că toate aceste funcții sunt surjective:

- ① matematic;
- ② prin predicate în Prolog (**indicație:** cu primul predicat veți colecta funcțiile strict descrescătoare  $f : \mathcal{L}_2^2 \rightarrow \mathcal{L}_3$ ; pentru al doilea predicat cerut, aveți de demonstrat că fiecare element al listei de funcții returnate de primul predicat satisface proprietatea de surjectivitate):
  - un predicat unar  $fctL2xL2laL3(-ListaFctStrDescresc)$ , care determină în argumentul său  $ListaFctStrDescresc$  lista funcțiilor strict descrescătoare de la  $\mathcal{L}_2^2$  la  $\mathcal{L}_3$ ;
  - un predicat zeroar  $toatesurj$  care întoarce  $true$  dacă toate funcțiile din lista returnată de predicatul  $fctL2xL2laL3$  sunt surjective.

Predicatele auxiliare pentru predicatul  $fctL2xL2laL3$  să fie utilizabile pentru oricare două poseturi finite, iar  $fctL2xL2laL3$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru romb și lanțul cu 3 elemente.

Predicatele auxiliare pentru predicatul  $toatesurj$  să fie utilizabile pentru orice listă de funcții având același codomeniu finit, iar  $toatesurj$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru lista de funcții returnată de predicatul  $fctL2xL2laL3$ .

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul unar  $fctL2xL2laL3$  definit ca mai sus.

**Exercițiul 8.** Fie  $V$  mulțimea variabilelor propoziționale și  $E$  mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice, iar  $\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi \in E$ , astfel încât:

$$\varphi = (\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow \gamma \quad \text{și} \quad \psi = \gamma \rightarrow (\alpha \wedge \neg \beta).$$

Să se demonstreze că, în logica propozițională clasică:

- nicio interpretare care satisface mulțimea de enunțuri  $\{\varphi, \psi\}$  nu satisface enunțul  $\gamma$ ;
- dacă mulțimea de enunțuri  $\{\varphi, \psi\}$  e satisfiabilă, atunci enunțul  $\gamma$  nu e teoremă formală.

① matematic;

② prin predicatele zeroare în Prolog:

- *propr1*, care întoarce *true* ddacă orice interpretare  $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$  satisface implicația  $h \models \{\varphi, \psi\} \Rightarrow h \models \gamma$ , efectuând o demonstrație semantică pentru această implicație pentru orice interpretare  $h$ , mai precis pentru fiecare triplet de valori de adevăr pentru enunțurile  $\alpha, \beta, \gamma$  într-o interpretare  $h$ ;
- *propr2*, care întoarce *true* ddacă satisfiabilitatea mulțimii de enunțuri  $\{\varphi, \psi\}$  implică  $\models \gamma$ , folosind predicate auxiliare care testează satisfiabilitatea mulțimii de enunțuri  $\{\varphi, \psi\}$  și dacă enunțul  $\gamma$  e teoremă formală, prin testarea tuturor tripletelor de valori de adevăr pentru enunțurile  $\alpha, \beta, \gamma$  într-o interpretare.

Pentru **jumătate din punctajul de la această a doua cerință**, puteți scrie doar unul dintre predicatele zeroare *propr1* și *propr2*, la alegere.

**Exercițiul 9.** Considerăm signatura de ordinul I:  $\tau = (1; 2, 2; \emptyset)$ , simbolul de operație unară  $f$  și simbolurile de relații binare  $Q, R$ , o mulțime  $A = \{a, b, c, d\}$  având  $|A| = 4$  și o structură de ordinul I de semnătură  $\tau$ :  $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, Q^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}})$ , cu mulțimea suport  $A$ , iar  $f^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$ ,  $Q^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  și  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  definite astfel:

- $Q^{\mathcal{A}}$  este relația de succesiune a lanțului  $(A, \leq)$  având  $\min(A, \leq) = a$ ,  $\max(A, \leq) = d$  și  $b < c$ ;
- $R^{\mathcal{A}} = (Q^{\mathcal{A}})^{-1}$ ;
- ca relație binară pe  $A$ ,  $f^{\mathcal{A}} \supseteq Q^{\mathcal{A}}$  și  $f^{\mathcal{A}} \cap R^{\mathcal{A}} \neq \emptyset$ .

Considerăm două variabile distincte  $x, y \in Var$  și enunțul:

$$\varepsilon = \exists x \exists y [(f(x) = f(y)) \rightarrow (Q(x, y) \vee R(x, y))].$$

Să se determine funcția  $f^{\mathcal{A}}$  și relațiile binare  $Q^{\mathcal{A}}$  și  $R^{\mathcal{A}}$ , apoi să se determine dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$ :

① matematic;

② prin predicate în Prolog:

- un predicat unar *detQ*(-RelQ), care întoarce în argumentul său *RelQ* relația de succesiune asociată ordinii totale  $\leq$  pe  $A$  cu proprietățile:  $\min(A, \leq) = a$ ,  $\max(A, \leq) = d$  și  $b < c$ ;
- un predicat unar *detR*(-RelR), care întoarce în argumentul său *RelR* inversa relației binare returnate de predicatul unar *detQ*;
- un predicat unar *detf*(-Fctf), care întoarce în argumentul său *Fctf* relația binară funcțională totală pe  $A$  care include relația binară returnată de predicatul unar *detQ* și nu este disjunctă de relația binară returnată de predicatul unar *detR*;
- un predicat zeroar *verifAsatepsilon*, care întoarce *true* ddacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$  printr-o demonstrație semantică, testând perechile de valori din  $A$  pentru variabilele  $x, y$  într-o interpretare arbitrară (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară (funcțională totală), deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții; a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la această a doua cerință, puteți scrie doar predicatul zeroar *verifAsatepsilon*, introducând direct operația unară  $f^A$  și relațiile binare  $Q^A$  și  $R^A$  în baza de cunoștințe.

Pentru **punctajul complet**, predicatele auxiliare pentru predicatele  $detQ$ ,  $detR$  și  $detf$  să fie utilizabile pentru orice mulțime finită în locul lui  $A$  și orice relație de ordine totală pe acea mulțime finită, iar  $detQ$ ,  $detR$  și  $detf$  să aplice aceste predicate auxiliare pentru mulțimea  $A$  și ordinea totală  $\leq$  de mai sus.

## 6 Lista 4 de subiecte

**Exercițiul 10.** Să se determine toate morfismele injective de poseturi  $f : \mathcal{M}_3 \rightarrow \mathcal{N}_5$  de la diamant la pentagon și să se arate că:

- niciuna dintre aceste funcții nu este morfism de latici de la  $\mathcal{M}_3$  la  $\mathcal{N}_5$ ,
- pentru fiecare dintre aceste funcții  $f : \mathcal{M}_3 \rightarrow \mathcal{N}_5$  și fiecare sublatice mărginită proprie (i.e. strict inclusă în  $\mathcal{M}_3$ )  $S$  a lui  $\mathcal{M}_3$  a cărei imagine prin  $f$  nu este lanț (ca subposet al lui  $\mathcal{N}_5$ ), restricția  $f|_S : S \rightarrow \mathcal{N}_5$  a lui  $f$  la  $S$  este morfism de latici mărginite,

① matematic;

② prin predicate în Prolog (**indicație:** cu primul predicat veți colecta funcțiile crescătoare injective  $f : \mathcal{M}_3 \rightarrow \mathcal{N}_5$ ; pentru celelalte predicate, aveți de demonstrat că fiecare element al listei de funcții returnate de primul predicat satisface fiecare dintre criteriile corespunzătoare acelor proprietăți; pentru al treilea predicat aveți de determinat și submulțimile  $S$  ale diamantului închise la operațiile de latice mărginită care conțin măcar două elemente  $x, y \in S$  cu  $f(x)$  și  $f(y)$  incomparabile în pentagon, și de verificat faptul că  $f$  păstrează operațiile de latice mărginită pe  $S$ ):

- un predicat unar *fctM3laN5(-ListaFctCrescInj)*, care determină în argumentul său *ListaFctCrescInj* lista funcțiilor crescătoare injective de la  $\mathcal{M}_3$  la  $\mathcal{N}_5$ ;
- un predicat zeroar *niciunamorfism* care întoarce *true* ddacă niciuna dintre funcțiile din lista returnată de predicatul *fctM3laN5* nu e morfism de latici de la  $\mathcal{M}_3$  la  $\mathcal{N}_5$ ;
- un predicat zeroar *restrmorfism* care întoarce *true* ddacă fiecare funcție din lista returnată de predicatul *fctM3laN5* păstrează operațiile de latice mărginită pe fiecare sublatice mărginită proprie a diamantului a cărei imagine prin acea funcție nu e total ordonată ca subposet al pentagonului.

Pentru **jumătate din punctajul** de la această a doua cerință, puteți scrie doar predicatul unar *fctM3laN5* definit ca mai sus.

**Exercițiul 11.** Fie  $E$  mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice, iar  $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in E$  și  $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(E)$ . Să se demonstreze că au loc următoarele reguli de deducție în logica propozițională clasică:

- $$\frac{\Sigma \cap \Delta \vdash \alpha \rightarrow (\beta \wedge \gamma), \Sigma \vdash (\beta \vee \delta) \rightarrow (\alpha \wedge \gamma), \Delta \vdash (\alpha \vee \delta) \leftrightarrow (\beta \vee \gamma)}{\Sigma \cup \Delta \vdash (\alpha \wedge \beta \wedge \gamma) \vee (\neg \alpha \wedge \neg \beta \wedge \neg \gamma)},$$
- $$\frac{\{\alpha, \beta\} \vdash \gamma \leftrightarrow \delta, \{\gamma, \delta\} \vdash \alpha \rightarrow \neg \beta}{\{\alpha, \beta\} \vdash \neg \gamma \wedge \neg \delta},$$

① matematic;

② prin predicatele zeroare în Prolog:

- *regula1*, care întoarce *true* ddacă are loc prima dintre cele două reguli de deducție de mai sus;
- *regula2*, care întoarce *true* ddacă are loc a doua dintre cele două reguli de deducție de mai sus.

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar *regula1*.

**Exercițiul 12.** Considerăm signatura de ordinul I:  $\tau = (1; 2; \emptyset)$ , simbolul de operație unară  $f$  și simbolul de relație binară  $R$ , o mulțime  $A = \{a, b, c, d\}$  având  $|A| = 4$ , relația binară  $Q = \{(a, b), (c, d)\}$  pe  $A$  și o structură de ordinul I de semnătură  $\tau$ :  $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}})$ , cu mulțimea suport  $A$ , iar  $f^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$  și  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  având proprietățile:

- relația binară funcțională totală  $f^{\mathcal{A}}$  de la  $A$  la  $A$  coincide cu închiderea simetrică a lui  $Q$ ;
- $R^{\mathcal{A}}$  este relația de ordine pe  $A$  având pe  $Q$  drept relație de succesiune asociată.

Considerăm două variabile distincte  $x, y \in Var$  și enunțul:

$$\varepsilon = \exists x \forall y [R(f(x), f(y)) \rightarrow (R(y, x) \vee \neg R(x, y))].$$

Să se determine funcția  $f^{\mathcal{A}}$  și relația binară  $R^{\mathcal{A}}$ , apoi să se determine dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$ :

① matematic;

② prin predicate în Prolog:

- un predicat unar *detopunara*( $-Fct$ ), care întoarce în argumentul său  $Fct$  relația binară funcțională totală pe  $A$  egală cu închiderea simetrică a lui  $Q$ ;
- un predicat unar *detrelbin*( $-Rel$ ), care întoarce în argumentul său  $Rel$  relația de ordine pe  $A$  asociată relației de succesiune  $Q$ ;
- un predicat zeroar *verifAsatepsilon*, care întoarce *true* ddacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$  (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară (funcțională totală), deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții; a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar *verifAsatepsilon*, introducând direct operația unară  $f^{\mathcal{A}}$  și relația binară  $R^{\mathcal{A}}$  în baza de cunoștințe.

## 7 Lista 5 de subiecte

**Exercițiul 13.** Să se determine toate funcțiile strict crescătoare  $f : \mathcal{M}_3 \rightarrow \mathcal{L}_2^2$  de la diamant la romb și să se arate că:

- toate aceste funcții sunt surjective,
- toate aceste funcții  $f : \mathcal{M}_3 \rightarrow \mathcal{L}_2^2$  păstrează relația de succesiune, i.e. satisfac proprietatea:  $(\forall x, y \in \mathcal{M}_3) (x \prec y \implies f(x) \prec f(y))$ ,
- niciuna dintre aceste funcții nu este morfism de latici de la  $\mathcal{M}_3$  la  $\mathcal{L}_2^2$ ,

① matematic;

② prin predicate în Prolog (**indicație:** cu primul predicat colectați funcțiile strict crescătoare de la diamant la romb; pentru celelalte predicate, aveți de demonstrat că fiecare element al listei de funcții returnate de primul predicat satisface fiecare dintre criteriile corespunzătoare acelor proprietăți):

- un predicat unar *fctM3laL2xL2*( $-ListaFctStrictCresc$ ), care determină în argumentul său *ListaFctStrictCresc* lista funcțiilor strict crescătoare de la  $\mathcal{M}_3$  la  $\mathcal{L}_2^2$ ;



- un predicat zeroar *toatesurj* care întoarce *true* ddacă toate funcțiile din lista returnată de predicatul *fctM3laL2xL2* sunt surjective;
- un predicat zeroar *toateprezsucc* care întoarce *true* ddacă toate funcțiile din lista returnată de predicatul *fctM3laL2xL2* păstrează relația de succesiune;
- un predicat zeroar *niciunamorflat* care întoarce *true* ddacă niciuna dintre funcțiile din lista returnată de predicatul *fctM3laL2xL2* nu este morfism de latici de la  $\mathcal{M}_3$  la  $\mathcal{L}_2^2$ .

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar un predicat unar *morfM3laL2xL2(-ListaMorfPoseturi)*, care determină în argumentul său *ListaMorfPoseturi* lista morfismelor de poseturi, i.e. a funcțiilor crescătoare, de la  $\mathcal{M}_3$  la  $\mathcal{L}_2^2$ .

**Exercițiul 14.** Fie  $V$  mulțimea variabilelor propoziționale și  $E$  mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice,  $\alpha, \beta, \gamma \in E$ , iar  $\Sigma = \{\neg\alpha \rightarrow (\beta \wedge \gamma), \alpha \leftrightarrow (\beta \vee \gamma)\}$ . Să se demonstreze că:

- $\Sigma \vdash \alpha$ ,
- dacă  $\alpha, \beta, \gamma \in V$ , atunci mulțimea de enunțuri  $\Sigma$  e satisfiabilă,
- dacă  $\vdash \neg\alpha$ , atunci  $\Sigma$  e nesatisfiabilă:

① matematic;

② prin predicatele zeroare în Prolog:

- *alfadinSigma*, care întoarce *true* ddacă are loc deducția sintactică  $\Sigma \vdash \alpha$ ;
- *satisfSigma*, care întoarce *true* ddacă  $\Sigma$  e satisfiabilă;
- *caznesatSigma*, care întoarce *true* ddacă, atunci când  $\vdash \neg\alpha$ , mulțimea  $\Sigma$  e nesatisfiabilă.

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar *alfadinSigma*.

**Exercițiul 15.** Considerăm signatura de ordinul I:  $\tau = (1; 2; 0)$ , simbolul de operație unară  $f$ , simbolul de relație binară  $R$  și simbolul de constantă  $k$ , o mulțime  $A = \{a, b, c, d\}$  având  $|A| = 4$ , relația binară  $Q = \{(a, b), (b, c)\}$  pe  $A$  și o structură de ordinul I de semnătură  $\tau$ :  $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}}, k^{\mathcal{A}})$ , cu mulțimea suport  $A$ , iar  $f^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$ ,  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  și  $k^{\mathcal{A}} \in A$  având proprietățile:

- funcția  $f^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$  este surjectivă, iar, ca relație binară funcțională totală de la  $A$  la  $A$ ,  $f^{\mathcal{A}}$  include relația de succesiune a lanțului  $(A, \leq)$  având  $\min(A, \leq) = a$ ,  $\max(A, \leq) = d$  și  $b < c$ , unde  $<$  este ordinea strictă asociată ordinii totale  $\leq$ ;
- $R^{\mathcal{A}}$  este relația de ordine pe  $A$  a cărei relație de succesiune asociată este  $Q$ ;
- $k^{\mathcal{A}} \in A$  nu este nici element minimal, nici element maximal în posetul  $(A, R^{\mathcal{A}})$ .

Considerăm două variabile distincte  $x, y \in Var$  și enunțul  $\varepsilon = \forall x \forall y [(f(x)=y \wedge f(y)=k) \rightarrow R(x, y)]$ . Să se determine funcția  $f^{\mathcal{A}}$ , relația binară  $R^{\mathcal{A}}$  și constanta  $k^{\mathcal{A}}$ , apoi să se determine dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$ :

① matematic;

② prin predicate în Prolog:

- un predicat unar *detopunara(-Fct)*, care întoarce în argumentul său *Fct* operația unară  $f^{\mathcal{A}}$  pe  $A$  cu proprietățile de mai sus (**indicație:** aveți de determinat o funcție surjectivă de la  $A$  la  $A$  care include relația de succesiune a acelui lanț cu 4 elemente; soluția, deci valoarea variabilei *Fct* care satisface acest predicat, este unică);

- un predicat unar  $detrelbin(-Rel)$ , care întoarce în argumentul său  $Rel$  relația de ordine pe  $A$  având pe  $Q$  drept relație de succesiune asociată;
- un predicat unar  $detct(-Ct)$ , care întoarce în argumentul său  $Ct$  elementul lui  $A$  care nu este nici minimal, nici maximal în posetul  $(A, R^A)$ , unde  $R^A$  este relația binară returnată de predicatul unar  $detrelbin$ ;
- un predicat zeroar  $verifAsatepsilon$ , care întoarce  $true$  ddacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$  (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară (funcțională totală), deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții; a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar  $verifAsatepsilon$ , introducând direct operația unară  $f^A$ , relația binară  $R^A$  și constanta  $k^A$  în baza de cunoștințe.

## 8 Lista 6 de subiecte – ENGLEZĂ

**Exercise 1.** Determine all functions  $f : \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3 \rightarrow \mathcal{N}_5$  from the direct product of the two-element chain with the three-element chain to the pentagon which preserve the cover relation, meaning that they satisfy the property:

$$(\forall x, y \in \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3) (x \prec y \implies f(x) \prec f(y)),$$

and prove that:

- all these functions preserve the minimum and the maximum for these bounded lattices, meaning they satisfy  $f(0) = 0$  and  $f(1) = 1$ ,
  - none of these functions is surjective,
  - none of these functions is a bounded lattice morphism from  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  to  $\mathcal{N}_5$ ,
- ① mathematically (**hint:** as you may notice from the Hasse diagrams of these two lattices, there exists a unique function from  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  to  $\mathcal{N}_5$  which preserves the cover relation  $\prec$ );
  - ② with Prolog predicates (**hint:** for the first predicate, you may collect the functions with that property, in a similar manner to the predicate  $colectfct$  from the laboratory lessons, using only the cover relations of the two posets; for the other predicates, you have to prove that each element of the functions list returned by the first predicate – which you don't apriori assume to be a singleton – satisfies each of the criteria corresponding to those properties):
    - a unary predicate  $fctL2xL3laN5(-ListaFctPrezSucc)$ , which determines in its argument  $ListaFctPrezSucc$  the list of the functions from  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  to  $\mathcal{N}_5$  that preserve the cover relation;
    - a nullary predicate  $toateprez01$  which returns  $true$  iff all functions from the list returned by the predicate  $fctL2xL3laN5$  preserve the constants 0 and 1;
    - a nullary predicate  $niciunasurj$  which returns  $true$  iff none of the functions from the list returned by the predicate  $fctL2xL3laN5$  is surjective;
    - a nullary predicate  $niciunamorflat$  which returns  $true$  iff none of the functions from the list returned by the predicate  $fctL2xL3laN5$  is a lattice morphism from  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  to  $\mathcal{N}_5$ .

For **half of the score** for this second requirement, you may write solely a unary predicate  $morflatL2xL3laN5(-ListaMorf)$ , that determines in its argument  $ListaMorf$  the list of the bounded lattice morphisms from  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  to  $\mathcal{N}_5$ .

**Exercise 2.** Let  $V$  be the set of the propositional variables and  $E$  the set of formulas of classical propositional logic, and  $\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi \in E$ , such that:

$$\varphi = \alpha \leftrightarrow [(\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)] \quad \text{and} \quad \psi = (\beta \leftrightarrow \gamma) \rightarrow \alpha.$$

Prove that:

- $\{\varphi\} \vdash \psi$ ,
- if  $\alpha, \beta, \gamma \in V$ , pairwise distinct, then  $\{\psi\} \not\vdash \varphi$ ,
- if  $\vdash \beta$  and  $\vdash \gamma$ , then  $\{\psi\} \vdash \varphi$ :

① mathematically;

② with the nullary Prolog predicates:

- *psidinfo*, which returns *true* iff the syntactic deduction  $\{\varphi\} \vdash \psi$  holds;
- *finudinpsi*, which returns *true* iff the syntactic deduction  $\{\psi\} \vdash \varphi$  does not hold;
- *fidinpsidcteor*, which returns *true* iff, when  $\vdash \beta$  and  $\vdash \gamma$ , the syntactic deduction  $\{\psi\} \vdash \varphi$  holds.

For **half of the score** for *this second requirement*, you may write solely the nullary predicate *psidinfo*.

**Exercise 3.** Let us consider the first order signature  $\tau = (1; 2; \emptyset)$ , the unary operation symbol  $f$  and the binary relation symbol  $R$ , a set  $A = \{a, b, c, d\}$  having  $|A| = 4$ , the binary relation  $Q = \{(a, b), (c, c)\}$  on  $A$  and a first order structure of signature  $\tau$   $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}})$  with set reduct  $A$ ,  $f^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$  and  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  with the properties:

- the reflexive closure of the functional total binary relation  $f^{\mathcal{A}}$  from  $A$  to  $A$  coincides with the reflexive closure of  $Q$  (**hint:** there exists a unique functional total binary relation  $f^{\mathcal{A}}$  from  $A$  to  $A$  with this property);
- $R^{\mathcal{A}}$  is the equivalence relation on  $A$  generated by  $Q$  (**hint:** it suffices to write the equivalence classes of  $R^{\mathcal{A}}$ , then draw its directed graph diagram, you don't have to apply the symmetric, reflexive and transitive closures to the binary relation  $Q$  one after the other).

Let us consider two distinct variables  $x, y \in Var$  and the formula  $\varepsilon = \forall x \exists y [R(x, f(y)) \rightarrow (f(f(x))=y)]$ . Determine the function  $f^{\mathcal{A}}$  and the binary relation  $R^{\mathcal{A}}$ , then determine whether  $\mathcal{A} \models \varepsilon$ :

① mathematically;

② with Prolog predicates:

- a unary predicate *detopunara*( $-Fct$ ), which returns in its argument  $Fct$  the functional total binary relation on  $A$  whose reflexive closure coincides to that of  $Q$  (**hint:** you have to determine a function from  $A$  to  $A$  with this property; the solution, so the value of the variable  $Fct$  that satisfies this predicate, is unique);
- a unary predicate *detrelbin*( $-Rel$ ), which returns in its argument  $Rel$  the equivalence relation on  $A$  generated by  $Q$ ;
- a nullary predicate *verifAsatepsilon*, which returns *true* iff  $\mathcal{A} \models \varepsilon$  (**hint:** pay attention to the representation of a function as a (functional total) binary relation, so as a list of pairs, which can be given to a unary predicate in a single clause, versus its representation by as many clauses for a binary predicate as there are elements in the domain of that function; the second representation is sufficient for the following reduced requirement, but the predicates for generation and collection of functions written at the laboratory classes use the first of these representations).

For **half of the score** for *this second requirement*, you may write solely the nullary predicate *verifAsatepsilon*, directly giving the unary operation  $f^{\mathcal{A}}$  and the binary relation  $R^{\mathcal{A}}$  in the knowledge base.

## 9 Lista 6 de subiecte – ROMÂNĂ

**Exercițiul 16.** Să se determine toate funcțiile  $f : \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3 \rightarrow \mathcal{N}_5$  de la produsul direct al lanțului cu două elemente cu lanțul cu trei elemente la pentagon care păstrează relația de succesiune, i.e. satisfac proprietatea:

$$(\forall x, y \in \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3) (x \prec y \implies f(x) \prec f(y)),$$

și să se arate că:

- toate aceste funcții păstrează minimul și maximul pentru aceste latici mărginite, i.e. satisfac  $f(0) = 0$  și  $f(1) = 1$ ,
  - niciuna dintre aceste funcții nu este surjectivă,
  - niciuna dintre aceste funcții nu este morfism de latici de la  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  la  $\mathcal{N}_5$ ,
- ① matematic (**indicație:** după cum observați din diagramele Hasse ale acestor două latici, există o unică funcție de la  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  la  $\mathcal{N}_5$  care păstrează relația de succesiune  $\prec$ );
- ② prin predicate în Prolog (**indicație:** la primul predicat, puteți colecta funcțiile cu acea proprietate, în maniera din predicatul *colectfct* de la laborator, folosind doar relațiile de succesiune ale celor două poseturi; pentru celelalte predicate, aveți de demonstrat că fiecare element al listei de funcții returnate de primul predicat – despre care nu veți presupune apriori că este un singleton – satisface fiecare dintre criteriile corespunzătoare acelor proprietăți):
- un predicat unar *fctL2xL3laN5(-ListaFctPrezSucc)*, care determină în argumentul său *ListaFctPrezSucc* lista funcțiilor de la  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  la  $\mathcal{N}_5$  care păstrează relația de succesiune;
  - un predicat zeroar *toateprez01* care întoarce *true* ddacă toate funcțiile din lista returnată de predicatul *fctL2xL3laN5* păstrează constantele 0 și 1;
  - un predicat zeroar *niciunasurj* care întoarce *true* ddacă niciuna dintre funcțiile din lista returnată de predicatul *fctL2xL3laN5* nu este surjectivă;
  - un predicat zeroar *niciunamorflat* care întoarce *true* ddacă niciuna dintre funcțiile din lista returnată de predicatul *fctL2xL3laN5* nu este morfism de latici de la  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  la  $\mathcal{N}_5$ .

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar un predicat unar *morflatL2xL3laN5(-ListaMorf)*, care determină în argumentul său *ListaMorf* lista morfismelor de latici mărginite de la  $\mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_3$  la  $\mathcal{N}_5$ .

**Exercițiul 17.** Fie  $V$  mulțimea variabilelor propoziționale și  $E$  mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice, iar  $\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi \in E$ , astfel încât:

$$\varphi = \alpha \leftrightarrow [(\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)] \quad \text{și} \quad \psi = (\beta \leftrightarrow \gamma) \rightarrow \alpha.$$

Să se demonstreze că:

- $\{\varphi\} \vdash \psi$ ,
- dacă  $\alpha, \beta, \gamma \in V$ , două câte două distincte, atunci  $\{\psi\} \not\vdash \varphi$ ,
- dacă  $\vdash \beta$  și  $\vdash \gamma$ , atunci  $\{\psi\} \vdash \varphi$ :

- ① matematic;
- ② prin predicatele zeroare în Prolog:

- *psidinfi*, care întoarce *true* ddacă are loc deducția sintactică  $\{\varphi\} \vdash \psi$ ;
- *finudinpsi*, care întoarce *true* ddacă nu are loc deducția sintactică  $\{\psi\} \vdash \varphi$ ;
- *fidinpsidteor*, care întoarce *true* ddacă, atunci când  $\vdash \beta$  și  $\vdash \gamma$ , are loc deducția sintactică  $\{\psi\} \vdash \varphi$ .

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar *psidinfi*.

**Exercițiul 18.** Considerăm signatura de ordinul I:  $\tau = (1; 2; \emptyset)$ , simbolul de operație unară  $f$  și simbolul de relație binară  $R$ , o mulțime  $A = \{a, b, c, d\}$  având  $|A| = 4$ , relația binară  $Q = \{(a, b), (c, c)\}$  pe  $A$  și o structură de ordinul I de semnătură  $\tau$ :  $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}})$ , cu mulțimea suport  $A$ , iar  $f^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$  și  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$  având proprietățile:

- închiderea reflexivă a relației binare funcționale totale  $f^{\mathcal{A}}$  de la  $A$  la  $A$  coincide cu închiderea reflexivă a lui  $Q$  (**indicație:** există o unică relație binară funcțională totală  $f^{\mathcal{A}}$  de la  $A$  la  $A$  cu această proprietate);
- $R^{\mathcal{A}}$  este relația de echivalență pe  $A$  generată de  $Q$  (**indicație:** e suficient să scrieți clasele de echivalență ale lui  $R^{\mathcal{A}}$ , apoi să-i desenați diagrama prin graf orientat, nu e nevoie să aplicați succesiv închiderile simetrică, reflexivă și tranzitivă relației binare  $Q$ ).

Considerăm două variabile distincte  $x, y \in Var$  și enunțul  $\varepsilon = \forall x \exists y [R(x, f(y)) \rightarrow (f(f(x))=y)]$ .

Să se determine funcția  $f^{\mathcal{A}}$  și relația binară  $R^{\mathcal{A}}$ , apoi să se determine dacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$ :

① matematic;

② prin predicate în Prolog:

- un predicat unar *detopunara*( $-Fct$ ), care întoarce în argumentul său  $Fct$  relația binară funcțională totală pe  $A$  a cărei închidere reflexivă coincide cu cea a lui  $Q$  (**indicație:** aveți de determinat o funcție de la  $A$  la  $A$  cu această proprietate; soluția, deci valoarea variabilei  $Fct$  care satisface acest predicat, este unică);
- un predicat unar *detrelbin*( $-Rel$ ), care întoarce în argumentul său  $Rel$  relația de echivalență pe  $A$  generată de  $Q$ ;
- un predicat zeroar *verifAsatepsilon*, care întoarce *true* ddacă  $\mathcal{A} \models \varepsilon$  (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară (funcțională totală), deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții; a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar *verifAsatepsilon*, introducând direct operația unară  $f^{\mathcal{A}}$  și relația binară  $R^{\mathcal{A}}$  în baza de cunoștințe.