

常微分方程

第五章 一阶线性微分方程组

上海财经大学应用数学系

March 24, 2010

第五章一阶线性微分方程组

模型1 人造卫星的运动

试建立地球人造卫星绕地球运动的微分方程。(忽略其它天体对人造卫星的影响, 只计及地球引力场对人造卫星的作用)

卫星的运动方程为

$$\begin{cases} m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{f m M x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \\ m \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{f m M y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \end{cases} \quad (1)$$

这就是一个含有两个未知函数的微分方程组。

第五章一阶线性微分方程组

模型1 人造卫星的运动

试建立地球人造卫星绕地球运动的微分方程。(忽略其它天体对人造卫星的影响, 只计及地球引力场对人造卫星的作用)

卫星的运动方程为

$$\begin{cases} m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{f m M x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \\ m \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{f m M y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \end{cases} \quad (1)$$

这就是一个含有两个未知函数的微分方程组。

第五章一阶线性微分方程组

模型2 捕食-被捕食模型

设有捕食种群和被捕食(或称食饵)种群生活在同一小环境中, 由于生育、生死和相互作用, 两种群个体的数量将随时间变化。试建立两种群个体数量随时间变化的数学模型。

捕食-被捕食两种群相互作用的数学模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - ax - by) \\ \frac{dy}{dt} = y(-r_2 + cx - dy) \end{cases} \quad (2)$$

其中 $d > 0, r_2 > 0, c > 0$ 。这是含有两个未知函数的微分方程组。

第五章一阶线性微分方程组

模型2 捕食-被捕食模型

设有捕食种群和被捕食(或称食饵)种群生活在同一小环境中, 由于生育、生死和相互作用, 两种群个体的数量将随时间变化。试建立两种群个体数量随时间变化的数学模型。

捕食-被捕食两种群相互作用的数学模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - ax - by) \\ \frac{dy}{dt} = y(-r_2 + cx - dy) \end{cases} \quad (2)$$

其中 $d > 0, r_2 > 0, c > 0$ 。这是含有两个未知函数的微分方程组。

5.1 一阶线性微分方程组的一般理论

一阶微分方程组

称

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \frac{dx_2}{dt} = f_2(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \cdots \quad \cdots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{cases} \quad (3)$$

为含有 n 个未知函数 x_1, x_2, \cdots, x_n 的一阶微分方程组。

5.1 一阶线性微分方程组的一般理论

一阶微分方程组的解

如果存在一组函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, 使得在 $[a, b]$ 上有下面 n 个式子

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

恒成立, 则称这组函数是一阶微分方程组(3)在 $[a, b]$ 上的一个解

5.1 一阶线性微分方程组的一般理论

一阶微分方程组的通解

有 n 个任意常数 c_1, c_2, \dots, c_n 的解

$$\begin{cases} x_1 = \phi_1(t, c_1, c_2, \dots, c_n) \\ x_2 = \phi_2(t, c_1, c_2, \dots, c_n) \\ \dots \quad \dots \\ x_n = \phi_n(t, c_1, c_2, \dots, c_n) \end{cases}$$

称为一阶微分方程组(3)的通解。

5.1 一阶线性微分方程组的一般理论

一阶线性微分方程组

有如果一阶微分方程组(3)中的每一个 $f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对所有未知函数都是一次的, 即

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \dots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t) \\ \frac{dx_2}{dt} = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \dots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t) \\ \dots \quad \dots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \dots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t) \end{cases} \quad (4)$$

称(4)为一阶线性微分方程组。其中 $a_{ij}, f_i(t) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续。

5.1 一阶线性微分方程组的一般理论

一阶线性微分方程组的向量形式

$$X' = A(t)X + F(t) \quad (5)$$

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}, F(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \cdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}$$

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \cdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

5.1 一阶线性微分方程组的一般理论

一阶线性微分方程组的向量形式

$$X' = A(t)X + F(t) \quad (5)$$

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}, F(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \cdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}$$

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \cdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

一阶线性微分方程组与高阶线性微分方程等价

$$\begin{cases} \frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t) \\ x(t_0) = \eta_1, x'(t_0) = \eta_2, \cdots, x^{(n-1)}(t_0) = \eta_n \end{cases}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & \cdots & -a_1(t) \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$X(t_0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \eta$$

一阶线性微分方程组与高阶线性微分方程等价

$$\begin{cases} \frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t) \\ x(t_0) = \eta_1, x'(t_0) = \eta_2, \cdots, x^{(n-1)}(t_0) = \eta_n \end{cases}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & \cdots & -a_1(t) \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$X(t_0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \eta$$

高阶线性微分方程组的转化

例

$$\begin{cases} \frac{d^3 x}{dt^3} = a_1(t)x + a_2(t)\frac{dx}{dt} + a_3(t)\frac{d^2 x}{dt^2} + b_1(t)y + b_2(t)\frac{dy}{dt} + f_1(t) \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = c_1(t)x + c_2(t)\frac{dx}{dt} + c_3(t)\frac{d^2 x}{dt^2} + d_1(t)y + d_2(t)\frac{dy}{dt} + f_2(t) \end{cases} \quad (6)$$

作变换, 令

$$x = x_1, \quad \frac{dx_1}{dt} = x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = x_3; \quad y = y_1, \quad \frac{dy_1}{dt} = y_2$$

高阶线性微分方程组的转化

例

$$\begin{cases} \frac{d^3 x}{dt^3} = a_1(t)x + a_2(t)\frac{dx}{dt} + a_3(t)\frac{d^2 x}{dt^2} + b_1(t)y + b_2(t)\frac{dy}{dt} + f_1(t) \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = c_1(t)x + c_2(t)\frac{dx}{dt} + c_3(t)\frac{d^2 x}{dt^2} + d_1(t)y + d_2(t)\frac{dy}{dt} + f_2(t) \end{cases} \quad (6)$$

作变换, 令

$$x = x_1, \quad \frac{dx_1}{dt} = x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = x_3; \quad y = y_1, \quad \frac{dy_1}{dt} = y_2$$

高阶线性微分方程组的转化

得到含有5个未知函数 x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 的一阶线性微分方程组

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ a_1(t) & a_2(t) & a_3(t) & b_1(t) & b_2(t) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ c_1(t) & c_2(t) & c_3(t) & d_1(t) & d_2(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f_1(t) \\ 0 \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

5.1 一阶线性微分方程组的一般理论

存在唯一性定理

设 $A(t)$ 是 $n \times n$ 矩阵, $F(t)$ 是 n 维列向量, 它们都在区间 $[a, b]$ 上连续。则对于区间 $[a, b]$ 上的任何数 t_0 及任一常数向量 $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$, 方程组 $X' = A(t)X + F(t)$ 存在唯一解 $\phi(t)$, 定义于整个区间 $[a, b]$ 上, 且满足初始条件 $\phi(t_0) = \eta$ 。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

齐次线性微分方程组

若线性微分方程组(5)中的 $F(t) \equiv \mathbf{0}$, 即

$$X' = A(t)X \quad (7)$$

称(7)为齐次线性微分方程组。若 $F(t) \not\equiv \mathbf{0}$, 称(5)为非齐次线性微分方程组。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

叠加原理

定理5.2 如果 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_m(t)$ 是齐次线性微分方程组(7)的 m 个解, 则它们的线性组合 $\sum_{i=1}^m c_i X_i(t)$ 也是(7)的解。其中 c_1, c_2, \dots, c_m 是任意常数。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

向量函数组的线性相关性

设 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$ 是区间 $[a, b]$ 上的向量函数, 如果存在不全为零的常数 c_1, c_2, \dots, c_n , 使下式恒成立

$$c_1 X_1(t) + c_2 X_2(t) + \dots + c_n X_n(t) \equiv \mathbf{0}, \quad t \in [a, b]$$

则称此组向量函数在区间 $[a, b]$ 上线性相关, 否则称这组函数线性无关。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

向量函数组的 Wronski 行列式

称区间 $[a, b]$ 上的 n 个向量函数

$$X_1(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) \\ x_{21}(t) \\ \vdots \\ x_{n1}(t) \end{bmatrix}, \quad X_2(t) = \begin{bmatrix} x_{12}(t) \\ x_{22}(t) \\ \vdots \\ x_{n2}(t) \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad X_n(t) = \begin{bmatrix} x_{1n}(t) \\ x_{2n}(t) \\ \vdots \\ x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

构成的行列式为这组向量函数的 Wronski 行列式, 即

$$W[X_1(t), X_2(t), \cdots, X_n(t)] \equiv \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

向量函数线性相关性的判别

定理5.3 如果向量函数 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上线性相关, 则它们在 $[a, b]$ 上的Wronski行列式恒等于零。

向量函数线性相关性的判别

定理5.4 如果向量函数 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$ 是方程组(7)的 n 个解, 则它们在区间 $[a, b]$ 上线性无关的充分必要条件为其Wronski行列式 $W(t) \neq 0, t \in [a, b]$ 。

向量函数线性相关性的判别

定理5.5 方程组(7)一定存在 n 个线性无关解。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

通解结构定理

定理5.6 如果 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$ 是方程组(7)的 n 个线性无关解, 则方程组(7)的通解可以表示为

$$X(t) = c_1 X_1(t) + c_2 X_2(t) + \dots + c_n X_n(t) \quad (8)$$

其中 c_1, c_2, \dots, c_n 是任意常数。且通解(8)包含了方程组(7)的所有解。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

Liouville公式

定理5.7 设 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$ 是方程组(7)的任意 n 个解, 则它们的Wronski行列式 $W(t)$ 满足一阶线性方程

$$W'(t) = [a_{11}(t) + a_{22}(t) + \dots + a_{nn}(t)]W(t)$$

因而有

$$W(t) = W(t_0) \cdot e^{\int_{t_0}^t [a_{11}(s) + a_{22}(s) + \dots + a_{nn}(s)] ds}, \quad t, t_0 \in [a, b] \quad (9)$$

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

一阶齐次线性微分方程组的解矩阵

如果一个 $n \times n$ 矩阵的每一列都是(7)的解, 则称这个矩阵为(7)的解矩阵。

一阶齐次线性微分方程组的基解矩阵

称(7)的 n 个线性无关解组成的解矩阵为(7)的基解矩阵。记为 $\Phi(t)$, 即

$$\Phi(t) = [\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_n(t)]$$

其中 $\phi_i(t)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 是(7)的 n 个线性无关解。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

解矩阵的性质

定理5.8 (7)一定存在一个基解矩阵 $\Phi(t)$ 。如果 $\psi(t)$ 是(7)的任一解, 则

$$\psi(t) = \Phi(t)\mathbf{c}$$

其中 \mathbf{c} 是确定的常数列向量。

解矩阵的性质

定理5.9 (7)的一个解矩阵 $\Phi(t)$ 是基解矩阵的充分必要条件为在区间 $[a, b]$ 上的某一点 t_0 处, $\det \Phi(t_0) \neq 0$ 。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

解矩阵的性质

定理5.10 如果 $\Phi(t)$ 是(7)在区间 $[a, b]$ 上的基解矩阵, C 是非奇异 $n \times n$ 常数矩阵, 则 $\Phi(t)C$ 也是(7)在区间 $[a, b]$ 上的基解矩阵。

解矩阵的性质

定理5.11 如果 $\Phi(t), \Psi(t)$ 是(7)在区间 $[a, b]$ 上的两个基解矩阵, 则存在一个非奇异 $n \times n$ 常数矩阵 C , 使在区间 $[a, b]$ 上 $\Psi(t) = \Phi(t)C$ 。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

例1

验证

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{bmatrix}$$

是方程组

$$X' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} X$$

的基解矩阵，并写出通解。

一阶齐次线性微分方程组解空间的结构

例2

试作出以矩阵

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{-t} & e^{2t} \\ -e^{-t} & -e^{-t} & e^{2t} \end{bmatrix}$$

为基解矩阵的齐次线性微分方程组。

一阶非齐次线性微分方程组解集合的性质

定理5.12

如果 $\bar{X}(t)$ 是非齐次线性微分方程组(5)的解, $X(t)$ 是它对应的齐次线性微分方程组(7)的解, 则 $\bar{X}(t) + X(t)$ 仍是非齐次线性微分方程组(5)的解。

定理5.13

如果 $X_1(t), X_2(t)$ 是非齐次线性微分方程组(5)的两个解, 则 $X_1(t) - X_2(t)$ 是对应的齐次线性微分方程组(7)的解。

一阶非齐次线性微分方程组解集合的性质

通解结构定理

设 $\Phi(t)$ 是齐次线性微分方程组(7)的一个基解矩阵, $\bar{X}(t)$ 是非齐次线性微分方程组(5)的某一解, 则非齐次线性微分方程组(5)的任一解 $X(t)$ 都可表示为

$$X(t) = \Phi(t)\mathbf{c} + \bar{X}(t)$$

其中 \mathbf{c} 是确定的常数列向量。

一阶非齐次线性微分方程组的常数变易法

设 $\Phi(t)$ 是方程组(7)的一个基解矩阵, 于是方程组(7)的通解为

$$X(t) = \Phi(t)\mathbf{c}$$

我们猜测: 方程组(5)也有这种形式的解, 但 \mathbf{c} 应为 t 的函数, 即假设

$$X(t) = \Phi(t)\mathbf{c}(t) \quad (10)$$

是方程组(5)的解。其中 $\mathbf{c}(t)$ 是待定的向量函数。

将(10)代入方程组(5)中, 得

$$\Phi'(t)\mathbf{c}(t) + \Phi(t)\mathbf{c}'(t) = A(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + F(t) \quad (11)$$

因为 $\Phi(t)$ 是方程组(7)的基解矩阵, 所以

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$$

因此, (11)变为

$$\Phi(t)\mathbf{c}'(t) = F(t)$$

一阶非齐次线性微分方程组的常数变易法

又因为 $\Phi(t)$ 是可逆的，从而得

$$\mathbf{c}'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t)$$

两边同时积分，得

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{c}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)F(s)ds \quad (12)$$

将(12)代回(10)中，得

$$X(t) = \Phi(t)\mathbf{c}(t_0) + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)F(s)ds$$

于是方程组(5)的通解为

$$\begin{aligned} X(t) &= \Phi(t)\tilde{\mathbf{c}} + \Phi(t)\mathbf{c}(t_0) + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)F(s)ds \\ &= \Phi(t)\mathbf{c} + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)F(s)ds \end{aligned} \quad (13)$$

一阶非齐次线性微分方程组的常数变易法

例3

试求方程组 $X' = A(t)X + F(t)$ 的通解。其中

$$A(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad F(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{bmatrix}$$

及对应方程组 $X' = A(t)X$ 的基解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{bmatrix}$$

5.2 一阶常系数线性微分方程组

常系数线性微分方程组

设 A 是 $n \times n$ 常数矩阵, 则常系数非齐次线性微分方程组为

$$X' = AX + F(t) \quad (14)$$

其对应的常系数齐次线性微分方程组为

$$X' = AX \quad (15)$$

5.2 一阶常系数线性微分方程组

矩阵指数 $\exp(A)$

设 A 是 $n \times n$ 常数矩阵, 称

$$\exp A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = E + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^n}{n!} + \cdots \quad (16)$$

为矩阵指数。

5.2 一阶常系数线性微分方程组

矩阵指数 $\exp A$ 的性质

(1) 如果矩阵 A, B 可交换, 即 $AB = BA$, 则

$$\exp A \cdot \exp B = \exp(A + B) \quad (17)$$

(2) 对任何矩阵 A , $(\exp A)^{-1}$ 存在, 且

$$(\exp A)^{-1} = \exp(-A) \quad (18)$$

(3) 如果 T 是非奇异矩阵, 则

$$\exp(T^{-1}AT) = T^{-1}(\exp A)T \quad (19)$$

5.2 一阶常系数线性微分方程组

矩阵指数函数 $\exp(At)$

称

$$\exp(At) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n t^n}{n!} \quad (20)$$

为矩阵指数函数。

5.2 一阶常系数线性微分方程组

$\exp(At)$ 的性质

定理5.15 矩阵

$$\Phi(t) = \exp(At)$$

是方程组(15)的基解矩阵, 且 $\Phi(0) = E$ 。

(1) 方程组(15)的通解可以表示为

$$X(t) = \exp(At)c$$

(2) 如果 $\Phi(t)$ 是方程组(15)的另外一个不同于 $\exp(At)$ 的基解矩阵, 则

$$\exp(At) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0) \quad (21)$$

5.2 一阶常系数线性微分方程组

$\exp(At)$ 的性质

定理5.15 矩阵

$$\Phi(t) = \exp(At)$$

是方程组(15)的基解矩阵, 且 $\Phi(0) = E$ 。

(1) 方程组(15)的通解可以表示为

$$X(t) = \exp(At)\mathbf{c}$$

(2) 如果 $\Phi(t)$ 是方程组(15)的另外一个不同于 $\exp(At)$ 的基解矩阵, 则

$$\exp(At) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0) \quad (21)$$

5.2 一阶常系数线性微分方程组

例1

设 A 是一个对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

试求 $X' = AX$ 的基解矩阵 $\exp(At)$ 。

例2

试求 $X' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} X$ 的基解矩阵 $\exp(At)$ 。

常系数齐次线性微分方程组的解法

分析：方程组(15)会不会有形如

$$X(t) = e^{\lambda t} \cdot \mathbf{c}, \quad (\lambda, \mathbf{c} \text{ 未知}, \mathbf{c} \neq 0) \quad (22)$$

的解呢？

将(22)代入方程组(15)中，得

$$(\lambda E - A)\mathbf{c} = 0$$

这意味着， $e^{\lambda t} \cdot \mathbf{c}$ 是方程组(15)的解的充分必要条件为： λ 是矩阵 A 的特征根且 \mathbf{c} 是对应于 λ 的特征向量。

常系数齐次线性微分方程组的解法

矩阵 A 的特征根是单根的情形

定理5.16 如果方程组(15)的系数矩阵 A 的 n 个特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 彼此互异, 且 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是它们对应的特征向量, 则方程组(15)的一个基解矩阵为

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1, e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n] \quad (23)$$

矩阵 A 的特征根是单根的情形

例3

求方程组 $X' = AX$ 的基解矩阵。其中

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

例4

求方程组 $X' = AX$ 的基解矩阵。其中

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$$

常系数齐次线性微分方程组的解法

矩阵 A 的特征根有重根的情形

空间分解法 待定系数法。

矩阵 A 的特征根有重根的情形

空间分解法

定理5.18 如果方程组(15)的系数矩阵 A 有 k 个不同的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, 它们的重数分别为 n_1, n_2, \dots, n_k , 且 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ 。令 η 分别取 n 阶单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$, 则满足初值问题(24)的解可由(25)确定, 分别记为 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$, 于是方程组(15)的一个基解矩阵为

$$\exp(At) = [X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)]$$

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(0) = \eta \end{cases} \quad (24)$$

矩阵 A 的特征根有重根的情形

空间分解法

定理5.18 如果方程组(15)的系数矩阵 A 有 k 个不同的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, 它们的重数分别为 n_1, n_2, \dots, n_k , 且 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ 。令 η 分别取 n 阶单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$, 则满足初值问题(24)的解可由(25)确定, 分别记为 $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$, 于是方程组(15)的一个基解矩阵为

$$\exp(At) = [X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)]$$

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(0) = \eta \end{cases} \quad (24)$$

空间分解法

$$\begin{aligned} X(t) &= \exp(At)\eta = \sum_{i=1}^k \exp(At)\mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k \exp(At) \cdot E \cdot \mathbf{v}_i \\ &= \sum_{i=1}^k \exp(At) \cdot e^{\lambda_i t} \cdot \exp(-\lambda_i Et) \cdot \mathbf{v}_i \\ &= \sum_{i=1}^k e^{\lambda_i t} \cdot \exp(A - \lambda_i E)t \cdot \mathbf{v}_i \\ &= \sum_{i=1}^k e^{\lambda_i t} \left\{ E + t(A - \lambda_i E) + \frac{t^2}{2!}(A - \lambda_i E)^2 + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i - 1)!}(A - \lambda_i E)^{n_i-1} \right\} \mathbf{v}_i \end{aligned} \tag{25}$$

空间分解法

注

如果矩阵 A 只有一个 n 重特征根, 则 n 维欧氏空间不必分解。此时(25)变为

$$X(t) = e^{\lambda t} \left\{ E + t(A - \lambda E) + \frac{t^2}{2!}(A - \lambda E)^2 + \cdots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}(A - \lambda E)^{n-1} \right\}$$

再根据定理5.18, 得方程组(15)的一个基解矩阵

$$\exp(At) = e^{\lambda t} \left\{ E + t(A - \lambda E) + \frac{t^2}{2!}(A - \lambda E)^2 + \cdots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}(A - \lambda E)^{n-1} \right\}$$

空间分解法

例5

求方程组 $X' = AX$ 的基解矩阵。其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

例6

求方程组 $X' = AX$ 的基解矩阵。其中

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -10 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

矩阵 A 的特征根有重根的情形

待定系数法

定理5.19 如果方程组(15)的系数矩阵 A 有 k 个不同特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, 重数分别为 n_1, n_2, \dots, n_k , 且 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. 则对 n_i 重特征根 λ_i , 方程组(15)有 n_i 个线性无关解, 形如

$$X(t) = (R_0 + R_1 t + \dots + R_{n_i-1} t^{n_i-1}) e^{\lambda_i t} \quad (28)$$

其中向量 $R_0, R_1, \dots, R_{n_i-1}$ 由矩阵方程确定:

$$\begin{cases} (A - \lambda_i E) R_0 = R_1 \\ (A - \lambda_i E) R_1 = R_2 \\ \dots \dots \\ (A - \lambda_i E) R_{n_i-2} = R_{n_i-1} \\ (A - \lambda_i E) R_{n_i-1} = 0 \end{cases} \quad (29)$$

矩阵 A 的特征根有重根的情形

待定系数法

用待定系数法求解前面的例5和例6。

常系数非齐次线性微分方程组的解法

常数变易公式

$$X(t) = \int_{t_0}^t \exp[(t-s)A] F(s) ds \quad (30)$$

和

$$X(t) = \exp[(t-t_0)A]\eta + \int_{t_0}^t \exp[(t-s)A] F(s) ds \quad (31)$$

常系数非齐次线性微分方程组的解法

例7

求方程组 $X' = AX + F(t)$ 满足初始条件 $X(0) = \eta$ 的解。其中

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}, \quad F(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \eta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5.3 应用实例

胆固醇流动的仓室模型

在研究传染病的传播、种群生态、环境的污染、药物在人体的分布等问题中，经常把所研究的事物看成由有限个部分组成的系统，而每个部分称为一个仓室。它具有以下特点：

(1) 每个仓室有固定的容量，内含每个时刻都均匀分布着的物质(或能量)；

(2) 各个仓室间以及仓室与外部环境间均可进行物质(或能量)交换，并服从物质(或能量)守恒定律。

这样的系统称为仓室系统。下面根据人体内胆固醇的吸收、合成、排泄等机理来建立胆固醇流动的仓室模型。

5.3 应用实例

人造卫星的运动

求解卫星的运动方程

$$\begin{cases} m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{f m M x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \\ m \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{f m M y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \end{cases} \quad (32)$$