

Reguláris mátrix QR felbontása

1. Számítsuk ki az alábbi mátrixok QR -felbontását Gram-Schmidt-ortogonalizációval:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -3 & 10 & \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{d) } \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 6 & 8 & 0 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

2. További feladatok a QR -felbontás gyakorlására Gram-Schmidt-ortogonalizációval: Bozsik József – Krebsz Anna: Numerikus módszerek példatár 30 – 31. oldal 52–60. feladatok.

Householder-transzformáció

Ha $\mathbf{a} \neq \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ és $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| \neq 0$, akkor $\mathbf{v} = \pm \frac{\mathbf{a} - \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|}$ esetén $H(\mathbf{v})\mathbf{a} = \mathbf{b}$,

ahol $H(\mathbf{v}) = I - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^T$ a Householder-transzformáció mátrixa,
és

$$H(\mathbf{v})\mathbf{c} = \mathbf{c} - 2(\mathbf{v}^T\mathbf{c})\mathbf{v}, \quad \text{ha } \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$$

3. Adjuk meg azt a \mathbf{v} egységvektort, melyre $H(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}$, ha

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

4. Householder-transzformációval hozzuk az $\mathbf{a} = [-1, 1, -1, 1]^T$ vektort $k \cdot \mathbf{e}_1$ alakra! Végezzük el a transzformációt a Householder-mátrix elemeinek kiszámítása nélkül a $\mathbf{b} = [2, 1, 1, 0]^T$ vektoron!
5. Householder-transzformációval hozzuk felsőháromszög mátrix alakra az alábbi lineáris egyenletrendszert, majd visszahelyettesítéssel oldjuk meg! A transzformációt a Householder-mátrix elemeinek kiszámítása nélkül végezzük el!

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

6. Oldjuk meg az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert Householder-transzformációval, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

7. Oldjuk meg az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert Householder-transzformációval, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

8. További feladatok a Householder-transzformáció gyakorlására: Bozsik József – Krebsz Anna: Numerikus módszerek példatár 31-33. oldal 61-75. feladatok.

MEGOLDÁS

1. Számítsuk ki az alábbi mátrixok QR -felbontását Gram-Schmidt-ortogonalizációval:

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

A módszer: A reguláris $A_{n \times n}$ mátrix oszlopvektorai lineárisan függetlenek. A Gram-Schmidt-ortogonalizációval előállítunk egy ortonormált bázist, ezek a vektorok alkotják a Q mátrix oszlopvektorait. Az R felső háromszögmátrix főátlójában a Gram-Schmidt-eljárással konstruált ortogonális vektorok hossza ($\|\cdot\|_2$), míg a diagonális felett az előállítás során fellépő együtthatók szerepelnek.

A módszer lépései:

$$\mathbf{v}_1 := \mathbf{a}_1, \quad \boxed{r_{1,1}} = \|\mathbf{v}_1\|, \quad \boxed{\mathbf{q}_1} = \frac{1}{r_{1,1}} \mathbf{v}_1;$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - r_{1,2} \mathbf{q}_1, \quad \text{ahol } \boxed{r_{1,2}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle \quad (\mathbf{v}_2 \perp \mathbf{q}_1 \text{ miatt}),$$

$$\boxed{r_{2,2}} = \|\mathbf{v}_2\|, \quad \boxed{\mathbf{q}_2} = \frac{1}{r_{2,2}} \mathbf{v}_2;$$

\vdots

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{a}_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{j,k} \mathbf{q}_j, \quad \text{ahol } \boxed{r_{j,k}} = \langle \mathbf{q}_j, \mathbf{a}_k \rangle \quad (\mathbf{v}_k \perp \mathbf{q}_j, j = 1, \dots, k-1 \text{ miatt})$$

$$\boxed{r_{k,k}} = \|\mathbf{v}_k\|, \quad \boxed{\mathbf{q}_k} = \frac{1}{r_{k,k}} \mathbf{v}_k \quad (k=3, \dots, n).$$

Nézzük a példánkat:

$$A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2] = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2] \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix}$$

$$\boxed{r_{11}} = \|\mathbf{a}_1\|_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\boxed{\mathbf{q}_1} = \frac{1}{r_{11}} \mathbf{a}_1 = \frac{1}{5} \mathbf{a}_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{r_{12}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = \frac{1}{5} \cdot ((-2) \cdot 4 + 1 \cdot 3) = -\frac{5}{5} = -1$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - r_{12} \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} - (-1) \cdot \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} -10 + 4 \\ 5 + 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ 8 \end{bmatrix} = \frac{2}{5} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{r_{22}} = \|\mathbf{v}_2\| = \left\| \frac{2}{5} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} \right\|_2 = \frac{2}{5} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \frac{2}{5} \cdot 5 = 2$$

$$\boxed{\mathbf{q}_2} = \frac{1}{r_{22}} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tehát a Q és R mátrixok a következők:

$$Q = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

$$\boxed{r_{1,1}} = \|\mathbf{a}_1\| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5},$$

$$\boxed{\mathbf{q}_1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{1,2}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(2-1) = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - r_{1,2} \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{2,2}} = \|\mathbf{v}_2\| = \frac{3}{5}\sqrt{1+4} = \frac{3}{\sqrt{5}},$$

$$\boxed{\mathbf{q}_2} = \frac{1}{r_{2,2}} \mathbf{v}_2 = \frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{1,3}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(0+0+0) = 0,$$

$$\boxed{r_{2,3}} = \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(0+0+0) = 0,$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{a}_3 - r_{1,3} \mathbf{q}_1 - r_{2,3} \mathbf{q}_2 = \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{3,3}} = \|\mathbf{v}_3\| = 2,$$

$$\boxed{\mathbf{q}_3} = \frac{1}{r_{3,3}} \mathbf{v}_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Végül $A = QR$, ahol

$$Q = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 0 \\ -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 3/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(c)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

$$\boxed{r_{1,1}} = \|\mathbf{a}_1\| = \sqrt{16+9} = 5,$$

$$\boxed{\mathbf{q}_1} = \frac{1}{5}\mathbf{a}_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{1,2}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = \frac{1}{5}(8-3) = 1,$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - r_{1,2} \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{2,2}} = \|\mathbf{v}_2\| = 2,$$

$$\boxed{\mathbf{q}_2} = \frac{1}{r_{2,2}}\mathbf{v}_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{1,3}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_3 \rangle = \frac{1}{5}(0+0+0) = 0,$$

$$\boxed{r_{2,3}} = \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = \frac{1}{5}(0+0+0) = 0,$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{a}_3 - r_{1,3} \mathbf{q}_1 - r_{2,3} \mathbf{q}_2 = \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{3,3}} = \|\mathbf{v}_3\| = 2,$$

$$\boxed{\mathbf{q}_3} = \frac{1}{r_{3,3}}\mathbf{v}_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Végül $A = QR$, ahol

$$Q = \begin{bmatrix} 4/5 & 3/5 & 0 \\ -3/5 & 4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(d)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 6 & 8 & 0 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

$$\boxed{r_{1,1}} = \|\mathbf{a}_1\| = \sqrt{4 + 36 + 9} = 7,$$

$$\boxed{\mathbf{q}_1} = \frac{1}{7}\mathbf{a}_1 = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{1,2}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = \frac{1}{7}(10 + 48 - 9) = 7,$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - r_{1,2} \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ -3 \end{bmatrix} - \frac{7}{7} \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{2,2}} = \|\mathbf{v}_2\| = 7,$$

$$\boxed{\mathbf{q}_2} = \frac{1}{r_{2,2}}\mathbf{v}_2 = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{1,3}} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_3 \rangle = 2,$$

$$\boxed{r_{2,3}} = \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = 0,$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{a}_3 - r_{1,3} \mathbf{q}_1 - r_{2,3} \mathbf{q}_2 = \frac{4}{7} \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\boxed{r_{3,3}} = \|\mathbf{v}_3\| = 4,$$

$$\boxed{\mathbf{q}_3} = \frac{1}{r_{3,3}}\mathbf{v}_3 = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Végül $A = QR$, ahol

$$Q = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 6 & 2 & -3 \\ 3 & -6 & 2 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 7 & 7 & 2 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

2. Adjuk meg azt a \mathbf{v} egységvektort, melyre $H(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}$, ha

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Megoldás:

Mivel $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\|$, alkalmazhatjuk a Householder-transzformációra vonatkozó tételt:

$$\mathbf{v} = \pm \frac{\mathbf{a} - \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|} = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

ugyanis

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}.$$

Ellenőrzés:

$$H(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{a} = (I - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{a} = \mathbf{a} - 2\mathbf{v}(\mathbf{v}^T\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

3. Householder-transzformációval hozzuk az $\mathbf{a} = [-1, 1, -1, 1]^T$ vektort $k \cdot \mathbf{e}_1$ alakra! Végezzük el a transzformációt a Householder-mátrix elemeinek kiszámítása nélkül a $\mathbf{b} = [2, 1, 1, 0]^T$ vektoron!

Megoldás: A Householder-transzformációra vonatkozó tételt szeretnénk alkalmazni:

Most $\mathbf{b} = \pm \|\mathbf{a}\| \mathbf{e}_1$, úgy választjuk meg az előjelet, hogy a \mathbf{v} formulájában szereplő osztásnál nagyobb nevezővel számoljunk (stabilitás!). Ezért legyen $\mathbf{b} = \sigma \|\mathbf{a}\| \mathbf{e}_1$, ahol

$$\sigma = -\text{sign}(a_1) \cdot \|\mathbf{a}\| = -\text{sign}(-1) \sqrt{(-1)^2 + (1)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = 2$$

Továbbá

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} - \sigma \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a} - \sigma \mathbf{e}_1\| = 2\sqrt{3},$$

végül

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{a} - \sigma \mathbf{e}_1}{\|\mathbf{a} - \sigma \mathbf{e}_1\|} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Alkalmazzuk a transzformációt a $\mathbf{b} = [2, 1, 1, 0]^T$ vektorra:

$$\begin{aligned} H(\mathbf{v})\mathbf{b} &= (I - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{b} = \mathbf{b} - 2\mathbf{v}(\mathbf{v}^T\mathbf{b}) = \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{6} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot (-6) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

4. Householder-transzformációval hozzuk felsőháromszög mátrix alakra az alábbi lineáris egyenletrendszert, majd visszahelyettesítéssel oldjuk meg!

A transzformációt a Householder-mátrix elemeinek kiszámítása nélkül végezzük el!

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

Első lépésben az A mátrix első oszlopát Householder-transzformációval $k \cdot \mathbf{e}_1$ alakra hozzuk. A numerikusan stabil számolás érdekében jó előjellet választunk $k = \sigma$ -nak (legyen a $\|\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1\|$ a lehető legnagyobb)

$$\sigma = -\operatorname{sgn}(a_1) \cdot \|\mathbf{a}\|_2 = -\operatorname{sgn}(4) \cdot \sqrt{4^2 + 3^2} = -5$$

Kiszámoljuk a \mathbf{v} vektort.

$$\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \quad \|\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1\|_2 = \frac{\sqrt{10}}{3}, \quad (1)$$

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1}{\|\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

A mátrix első oszlopára nem kell alkalmaznunk a transzformációt, mert a konstrukció garantálja az eredményt, ugyanis

$$\mathbf{H}(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Alkalmazzuk a transzformációt a második oszlopra:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_2 &= (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v} \mathbf{v}^T) \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2 - 2 \cdot \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v}^T \mathbf{a}_2) = \\ &= \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot (-5) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Alkalmazzuk a transzformációt a LER jobb oldali vektorára:

$$\mathbf{H}(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v} \mathbf{v}^T) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} - 2 \cdot \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v}^T \mathbf{b}) = \quad (2)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \quad (3)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Egy Householder-transzformációs lépés után a lineáris egyenletrendszer felsőháromszög alakú lett

$$\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Visszahelyettesítéssel kapjuk a megoldást:

$$\begin{aligned} 2x_2 &= 4 \rightarrow x_2 = 2, \\ -5x_1 + x_2 &= -3 \rightarrow -5x_1 = -5 \rightarrow x_1 = 1. \end{aligned}$$

5. Oldjuk meg az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert Householder-transzformációval, ahol

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Megoldás:

Első lépésben az A mátrix első oszlopát Householder-transzformációval $k_1 \cdot \mathbf{e}_1$ alakra hozzuk. A numerikusan stabil számolás érdekében legyen $k_1 = -\|\mathbf{a}_1\| = -\sqrt{2}$. Ekkor

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \|\mathbf{a}_1\| = \|\mathbf{b}_1\|.$$

Kiszámoljuk a \mathbf{v}_1 vektort:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1}{\|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Most alkalmazzuk a $H(\mathbf{v}_1)$ Householder-transzformációt az A mátrixra (azaz az A oszloppaira).

A mátrix első oszlopára a konstrukció automatikusan adja az eredményt: $H(\mathbf{v}_1)\mathbf{a}_1 = \mathbf{b}_1$.

Alkalmazzuk a transzformációt a második oszlopra:

$$\mathbf{H}(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{a}_2 = (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T) \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2 - 2 \cdot (\mathbf{v}_1^T \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

ugyanis $\mathbf{v}_1^T \mathbf{a}_2 = 0$.

Alkalmazzuk a transzformációt a harmadik oszlopra:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{a}_3 &= (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T) \cdot \mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_3 - 2 \cdot (\mathbf{v}_1^T \mathbf{a}_3) \cdot \mathbf{v}_1 = \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{4 + \sqrt{2}}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{4 + \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} - (3 - \sqrt{2}) \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 + 2\sqrt{2} \\ 0 \\ 3 - \sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2\sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Végül alkalmazzuk a transzformációt a LER jobb oldali vektorára:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{b} &= (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} - 2 \cdot (\mathbf{v}_1^T \mathbf{b}) \cdot \mathbf{v}_1 = \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{6 + 2\sqrt{2}}{4 + 2\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3\sqrt{2} \\ 2 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Láthatjuk, hogy a $H_1 = H(\mathbf{v}_1)$ transzformáció egyszeri végrehajtásával az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ LER felső háromszögalakú lett

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -\sqrt{2} & 0 & -2\sqrt{2} & -3\sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{array} \right].$$

Visszahelyettesítéssel kapjuk a LER megoldását: $x_3 = 1$, $x_2 = 1$, $x_1 = 1$.

Mivel a Householder-transzformáció mátrixa ortogonális mátrix, láthatjuk, hogy az A mátrixnak egy QR felbontását kaptuk az eljárás során, ahol

$$Q = H_1 \quad \text{és} \quad R = H_1 A.$$

6. Oldjuk meg az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert Householder-transzformációval, ahol

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Megoldás:

Első lépésben az A mátrix első oszlopát Householder-transzformációval $k_1 \cdot \mathbf{e}_1$ alakra hozzuk. A numerikusan stabil számolás érdekében legyen $k_1 = -\|\mathbf{a}_1\| = -4$. Ekkor

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \|\mathbf{a}_1\| = \|\mathbf{b}_1\|.$$

Kiszámoljuk a \mathbf{v}_1 vektort:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1}{\|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1\|} = \frac{1}{8} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{e}_1.$$

Most alkalmazzuk a $H(\mathbf{v}_1)$ Householder-transzformációt az A mátrixra (azaz az A oszloppaira).

A mátrix első oszlopára a konstrukció automatikusan adja az eredményt: $H(\mathbf{v}_1)\mathbf{a}_1 = \mathbf{b}_1$.

Alkalmazzuk a transzformációt a második oszlopra:

$$\mathbf{H}(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{a}_2 = (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T) \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2 - 2 \cdot (\mathbf{v}_1^T \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Alkalmazzuk a transzformációt a harmadik oszlopra:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{a}_3 &= (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T) \cdot \mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_3 - 2 \cdot (\mathbf{v}_1^T \mathbf{a}_3) \cdot \mathbf{v}_1 = \\ &= \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot (-2) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Végül alkalmazzuk a transzformációt a LER jobb oldali vektorára:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{b} &= (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} - 2 \cdot (\mathbf{v}_1^T \mathbf{b}) \cdot \mathbf{v}_1 = \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A $H_1 = H(\mathbf{v}_1)$ transzformáció egyszeri végrehajtásával az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ LER a következő alakú lett:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -4 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Alkalmazzuk ismét a Householder-transzformációt a

$$[\tilde{A} \mid \tilde{\mathbf{b}}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

feladatra. Ekkor

$$\tilde{\mathbf{a}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{b}}_1 = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{v}}_2 = \frac{1}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}} \begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$H(\tilde{\mathbf{v}}_2)\tilde{\mathbf{a}}_2 = (I - 2\tilde{\mathbf{v}}_2 \cdot \tilde{\mathbf{v}}_2^T)\tilde{\mathbf{a}}_2 = \tilde{\mathbf{a}}_2 - 2(\tilde{\mathbf{v}}_2^T \cdot \tilde{\mathbf{a}}_2)\tilde{\mathbf{v}}_2 =$$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{2+3\sqrt{2}}{4+2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + (1-2\sqrt{2}) \begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3-\sqrt{2} \\ -1+2\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix},$$

$$H(\tilde{\mathbf{v}}_2)\tilde{\mathbf{b}} = H(\tilde{\mathbf{v}}_2)\tilde{\mathbf{a}}_2 = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

A $H(\tilde{\mathbf{v}}_2)$ transzformáció hatása

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \implies \left[\begin{array}{cc|c} -\sqrt{2} & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \end{array} \right],$$

összefoglalva

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \implies \left[\begin{array}{ccc|c} -4 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \end{array} \right].$$

A LER megoldását visszahelyettesítéssel kapjuk meg: $x_3 = 1$, $x_2 = 0$, $x_1 = 1$.

A Householder-transzformáció kétszeri alkalmazásával az A mátrix QR felbontását kapjuk, ahol

$$Q = H_1 H_2 \quad \text{és} \quad R = H_2 H_1 A,$$

$$H_1 = H(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_2 = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & H(\tilde{\mathbf{v}}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix},$$

$$Q = H_1 H_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}, \quad R = H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ 0 & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$