

Numerikus Módszerek

1. Zh megoldása

2019. november 5.

1. (a) Először váltsuk át a 0,12 és 0,48 számokat kettes számrendszerbe.

	12
0	24
0	48
0	96
1	92
1	84
1	68
1	36
0	72
1	44
0	88

A mantissa hosszának megfelelően az első 6 hasznos jegyet kell megtartanunk, ez az 111101. Mivel az ez után következő 7. jegy nulla, ezért ezen az értéken nem változtatunk. Mivel lefelé kerekítettünk, ezért ellenőriznünk kell, hogy a kapott számhoz vagy a felső szomszédjához van-e közelebb a 0,12.

$$[111101] - 3 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} \right) \cdot 2^{-3} = \frac{32 + 16 + 8 + 4 + 1}{512} = \frac{61}{512}$$

$$[111110] - 3 = \frac{62}{512}$$

Mivel

$$0,119140625 \approx \frac{61}{512} - 0,12 < 0,12 - \frac{62}{512} \approx 0,12109375,$$

ezért $f(0,12) = [111101] - 3 = \frac{61}{512}$ a megfeleltetett gépi szám.

Mivel $0,48 = 4 \cdot 0,12$, ezért az 0,48 gépi megfelelője megegyezik az 0,12-höz tartozó gépi számmal, azzal a különbséggel, hogy most a karakterisztika kettővel nagyobb lesz (az első két nulla törlődik a kettdestörtté alakításkor), vagyis

$$[111101] - 1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} \right) \cdot 2^{-1} = \frac{32 + 16 + 8 + 4 + 1}{128} = \frac{61}{128},$$

ezért $f(0,48) = [111101] - 1 = \frac{61}{128}$ a megfeleltetett gépi szám. (6 pont)

- (b) El kell végeznünk az 0,12 + 0,48 gépi összeadást. Ehhez előbb közös karakterisztikára kell hoznunk a számokat. Mindig a kisebb karakterisztikájú számot igazítjuk a nagyobbhoz, így most az $f(0,12)$ -t kerekítjük. A lecsorduló nulla miatt lefelé kerekítünk, így

$$[111101] - 3 \rightarrow [001111] - 1.$$

$$\begin{array}{r} [111101] - 1 \\ + [001111] - 1 \\ \hline [1001100] - 1 \end{array}$$

Innen normalizálással kapjuk a végeredményt:

$$[1001100] = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}\right) \cdot 2^0 = \frac{19}{32} \approx 0,59375.$$

(3 pont)

(c) $f(0,12) = [111101] - 3$ abszolút hibakorlátja:

$$\Delta_{f(0,12)} = \frac{1}{2} \cdot 2^{-6} \cdot 2^{-3} = 2^{-10}$$

$f(0,48) = [111101] - 1$ abszolút hibakorlátja:

$$\Delta_{f(0,48)} = \frac{1}{2} \cdot 2^{-6} \cdot 2^{-1} = 2^{-8}$$

Az eredmény, $[1001100] = \frac{19}{32}$ abszolút hibakorlátja:

$$\Delta_{\frac{19}{32}} = \frac{1}{2} \cdot 2^{-6} \cdot 2^0 = 2^{-7}$$

(3 pont)

2. Végezzük el az elimináció első két lépését, hogy megsejtsük a megoldást.

1. lépés:

A 2. sorból vonjuk ki az 1. sort.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \boxed{1} & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \boxed{0} & 1 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

2. lépés:

A 3. sorból vonjuk ki a 2. sort.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0} & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pont)

Sejtés: a mátrix általános alakja az elimináció után egy $n \times n$ -es felsőháromszögmátrix lesz.

A diagonálisban 1-esek és a fölötte lévő átlóban -1 -esek.

(1 pont)

Feltesszük tehát, hogy a sejtés a mátrix egy $k \times k$ -s részmátrixára igaz.

Be kell látnunk, hogy ez az elimináció k . lépése után is igaz marad.

A k . lépés előtti állapot:

$$\begin{array}{l}
1. \\
2. \\
\vdots \\
k. \\
k+1. \\
k+2. \\
\vdots \\
n.
\end{array}
\begin{bmatrix}
1 & -1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\
0 & 1 & -1 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \dots & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \boxed{1} & 1 & \dots & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1
\end{bmatrix} \rightarrow$$

A k . lépésben a $k+1$. sorból kivonjuk a k . sort.

k . sor:

$$[0 \ 0 \ \dots \ 1 \ -1 \ \dots \ 0]$$

$k+1$. sor:

$$[0 \ 0 \ \dots \ 1 \ 0 \ \dots \ 0]$$

$k+1$. sor $- k$. sor:

$$[0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1 \ \dots \ 0]$$

A $k+1$. sor eliminálása után, a mátrix bal felső, $(k+1) \times (k+1)$ -s részmátrixa megegyezik a sejtésben megfogalmazottal.

$$\begin{array}{l}
1. \\
2. \\
\vdots \\
k. \\
k+1. \\
k+2. \\
\vdots \\
n.
\end{array}
\begin{bmatrix}
1 & -1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\
0 & 1 & -1 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \dots & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & 0 & 1 & -1 & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \boxed{0} & 1 & \dots & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1
\end{bmatrix}$$

Ezzel beláttuk, hogy $n-1$ Gauss-eliminációs lépés után a mátrix alakja megegyezik a sejtésben megfogalmazottal. A Gauss-elimináció során determináns tartó átalakításokat végeztünk, így a determináns értéke a felsőháromszög alakból a diagonálisban szereplő 1-esek szorzata:

$$\det(A) = 1.$$

(5 pont)

3. (a)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 12 & 4 \\ -4 & 5 & -13 & -1 \\ 12 & -13 & 38 & 8 \\ 4 & -1 & 8 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ l_1 & 1 & 0 & 0 \\ l_2 & l_3 & 1 & 0 \\ l_4 & l_5 & l_6 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -4 & 12 & 4 \\ 0 & u_1 & u_2 & u_3 \\ 0 & 0 & u_4 & u_5 \\ 0 & 0 & 0 & u_6 \end{bmatrix}$$

Az együtthatókat a parkettázásnak megfelelő sorrendben számítjuk ki:

$$\begin{array}{ll}
-4 = l_1 \cdot 4 \rightarrow l_1 = -1 & 5 = l_1 \cdot (-4) + u_1 = 4 + u_1 \rightarrow u_1 = 1 \\
12 = l_2 \cdot 4 \rightarrow l_2 = 3 & -13 = l_1 \cdot 12 + u_2 = -12 + u_2 \rightarrow u_2 = -1 \\
4 = l_4 \cdot 4 \rightarrow l_4 = 1 & -1 = l_1 \cdot 4 + u_3 = -4 + u_3 \rightarrow u_3 = 3
\end{array}$$

Ezt követően kiszámítjuk L második oszlopát:

$$\begin{array}{l}
-13 = l_2 \cdot (-4) + l_3 \cdot u_1 = -12 + l_3 \rightarrow l_3 = -1 \\
-1 = l_4 \cdot (-4) + l_5 \cdot u_1 = -4 + l_5 \rightarrow l_5 = 1
\end{array}$$

és U harmadik sorát:

$$\begin{aligned} 38 &= l_2 \cdot 12 + l_3 \cdot u_2 + u_4 = 36 + 1 + u_4 \rightarrow u_4 = 1 \\ 8 &= l_2 \cdot 4 + l_3 \cdot u_3 + u_5 = 12 + 3 + u_5 \rightarrow u_5 = -1 \end{aligned}$$

Majd végül l_6 -ot és u_6 -ot:

$$\begin{aligned} 8 &= l_4 \cdot 12 + l_5 \cdot u_2 + l_6 = 12 - 3 + l_6 \cdot u_4 \rightarrow l_6 = -1 \\ 18 &= l_4 \cdot 4 + l_5 \cdot u_3 + l_6 \cdot u_5 + u_6 = 4 + 9 + 1 + u_6 \rightarrow u_6 = 4 \end{aligned}$$

Visszaírva a kapott értékeket a megfelelő mátrixokba:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 12 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

(6 pont)

Innen a $\det(A) = 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4 = 16$.

(1 pont)

Az LU-felbontást a „tárolás” módszerrel is elkészíthetjük.

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 4 & -4 & 12 & 4 \\ -4 & 5 & -13 & -1 \\ 12 & -13 & 38 & 8 \\ 4 & -1 & 8 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow \left[\begin{array}{c|ccc} 4 & -4 & 12 & 4 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & -4 & 14 \end{array} \right] \rightarrow \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{c|ccc} 4 & -4 & 12 & 4 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c|ccc} 4 & -4 & 12 & 4 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right] \end{aligned}$$

(b) Vegyük ki U diagonálisát a D diagonális mátrixba.

Ennek felhasználásával a Cholesky-felbontást a következőképpen kapjuk:

$$A = LU = L\sqrt{D}\sqrt{D}L^T = \tilde{L}\tilde{L}^T.$$

$$\tilde{L} = L \cdot \sqrt{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(5 pont)

4. Számítsuk ki az A mátrix QR -felbontását:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2] \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix}$$

$$r_{11} = \|\mathbf{a}_1\|_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{r_{11}}\mathbf{a}_1 = \frac{1}{5}\mathbf{a}_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

(3 pont)

$$r_{12} = \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{q}_1 \rangle = \frac{1}{5} \cdot ((-2) \cdot 4 + 1 \cdot 3) = -\frac{5}{5} = -1$$

$$\mathbf{a}_2 - r_{12}\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} - (-1) \cdot \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} -10 + 4 \\ 5 + 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ 8 \end{bmatrix} = \frac{2}{5} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$r_{22} = \|\mathbf{a}_2 - r_{12}\mathbf{q}_1\|_2 = \left\| \frac{2}{5} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} \right\|_2 = \frac{2}{5} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \frac{2}{5} \cdot 5 = 2$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{r_{22}}(\mathbf{a}_2 - r_{12}\mathbf{q}_1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

(4 pont)

Tehát a Q és R mátrixok a következők:

$$Q = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(1 pont)

5. Első lépésben a mátrix első oszlopát Householder-transzformációval $k \cdot \mathbf{e}_1$ alakra hozzuk. A numerikusan stabil számolás érdekében jó előjelet választunk $k = \sigma$ -nak.

$$\sigma = -\operatorname{sgn}(a_1) \cdot \|\mathbf{a}\|_2 = -\operatorname{sgn}(4) \cdot \sqrt{4^2 + 3^2} = -5$$

Kiszámoljuk a \mathbf{v} vektort.

$$\begin{aligned} \mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1 &= \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ \|\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1\|_2 &= \frac{\sqrt{10}}{3}, \\ \mathbf{v} &= \frac{\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1}{\|\mathbf{a} - \sigma \cdot \mathbf{e}_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(3 pont)

A mátrix első oszlopára nem kell alkalmaznunk a transzformációt, mert a konstrukció garantálja az eredményt.

Alkalmazzuk a transzformációt a második oszlopra:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_2 &= (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v} \mathbf{v}^T) \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2 - 2 \cdot \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v}^T \mathbf{a}_2) = \\ &= \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot (-5) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(3 pont)

Alkalmazzuk a transzformációt a jobb oldali vektorra:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{b} &= (\mathbf{I} - 2 \cdot \mathbf{v} \mathbf{v}^T) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} - 2 \cdot \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v}^T \mathbf{b}) = \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(3 pont)

Egy Householder-transzformációs lépés után a lineáris egyenletrendszer felsőháromszög alakú.

$$\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Visszahelyettesítéssel kapjuk a megoldást:

$$\begin{aligned} 2x_2 &= 4 \rightarrow x_2 = 2 \\ -5x_1 + x_2 &= -3 \rightarrow -5x_1 = -5 \rightarrow x_1 = 1 \end{aligned}$$

(1 pont)