


Grafos


Algoritmos y Estructuras de Datos III

Grafos todos los días




Red de subtes

Grafos todos los días



Rutas entre ciudades

Grafos todos los días



Molécula de penicilina


Grafos todos los días

deportexdeporte

por Luciana Bonomo


ATP Buenos Aires, febrero 2005

Entrevistas	1ra ronda	2da ronda	cuartos	semi	final
Notas	(3) Chela	López	Mantilla		
Entrevistas	(Q) López	Mantilla	Mantilla		
Audios	Mantilla	Mantilla	Mantilla		
Fútbol	Hernández	Mantilla	Mantilla		
Tenis	Ferrer	Mantilla	Mantilla		
Basquet	Martin	Mantilla	Mantilla		
Polideportivo	Corsetti	Mantilla	Mantilla		
	(3) Cañas	Mantilla	Mantilla		
	(7 WC) Nadal	Mantilla	Mantilla		
	Calleri	Mantilla	Mantilla		
	(WC) Massa	Mantilla	Mantilla		
	Starace	Mantilla	Mantilla		
	Montañés	Mantilla	Mantilla		
	Saretta	Mantilla	Mantilla		
	(Q) Luzzi	Mantilla	Mantilla		
	(2) Gaudio	Mantilla	Mantilla		



Torneo

Grafos todos los días



Redes sociales

El origen: Los puentes de Königsberg



Leonhard Euler (1707–1783)


El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ La ciudad de Königsberg (hoy Kaliningrado) tenía en el siglo XVIII siete puentes.
- ▶ Euler (1735) planteó (y resolvió) el problema de cruzar por todos ellos exactamente una vez y volver al punto de partida.




El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ L. Euler, *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis* (26 de Agosto de 1735) [E53].




El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ Euler mostró que el problema **no tiene solución** y dio una condición necesaria para el caso general.
- ▶ **Carl Hierholzer** (1840-1871) mostró en 1871 que esta condición es también suficiente, y formalizó la demostración.




El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ Euler mostró que el problema **no tiene solución** y dio una condición necesaria para el caso general.
- ▶ **Carl Hierholzer** (1840-1871) mostró en 1871 que esta condición es también suficiente, y formalizó la demostración.




El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ Euler mostró que el problema **no tiene solución** y dio una condición necesaria para el caso general.
- ▶ **Carl Hierholzer** (1840-1871) mostró en 1871 que esta condición es también suficiente, y formalizó la demostración.



Segundo acto: El problema del caballo

Definición. Un caballo de ajedrez debe visitar todas las casillas pasando **exactamente una vez** por cada una.




Segundo acto: El problema del caballo

- ▶ La referencia más temprana a este problema es del siglo IX.
- ▶ **Alexandre-Theophile Vandermonde** (1735–1796) estudió este problema, pero no encontró una solución.
 - ▶ A. Vandermonde, *Remarques sur des problèmes de situation*. Académie des Sciences (1771).
- ▶ El primer algoritmo (heurístico!) fue presentado en 1823. En términos modernos, es una heurística golosa que en cada paso se mueve al vecino de menor grado.
 - ▶ C. H. von Warnsdorf, *Des Rösselsprungs einfachste und allgemeinste Lösung* (1823).


Segundo acto: El problema del caballo

Este problema corresponde a encontrar un **circuito Hamiltoniano** en el siguiente grafo:



Segundo acto: El problema del caballo

Una **solución** para el caso de 8×8 :





Tercer acto: Más sobre grafos Hamiltonianos



Sir William Hamilton (1805–1865)


Tercer acto: Más sobre grafos Hamiltonianos

- ▶ Hamilton (1857) inventó el **juego icosiano**, que consiste en encontrar un camino que pase por todos los vértices de un **dodecaedro** y que retorne al punto de partida.




Tercer acto: Más sobre grafos Hamiltonianos

- ▶ Un recorrido con estas propiedades se llama actualmente **circuito hamiltoniano**, y para este caso particular se puede encontrar una solución.



La partida de nacimiento: Sylvester



James Sylvester (1814–1897)

El término **grafo** (graph) fue introducido en 1887 por Sylvester, en el contexto de análisis algebraico de estructuras moleculares.

El desafío: La conjetura de los cuatro colores

Conjetura. Todo mapa se puede colorear usando 4 colores, de modo tal que regiones adyacentes usen colores distintos.

- ▶ Las regiones deben ser **contiguas**.
- ▶ Dos regiones no se consideran adyacentes si sólo se intersectan en un punto.

El desafío: La conjetura de los cuatro colores




El desafío: La conjetura de los cuatro colores




El desafío: La conjetura de los cuatro colores



El desafío: La conjetura de los cuatro colores



El desafío: La conjetura de los cuatro colores



El desafío: La conjetura de los cuatro colores



El desafío: La conjetura de los cuatro colores

- ▶ August Möbius (1790–1868) conocía este problema, aunque es posible que no sea él mismo quien lo haya propuesto por primera vez.
- ▶ Francis Guthrie (1831–1899) **redescubrió la conjetura** mientras coloreaba un mapa de Inglaterra, y su hermano la comunicó a Augustus De Morgan (1806–1871).
- ▶ Alfred Kempe (1849–1922) dio una demostración en 1879, pero Percy Heawood (1861–1955) encontró en 1890 un error. Al mismo tiempo, demostró el **teorema de los cinco colores**.
- ▶ Oystein Ore (1899–1968) y Joel Stemple mostraron en 1969 que la conjetura es cierta para todos los mapas de **hasta 40 regiones**.
- ▶ Kenneth May, *The origin of the four-color conjecture*. Isis 56 (1965) 346–348.

El desafío: La conjetura de los cuatro colores

- ▶ La primera **demostración** fue dada en 1976 por Kenneth Appel (1932–) y Wolfgang Haken (1928–).
- ▶ Appel y Haken redujeron todos los contraejemplos posibles a **1936 contraejemplos minimales**.
- ▶ Utilizando un **programa de computadora**, verificaron que todos esos posibles contraejemplos se pueden colorear con cuatro colores.
- ▶ **Estado actual:** Algoritmo $O(n^2)$ para colorear un mapa con 4 colores (N. Robertson, D. Sanders, P. Seymour y R. Thomas, 1996).
- ▶ Demostración simplificada con **633 configuraciones minimales**.

Grafos

Definiciones:

- ▶ Un **grafo** $G = (V, X)$ es un par de conjuntos, donde V es un conjunto de **puntos** o **nodos** o **vértices** y X es un subconjunto del conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de V .
- ▶ Los elementos de X se llaman **aristas**, **ejes** o **arcos**.
- ▶ Dados v y $w \in V$, si $e = (v, w) \in X$ se dice que v y w son **adyacentes** y que e es **incidente** a v y w .

Notación: $n = |V|$ y $m = |X|$

Multigrafos y pseudografos

Definiciones:

- ▶ Un **multigrafo** es un grafo en el que puede haber varias aristas entre el mismo par de nodos distintos.
- ▶ Un **pseudografo** es un grafo en el que puede haber varias aristas entre cada par de nodos y también puede haber aristas (*loops*) que unan a un nodo con sí mismo.

Definiciones de acuerdo a la nomenclatura del libro de Harary.

Grafos

Definiciones:

- ▶ El **grado** de un nodo v es la cantidad de aristas incidentes a v .

Notación: $d(v)$ es el grado de v .

Teorema:

La suma de los grados de los nodos de un grafo es igual a 2 veces el número de aristas, es decir

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m$$

Grafos

Definiciones:

- Un grafo se dice **completo** si todos los nodos son adyacentes entre sí.

Notación: K_n es el grafo completo de n nodos.

- Dado un grafo $G = (V, X)$, el grafo **complemento** tiene el mismo conjunto de nodos y un par de nodos son adyacente si y solo si no son adyacentes en G .

Notación: \bar{G} es el grafo complemento de G .

¿Cuántas aristas tiene un grafo completo de n nodos?

Si G tiene n nodos y m aristas, ¿cuántas aristas tiene \bar{G} ?

Caminos y circuitos

Definiciones:

- Un **camino** en un grafo es una sucesión de aristas $e_1 e_2 \dots e_k$ tal que un extremo de e_i coincide con uno de e_{i-1} y el otro con uno de e_{i+1} para $i = 2, \dots, k-1$.

Hay otras formas de definir un camino...

- Un **camino simple** es un camino que no pasa dos veces por el mismo nodo.
- Un **circuito** es un camino que empieza y termina en el mismo nodo.
- Un **circuito simple** es un circuito de 3 o más nodos que no pasa dos veces por el mismo nodo.

Distancia

Definiciones:

- La **longitud** de un camino es la cantidad de aristas que tiene ese camino.
- La **distancia** entre dos nodos v y w de un grafo se define como la longitud del camino más corto entre v y w .

Notación: $d(v, w)$ denota la distancia entre v y w .

- Para todo nodo v , $d(v, v) = 0$.
- Si no existe camino entre v y w se dice que $d(v, w) = \infty$.

Proposición: Si un camino P entre v y w tiene longitud $d(v, w)$, P debe ser un camino simple.

Distancia

Proposición:

La función de distancia cumple las siguientes propiedades para todo u, v, w pertenecientes a V :

- $d(u, v) \geq 0$ y $d(u, v) = 0$ si y sólo si $u = v$.
- $d(u, v) = d(v, u)$.
- $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

Subgrafos

Definiciones:

- ▶ Un grafo se dice **conexo** si existe un camino entre todo par de nodos.
- ▶ Dado un grafo $G = (V, X)$, un **subgrafo** de G es un grafo $H = (V', X')$ tal que $V' \subseteq V$ y $X' \subseteq X \cap (V' \times V')$.
- ▶ Un subgrafo $H = (V', X')$ de $G = (V, X)$, es un **subgrafo inducido** si para todo par de nodos $u, v \in V'$, $(u, v) \in X \iff (u, v) \in X'$.
- ▶ Una **componente conexa** de un grafo G es un subgrafo conexo maximal de G .

Grafos bipartitos

Definiciones:

- ▶ Un grafo $G = (V, X)$ se dice **bipartito** si existe una partición V_1, V_2 del conjunto de nodos V tal que:

$$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset, \quad V_1 \neq \emptyset, \quad V_2 \neq \emptyset$$

y tal que todas las aristas de G tienen un extremo en V_1 y otro en V_2 .

- ▶ Un grafo bipartito con partición V_1, V_2 , es **bipartito completo** si todo nodo en V_1 es adyacente a todo nodo en V_2 .

Teorema:

Un grafo G con 2 o más nodos es bipartito si y sólo si no tiene circuitos simples de longitud impar.

Isomorfismo

Definiciones:

- ▶ Dados dos grafos $G = (V, X)$ y $G' = (V', X')$ se dicen **isomorfos** si existe una función biyectiva $f : V \rightarrow V'$ tal que para todo $v, w \in V$:

$$(v, w) \in X \iff (f(v), f(w)) \in X'.$$

Isomorfismo

Proposición:

Si dos grafos $G = (V, X)$ y $G' = (V', X')$ son isomorfos, entonces

- ▶ tienen el mismo número de nodos,
- ▶ tienen el mismo número de aristas,
- ▶ para todo $k, 0 \leq k \leq n - 1$, tienen el mismo número de nodos de grado k ,
- ▶ tienen el mismo número de componentes conexas,
- ▶ para todo $k, 1 \leq k \leq n - 1$, tienen el mismo número de caminos simples de longitud k .

Isomorfismo

¿Es cierta la recíproca de esta propiedad?

¿Hay condiciones necesarias y suficientes fácilmente verificables para ver si dos grafos son isomorfos?

Representación de grafos

Representación de grafos en la computadora

- ▶ Matrices
- ▶ Listas

Representación de grafos

Matriz de adyacencia de un grafo

$A \in R^{n \times n}$, donde los elementos a_{ij} de A se definen como:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } G \text{ tiene una aristas entre los nodos } i \text{ y } j \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Representación de grafos

Matriz de incidencia de un grafo

$B \in R^{m \times n}$, donde los elementos b_{ij} de B se definen como:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si la aristas } i \text{ es incidente al nodo } j \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Representación de grafos

Teorema:

Si A es la matriz de adyacencia del grafo G , el elemento a_{ij}^k de A^k es igual a la cantidad de caminos de longitud k entre i y j .

Corolario:

$$a_{ii}^2 = d(v_i).$$

Digrafos

Definiciones:

- ▶ Un **grafo orientado** o **digrafo** $G = (V, X)$ es un par de conjuntos V y X donde V es el conjunto de puntos, nodos o vértices y X es un subconjunto del conjunto de los pares **ordenados** de elementos distintos de V .
- ▶ El **grado de entrada** $d_{in}(v)$ de un nodo v de un grafo orientado es la cantidad de arcos que *llegan* a v . Es decir, la cantidad de arcos que tienen a v como segundo elemento.
- ▶ El **grado de salida** $d_{out}(v)$ de un nodo v de un grafo orientado es la cantidad de arcos que *salen* de v . Es decir, la cantidad de arcos que tienen a v como primer elemento.

Digrafos

Definiciones:

- ▶ Un **camino orientado** en un grafo orientado es una sucesión de arcos $e_1 e_2 \dots e_k$ tal que el primer elemento del par e_i coincide con el segundo de e_{i-1} y el segundo elemento de e_i con el primero de e_{i+1} $i = 2, \dots, k - 1$.
- ▶ Un **cicuito orientado** en un grafo orientado es un camino orientado que comienza y termina en el mismo nodo.
- ▶ Un digrafo se dice **fuertemente conexo** si para todo par de nodos u, v existe un camino orientado de u a v y otro de v a u .